



تصویر ابو عبد الرحمن کردی



نجوم و فضا

فرهنگ‌نامه‌ی



منتدى اقرأ الثقافي

www.iqra.ahlamontada.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نجوم و فضا

فرهنگ نامہی



فهرست



تاریخ نجوم

- نجوم در دوران باستان ۶
- نجوم اسلامی - ایرانی ۸
- تاریخچه ابزارهای نجومی ۱۰

مشاهده کیهان

- تلسکوپ فضایی هابل ۱۴
- شاهکارهای هابل ۱۶
- تلسکوپ چگونه کار می‌کند؟ ۱۸
- رصدخانه‌ها ۲۰
- طرح‌های جدید و بزرگ‌ترین رصدخانه‌های جهان ۲۲
- تحلیل نور ۲۴
- تابش‌هایی از فضا ۲۶
- اخترشناسی فروسرخ ۲۸
- اخترشناسی رادیویی ۳۰
- اخترشناسی فرابنفش ۳۲
- اخترشناسی پرتو ایکس ۳۴
- اخترشناسی پرتو گاما ۳۶
- جلوه‌هایی از اخترشناسی نامرئی ۳۸
- تلسکوپ‌های عجیب ۴۰

کاوش فضا

- موشک‌ها چگونه کار می‌کنند؟ ۴۴
- پیش‌رانش موشک ۴۶



- پرتاب‌گرهای فضایی ۴۸
- مراکز پرتاب ۵۰
- شمارش معکوس ۵۲
- ماهواره‌ها و مدارها ۵۴
- سازمان‌های فضایی و جایگاه ایران ۵۶
- ماهواره‌های مخابراتی ۵۸
- ماهواره‌های ناوبری ۶۰
- ماهواره‌های هواشناسی ۶۲
- ماهواره‌های منابع زمینی ۶۴
- ماهواره‌های نظامی ۶۶
- پس‌مانده‌های فضایی ۶۸
- پرواز به فضا ۷۰
- حرفه‌ی فضانوردی ۷۲
- ساتل فضایی ۷۴
- سفرساتل فضایی ۷۶
- زندگی در فضا ۷۸
- علم در فضا ۸۰



- ایستگاه فضایی بین‌المللی ۸۲
- فضاپیماهای مداری آینده ۸۴
- نسل جدید موشک‌های چند مرحله‌ای ۸۶
- سفر میان سیاره‌ای ۸۸
- ناوهای فضایی آینده: سفر به ستاره‌ها ۹۰

سیاره‌ها و قمرها

- منظومه‌ی شمسی ۹۴
- کاوش‌گرهایی به سوی سیاره‌ها ۹۶
- کاوش‌گران منظومه‌ی شمسی ۹۸
- تولد منظومه‌ی شمسی ۱۰۰

زمین ۱۰۲

- سطح زمین ۱۰۴
- جو زمین ۱۰۶
- سیاره‌ی زنده ۱۰۸
- ماه ۱۱۰
- تأثیرات ماه ۱۱۲
- سطح ماه ۱۱۴
- کاوش ماه ۱۱۶
- سمت نزدیک ماه ۱۱۸
- سمت دور ماه ۱۲۰
- عطارد (تیر) ۱۲۲
- سطح عطارد ۱۲۴
- زهره (ناهید) ۱۲۶
- جو زهره ۱۲۸
- سطح زهره ۱۳۰
- مریخ (بهرام) ۱۳۲
- جست‌وجوی حیات در مریخ ۱۳۴
- کاوش در مریخ ۱۳۶
- روبات‌ها، مقدمه‌ی سفر انسان به مریخ ۱۳۸
- سطح مریخ ۴۰
- مشتري ۱۴۲
- جو مشتري ۱۴۴
- قمرهای مشتري
- زحل ۱۴۸
- حلقه‌های زحل
- قمرهای زحل ۲
- اورانوس ۱۵۴
- نپتون ۱۵۶



نجوم و فضا



سرپرستار علمی: بابک امین تفرشی
مترجم: شادی حامدی آزاد

نویسندگان و مترجمان همکار: پوریا ناظمی، آیرین شیوایی

ویراستار ادبی: ترانه امیرابراهیمی

عکاسان داخلی: بابک امین تفرشی، آشین دانیلی‌ذکریان، هاتف همایی،

امیرحسین ابوالفتح، علیرضا وفا، همایون امیریگانه

تصویرگران داخلی: الهام محبوب، فرهاد جمشیدی، امیر نساجی

همه‌ی حقوق چاپ و نشر فرهنگ‌نامه‌ی نجوم، برای نشر طلایی محفوظ است. هرگونه بهره‌برداری از این اثر، به اجازه‌ی ناشر نیاز دارد.

سرشناسه:

کوپر، هیتر، ۱۹۴۹ - ۳ - Couper, Heather

عنوان و نام پدیدآور:

فرهنگ‌نامه‌ی نجوم و فضا / نویسندگان هیتر کوپر، نایجل هنبست؛ مترجم شادی حامدی آزاد.

مشخصات نشر:

تهران: طلایی، ۱۳۸۸.

مشخصات ظاهری:

۳۲۰ ص: مصور (رنگی)

شابک:

۹۷۸-۹۶۴-۹۶۴۰۷-۹-۲

وضعیت فهرست نویسی:

فیبا

یادداشت:

عنوان اصلی: space encyclopedia

یادداشت:

کتابنامه

موضوع:

نجوم -- دایرةالمعارف‌های کودکان و نوجوانان

موضوع:

نجوم فضایی -- دایرةالمعارف‌های کودکان و نوجوانان

شناسه افزوده:

هنبست، نایجل

شناسه افزوده:

Henbest, Nigel

شناسه افزوده:

حامدی آزاد، شادی، مترجم ۱۳۵۹-

رده بندی کنگره:

QB۱۴/ک۹۴۳ ۱۳۸۸

رده بندی دیویی:

۵۲۰

شماره کتابشناسی ملی:

۱۹۲۰۰۴۶

نشر طلایی

مدیر تولید و برنامه‌ریز: کاظم طلایی

مشاور محتوایی: منصور ملک‌عباسی

مدیر هنری: کاظم طلایی

صفحه آرا: مرضیه افشاری‌پور

نمایه‌ی موضوعی: مریم یعقوبی

اسکن تصاویر: هدایت اسکندر

لیتوگرافی: ندای دانش

چاپ: پنج رنگ

صحافی: آفرنگ

شمارگان: ۸۰۰ نسخه

چاپ اول: زمستان ۱۳۸۸

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۹۶۴۰۷-۹-۲

تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۱۱۵۷۵، ۸۸۸۳۱۶۳

تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۰۱۶۴۱۹

nashre.talaee@gmail.com www.talaee.ir

کهکشان‌ها و ورای آن‌ها

راه شیری ۲۱۴

فضای میان‌ستاره‌ای ۲۱۶

همسایگان محلی ما ۲۱۸

بازوی برساوش ۲۲۰

بازوی قوس ۲۲۲

قلب راه شیری ۲۲۴

ابره‌های ماژلان ۲۲۶

گروه محلی ۲۲۸

کهکشان‌ها ۲۳۰

کهکشان‌های برخوردی ۲۳۲

خوشه‌های کهکشانی ۲۳۴

کهکشان‌های فعال ۲۳۶

مقیاس کیهان ۲۳۸

انبساط کیهان ۲۴۰

مهبانگ ۲۴۲

نخستین ۳ دقیقه ۲۴۴

پژواک مهبانگ ۲۴۶

شکل‌گیری کهکشان‌ها ۲۴۸

ماده‌ی تاریک ۲۵۰

شکل فضا ۲۵۲

آینده‌ی دور ۲۵۴

حیات در دنیا‌های دیگر ۲۵۶

هوش‌مندان فرازمینی ۲۵۸

اخترشناسی آماتوری

زمین چرخان ۲۶۲

مدار زمین ۲۶۴

پلوتون ۱۵۸

اعضای خُرد ۱۶۰

دنباله‌دارها ۱۶۲

شهاب‌ها ۱۶۴

سیارک‌ها ۱۶۶

شهاب‌سنگ‌ها ۱۶۸

برخوردها ۱۷۰

ستارگان

درون خورشید ۱۷۴

سطح خورشید ۱۷۶

جَو خورشید ۱۷۸

گرفت‌های خورشید ۱۸۰

اندازه‌های ستاره‌ها ۱۸۲

ستاره‌های متغیر ۱۸۴

ستاره‌ها چه قدر دورند؟ ۱۸۶

ویژگی‌های ستاره‌ها ۱۸۸

چرخه‌ی زندگی ستاره‌ها ۱۹۰

جایی که ستاره‌ها متولد می‌شوند ۱۹۲

خوشه‌ها و دوتایی‌ها ۱۹۴

خوشه‌های کروی ۱۹۶

دیگر منظومه‌های شمسی ۱۹۸

غول‌های سرخ ۲۰۰


سحابی‌های سیاره‌نما ۲۰۲

آبرناوخترا ۲۰۴

ستاره‌های نوترونی ۲۰۶

سیاه‌چاله‌ها ۲۰۸

درون سیاه‌چاله ۲۱۰



گاه‌شمار نجوم و فضا

نام‌آوران نجوم و فضا

واژه‌نامه

نمایه‌ی موضوعی

کاوش در اینترنت



مقدمه

اخترشناسی یا نجوم، دنیای پررمز و رازی است که به‌ظاهر، با زندگی روزمره‌ی ما ارتباطی ندارد و فقط ذهن‌های کنج‌کاو را به خود جلب می‌کند. اما زمین و هرچه در این سیاره‌ی خُرد است، با کیهان عظیم اطراف آن ارتباط دارد. در حالی که جایی آرام نشسته‌اید و این نوشته را می‌خوانید، با سرعتی بیش‌تر از هواپیمای جت در حال چرخش به دور مرکز زمین هستید. از سوی دیگر، زمین ما را با سرعتی صد برابر تندتر از سرعت صوت، در فضا به دور خورشید می‌گرداند!

اما این پایان ماجرا نیست؛ خورشید نیز در سفر کهکشانی خود، سیاره‌ها، زمین و تمام ما را با سرعت حدود ۳۰۰ کیلومتر بر ثانیه، دور مرکز راه شیری می‌گرداند. تصور کنید که در یک دقیقه‌ای که این نوشته را خوانده‌اید، بیش از فاصله‌ی تهران تا قطب جنوب را پیموده‌اید و اگر فقط ۲۰ دقیقه صبر کنید، فاصله‌ی زمین تا ماه را در فضا طی می‌کنید. در حقیقت، ما در هر شبانه‌روز از زندگی خود، ۳۶ بار از زمین به ماه می‌رویم و برمی‌گردیم!

اخترشناسی امروز به دنبال پاسخ برخی از بنیادی‌ترین پرسش‌های انسان است. آیا ما در کیهان تنها هستیم؟ زمین، منظومه‌ی شمسی و کهکشان ما چگونه در تاریخ کیهانی به‌وجود آمده‌اند؟ در فضای بی‌کران، جایگاه زمین کجاست؟

آشنایی با مبانی نجوم، رصد آسمان شب و معرفی مرزهای دانش اخترشناسی، هدف ما برای تهیه‌ی این فرهنگ‌نامه بود. تغییرها و اکتشاف‌ها در نجوم، با چنان سرعتی در دنیای تلسکوپ‌های عظیم و کاوشگرهای فضایی امروز رخ می‌دهد که منابع آموزشی به‌روز نیاز است.

گروه نویسندگان و مترجمان این اثر نیز کوشیده‌اند تازه‌ترین روی‌دادهای اخترشناسی را در این فرهنگ‌نامه منعکس کنند. این اثر بر مبنای تازه‌ترین نسخه‌ی فرهنگ‌نامه‌ی فضا (Encyclopedia of Space) از انتشارات DK تنظیم شده است. علاوه بر ترجمه، مطالب مربوط به کاوش‌های فضایی و یافته‌های اخترشناسی در چند سال اخیر به کتاب افزوده شده‌است. فصل تاریخ نجوم و چند بخش جدید نیز تألیف و به اصل کتاب افزوده شد. از سوی دیگر، با معرفی اخترشناسان ایرانی امروز و گذشته و استفاده از تصاویر دیدنی از آسمان، که در ایران تهیه شده‌اند، کوشیده‌ایم ارتباط بیش‌تری بین علم اخترشناسی و جامعه‌ی ایرانی برقرار کنیم.



تاریخ نجوم

کاوش‌گرهایی که به دنیاهایی در ورای زمین سفر می‌کنند، تلسکوپ‌های غول‌پیکری که میلیارد‌ها سال نوری در اعماق کیهان نفوذ می‌کنند، اخترشناسان و روش‌هایی که از یک باریکه‌ی کم‌سوی نور شناسنامه‌ی فیزیکی و شیمیایی ستاره‌های دوردست را به دست می‌آورند، کیهان‌شناسانی که ابتدای پیدایش عالم را شبیه‌سازی و آینده‌ی کهکشان‌ها را بر اساس مدل‌های علمی پیش‌بینی می‌کنند. همه‌ی این دستاوردهای شگفت اخترشناسی امروز، که بر دوش منجمان بزرگی در تاریخ جهان نشسته، پله‌ای از نردبانی است که هزاران سال پیش با نخستین کنجکاوی‌های ابتدایی انسان در آسمان شب آغاز شد. اخترشناسی اولیه با باورها و اسطوره‌های کهن شکل گرفت. دلیل پدیده‌های سماوی حیرت‌انگیز، خدایانی در آسمان دانسته می‌شد که قدرت افلاک را در دست داشتند و پیش‌گویی‌هایی که از راز آن‌ها سر در می‌آوردند، به طالع‌بینی می‌پرداختند. به مرور، اخترشناسی علمی مسیر خود را از اختربینی جدا کرد و رصدهای دقیق، روش‌های ریاضی، ابزارهای علمی و قوانین فیزیک پایه‌های اصلی نجوم امروز شد.

نجوم در دوران باستان



بی‌گمان توجه انسان به آسمان شب، خورشید و ماه از هزاران سال پیش و حتی در دوران غارنشینی آغاز شده است. اما از زمانی که انسان دشت‌نشین و کشاورزپیشه شد، به تقویم نیاز پیدا کرد و دانش نجوم از همان دوره پا گرفت. انسان برای زمان‌سنجی، به رصد اهله‌ی ماه پرداخت و صورت‌های فلکی را ابداع کرد تا نشان‌دهنده‌ی محل خورشید در آغاز فصل‌های سال باشد. کم‌کم، با توجه بیش‌تر به آسمان، صورت‌های فلکی بیش‌تری ابداع شد و پدیده‌های آسمان مورد توجه نخستین اخترشناسان باستان قرار گرفت. نقش روی سفال‌ها و مهرهای قدیمی حاکی از آن است که دست‌کم، از حدود ۶ هزار سال پیش، برخی صورت‌های فلکی منطقه‌البروج در میان‌رودان (شامل جنوب غرب ایران) شناخته شده بود. حدود ۵ هزار سال پیش، در ساختار هرم‌های بزرگ مصر، نشانه‌هایی از توجه عمیق به آسمان دیده شد. در هزاره‌ی سوم پیش از میلاد، اقوام آمریکای مرکزی رصدگران دقیقی بودند و در همان دوره، در بابل و امپراتوری هخامنشی، نجوم در اوج شکوفایی بود. با رشد علم در یونان باستان، بیش از ۲ هزار سال پیش دوره‌ی جدیدی از اخترشناسی آغاز شد و از حدود یک هزاره پیش، در اوج دوره‌ی شکوفایی علم در جامعه‌ی مسلمانان، منجمان ایرانی و عرب بسیاری به تحقیق، ساخت ابزار و رصدخانه و ارائه‌ی جداول دقیق نجومی پرداختند. دانش این دوره، انقلاب نجوم کوپرنیکی را در اروپا پایه‌گذاری کرد.



در هرم بزرگ جیزه، تونلی یافت شده که در امتداد ستاره‌ی قطبی ۴۸۰۰ سال پیش ساخته شده است.

کاهنان مصری

آنچه از برخی نقاشی‌های دیواری در معابد و هرم‌های مصر برجای مانده، نشان‌دهنده‌ی آن است که کاهنان یا روحانیان مصری، رصدگران دقیقی بودند که برای پادشاه و جهت پیش‌گویی روی‌دادها، به رصد می‌پرداختند. آن‌ها زمان طغیان رود نیل را با طلوع صبح‌گاهی ستاره‌ی شباهنگ حدس می‌زدند. زیرا در آن هنگام، نیمه‌ی تابستان و فصل خشک به پایان می‌رسید. هرم بزرگ جیزه، که ساخت آن ۴۸۰۰ سال پیش شروع شد، تونلی دارد که از محل آرامگاه مرکزی هرم شروع می‌شود و رو به ستاره‌ی قطبی آن زمان (ثعبان در صورت فلکی اژدها)، امتداد می‌یابد.

رصدگران بابل

روی دو لوح گلی پخته، مربوط به حدود ۷۰۰ سال پیش از میلاد که در تمدن بابلی (جایی که عراق امروز قرار دارد) یافت شده، اطلاعات کاملی از حرکت ستاره‌ها و سیاره‌ها ثبت شده است. فهرستی از ستاره‌ها و صورت‌های فلکی شناخته‌شده‌ی آن زمان، نشانه‌ی روشنی از وجود پشتوانه و سستی بسیار غنی از رصد آسمان به‌همت بابلی‌هاست. برخی صور فلکی تا این روزگار حفظ شده و به دست ما رسیده است. بابلی‌ها میراث بزرگ دیگری نیز در تاریخ نجوم دارند و آن تقسیم مدت یک سال به ۳۶۰ روز است. با ظهور امپراتوری هخامنشی و گسترش آن به بابل، مغان ایرانی (پیروان حضرت نوح علیه السلام) نیز، که منجمانی توانا بودند، به رصدگران بابلی پیوستند و دوره‌ی شکوفایی نجوم منطقه فراسید.



کتیبه‌ای با قدمت بیش از ۲ هزار سال از بابل که به ظهور دنباله‌مداری اشاره کرده که همان دنباله‌مدار دوره‌ای هالی است.

تحول یونانی

در اواسط هزاره‌ی اول پیش از میلاد، با رشد تمدن یونانی و انتقال تدریجی دانش مصر و میان‌رودان و ایران به آن‌جا، دانش دوران باستان به تحولی بزرگ رسید. برخلاف بابلی‌ها، که نجوم را بیش‌تر برای کاربرد آن در پیش‌گویی آینده (اختربینی) مطالعه می‌کردند، یونانیان در پی یافتن اصول کلی و قوانین فیزیکی بودند که بر حرکت‌های عالم حکم می‌راند. به این سبب، آنان فلسفه را با علم درآمیختند. ارسطو در قرن چهارم پیش از میلاد، نظامی برای کارکرد جهان و پدیده‌های آن بیان کرد که بر پایه‌ی افلاکی بی‌تغییر و لایه‌لایه بر گرد زمین بود. آبرئس در قرن دوم پیش از میلاد، فهرستی از ۸۵۰ ستاره‌ی رصدشده ارائه داد و نخستین ستاره‌ها را بر اساس روشنایی مرتب کرد که مبنای دستگاه قدرسنجی ستاره‌ها در نجوم شد. حدود سیصد سال بعد، در قرن دوم میلادی، منجم مصری - یونانی، بطلمیوس، مهم‌ترین کتاب نجوم دوران باستان را نوشت. کتاب مجسطی قرن‌ها منبع اصلی منجمان بود و مدل زمین‌مرکزی بطلمیوس تا دوران کوپرنیک، یعنی ۱۴ قرن، مبنای اصلی بود.





بنای ۳۲۰۰ ساله زیگورات چغازنبیل در نزدیکی شوش (خوزستان). برخی محققان عقیده دارند کاهنان دوران باستان، از فراز این زیگورات‌ها آسمان را رصد می‌کردند.

نجوم در ایران باستان

متن‌های باقی‌مانده از دوران کهن ایران، از رشد دانش ستاره‌شناسی در این زمان نشان دارد. گذشته از برخی افسانه‌های کهن در متونی مانند شاهنامه‌ی فردوسی، که به برخی ابزارهای رصدی پیش‌رفته نظیر جام جمشید اشاره دارند، می‌توان در بسیاری از متون مقدس تاریخی در این زمینه، نشانه‌های آشکاری یافت. در فصل یشت‌های آوستا و به‌ویژه در فصل تیشتر یشت، علاوه بر ارائه‌ی تقسیم‌بندی دقیقی از ستاره‌ها و سیاره‌ها، به برخی پدیده‌ها مانند بارش‌های شهاب نیز اشاره شده است. وجود بناهایی مانند تخت تاقدیس (احتمالاً نخستین آسمان‌نما در جهان)، امروزه از مرز افسانه خارج شده است و پژوهش‌های باستان‌شناختی در زمینه‌ی آن‌ها صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، بخش زیادی از سنت نجوم دوران باستانی ایران، که مربوط به امپراتوری هخامنشی و پس از فتح بابل به‌دست ایرانیان است، در رده‌ی دست‌آوردهای نجوم بابل طبقه‌بندی شده است. در این دوره‌ی ایرانی - بابلی، افرادی مانند نبوریمانی به فعالیت پرداختند که مطالعات دقیقی درباره‌ی طول سال و محاسبه‌ی چرخه‌ی گرفت‌ها داشت. ضمن این‌که به سبب باورهای آیینی، تقریباً همه‌ی بناهای مذهبی کاربری نجومی یا دست کم تقویمی داشتند و طبقات بالای روحانیان باید دانش کاملی از ستاره‌شناسی می‌داشتند و همه‌ی این‌ها بخشی از اسرار هنوز کاوش‌نشده‌ی تمدن‌های باستانی این منطقه از جهان است.

نجوم چینی

سنت اخترشناسی چین، به هزاره‌ی دوم پیش از میلاد می‌رسد و امروزه کمتر از آن صحبت می‌شود. اما نجوم در چین پشته‌ای و اسناد بسیار محکمی دارد. در چین باستان، محاسبات دقیقی از دوره‌های گرفت خورشید و ماه انجام می‌شد و چینی‌ها از صورت‌های فلکی ویژه‌ی خود استفاده می‌کردند. رسم نقشه‌های دقیق از ستاره‌ها، یکی دیگر از پیش‌گامی‌های چینیان به‌شمار می‌رود؛ به همین دلیل، یکی از قدیمی‌ترین نقشه‌های چاپی از ستاره‌ها به نام سوسانگ، متعلق به چینیان و مربوط به سال‌های حدود ۱۰۹۲ میلادی است. چینیان در رصد و ثبت دنباله‌دارها و جرم‌های نوظهور آسمان، پیشینه‌ای طولانی داشتند و یکی از دقیق‌ترین ثبت‌ها از ابرنواختر ۱۰۵۴ میلادی در صورت فلکی ثور را انجام دادند؛ ابرنواختری که امروزه بقایای آن در قالب سحابی خرچنگ شناخته می‌شود. به‌علاوه، آنان رصدخانه‌ی تاریخی پکن را بر مبنای طرح رصدخانه‌ی مراغه بنا نهادند و ابزارهای نجومی بسیاری مانند کروی سماوی ساختند که در طول تاریخ نجوم چین تحول فراوانی یافت.

یک نقشه‌ی آسمان از متجمان قدیم چین



نجوم در آمریکای مرکزی

یکی از بارزترین ویژگی‌های تمدن‌های بومی آمریکای شمالی و آمریکای مرکزی، توجه و وابستگی آن‌ها به جهان ستارگان است. بسیاری از این اقوام، مانند سرخ‌پوستان اینکا، شاه خود را فرزند خورشید می‌دانستند و معمولاً در ساخت بناها و عبادت‌گاه‌های خود جهت‌گیری‌های نجومی را رعایت می‌کردند. آن‌ها به رصد دقیق سیاره‌ی زهره نیز می‌پرداختند. تقویم پیچیده‌ی مایاها و بناهای مبتنی بر دیدگاه آن‌ها از ستاره‌ها، نمونه‌هایی از دست‌آوردهای این سرخ‌پوستان به‌شمار می‌رود که جلوه‌ای از آن‌ها را می‌توان در اساطیر این منطقه یافت؛ بناهایی مانند هرم چچن ایتزا در مکزیک از جمله بناهایی با کاربرد نجومی است.

زیگورات‌های سنگی مانند این بنا در مکزیک، رصدگاه‌های کهن آمریکای مرکزی بودند.



نجوم اسلامی - ایرانی

در تاریخ کلاسیک روایت می‌شود که ایرانیان و مسلمانان، فقط مترجمان آثار یونانی به‌شمار می‌روند که این آثار را در قرون وسطی حفظ کردند و آن‌را به اروپاییان بازگرداندند. اما برخلاف آن، باید دانشمندان دوره‌ی ایرانی - اسلامی را دانشمندانی مبتکر و خلاق دانست که در کنار ترجمه، برای پیش‌برد دانش ستاره‌شناسی بر مبنای اصول علمی زمان خود می‌کوشیدند. وابستگی بسیاری از شعایر دینی مسلمانان به محاسبات نجومی، باعث رشد حیرت‌انگیز هیئت و ابزارهای کاربردی، مانند اسطرلاب‌ها و ساعت‌های آفتابی میان آنان شد و رصدخانه‌ی علمی را به جهانیان معرفی کردند. سنت زیج‌نویسی، که از پیش از اسلام باقی مانده بود، در این دوره به اوج رسید و زیج‌های کهن و کارآمدی تألیف شد که هنوز هم دربردارنده‌ی ارزش‌های فراوانی است (زیج، جداول نجومی حاصل سال‌ها رصد و محاسبه است که مانند تقویمی برای پیش‌بینی وضعیت ماه، خورشید و سیاره‌ها به‌کار می‌رفت).



یکی از رصدخانه‌های دوران نجوم اسلامی


برخی منجمان مشهور دوره‌ی اسلامی

عبدالرحمن صوفی رازی: دانشمند بزرگ ایرانی قرن دهم میلادی که در زمان آل بویه، رصدخانه‌ی بزرگی در شیراز تأسیس کرد. او کتاب مجسطی بطلمیوس و جداول ستاره‌ای آن‌را اصلاح کرد و توانست صور فلکی جدیدی، مانند صورت فلکی ققنوس، در آسمان رصد کند. او از نخستین منجمانی بود که به ماهیت متفاوت برخی جرم‌های سماوی پی برد و آن‌ها را سحابی نامید. از او فهرستی از ۹ جرم غیر ستاره‌ای برجای مانده که کهکشان سلسله یا آندرومدا از معروف‌ترین جرم‌های این مجموعه است. عبدالرحمن نخستین بار به ابر بزرگ ماژلان اشاره کرد. اثر بزرگ او، صورالکواکب، قرن‌ها از منابع اصلی منجمان در شناخت آسمان و تعیین جایگاه ستاره‌ها بود.



کتاب صور الکواکب نوشته‌ی صوفی رازی

ابوریحان بیرونی: دانشمند جامع‌الاطراف که در خوارزم زاده شد و هم‌عصر دانشمندانی چون ابوالوفای بوزجانی و ابوعلی سینا بود و بیش‌تر آثارش در حوزه‌ی نجوم و ریاضیات است. او روش جدیدی برای اندازه‌گیری شعاع زمین ارائه کرد که نتیجه‌ای بسیار دقیق‌تر از روش معمول اراتستن به‌دست می‌داد. ابوریحان همراه با ابوالوفای بوزجانی، با رصد هم‌زمان یک ماه‌گرفتگی، به تعیین تفاوت طول جغرافیایی دو منطقه‌ی متفاوت دست زد و برای افزایش دقت رؤیت هلال ماه و جهت‌یابی، چند ابزار نجومی ابداع کرد. از آثار بزرگ بیرونی کتاب التفهیم و قانون مسعودی است که فراتر از یک زیج ساده دایرةالمعارفی کامل از دانش نجوم دوره‌ی اسلامی به‌شمار می‌رود.



طرحی از ابوریحان بیرونی که چگونگی اهلی ماه را توضیح می‌دهد.

خواجه نصیرالدین توسی: این ریاضی‌دان و اخترشناس شهر ایرانی، در قرن سیزدهم میلادی

می‌زیست. او را باید یکی از پیش‌گامان علمی زمان خود به‌شمار آورد که در تحلیل حرکت سیاره‌ها، مکتب جدیدی بنا نهاد. خواجه نصیر توسی توانست حمایت لازم را برای ساخت رصدخانه‌ی مراغه جلب کند و یکی از بزرگ‌ترین مراکز علمی جهان را بنیان نهد که از پکن گرفته تا رصدخانه‌ی تیکو در اروپا، از آن الگوبرداری شد. او نظریه‌ای مطرح کرد که به همراه توضیحات و تکمله‌های شاگردان و همکارانش، به مکتبی در نجوم تبدیل شد که به مکتب مراغه معروف است و از آن به دوره‌ی پیش از کوپرنیک نیز یاد می‌شود. توسی با درک مشکلات نظریه‌ی بطلمیوس حاکم بر دیدگاه فکری آن زمان، نظریه‌ای درباره‌ی حرکت سیاره‌ها در منظومه‌ی شمسی مطرح کرد که از مدل زمین‌مرکزی دور می‌شد و یک گام تا نظریه‌ی خورشیدمرکزی فاصله داشت. این نظریه، که به جفت توسی معروف است، مرکزیت حرکت را از زمین می‌گرفت. دیگر دانشمندان مکتب مراغه نیز نقدهایی جدی بر روش بطلمیوس وارد کردند. نظریه‌ی جفت توسی به یونانی ترجمه شده بود و در کتابخانه‌ی واتیکان نگهداری می‌شد؛ جایی که کوپرنیک مدت‌ها وقت خود را صرف مطالعه و گردآوری اطلاعاتی کرد که بر مبنای آن‌ها، طرح خورشیدمرکزی خود را قالب‌بندی کرد.



غیاث‌الدین جمشید کاشانی: ریاضی‌دان و اخترشناس قرن چهاردهم میلادی که او را یکی از نوابغ تاریخ ریاضیات می‌دانند. او عدد پی را به دقیق‌ترین صورت از طریق چندضلعی‌های محاط بر دایره حساب کرد و رصدخانه‌ای را به همراهی الغیبیک در سمرقند بنا نهاد. زیج خاقانی را نیز تدوین کرد و محاسبات بسیاری در نجوم و ساخت ابزارهای نجومی انجام داد و پیش‌رفت‌های بسیاری در علم مثلثات به‌دست آورد. هنوز هم در برخی مکاتب درسی، از جمله در فرانسه، قضیه‌ی کسینوس‌ها در مثلثات را به نام او می‌شناسند.

مراغه، اوج نجوم اسلامی


در بین فعالیت‌هایی که منجمان مسلمان داشتند، باید تأسیس رصدخانه‌ی مراغه را نقطه‌ی عطفی دانست که نه تنها محیطی علمی را در اختیار اخترشناسان مسلمان قرار داد، بلکه باعث گسترش تفکر ساخت چنین رصدخانه‌هایی در نقاط گوناگون جهان شد. از سوی دیگر، مکتبی را در نجوم به ثمر رساند که به مکتب مراغه معروف شد و یکی از ویژگی‌های آن نقدهایی بود که به دستگاه نجوم بطلمیوسی وارد می‌کرد. این رصدخانه در قرن سیزدهم میلادی، به همت خواجه نصیرالدین توسی ساخته شد و دانشمندان نامداری چون قطب‌الدین شیرازی، مؤیدالدین عریضی، محی‌الدین مغربی و اخترشناسی چینی به نام فائو مون جی در آن گرد آمدند. اخترشناسان چینی پس از آن در سلسله‌ی یوان و به دستور قوبلای خان، رصدخانه‌ی مدرن گائوچنگ را تکمیل کردند.



طرح بازسازی شده‌ای از مجموعه‌ی رصدخانه‌ی مراغه

رصدخانه‌ی سمرقند

در قرن‌های چهاردهم و پانزدهم میلادی، که بحث درباره‌ی مدل‌های سیاره‌ای مکتب مراغه بالا گرفته بود، الغریبک، پادشاه دانشمند متولد سلطانیه‌ی زنجان، به تأسیس رصدخانه‌ی دیگری در سمرقند دست زد. او برای این کار، جمعی از بهترین دانشمندان زمان خود را گردآورد که در رأس آن‌ها، چهره‌ی تابان دانش ریاضیات و نجوم ایران، غیاث‌الدین جمشید کاشانی قرار داشت. او، که پیش از آن زیج خاقانی را تدوین کرده بود، در این رصدخانه در زمینه‌ی تدوین زیج الغریبک همکاری کرد که یکی از زیج‌های تأثیرگذار در تاریخ نجوم اسلامی است.



ابزار زاویه‌سنجی به نام شدس فخری به طول ۱۱ متر در بقایای رصدخانه‌ی سمرقند

تحول خورشید مرکزی

در دوران کهن باور عمومی درباره‌ی جایگاه زمین در کیهان این بود که زمین در مرکز این جهان است. هم اخترشناسان و هم مردم عادی از آن حمایت می‌کردند؛ زیرا زمین جایگاهی مقدس و مکان آن فقط مرکز کل کیهان تصور می‌شد. نظریه‌ی زمین مرکزی را بطلمیوس توسعه داد و مدل او قرن‌ها پذیرفته ماند. اما منجمان مسلمان، از جمله نصیرالدین توسی، بر آن ایرادهایی یافتند. سرانجام، در اوایل قرن شانزدهم میلادی، فرصت تغییر این باور اشتباه به دست نیکولاس کوپرنیک، کشیش و منجم لهستانی، افتاد. او خورشید را مرکز دانست و زمین و دیگر سیاره‌ها را دور آن. اما نظریه‌ی خورشیدمرکزی آن قدر مخالف داشت که به سال‌ها رصد اخترشناسان نیاز بود تا پذیرفته شود در نیمه‌ی دوم همان قرن، منجم دانمارکی، تیکو براهه، که خود به فلسفه‌ی ارسطویی و مدل زمین مرکزی عقیده داشت، رصدهایی انجام داد که این اصول را رد کرد.

او در سال ۱۵۷۲، ستاره‌ی جدیدی را در صورت فلکی ذات‌الکرسی دید که امروز می‌دانیم یک ابرنواختر (انفجار ستاره‌ای) بوده است. تغییر در افلاک که بنا بر فلسفه‌ی ارسطویی ابدی و تغییرناپذیرند، براهه را متحیر کرده بود. سپس در ۱۵۷۷ دنباله‌دار پرنوری ظاهر شد که براهه مدار آن‌را در چند فلک متفاوت سیاره‌ای دنبال کرد؛ پدیده‌ای که مدل زمین مرکزی را مورد تردید قرار می‌داد. در اوایل قرن هفدهم، یوهان کپلر، که دستیار براهه و میراث‌دار سال‌ها رصد او بود، قوانین سه‌گانه‌ی حرکت سیاره‌ها را بر پایه‌ی مدل خورشید مرکزی و مدارهای بیضوی به دور خود ارائه داد که در نجوم امروز، اصولی پذیرفته شده‌اند. در همان سال‌ها، ورود تلسکوپ به دنیای نجوم چشمان گالیله را به روی عجایب تازه‌ای گشود که نظریه‌ی خورشیدمرکزی را تأیید می‌کرد.



خواجه نصیرالدین توسی



نیکولاس کوپرنیک

تاریخچه‌ی ابزارهای نجومی

از دوره‌ای که انسان با چشم آسمان را می‌کاوید تا امروز، که مجموعه‌ای حیرت‌انگیز از تلسکوپ‌های غول‌پیکر در فضا و زمین چشم به آسمان دوخته‌اند، راه درازی طی شده است؛ راهی که چندین هزار سال پیش با رصدخانه‌های سنگی یا دستگاه‌های تقویم‌شناس تمدن‌های نخست آغاز شد. این آرایه‌های سنگی در مصر، اروپا (به‌خصوص بریتانیا) و آمریکای مرکزی شناسایی شده‌اند. در دوره‌ی شکوفایی نجوم در میان‌رودان، رصدگران آسمان ابزارها و بناهای دیگری ساختند. اما ابزارهای اولیه در دوره‌ی نجوم اسلامی به ابزارهایی دقیق تبدیل شدند که نهایت دقت ممکن را در رصد با چشم غیر مسلح، امکان‌پذیر می‌ساختند. قرن‌ها بعد، انقلاب عصر تلسکوپ آغاز شد و این ابزار نو، خیلی زود روند تکامل خود به تلسکوپ‌های گوناگون و غول‌هایی طی کرد که امروز در کوهستان‌های رمین می‌بینیم.



رصدخانه‌های سنگی

استون‌هنج، دایره‌هایی از سنگ‌های عظیم است که حدود ۵ هزار سال پیش، اقوامی در جنوب جزیره‌ی بریتانیا آن‌ها را به آن محل آوردند و برافراشتند. آن‌ها با نگاه کردن به خورشید، ماه و ستاره‌ها از میان این سنگ‌ها، زمان شروع و پایان فصل‌ها را یافتند و تقویمی مطلوب برای نیازهای روزمره و آیینی خود به‌دست آوردند و شاید توانایی پیش‌بینی برخی پدیده‌های نجومی را نیز کسب کردند. این بنا کهن‌ترین رصدخانه‌ی باستانی با عظمت است.



استون هنج، آرایه‌ای ۵ هزار ساله از سنگ‌های عظیم در بریتانیا

برخی ابزارهای منجمان مسلمان

اسطرلاب: با آن‌که اسطرلاب برای نامیدن مجموعه‌ای از ابزارهای رصدی گوناگون به‌کار رفته، آن‌چه امروزه به این نام مشهور شده، نوع خاصی از اسطرلاب به نام اسطرلاب جهان‌نماست. کلمه‌ی اسطرلاب از ترکیب دو واژه‌ی یونانی و به معنی ستاره گرفتن است. مخترع این ابزار به‌درستی معلوم نیست. برخی آن‌را به ایرانیان باستان نسبت می‌دهند و جام جمشید را، نوعی اسطرلاب می‌دانند و برخی اَبَرخُس یا بطلمیوس را مبدع آن می‌دانند (قدیمی‌ترین ابزار اسطرلاب‌مانند یافت شده متعلق به بیش از ۲ هزار سال پیش در یونان است). اما آن‌چه مسلم است، رونق و پیش‌رفت بی‌ظیری است که این ابزار در تمدن اسلامی پیدا کرد و محاسبات آن پیچیده‌تر و دقت آن افزون‌تر شد. اسطرلاب شامل قرص‌هایی چرخان و متصل به هم است که جایگاه ستاره‌ها، سیاره‌ها، ماه و خورشید را در زمان‌های متفاوت سال نشان می‌دهد یا با نشانه‌روی به ستاره‌های خاص، می‌توان زمان محلی را تعیین کرد.



اسطرلاب

ذات‌الحلق: ذات‌الحلق، ابزاری شامل حلقه‌هایی درون هم است که علاوه بر امکان ثبت موقعیت ستاره‌ها، دستگاهی برای تبدیل مختصات سماوی نیز هست و در رصدخانه‌ی مراغه یکی از اصلی‌ترین ابزارهایی به‌شمار می‌رفت که در کنار دیگر ابزارها مانند حلقه‌ی انقلابین، حلقه‌ی اعتدالین، ذات‌الرربعین، ذات‌الثقبتین و... کارایی داشت.

رُبعِ جداری یا رُبعِ دیواری: ربع دیواری، که آن‌را المنه نیز می‌نامند، یکی از ابزارهای اصلی رصدخانه‌های غیر اپتیک باستانی بود و ابزار اصلی رصدخانه‌ی مراغه نیز به‌شمار می‌رفت. این ابزار کماتی برابر یک‌چهارم دایره است. بر اساس نوشته‌های یکی از منجمان رصدخانه‌ی مراغه، شعاع دایره‌ی ربع دیواری مراغه حدود ۲۵ متر بود. این ربع دایره منطبق بر نصف‌النهار ناظر، در امتداد شمال - جنوب قرار می‌گرفت و با کمک ابزارهای جنبی این امکان فراهم می‌آمد که بتوان مختصات ستاره را هنگام عبور از نصف‌النهار ناظر به‌دقت ثبت کرد.

جانتار مانتارا


جانتار مانتارا یا رصدخانه‌های باستانی، در نقاط گوناگون هندوستان بنا شده‌اند و هنوز آثار آن‌ها باقی است. این مجموعه بناهای نجومی، برای کاربردهای گوناگون و بیش‌تر جهت محاسبه‌ی تاریخ و زمان و هم‌چنین اختربینی ساخته شده بودند. یکی از معروف‌ترین جانتار مانتاراها، که در اصل یانتراماندر تللف می‌شود، به‌همت مهاراجه جای‌سینگ دوم در جیبور بنا شد. این بنای متعلق به قرن هجدهم میلادی، ۱۴ ابزار سنگی بزرگ برای رصد سیاره‌ها، پیش‌بینی گرفت‌ها و تعیین زمان و تقویم داشت که با معماری ویژه‌ای در یک مجموعه گرد آمده بود. با آن‌که این رصدخانه‌ها در دوره‌ی اختراع تلسکوپ ساخته شدند، کماکان از سبک رصدخانه‌های پیش از تلسکوپ و ابزارهایی مانند ابزارهای رصدخانه‌ی مراغه پیروی می‌کردند.



رصدخانه‌ی تاریخی جانتار مانتار در دهلی، هند

رصدخانه‌ی تیکو

در قرن شانزدهم میلادی، فردریک دوم، پادشاه دانمارک و نروژ، هزینه‌ی ساخت دو مجموعه‌ی علمی را در اختیار تیکو براهه، اخترشناس بزرگ دانمارکی، گذاشت: رصدخانه‌هایی به نام اورانیبورگ و استیرنبورگ که در جزیره ون بنا شد. این رصدخانه‌ها نیز از رصدخانه‌های دوره‌ی اسلامی الگو گرفتند و مهم‌ترین ابزار آن‌ها یک ربع‌جداری دقیق و عظیم بود. بعدها تیکو به پراگ بازگشت و با پشتیبانی شاه رودلف دوم، رصدخانه‌ای در ۵۰ کیلومتری این شهر بنا کرد. اما بیش‌تر رصدهای اصلی تیکو در جزیره ون صورت گرفت و این رصدها سنگ بنایی شد تا در سال‌های بعد، دستیار او، کپلر، بر مبنای آن‌ها قوانین حرکت سیاره‌ها را مشخص کند.



رصدخانه‌ی تیکو براهه در جزیره ون بر مبنای برخی ابزارهای رصدخانه‌ی مراغه ساخته شد



اختراع تلسکوپ و پس از آن

مونت ویلسون: پس از شکست در ساخت تلسکوپ‌های غول‌پیکر شکستی به سبب مشکلات عدسی‌های بزرگ، تلسکوپ‌های بارتابی بزرگ روزبه‌روز بهتر شدند. در سال‌های آغازین قرن بیستم، جرج الری هیل، رؤیای خود را برای ساخت بزرگ‌ترین تلسکوپ‌های جهان با حمایت دوست‌داران علم و منجمان دیگر، عملی کرد و تلسکوپ ۱/۵ متری در یکی از بهترین رصدگاه‌های ایالات متحده، کوه ویلسون نزدیک سواحل اقیانوس آرام در کالیفرنیا، ساخته شد. ساخت تلسکوپ ۲/۵ متری مونت ویلسون حدود یک دهه طول کشید و تا پیش از ساخت تلسکوپ ۵ متری پالومار به‌سرپرستی خود هیل، سال‌ها بزرگ‌ترین تلسکوپ جهان بود. تلسکوپ‌های بزرگ در مونت ویلسون، دانش اخترشناسی را متحول کردند. ادوین هابل (۱۹۵۳ - ۱۸۷۷)، پیش از آن‌که به اخترشناسی علاقه‌مند شود، حقوق‌دان بود و در سال ۱۹۱۹ به مونت ویلسون رفت. در سال ۱۹۲۳، نخستین ستاره‌ی متغیر قیفاووسی را در «سحابی مسلسله یا آندرومدا» (M۳۱) کشف کرد و با یافتن تعداد بیش‌تری از این متغیرها، موفق شد نخستین بار در تاریخ، یکتا نبودن کهکشان راه شیری را ثابت کند. بسیاری از جرم‌هایی که پیش از هابل، سحابی و جرم‌های متعلق به راه شیری دانسته می‌شدند، کهکشان‌هایی مستقل و دوردست بودند. در دهه‌ی ۱۹۲۰، هابل متوجه دور شدن اغلب کهکشان‌ها از راه شیری شد و رابطه‌ی میان سرعت فرار کهکشان‌ها و فاصله‌ی آن‌ها از ما را یافت، که امروزه به قانون هابل مشهور است. این دو موضوع در سال‌های بعد نشان داد که کیهان در حال انبساط است و این فرضیه که از نقطه‌ی اولیه‌ای به نام مه‌بانگ آغاز شده است. هابل روشی نیز برای طبقه‌بندی کهکشان‌ها ارائه داد که هنوز هم کاربرد دارد



صف مردم لس‌آنجلس که برای رصد آسمان با بزرگ‌ترین تلسکوپ جهان در اوایل قرن بیستم به کوهستان ویلسون رفته بودند.

با وجود نظریات دانشمندانی چون راجر بیکن در قرن سیزدهم میلادی، که در آن فکر استفاده از ترکیبی از عدسی‌ها برای دیدن جرم‌های دورتر مطرح شد، به‌نظر می‌رسد باید نخستین کسی را که موفق به ساخت تلسکوپ واقعی شد، هانس لیپرشیه‌ینک‌ساز آلمانی دانست که این کار را در سال ۱۶۰۸ به انجام رساند. اخبار این اختراع به‌سرعت پراکنده شد و گالیله گزارش‌های آن‌را در سفری، که یک سال بعد به ونیز رفت، شنید. گالیله تلسکوپ دست‌ساز خود را در سال ۱۶۰۹ ساخت و نخستین منجمی شد که با تلسکوپ آسمان را کاوید.



تلسکوپ غول‌پیکر ۱/۸ متری در قلعه‌ی محل زندگی لرد راس

تلسکوپ لرد راس: ویلیام پارسون یا لرد راس سوم (۱۸۶۷ - ۱۸۰۰) یکی از اشراف ثروت‌مند دوره‌ی خود بود. بلندپروازی‌هایش، او را به سمت ساخت تلسکوپ بازتابی غول‌پیکری سوق داد که حتی از تلسکوپ ویلیام هرشل معروف نیز، که چند دهه پیش‌تر اورانوس را کشف کرد، بزرگ‌تر باشد. او در سال ۱۸۴۵، در ایالت زیر حاکمیت خود در ایرلند و قلعه‌ی بیر، تلسکوپ ساخت که آینه‌ای به قطر ۱/۸ متر با فاصله‌ی کانونی حدود ۱۶/۵ متر داشت.



مشاهده‌ی کیهان

اخترشناسی نور مرئی ۲۵-۱۴

اخترشناسی پرتوهای نامرئی ۴۱-۲۶

اخترشناسی، از دوره‌ای که چیزی جز چشم و ابزارهای ابتدایی سنجش برای مشاهده‌ی آسمان شب وجود نداشت، تا امروز که از تمام علوم و یافته‌های فن‌آورانه‌ی قرن بیست‌ویکم برای شناخت کیهان استفاده می‌شود، راه درازی طی کرده است.


اخترشناسی، برخلاف شیمی، فیزیک یا زیست‌شناسی، علمی با موضوعات دم‌دستی نیست؛ بدین معنی که اخترشناسان نمی‌توانند روی اجسامی که بررسی می‌کنند، آزمایشی انجام دهند. البته فضایی‌ماهایی که به گوشه و کنار منظومه‌ی شمسی فرستاده می‌شوند، تا حدودی این موضوع را تغییر داده‌اند؛ اما ستاره‌ها و کهکشان‌ها آن‌قدر دورند که اخترشناسان آن‌ها را از همین فاصله‌ی دوردست رصد می‌کنند. البته فن‌آوری امروز، فرآیند رصد را بسیار پیش‌رفته کرده است. زمانی رصد فقط به دریافت نور مرئی از اجسام آسمانی محدود بود. اما امروزه، اخترشناسان حرفه‌ای می‌توانند از امواج رادیویی تا پرتوهای گاما را دریافت کنند که هریک بخشی از اطلاعات را درباره‌ی کیهان آشکار می‌سازند. علوم الکترونیک و رایانه نیز در جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل آن‌ها انقلابی به‌وجود آورده‌اند. بنابراین، اخترشناسان امروز، در مقایسه با زمان‌های گذشته، درباره‌ی این گیتی پهناور اطلاعات بیش‌تری در اختیار دارند تا رازهای بیش‌تری از خلقت الهی را رمزگشایی کنند.

تلسکوپ فضایی هابل


بهترین تلسکوپ برای اخترشناسانی که در جستجوی تصاویر فوق العاده واضح از اعماق کیهان اند، تلسکوپ فضایی هابل است. هابل، که پس از چند دهه برنامه ریزی در سال ۱۳۶۹/۱۹۹۰ به فضا پرتاب شد، رصدخانه ای بی سرنشین است. این تلسکوپ در مداری به ارتفاع حدود ۶۰۰ کیلومتر (مداری فراتر از ابرها و غبار جوی که دید تلسکوپ های زمینی را محدود می کند) قرار گرفته است. اخترشناسان از چندین کشور، با هدایت از راه دور، از تلسکوپ هابل استفاده می کنند. در این تلسکوپ، مانند بیش تر تلسکوپ های جدید، آشکارسازهای حساس نور جای گزین انسان رصدگر در پشت چشمی تلسکوپ شده اند و دوربین های الکترونیک، تصاویر زیبایی از عالم ثبت می کنند.

هابل چگونه کار می کند؟

هابل تلسکوپی بازتابی و بسیار شبیه تلسکوپ های روی زمین است. البته این تلسکوپ در فضا، باید بدون منبع زمینی برق، یا پایه ای که آن را به دور خودش بگرداند یا کابل های اتصال به رایانه های هدایت کننده کار کند. در عوض، هابل حامل ابزارهایی از آن نوع است که بر بسیاری از ماهواره ها یافت می شود: مانند صفحه های خورشیدی برای تأمین انرژی و توان الکتریکی، چرخ هایی به نام ژيروسکوپ برای جهت گیری سریع و دقیق و آنتن های رادیویی برای برقراری ارتباط با زمین.



دریافت تصاویر هابل از سحابی رتیل.



شناختن هابل

پرتاب	۲۵ آوریل ۱۹۹۰
آینه ی اصلی	به قطر ۲/۴ متر
آینه ی ثانویه	به قطر ۰/۳۴ متر
طول	۱۳/۱ متر
قطر	۴/۳ متر
مساحت های خورشیدی	۲/۴ × ۱۲/۱ متر
جرم	۱۱/۱ تن
ارتفاع مدار	۶۰۰ کیلومتر
دوره ی تناوب مدار	۹۶ دقیقه
سرعت در مدار	۲۷۷۰۰ کیلومتر بر ساعت
طول عمر پیش بینی شده	۱۵ سال (افزایش یافته است)
هزینه (در زمان پرتاب)	۱/۵ میلیارد دلار

هدایت از روی زمین

اتاق هدایت مأموریت هابل در مرکز پروازهای فضایی گاردرد ناسا در مریلند (ایالات متحده) است. جایی که مهندسان پیوسته با این فضاپیما در ارتباط اند و سلامت آنرا زیر نظر دارند. این مهندسان بین تلسکوپ در مدار و اخترشناسان مؤسسه علوم تلسکوپ فضایی در بالتیمور، شهری نزدیک به مرکز گاردرد، که رصدهای تلسکوپ را برنامه ریزی می کنند ارتباط برقرار می کنند.

ماهواره ی ردیابی و رله ی داده ها (TDRS) نقش رله کننده ی پیام های رادیویی میان زمین و هابل را بازی می کند. این ماهواره از مدار بلند خود، زمین و هابل را همزمان در تیررس دارد.

رد و بدل علامت بین TDRS و زمین

آنتن پرتوان دستور را از زمین دریافت می کند و تصاویر هابل را به صورت علامت تلویزیونی به زمین می فرستد.

دستگاه های ضبط

طیف نگار تصویری (STIS) تلسکوپ فضایی نور را به طول موج های تشکیل دهنده ی آن می شکند.

طیف نگار فرابنفش به نام کاس (COS) که در تعمیر چهارم هابل جایگزین دستگاه تصحیح اپتیک کاستار شد.

جای کاس

دوربین پیش رفتنی نقشه برداری (ASC) بسیار حساس است، اما در مقایسه با دوربین سیاره ای، میدان دید محدودتری دارد.

دوربین فروسرخ نزدیک و طیف سنج چندمنظوره (NICMOS) شامل سه آشکارساز فروسرخ است.

رایانه ها همگی دستگاه های سوار بر تلسکوپ را تنظیم می کنند.

آینه ی اصلی (اولیه) به قطر ۲/۴ متر نور را جمع آوری و کانونی می کند.

حسگرهای هدایت ظریف روی ستاره های درخشان قفل می شوند تا از ثابت ماندن تلسکوپ و معو نشدن تصاویر اطمینان حاصل شود.

دوربین میدان دید باز و سیاره ای (WFPC) دوربین اصلی برای عکسبرداری است.

ایستگاه زمینی TDRS بیومکزیکو، ایالات متحده، علامت را بین هابل و مرکز پروازهای فضایی گاردرد و ناسا رد و بدل می کند.

هابل، تلسکوپ فضایی

آینه‌ی معیوب

نخستین تصاویری که اخترشناسان از هابل دریافت کردند، با آن‌که از هر تلسکوپ زمینی بهتر بود، چندان واضح نبود. متخصصان ناسا دریافتند که آینه‌ی تلسکوپ، با کمی خطا ساخته شده و تورفتگی لایه‌ی خارجی آینه ۰/۰۰۲ میلی‌متر کم است.

ژیروسکوپ‌ها هابل را به سوی ستاره‌ها و دیگر اهداف در فضا نشانده می‌روند.

هنگام پرتاب، سایه‌بان تلسکوپ را حفاظت می‌کرد و اکنون از خراب شدن تصاویر به دلیل نور شدید خورشید جلوگیری می‌کند

مغناطیس‌سنج، حرکت هابل را به درون میدان مغناطیسی زمین حس می‌کند.

میلیمی اطراف تلسکوپ برای فضاوردان.


آینه‌ی ثانویه درون لوله‌ی تلسکوپ محافظت می‌شود.

نور از آینه‌ی اصلی به آینه‌ی ثانویه بازتاب می‌شود و سپس به دوربین‌ها و دیگر آشکارسازهای پشت آینه‌ی اصلی می‌رسد.


آتش پیش‌راندنی دوم

صفحه‌های خورشیدی با تبدیل نور خورشید به برق، نیروی تلسکوپ را تأمین می‌کنند.

تصویر کهکشان M۱۰۰ با تلسکوپ زمینی.




تصویر هابل از کهکشان M۱۰۰



مزایای هابل

تلسکوپ‌هایی که کیهان را از روی زمین می‌نگرند، باید از میان جو آشفته‌ی زمین به بالا خیره شوند و جو پیوسته نور و تصویر ستاره‌ها و کهکشان‌ها را منحرف و آشفته می‌کند؛ درست مثل این‌که از میان آب‌های آشفته در استخری شلوغ، به اطرافتان نگاه کنید. به همین سبب است که به نظر می‌رسد ستاره‌ها چشمک می‌زنند. هابل، از قرارگاهش بر فراز جو، دید روشن و واضحی از همه چیز در کیهان دارد؛ از سیارات نزدیک تا اختروش‌هایی در فاصله‌ی میلیاردها سال نوری از ما.




دومین مأموریت تعمیر هابل در سال ۱۳۷۶/۱۹۹۷.

مأموریت‌های تعمیر

در حالی که شاتل فضایی دیسک‌آوری، هابل را محکم با بازوی روبوتی خود نگه‌داشته بود، فضاوردان شاتل، استیون اسمیت و مارک لی، تلسکوپ را در مدار تعمیر کردند. هابل نیز، مانند هر ابزار دیگری، به رسیدگی منظم احتیاج دارد. در نخستین مأموریت تعمیر، در سال ۱۳۷۲/۱۹۹۳، فضاوردان برای تصحیح و وضوح تصاویر، که به سبب خطایی در آینه‌ی اصلی از دست رفته و موجب ناواضحی تصاویر هابل شده بود، عدسی‌های تصحیح‌کننده‌ای نصب کردند. عملکرد این عدسی‌ها مانند لنزهای طبی است که به جای عینک از آن‌ها استفاده می‌شود.

در فوریه‌ی سال ۱۹۹۷/ بهمن ۱۳۷۵ دومین مأموریت تعمیر، بخش اول تعمیر سوم در دسامبر ۱۹۹۹/ آذر ۱۳۷۸ و بخش دوم تعمیر سوم در مارس ۲۰۰۲/ اسفند ۱۳۸۰ انجام شد. در این مأموریت‌ها، باتری‌ها و صفحه‌های خورشیدی، ژیروسکوپ‌ها، رایانه‌ها، قطعات فنی، دوربین‌ها و آشکارساز تلسکوپ، تعمیر یا جای‌گزین شد. اما پس از انفجار شاتل فضایی کلمبیا در سال ۱۳۸۱/۲۰۰۳، تعمیر چهارم هابل عقب افتاد. با آن‌که چند ژیروسکوپ و دوربین اصلی (ACS) هابل از کار افتاده بود، سرانجام در ماه مه ۲۰۰۹/ اردیبهشت ۱۳۸۸، آخرین تعمیر انجام شد و تلسکوپ جان تازه‌ای گرفت. در مأموریت بزرگ تعمیر چهارم، علاوه بر تعویض باتری‌ها و ژیروسکوپ‌ها، دوربین میدان دید باز شماره‌ی ۳ و طیف‌نگار جدید منشأ کیهانی نصب و دو آشکارساز مهم هابل نیز تعمیر شد. با این تغییرات، هابل دست کم تا سال ۱۳۹۳/۲۰۱۴ به‌طور کامل فعالیت خواهد کرد.

شاهکارهای هابل



برخی از مشهورترین نماهای کیهان از دریچهی دید تلسکوپ هابل

از زمان پرتاب هابل، نزدیک به یک میلیون مشاهدهی علمی با این تلسکوپ انجام شده است. در نتیجه، حدود ۵ هزار مقاله در معتبرترین نشریه‌های تخصصی اخترشناسی و فیزیک و شمار بسیار بیش‌تری مقاله در گردهم‌آیی‌های بین‌المللی اخترشناسی منتشر شده است. اخترشناسان، در سراسر دنیا، از داده‌های این تلسکوپ بهره برده‌اند. دیگر آثار بزرگ هابل بر اخترشناسی چنین است: بررسی تحول انواع کهکشان‌ها و برخورد میان آن‌ها؛ سیاه‌چاله‌های ابرپرجرم مرکز کهکشان‌ها و فوران‌های عظیم ذرات از آن‌ها؛ کشف نشانه‌های وجود سیاه‌چاله‌های میان‌وزن در مرکز خوشه‌های کروی؛ شناخت سحابی‌های سیاره‌نما؛ شناخت بازمانده‌های انفجار ابرنواختری، از جمله تصویربرداری پیاپی از تحول سحابی ابرنواختر A ۱۹۸۷ در ابر بزرگ ماژلان؛ شناخت قرص‌های غباری سیاره‌ساز در اطراف ستاره‌های جوان؛ کشف‌های متعدد در زمینه‌ی سیاره‌های فراخورشیدی؛ کشف کوتوله‌های قهوه‌ای؛ تصویربرداری مستقیم از چند سیاره‌ی فراخورشیدی احتمالی، نخستین بار در تاریخ اخترشناسی؛ رصد تکه‌تکه شدن دو دنباله‌دار لی پیر و شواسمان - واخمان ۳ در هنگام عبور از نزدیکی خورشید؛ رصدهای دقیق مریخ و تمام سیاره‌های گازی، مشاهده و تأیید کشف خرده‌سیاره‌های دوردست بزرگ در کمربند کویپر و ورای آن. در این میان، یکی از بزرگ‌ترین یافته‌های هابل، تخمین دقیق سن کیهان (۱۳/۷ میلیارد سال) با سنجش شتاب انبساط کیهان به کمک فاصله‌سنجی دقیق از روش مشاهدهی ستاره‌های متغیر قیفاووسی در کهکشان‌های گوناگون و هم‌چنین رصد انفجارهای ستاره‌ای یا ابرنواختر در کهکشان‌های دور و نزدیک بوده است.



نسل آیندهی تلسکوپ فضایی

در سال ۱۳۹۳/۲۰۱۴، اخترشناسان ناسا تلسکوپ فضایی جیمز وب را با آینه‌ای به قطر حدود ۶ متر (۲/۵ برابر آینه‌ی هابل) و توانایی شگفت‌انگیز در کاوش کیهان در نور فروسرخ، به فضا می‌فرستند. این تلسکوپ در فاصله‌ی بیش از یک میلیون کیلومتری زمین در یکی از نقاط تعادل لاگرانژی مدار زمین - خورشید قرار می‌گیرد تا هیچ تابش گرمایی مزاحمی از زمین در نگاه فروسرخ آن به کیهان اثر نگذارد. این تلسکوپ اجزای بارها کم‌نورتر و جزئیات بسیار کوچک‌تر از توان هابل را ثبت خواهد کرد؛ از جمله دورترین کهکشان‌های کیهان که نور آن‌ها مربوط به زمان تولد نخستین کهکشان‌هاست. با انجام‌شدن تعمیر چهارم هابل، این تلسکوپ نیز دست کم تا پس از شروع کار تلسکوپ وب در فضا فعال خواهد بود.

تیزبین‌تر از همیشه

پس از آخرین تعمیر هابل در سال ۲۰۰۹ / ۱۳۸۸ (در ۱۹ سالگی آن)، توانایی و عمق دید این تلسکوپ، افزایش بسیار یافته است. آشکارسازهایی که چند سال از کار افتاده بودند، زنده شدند. دوربین جدید سیاره‌ای هم، در مقایسه با هم‌نمای قبلی خود، ۳۵ بار توانایی رصد بیش‌تری دارد. به‌علاوه، طیف‌نگار کاس در نور فرابنفش، بسیار حساس‌تر از ابزارهای پیشین است یکی از اولین شاهکارهای هابل پس از تعمیر، تصویری از سحابی پروانه است که دوربین سیاره‌ای تهیه کرده است. این سحابی سیاره‌ما پایان زندگی ستاره‌ای مانند خورشید را نشان می‌دهد. گاز بیرونی ستاره، که با سرعت حدود یک میلیون کیلومتر بر ساعت به فضا می‌گریزد، از تابش هسته‌ی داغ ستاره گرم شده است و می‌درخشد. سحابی پروانه با نام فهرست‌شده‌ی NGC ۶۳۰۲ در فاصله‌ی ۳۸۰۰ سال نوری از ما و در امتداد صورت فلکی عقرب قرار دارد.

سحابی سیاره‌ما، پروانه، پایان زندگی یک ستاره‌ی خورشیدمانند است.

هابل به نام کیست؟

ادوین هابل در دو دهه‌ی نخست قرن بیستم، به کمک تلسکوپ‌های رصدخانه‌ی مونت ویلسون در کالیفرنیا، که بزرگ‌ترین چشم‌ان اخترشناسی دنیا بودند، وجود کهکشان‌هایی به‌جز راه شیری را کشف کرد. سپس به گریز کهکشان‌ها از هم و انبساط کیهان پی برد. چون رشته‌ی اخترشناسی در فهرست جایزه‌ی نوبل قرار نداشت، هابل هرگز موفق به دریافت جایزه‌ی نوبل نشد. اما یک تلسکوپ فضایی بی‌نظیر نام او را جاودانه کرد.



ادوین هابل در محفظه‌ی آینده‌ی ثانویه‌ی تلسکوپ غول‌پیکر مونت پالومار

تاریخچه‌ی فعالیت‌های تلسکوپ هابل

• اخترشناس آمریکایی، لیمان اسپیتزر (۱۹۱۴-۱۹۹۷)، نخستین بار در سال ۱۹۴۶/۱۳۲۵ ساخت رصدخانه‌ای فرازمینی را پیشنهاد کرد.

• ناسا در سال ۱۹۷۷/۱۳۵۶ ساخت هابل را آغاز کرد.


• شاتل فضایی در سال ۱۹۹۰/۱۳۶۹ هابل را در مدار قرار داد.

• اخترشناسان خیلی زود دریافته‌اند که آینده‌ی اصلی، کمی با خطا ساخته شده است، اما رایانه‌ها می‌توانستند بخشی از این خطا را تصحیح کنند.

• در سال ۱۹۹۲/۱۳۷۱، هابل شواهدی از وجود سیاه‌چاله‌ای پُرجرم را در کهکشان M87 یافت.

• مأموریت تعمیر در سال ۱۹۹۳/۱۳۷۲ دید هابل را تصحیح کرد.

• در سال ۱۹۹۴/۱۳۷۳، هابل برخورد دنباله‌دار شومیکر-لوی ۹ با مشتری را ثبت کرد.



• در سال ۱۹۹۵/۱۳۷۴، هابل از تولد ستاره‌ها در سحابی عقاب عکس‌برداری کرد. همچنین تصویری از دورترین کهکشان‌ها، تا ۱۰ میلیارد سال نوری دورتر، تهیه کرد.

• در سال ۱۹۹۷/۱۳۷۶، دوربین فروسرخ جدیدی به هابل اضافه شد. سپس هابل مکان‌های فرود فضایی‌های مریخ‌نورد ناسا را بررسی کرد و توفان‌های غبار روی مریخ را به تصویر کشید.

• در سال ۱۹۹۹/۱۳۷۸، هابل کهکشانی را با فوران‌گر پرتو گاما کشف کرد. این یکی از قدرتمندترین انفجارهای کیهانی است که تا به حال رصد شده است.

• در سال ۲۰۰۱/۱۳۸۰، هابل از سحابی‌های پیراستاره‌ای بسیار جوان در اطراف ستاره‌های نوزاد در سحابی جبار تصویر گرفت که نشان‌دهنده‌ی پیدایش منظومه‌های سیاره‌ای به دور این ستاره‌هاست.

• در سال ۲۰۰۲/۱۳۸۱، دوربین پیش‌رفته‌ی نقشه‌برداری هابل (ACS) در بخش دوم مأموریت سوم تعمیر هابل نصب شد. این دوربین تا ۵ سال بعد فعال ماند و پس از تعمیر چهارم در سال ۱۳۸۸ دوباره آماده شد.

• در سال ۲۰۰۳/۱۳۸۲، هابل نشانه‌ی انبساط شتابدار کیهان را با رصد اُپرنواختاری در کهکشان بسیار دور یافت. این نخستین نشانه‌ی قوی رصدی از وجود انرژی تاریک بود. در این سال، هابل سیاره‌ی فراخورشیدی را یافت که به سبب نزدیکی بسیار به ستاره‌ی مادر، جو آن در حال تبخیر است. در داده‌های هابل، نخستین بار ترکیبات تشکیل‌دهنده‌ی جو یک سیاره‌ی فراخورشیدی شناخته شد.

• در سال ۲۰۰۴/۱۳۸۳، هابل پس از مدت‌ها عکس‌برداری از ناحیه‌ای کوچک در آسمان، عمیق‌ترین تصویر از کیهان را با هزاران کهکشان دور دست ارائه داد که به نام تصویر فراآر ف هابل (UDF) شناخته شد.

• در سال ۲۰۰۵/۱۳۸۴، دو قمر و دو حلقه‌ی بیرونی جدید در تصاویر تلسکوپ هابل از سیاره‌ی اورانوس کشف شد.

• در سال ۲۰۰۶/۱۳۸۵، دو قمر کوچک جدید در تصاویر هابل از پلوتون کشف شد. در همان سال تلسکوپ هابل در همکاری با داده‌های تلسکوپ پرتو ایکس چاندرا نشانه‌ی قطعی از وجود ماده‌ی تاریک و توزیع کهکشانی دقیق آن را در خوشه‌ی کهکشانی «گلوله» یافت.

• در سال ۲۰۰۷/۱۳۸۶، نخستین نقشه‌ی سه بُعدی از توزیع ماده‌ی تاریک بین‌کهکشانی براساس داده‌های هابل ارائه شد. تلسکوپ هابل از وجود اثر شتاب‌دهنده‌ی انرژی تاریک در دوران جوانی کیهان، نشانه‌هایی قوی یافت.

• در سال ۲۰۰۸/۱۳۸۷، شمار بسیاری از سحابی‌های کیهانی در تصاویر عمیق هابل کشف شد که کهکشان‌هایی با شکل‌های آشفته و گمان‌مانند حاصل از انحراف یا هم‌گرایی نور آن‌ها بر اثر عبور از کنار کهکشان‌هایی در مسیر رسیدن به زمین بود. به این لنزهای کیهانی عدسی‌های گرانش گفته می‌شود که به آشکارسازی کهکشان‌های بسیار کم‌فرغ دور دست کمک می‌کنند.

• در سال ۲۰۰۹/۱۳۸۸، آخرین تعمیر هابل در مأموریت فضایی بسیار دشواری، با موفقیت انجام شد و نخستین تصویر آن پس از تعمیر، لکه‌ای بر مشتری بود که از برخورد دنباله‌مداری کوچک با این سیاره به‌وجود آمده بود.



بیش‌تر بدانیم

تلسکوپ چگونه کار می‌کند؟ ۱۸
تحلیل نور ۲۴
تابش‌هایی از فضا ۲۶
اخترشناسی فروسرخ ۲۸
ماهواره‌ها و مدارها ۵۴

چشم‌های ایرانی هابل


یکی از دانشمندان همکار مؤسسه‌ی تلسکوپ فضایی، مرکز اصلی برنامه‌ریزی و تحلیل داده‌های تلسکوپ هابل و تلسکوپ آینده‌ی فضایی، دکتر بهرام مبشر، کیهان‌شناس ایرانی، است. او سال ۱۳۳۷ در تهران به دنیا آمد و پژوهش‌گری نام‌دار در شناخت تحول کهکشان‌ها و شکل‌گیری آن‌ها در دوران ابتدایی کیهان است. بیش‌تر مشاهده‌های او برای کاوش دوردست‌های کیهان، تلسکوپ هابل انجام می‌شود. کشف برخی از دورترین کهکشان‌های شناخته‌شده‌ی کیهان از دست‌آوردهای گروه اوست.

تلسکوپ چگونه کار می‌کند؟

تلسکوپ بازتابی AAT

تلسکوپ آنگلو-استراليا (AAT)، که بر کوستان‌های سایدينگ اسپيرينگ استراليا نصب است، آينه‌ای به قطر ۳/۹ متر دارد می‌تواند به حای آينه‌ی ثانويه در اتاقك عكس‌برداري قرار داد تا يك اخترشناس در درون آن به تصويربرداري مشغول شود. هم‌چنين به جای اين آينه، ربات طيف‌سنجی قرار می‌گیرد که با قرار دادن آن، فیبر نوری از نقاط گوناگون تصوير حد، گه طيف‌سنجی می‌کند.

اتاقك رصدگر



تلسکوپ AAT سوار بر استقرار نعل اسبی خود.

تلسکوپ بازتابی ۸ متری جیمینی

تلسکوپ‌های دوقلوی جیمینی یا دوپیکر، که در هویسی و شیلی قرار دارند، در اختیار اخترشناسی در هفت کشور است.

قطر آينه‌ی اصلی ۸ متر است و نور اجسامی را، که ۵۰۰ میلیون بار کم‌سور از حد دید چشم غیر مسلح‌اند، دریافت می‌کند.

آشکارسازها و تجهیزات ثبت اطلاعات پشت آينه‌ی اصلی، روی سکوی رصد قرار دارند و گاه به جای آينه‌ی ثانويه نصب می‌شوند.

مسله‌ای برای حرکت دادن تلسکوپ به بالا و پایین


محفظه آينه

سکوی رصد

کل استقرار تلسکوپ از ساختمان رصدخانه جداست و به صورت افقی می‌چرخد

آينه‌ها

آينه‌ی تلسکوپ‌های رصدخانه‌ای، که از سرامیک شیشه‌ای یا ضریب انبساط کم (برای ثابت ماندن نحنای آن در سرما و گرما) ساخته می‌شود، بیش از یک سال صیقل داده می‌شود. سپس سطحش با ورقه‌ی نازکی از آلومینیوم پوشیده می‌شود. آينه‌ها باید کاملاً صاف و یک‌دست باشند. در غیر این صورت، نور دریافتی اشفته و تصویر محو می‌شود. مثلاً سطح آينه‌ی تلسکوپ جیمینی تا دقت ۱۶ میلیارد متر صیقل داده شده است.



آينه‌ی جیمینی آن‌قدر صاف و صیقلی است که اگر این آينه‌ی ۸ متری به قطر سیاره‌ی زمین بزرگ می‌شد، ارتفاع بزرگ‌ترین برجستگی آن فقط حدود ۳۰ سانتی‌متر بود.

جمع‌آوری نور از آسمان کماکان منبع اصلی دریافت اطلاعات از کیهان برای اخترشناسان است. بیش‌تر اجرام آسمانی، به استثنای ماه و خورشید، دور و نسبتاً کم فروغ‌اند. تلسکوپ تا حد ممکن نور جمع‌آوری می‌کند؛ هرچه نور بیش‌تری جمع‌آوری کند، اطلاعات بیش‌تری فراهم آورده است. به همین سبب، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های تلسکوپ، قطر دهانه‌ی آن است. دو نوع تلسکوپ وجود دارد: بازتابی‌ها با استفاده از آينه و شکستی‌ها با استفاده از عدسی نور را جمع می‌کنند. بیش‌تر تلسکوپ‌های حرفه‌ای امروزی بازتابی‌هایی با آينه‌های چند متری‌اند که بر فراز قله‌ی کوه‌ها، بالاتر از آشفته‌گی‌های حاصل از حرکت هوا در لایه‌های پایینی جو، قرار گرفته‌اند.


تلسکوپ‌های بازتابی

بازتابی‌ها، مانند تلسکوپ جیمینی (تصویر مقابل)، نور را با آينه‌ی مقعر عظیمی دریافت می‌کنند و پس از آن امکان دارد تصویر به کمک آينه یا آينه‌های ثانويه، به هر بخش تلسکوپ بازتاب شود. بنابراین، لازم نیست تجهیزات سوار بر تلسکوپ متحرک باشند و بر وزن آن بیفزایند. آينه‌ها نور را به این آشکارسازها می‌رسانند. بازتابی‌ها در مقایسه با شکستی‌ها، دو مزیت اصلی دارند: نور را با آينه جمع‌آوری می‌کنند؛ بنابراین، خطای رنگی (تجزیه‌ی نور ستاره به طیفی از رنگ‌ها) رخ نمی‌دهد و چون آينه، برخلاف تلسکوپ‌های شکستی، در انتهای بدنه‌ی تلسکوپ نصب و از پشت سر پشتیبانی می‌شود، حدی برای اندازه‌ی تلسکوپ وجود ندارد. آينه‌ها را می‌توان بسیار نازک‌تر و سبک‌تر ساخت. به همین سبب، قطر بزرگ‌ترین تلسکوپ بازتابی ساخته شده در جهان بیش از ۱۰ برابر قطر بزرگ‌ترین تلسکوپ شکستی است.

تلسکوپ‌های شکستی

شکستی‌ها نور را با عدسی دریافت می‌کنند که تصویر را بر صفحه‌ی عکاسی یا آشکارساز الکترونیک نور کانونی می‌کند. شکستی‌ها برای رصد اجرام درخشان، مفید و مناسب‌اند؛ اما شیشه‌ی ضخیم عدسی، نور ارزش‌مند اجرام کم‌سوتر را جذب می‌کند. عدسی هم‌چنین رنگ‌های گوناگون نور را در نقاط متفاوت کانونی می‌کند و سبب بروز خطای رنگی می‌شود. این عدسی‌ها سنگین‌اند؛ عدسی‌ای به قطر بیش از یک متر تحت وزن خودش تاب برمی‌دارد و شکم می‌دهد. به سبب این مشکلات، با آن‌که تلسکوپ‌های شکستی کوچک با طراحی جدید و بدون خطای رنگی ابزار منتخب بسیاری از منجمان آماتور و عکاسان نجومی است، در رصدخانه‌های حرفه‌ای امروزی چندان به کار نمی‌رود.

رفع خطای رنگی با عدسی‌های ترکیبی.



تلسکوپ، در حالی که به این سو و آن سوی آسمان سر می‌زند، بر هر جسم انتخاب شده‌ای «قفل» و آن را دنبال می‌کند. به سبب نور کم اجرام آسمانی، نوردهی طولانی مدت بهترین داده‌ها را برای تحلیل به دست می‌دهد.

آینه ثانویه

بدنه‌ی باز تلسکوپ وزن آن را کاهش می‌دهد.

مسیر نور در تلسکوپ بازتابی (طرح کانگرین)

آینه‌ی اصلی نور ورودی را از جسمی در فضا جمع‌آوری می‌کند

آینه‌ی ثانویه محدب

نور از آینه‌ی اصلی به سوی آینه‌ی ثانویه بازتاب می‌شود.

نوری که آینه‌ی ثانویه بازتابش کرده است، از میان سوراخ وسط آینه‌ی اصلی می‌گذرد.

نور در این‌جا کانونی می‌شود؛ جایی که مجموعه‌ای از ابزارها، آماده‌ی ثبت داده‌ها هستند.

جهت شمال - جنوب برای محور میل در مختصات آسمانی.

محور قطبی با نقطه‌ی قطب آسمان هم‌خط می‌شود.

تلسکوپ با سرعتی ثابت به دور محور قطبی (محور بعد) می‌گردد.

در استقرار استوایی محور استقرار به سوی قطب آسمان (شمال یا جنوب که به نیم‌کره بستگی دارد) نشانه می‌رود. تلسکوپ برای دنبال کردن ستاره‌ها، در حالی که حول نقطه‌ی قطب می‌گردد، گرد محور می‌چرخد.

تصویر تلسکوپ اشمیت از ناحیه‌ی سحابی چپار که میدان دید آن به پهنای ظاهری ۱۲ قرص ماه کامل است.

تلسکوپ‌های بازتابی متعارف ناحیه‌ای از آسمان به قطر یک قرص ماه را می‌بینند. دو قرص ماه برابر با یک درجه در آسمان است و برای مقایسه، از افق تا درست بالای سر ۹۰ درجه است.

تلسکوپ اشمیت

تلسکوپ اشمیت ترکیبی از تلسکوپ بازتابی و تلسکوپ شکستی است. آینه‌ی آن نور ستاره را به صفحه‌ی عکاسی خمیده‌ای بازتاب می‌کند (در سال‌های اخیر تراشه‌های الکترونیک CCD با حساسیت و توانایی بسیار بیش‌تر جای‌گزین صفحه‌ی عکاسی شده است). روی صفحه‌ی خمیده، تصویری با زاویه‌ی باز شکل می‌گیرد؛ اما به یک عدسی تصحیح‌کننده در سر لوله‌ی تلسکوپ برای برطرف کردن اعوجاج (خطای کروی) تصویر نیاز است. تلسکوپ‌های اشمیت می‌توانند از نواحی وسیعی از آسمان تصویر تهیه کنند که برای انجام‌دادن طرح‌های نقشه‌برداری آسمان و جست‌وجو و ردیابی اجسام، مانند کشف و ردیابی خرده‌سیاره‌های جدید، مفید است.

تلسکوپ به بالا و پایین حرکت می‌کند.

تلسکوپ به صورت افقی می‌چرخد.

استقرار سمت - ارتفاعی به تلسکوپ‌های عظیم امکان می‌دهد به صورت افقی نصب شوند و به سوی بالا یا پایین (در «ارتفاع» و اطراف (در «سمت») حرکت و ستاره‌ها را دنبال کنند.

استقرارها

استقرار تلسکوپ تقریباً به اندازه‌ی آینه‌ی آن مهم است. استقرار باید وزن تلسکوپ را تحمل کند و تلسکوپ را، هم‌زمان با چرخش زمین به دور محور خود، بچرخاند. در غیر این صورت، اجسام حین رصد از میدان دید تلسکوپ خارج می‌شوند. دو نوع اصلی استقرار وجود دارد: استوایی و سمت - ارتفاعی. نوع سمت - ارتفاعی استقرار اصلی تلسکوپ‌های حرفه‌ای امروزی است. هدایت رایانه‌ای پیوسته به تلسکوپ‌های غول‌پیکر، مانند جمینی، اجازه می‌دهد مسیر اجرام را حین حرکتشان در آسمان دنبال کنند.

نخستین شکستی

• گالیله مخترع تلسکوپ نبود و مدتی پیش از او، اولین دوربین‌ها ساخته شده بود اما نخستین فردی بود که از این وسیله برای کاوش آسمان استفاده کرد. تلسکوپ‌های دست‌ساز او، که بزرگ‌ترین تلسکوپ‌های جهان در آن دوره بودند، قدرتی بیش‌تر از یک تلسکوپ اسباب‌بازی امروزی نداشتند. اما گالیله با همان‌ها، گودال‌های ماه، چهار قمر بزرگ مشتری و ماهیت ستاره‌ای راه شیری را کشف کرد.



نخستین بازتابی

• ایزاک نیوتن، که پیش‌گام شماری از زمینه‌های علم به‌شمار می‌رود، نخستین فردی بود که به بررسی تجزیه‌ی نور و شکل‌گیری طیف از طریق منشور پرداخت. او نتیجه گرفت که عدسی‌ها همواره تصاویری با تجزیه و خطای رنگی ایجاد می‌کنند. از این‌رو، به طراحی تلسکوپ‌ی پرداخت که به جای عدسی، در آن برای گردآوری نور، از آینه استفاده می‌شد. تلسکوپ بازتابی او، که در سال ۱۶۶۸ ساخته شد، آینه‌ی فلزی داشت که به جای شیشه، از مس، قلع و آرسنیک (زرنیک) ساخته شده بود.



بیش‌تر بدانیم

- طرح‌های جدید و بزرگ‌ترین رصدخانه‌های جهان ۲۲
- تحلیل نور ۲۴
- تابش‌هایی از فضا ۲۶
- زمین چرخان ۲۶۲
- تلسکوپ‌های شکستی ۲۹۰
- تلسکوپ‌های بازتابی ۲۹۲

رصدخانه‌ها



یکی از تلسکوپ‌های بزرگ رصدخانه‌ی لاپالما

تلسکوپ‌های بزرگ در مکانی ثابت نصب می‌شوند. برای حفاظت از تلسکوپ و دستگاه‌های آشکارساز، آن‌ها را درون ساختمانی قرار می‌دهند که اغلب به صورت گنبدی دوار و بزرگ است. شکاف باز و بسته‌شونده‌ی در گنبد، پنجره‌ی است که تلسکوپ از آن به آسمان می‌نگرد. این ساختمان محافظ تلسکوپ و ابزارها از گرما و تابش خورشید در روز، گرد و غبار، برف و باران است. از سوی دیگر، سبب کاهش نور مزاحم محیط بر تلسکوپ و دستگاه‌های حساس رصدخانه می‌شود. به سبب حرکت تلسکوپ در پیمایش کروی آسمان، فضایی گنبدی انتخاب مناسبی است. گنبد نیز با حرکت آرام تلسکوپ به دنبال ستاره‌ها و اجرام سماوی جابه‌جا می‌شود. با وجود این، در برخی تلسکوپ‌های بزرگ جدید، ساختمان‌های غیر کروی نیز به جای گنبدهای «ستی» در رصدخانه‌ها ساخته شده‌اند. گنبدها، از هر نوع که باشند، پوششی سفید یا بسیار بازتاب‌کننده دارند تا گرمای رور را جذب نکنند و در شب پس ندهند و در شب به سرعت با محیط اطراف هم‌دا شوند.

مکان رصدخانه

تلسکوپ‌ها را در جایی نصب می‌کنند که دور از آشفته‌گی‌های جوی، رطوبت یا عمار رباد، نور و آلودگی شهرهای بزرگ باشد. چنین مکانی معمولاً بر فرار کوه‌های مرتفع مشرف به بیابان‌های پست یا مشرف به قیابوس‌ها پیدا می‌شود. در رصدخانه‌های مطلوب، باید شب‌های بسیاری از سال هوا صاف و آرام باشد و تلسکوپ بر فرار آشفته‌گی جوی قرار گرفته باشد تا وضوح تصویر جرم‌های آسمان به حد مطلوب برسد. همچنین رصدگاه باید از نورهای مزاحم شهر بسیار دور باشد. گاه انتخاب رصدگاه مطلوب به توجه به جغرافیا، زمین‌شناسی، اقلیم، تاریکی و شفافیت آسمان محل چند سال طول می‌کشد. بهترین رصدخانه‌های شناخته شده جهان، کوهستان ۴ هزار متری موناکی در جزایر هاوایی و مشرف به اقیانوس آرام، کوهستان‌های مرتفع در صحرای آتاکامای شیلی و ارتفاعات جزیره‌ی لاپالما در مجموعه جزایر قناری در اقیانوس اطلس است.

درون گنبد رصدخانه

برخلاف تلسکوپ‌های آماتور، که می‌توان با آن‌ها به تماشای مستقیم آسمان پرداخت، در تلسکوپ‌های رصدخانه‌ای فقط آشکارسازهای پیش‌رفته‌ای مانند دوربین‌های سی‌سی‌دی و طیف‌سنج‌ها به آسمان «نگاه» می‌کنند. این ابزارهای بزرگ در یکی از کانون‌های این تلسکوپ‌ها نصب می‌شوند یا نور به سمت آن‌ها هدایت می‌گردد. اتفاقی در کنار تلسکوپ محل کار متصدی تلسکوپ است. او درخواست‌های اخترشناسان را به تلسکوپ وارد می‌کند. اخترشناسان، که از دانشگاه‌ها و مراکز علمی به محل رصدخانه آمده‌اند، اغلب با ساختار و کاربرد تلسکوپ آشنا نیستند. آن‌ها فقط در اتاق تحقیقات در رصدخانه‌ها تصاویر و داده‌های مورد نیاز را دریافت می‌کنند. در هر رصدخانه، همکاری مانند متصدی، مهندسان و متخصصان دستگاه‌ها، اخترشناسان تمام‌وقت دستیار (برای مشاوره، رفع مشکلات اخترشناسان مهمان و انجام دادن تحقیقات بلندمدت) و نیروهای خدمات وجود دارند. به علاوه، گروهی علمی از استادان، برنامه‌ریزی‌های علمی رصدخانه را بر اساس درخواست‌های پژوهشی رسیده زمان‌بندی می‌کنند.


نخستین رصدخانه‌ها در عصر تلسکوپ

در دهه‌ی ۱۶۷۰ میلادی، رصدخانه‌ی پاریس نخستین رصدخانه‌ی مجهز به تلسکوپ در جهان بود. پیش از عصر تلسکوپ، رصدخانه‌های تاریخی بسیاری مانند رصدخانه‌ی بزرگ مراغه ساخته شده بود. رصدخانه‌ی پاریس کار خود را با مدیریت جووانی کاسینی، اخترشناس مشهور ایتالیایی، شروع کرد. تلسکوپ‌های شکستی با لوله‌های بسیار بلند برسم ساختمان رصدخانه قرار می‌گرفت و گنبدی در کار نبود. در سده‌ی نوزدهم، با افزایش ساخت تلسکوپ‌های بارتابی بزرگ به جای تلسکوپ‌های شکستی (به سبب ساخت ساده‌تر و نتیجه‌ی کم‌حطاط و کاربردی‌تر)، تلسکوپ‌هایی با آینه‌هایی به بزرگی ۱۵ و ۱۸ متر نیز در انگلستان و ایرلند ساخته شد. اما هیچ کدام در ساختمانی مانند رصدخانه‌های امروزی قرار نگرفت. در اوایل قرن بیستم، به کوشش جورج الری هیل، رصدخانه‌ی بزرگی در کالیفرنیا در غرب ایالات متحده، ساخته شد که تحولات مهمی در اخترشناسی به وجود آورد. تلسکوپ‌های ۱۵ و سپس ۲۵ متری رصدخانه‌ی مونت ویلسون و در دهه‌ی ۱۹۴۰ تلسکوپ ۵ متری هیل در رصدخانه‌ی مونت پالومار، رکورد بزرگ‌ترین رصدخانه‌های جهان را شکستند. در اوایل قرن بیستم، هیل اعرگر ساخت نخستین رصدخانه‌ی خورشیدی به شکل برج‌های بند در مونت ویلسون بود. در این برج‌ها، آینه‌های اصلی در ارتفاع چند ده متری زمین نور را به سمت آشکارسازها در پایه‌ی برج کانونی می‌کنند.

اخترشناسان همراه با آلبرت اینشتین در مقابل تلسکوپ شکستی یک متری مرکز در ایالات متحده؛ آخرین تلسکوپ شکستی غول‌پیکر در دنیای نجوم.



ارتفاعات جزیره‌ی لاپالما در مجمع‌الجزایر قناری واقع در اقیانوس اطلس، محل برخی از بزرگ‌ترین رصدخانه‌های جهان است.



تلسکوپ ۵۰ سانتی متری
رصدخانه‌ی دانشگاه شیراز



رصدخانه‌های رباتی

با آن‌که تمام تلسکوپ‌های جدید به صورت غیردستی و با رایانه هدایت می‌شوند، برخی تلسکوپ‌ها توانایی آن را دارند که هزاران کیلومتر دورتر و بدون نیاز به نیروی انسانی تمام‌وقت، کاملاً رباتی و هوشمند، به کاوش آسمان بپردازند. این تلسکوپ‌ها به همراه گنبد و آشکارسازهای خود، از طریق اینترنت هدایت می‌شوند. با افزایش چنین تلسکوپ‌هایی در جهان، اخترشناسان کمتری برای مشاهدات خود به محل رصدخانه‌ها در قله‌های بلند و دوردست سفر خواهند کرد؛ زیرا می‌توانند از دفتر کار خود تلسکوپ را هدایت کنند و به مشاهده‌ی آسمان بپردازند. امروزه چنین تلسکوپ‌هایی حتی برای استفاده‌ی دانش‌آموزان نیز وجود دارد.



رصدخانه بدون گنبد

بسیاری از منجمان آماتور و مراکز نجوم آماتوری در جهان، که تصمیم می‌گیرند تلسکوپ خود را در محلی مناسب ثابت کنند، به جای ساخت گنبدی پرهزینه، آن را به سادگی درون اتاقکی با سقف کشویی قرار می‌دهند. با کنار رفتن سقف، تمام آسمان در برابر آن‌ها پیداست. این روش، مناسب جایی است که نور مستقیم مزاحمی در اطراف نباشد.



رصدخانه‌ی ملی ایران

اخترشناسان حرفه‌ای ایران در انتظار ساخت تلسکوپ بزرگی در ایران‌اند که برای تحقیقات به‌روز اخترشناسی قابل استفاده باشد. در حال حاضر، قطر آینه‌ی بزرگ‌ترین تلسکوپ ایران از حدود نیم متر بیش‌تر نیست؛ اما طرح رصدخانه‌ی ملی، تلسکوپی به قطر حدود ۳ متر است که بزرگ‌ترین تلسکوپ منطقه خواهد شد. این تلسکوپ، با توجه به توانایی هدایت رباتی، آشکارسازها و ساختار آنتیک جدید، در کنار تلسکوپ‌های غول‌پیکر جهان تلسکوپی توانا خواهد شد و علاوه بر رفع نیاز شماری از تحقیقات داخلی، در طرح‌های بین‌المللی با حضور شبکه‌ای از تلسکوپ‌ها همکاری خواهد کرد. طرح رصدخانه‌ی ملی ایران در اوایل دهه‌ی ۱۳۸۰ شمسی آغاز شد. این طرح با مدیریت کیهان‌شناس ایرانی، دکتر رضا منصوری، در پژوهش‌گاه دانش‌های بنیادی (IPM) با مشاوره‌ی علمی جمعی از اخترشناسان پیش می‌رود. قرار است تلسکوپ آن، که با همکاری متخصصان ایرانی طراحی می‌شود، در اوایل دهه‌ی ۱۳۹۰ شمسی، نخستین نور خود را دریافت کند. برای مکان‌یابی رصدخانه‌ی ملی ایران گروه‌های رصدگر با ابزارهای دقیق چندین سال در کوهستان‌های منتخب به ثبت داده‌های مورد نیاز پرداختند تا از بین چهار رصدگاه مطلوب در استان‌های کرمان، خراسان، اصفهان و قم، قله‌ی مرتفعی در نزدیکی کاشان انتخاب شد. این کار تحقیقاتی پرمشقت‌شان داد که نه فقط رصدگاه‌های بسیار تاریکی در ایران وجود دارد (که در خطر جدی گسترش شهرها و آلودگی نوری‌اند)، بلکه کشور ما دارای مکان‌های مناسبی با آشفستگی جو‌ی کم و دید نجومی مطلوب برای ساخت تلسکوپ‌های بزرگ‌تر در آینده است.

قله‌ای مرتفع در حوالی کاشان، مکان رصدخانه‌ی ملی ایران است.

رصدخانه‌های ایران


تا زمستان ۱۳۸۸، بیش از ۳۰ رصدخانه در ایران برای کاربری آموزشی، تفریحی و تحقیقاتی ساخته شده است که بیش‌تر آن‌ها به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی تعلق دارد و برخی نیز متعلق به مراکز عمومی، انجمن‌ها و مراکز نجوم است یا برای استفاده‌ی شخصی ساخته شده است. این رصدخانه‌ها شامل تلسکوپ‌هایی با اندازه‌ی ۲۰ تا ۶۰ سانتی مترند. بزرگ‌ترین تلسکوپ‌های بازتابی ایران تلسکوپ ۶۰ سانتی متری رصدخانه‌ی خواجه نصیرالدین توسی متعلق به دانشگاه تبریز و تلسکوپ ۵۰ سانتی متری رصدخانه‌ی ابوریحان بیرونی متعلق به دانشگاه شیراز است. بزرگ‌ترین تلسکوپ شکستی نیز تلسکوپ ۱۸ سانتی متری رصدخانه‌ی ری متعلق به مرکز نجوم در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) است. با تلسکوپ‌های رصدخانه‌ای ایران می‌توان فعالیت‌های آموزشی، آماتوری و عمومی بسیاری انجام داد؛ اما تلسکوپ مورد نیاز پژوهش‌های روز اخترشناسان حرفه‌ای، تلسکوپ‌های بسیار بزرگ‌تری با امکانات جدید و در مکانی مناسب به دور از نور شهر است.

دکتر رضا منصوری، مدیر طرح
رصدخانه‌ی ملی ایران



بیش‌تر بدانیم

تلسکوپ چگونه کار می‌کند؟ ۱۸
طرح‌های جدید و بزرگ‌ترین رصدخانه‌های جهان ۲۲



طرح‌های جدید و بزرگ‌ترین رصدخانه‌های جهان



کننده‌ها، با ارتفاع ۳۰ متر، تلسکوپ‌های کک را حفاظت می‌کنند. وزن خود تلسکوپ‌ها ۲۷۰ تن است و ارتفاعشان به اندازه‌ی ساختمانی ۸ طبقه است. آن‌ها بر قاب‌های سیکی سوارند که با وجود فراهم آوردن قدرت لازم برای نگهداری تلسکوپ، وزن و هزینه را کاهش می‌دهند.

محوطه‌ی جمع‌آوری نور در کک ۱۷ برابر تلسکوپ فضایی هابل است. دید هابل به سبب دوری از جو زمین، بسیار واضح‌تر است؛ اما تلسکوپ‌های کک احرام کم‌نورتر و دورتری می‌بینند.

هرچه آینه‌ی تلسکوپ بزرگ‌تر باشد، نور بیش‌تری جمع و جزئیات بیش‌تری رصد می‌شود. اما آینه‌هایی با قطر بیش از ۸ متر محدودیت‌هایی دارند. محدودیت اول، جو است: حتی تصویر یک آینه‌ی غول‌پیکر نیز، به سبب جبهه‌های دائماً در حال حرکت هوا در جو، آشفته می‌شود. محدودیت دوم اندازه‌ی تلسکوپ است: هرچه آینه‌ی تلسکوپ بزرگ‌تر باشد، حمل و نقل، و کار با آن مشکل‌تر است. در جدیدترین مدل‌های تلسکوپ‌های زمینی، راه‌حل‌های مبتکرانه‌ای برای مقابله با این محدودیت‌ها در نظر گرفته شده است.

تلسکوپ‌های کک

تلسکوپ‌های دوقلوی کک بر قله‌ی ۴۲۰۰ متری موناکی در هاوایی، بر فراز ابرها و بخار آب موجود در لایه‌های پایینی جو قرار دارند. قطر آینه‌ی اصلی هر یک از این دو تلسکوپ ۱۰ متر و محوطه‌ی جمع‌کننده‌ی نور در آن‌ها، نصف مساحت یک زمین تنیس است. آینه‌ی تکی به این ابعاد، زیر فشار وزن خود خمیده می‌شود. به همین سبب، هر یک از این آینه‌ها از ۳۶ تکه آینه‌ی شش ضلعی ساخته شده‌اند. وزن هر تکه ۴۰۰ کیلوگرم، عرض آن ۱/۸ متر و ضخامتش فقط ۷/۷ سانتی‌متر است.



آپتیک‌های فعال

نخستین آینه‌ی چند تکه در دنیا، که بر تلسکوپ کک استوار است، در سال ۱۳۷۱/۱۹۹۲ تکمیل شد. هر دو تلسکوپ کک از دستگاه آپتیک فعال، برای خشی کردن آشفته‌گی‌های حاصل از وزن آینه‌ها یا باد، استفاده می‌کنند. آینه‌ها روی پیستون‌هایی قرار دارند که با فشار، جهت آینه‌ها را تا دقت بسیار زیادی تنظیم می‌کنند. یک رایانه آینه‌ها را از طریق این پیستون‌ها هدایت می‌کند؛ یعنی هر قطعه‌ی سازنده‌ی آینه را دوبار در ثانیه با دقتی هزار بار ظریف‌تر از موی انسان تنظیم می‌کند. در نتیجه، این ۳۶ قطعه هم‌چون صفحه‌ی شیشه‌ای یک‌دست و واحدی عمل می‌کنند.

قدرت‌مندترین تلسکوپ‌های جهان

نام	قطر	موقعیت	توضیحات
تلسکوپ بسیار بزرگ (VLT)	۸/۲ × ۴ متر	شیلی	گردآوری نور برابر با آینه ۱۶/۴ متر
تلسکوپ دوچشمی بزرگ (LBT)	۸/۴ × ۲ متر	ایالات متحده	گردآوری نور برابر با آینه ۱۱/۸ متر
تلسکوپ بزرگ جزایر قناری (GTC)	۱۰/۴ متر	جزایر قناری	با آینه چند تکه مانند تلسکوپ‌های کک
تلسکوپ بزرگ آفریقای جنوبی (SALT)	۱۱ متر	آفریقای جنوبی	با محور ارتفاع ثابت و قطر مفید ۹/۸ متر
هابی - ابرلی	۱۱ متر	ایالات متحده	با محور ارتفاع ثابت و قطر مفید ۹/۲ متر
کک ۱	۱۰ متر	هاوایی	نخستین آینه‌ی چند تکه
کک ۲	۱۰ متر	هاوایی	دوقلوی کک ۱
سوبارو	۸/۳ متر	هاوایی	متعلق به ژاپن
چینی شمالی	۸/۱ متر	هاوایی	
چینی جنوبی	۸/۱ متر	شیلی	
تلسکوپ چند آینه‌ای (MMT)	۶/۵ متر	ایالات متحده	پیش‌تر آینه‌ای ۶ تکه داشت.
ماژلان I	۵/۶ متر	شیلی	
ماژلان II	۵/۶ متر	شیلی	
BTA	۶ متر	روسیه	نخستین تلسکوپ سمت - ارتفاعی بزرگ
هیل	۵ متر	ایالات متحده	بزرگ‌ترین تلسکوپ دنیا از ۱۹۴۸ تا ۱۹۷۹
ویلیام هرشل	۴/۲ متر	جزایر قناری	انگلستان / هلند / اسپانیا
لاموست (رصدخانه نجومی پکن)	۴/۲ متر	چین	تلسکوپ بزرگ چین
سروتولولو (معروف به بلانکو)	۴ متر	شیلی	
آنگلو - استرالیایی	۳/۹ متر	استرالیا	انگلستان / استرالیا
مایال	۳/۸ متر	ایالات متحده	تلسکوپ بزرگ رصدخانه‌ی کیت پیک
CFHT	۳/۶ متر	هاوایی	تلسکوپ کانادا، فرانسه، هاوایی

بزرگترین تلسکوپ‌ها

• در سال ۱۹۴۸ میلادی، ایالات متحده تلسکوپ ۵ متری هیل را بر کوهستان مونت پالومار کالیفرنیا تکمیل کرد که مقام «بزرگترین» را از تلسکوپ «۱۰۰ اینچی» یا ۲/۵ متری مونت ویلسون ربود. این تلسکوپ در سال ۱۹۱۷ ساخته شده بود. هیل داده‌ها را بر صفحه‌های عکاسی جمع‌آوری می‌کرد.

• از سال ۱۹۷۵ تا اواخر دهه ۱۹۸۰، چند تلسکوپ ۴ متری ساخته شد. با آن‌که این تلسکوپ‌ها از هیل کوچکتر بودند، در آن‌ها از آشکارسازهای الکترونیک حساس‌تری استفاده می‌شد.

• در سال ۱۹۷۶، روسیه تلسکوپ ۶ متری زیلین چوگسکایا (BTA) را برای رصدخانهی اختر فیزیکی در کوهستان قفقاز ساخت. این نخستین تلسکوپ عظیم جهان با استقرار سمت - ارتفاعی بود؛ اما اپتیک تلسکوپ مشکلاتی داشت.

• تلسکوپ ۱۰ متری تک در سال ۱۹۹۲ کامل شد. این نخستین تلسکوپ در دهه ۱۰ متری‌هاست که در آن از گشودگی زیاد دهانه استفاده شده است تا از بازده آشکارسازهای الکترونیک امروزی بهره ببرد.

• تلسکوپ بسیار بزرگ شامل چهار تلسکوپ ۸ متری است که از اوایل دهه ۲۰۱۰ چهار تلسکوپ به صورت آرایه‌ای واحد نیز، که برابر با تلسکوپ به قطر ۱۶/۴ متر است، کار خواهند کرد.

• تلسکوپ بزرگ آفریقای جنوبی (SALT) در سال ۲۰۰۵ کامل شد. آینه‌ی این تلسکوپ به قطر ۹/۸ × ۱۱ متر شامل ۹ قطعه شش‌ضلعی است و با توجه به شکل آینه و محور ارتفاع ثابت تلسکوپ، قطر مفید آینه ۹/۸ متر است.

• تلسکوپ دوچشمی بزرگ (LBT) در مونت‌گرام آریزونا (ایالات متحده) شامل دو آینه‌ی ۸/۴ متری کنار هم و روی یک پایه است که در سال ۲۰۰۷ کامل شد و با توان گردآوری نوری تلسکوپ ۱۱/۹ متری و توان تفکیک تلسکوپ ۲۳ متری به آسمان چشم می‌گشاید.

• تلسکوپ بزرگ جزایر قناری (GTC) با آینه چند تکه ۱۰/۴ متری در سال ۲۰۰۸ به آسمان چشم گشود.

• طرح‌های آینه‌ده، فن‌آوری ساخت آینه‌های سبک و آینه‌های غول‌پیکر چندتکه، آینه‌دهی شگفتی را از اخترشناسی رسم می‌کنند. اکنون رؤیای اخترشناسان، تلسکوپ‌های بسیار بزرگتر است. طرح تلسکوپ غول‌پیکر ماژلان (GMT) با ۷ آینه‌ی ۸/۴ متری (۶ آینه در اطراف و یکی در وسط) نخستین نمونه از این غول‌های آینه‌ده است که احتمالاً در سال ۲۰۱۸ کامل خواهد شد. قطر این تلسکوپ ۲۴/۵ متر خواهد بود و احتمالاً در شبلی نصب می‌شود. تلسکوپ فوق بزرگ (ELT) یا تلسکوپ غول‌پیکر بعدی را با آینه‌ی ۴۲ متری چندتکه، اروپایی‌ها می‌سازند که احتمالاً تا پایان دهه ۲۰۱۰ میلادی کامل خواهد شد.

ساختمان‌هایی که محافظ تلسکوپ‌های VLT هستند همراه با تجهیزات می‌چرخند تا چرخش زمین را جبران کنند.



تلسکوپ بسیار بزرگ


بزرگ‌ترین تلسکوپ جهان آرایه‌ی از تلسکوپ‌های سسار بزرگ (VLT)

رصدخانه‌ی جنوبی اروپا در شبلی ست این مجموعه شامل چهار تلسکوپ ۸۲ متری، هر یک یک میلیارد بار قدرت‌مندتر از چشم غیر مسلح است. تلسکوپ‌های VLT، که با رایانه‌ای قدرت‌مند به هم متصل‌اند، به اندازه‌ی یک تکه‌ای به قطر ۱۶/۴ متر نور جمع‌آوری می‌کنند. اگر قدرت آن‌ها به تلسکوپ ۱۸ متری دیگر در همان مکان ترکیب شود، قدرت دیدن حریات بسیاری ر برتری را بر پیدا می‌کنند؛ قدرتی که از نظر تئوری برای تشخیص فضاپرواز روی ماه کافی است از به چهارتایی س تلسکوپ‌ها در واین دهه ۲۰۱۰ میلادی آغاز به کار می‌کند.

تلفیق نوری

بج تلسکوپ کوچک، هریک با آینه‌ای به قطر ۴۰ سانتی‌متر، آرایه‌ی تدحل سطح کمریخ را می‌سازد که نمونه‌ی از چندین مجموعه تلسکوپ ترکیبی در جهان ست. ساختار این مجموعه بر پایه‌ی تدحل سطح‌های محوم رادیویی است؛ اما در نور مرئی، تلسکوپ‌ها در فصله‌ی ۱۰۰ متر پراکنده‌اند و به‌طور نظری، توان تفکیکی برابر آینه‌ی ۱۰۰ متری دارند؛ به‌طوری که توان شمردن پلاک یک خودرو را هرار کیلومتری حوند اما می‌ر گردآوری نور آن‌ها بسیار کمتر از چسب آینه‌ی بزرگی است

تلسکوپ نوری با دهانه‌ی تلفیقی در کمریخ.



بیش‌تر بدانیم

تلسکوپ فضایی هابل ۱۴ تلسکوپ چگونه کار می‌کند؟ ۲۴ تحلیل نور ۳۰ اخترشناسی رادیویی

آینه‌گردان نور را جمع‌آوری می‌کند.



فرستادن پرتو لیزر به آسمان نیومکزیکو.



اپتیک تطبیقی


به سب حرکت دائمی جو، دید ما از ستاره‌ها همواره آشفته می‌شود زیرا نور ستاره‌ها در عبور از جو بارها می‌شکند، تغییر جهت می‌یابد و تصویر هر حرم آسمانی از پس این لایه‌ی آشفته محو می‌شود. در اپتیک تطبیقی، پرتو لمری قدرت‌مند، در لایه‌های بالایی جو و در امتداد مکان ستاره‌ی مورد رصد، یک ستاره‌ی مصنوعی به‌وجود می‌آورد رایانه‌ای قدرت‌مند، چگونگی آشفته شدن نور ستاره‌ی مصنوعی را در گذر از جو بررسی می‌کند این رایانه صدها بار در هر لحظه، آینه‌ی عطف‌پذیری را به گونه‌ی تنظیم می‌کند که پرتوهای جبهه‌ی نور، بیش از رسیدن به کانون، همان‌طور که پیش از عبور از جو بودند، کاملاً موازی شوند. به این ترتیب، تمام تصاویری را که تلسکوپ می‌سازد، واضح می‌کند البته این روش بسیار زمان‌گیر است و هنوز به اندازه‌ی تلسکوپ‌های فضایی نتیجه‌بخش نیست

تحلیل نور

چشم انسان به حد کافی برای آشکارسازی نورهای کم فروغ مناسب نیست و سنجش های دقیق سماوی نیز با آن امکان پذیر نیست. به همین سبب اخترشناسان حرفه ای به ندرت از درون تلسکوپ نگاه می کنند. در عوض، تلسکوپ ها نور اجسامی چون ستاره ها، سحابی ها یا کهکشان ها را به کمک دوربین های الکترونیک حساسی ثبت می کنند. اگر جسم بسیار کم نور باشد، این دوربین ها از آن عکس هایی با نوردهی های چند دقیقه تا چند ساعتی می گیرند و در این مدت، نور کافی از آن جسم بر آشکارساز جمع می شود. طیف نگارها نور را به طول موج های گوناگون تشکیل دهنده ی آن می شکنند تا شدت هر یک را مشخص کنند و به دنبال اطلاعات فیزیکی و شیمیایی جسم در طیف نور آن بگردند؛ رایانه ها نتیجه را تحلیل می کنند تا میزان گرمای جسم و ترکیبات آن را نشان دهند. این دو ابزار، تا آخرین نکته ی اطلاعات را از نور سیاره، ستاره یا کهکشان می گیرند. باور نکردنی است که این همه اطلاعات از فیزیک و شیمی اجرام سماوی در باریکه ای از نور آن ها نهفته است.

تراشه های حساس به نور


تصاویر خیره کننده ی کهکشان ها، شبیه عکس یک دستی به نظر می رسند؛ اما در حقیقت، از دانه های مربع شکلی به نام پیکسل، هم چون تصویر صفحه ی تلویزیون یا نمایشگر رایانه، تشکیل شده اند. این تصاویر را به کمک دوربین های الکترونیک می گیرند که یک تراشه ی رایانه ای حساس به نور به نام ابزار مزدوج کننده ی بار الکتریکی (CCD) دارند. CCD بسیار حساس تر از صفحه های عکاسی اند؛ در نوردهی ۲ دقیقه ای با CCD جزئیاتی به کم سویی جزئیات نوردهی یک ساعته با فیلم عکاسی ظاهر می شود. بسیاری از کارشناسان، تحولی را که CCD ها در علم اخترشناسی ایجاد کرده اند، با تحول ورود تلسکوپ به دنیای نجوم مقایسه می کنند. در حالی که چشم انسان یا فیلم های عکاسی عادی فقط چند درصد از فوتون های نوری را ثبت می کند، دوربین های CCD چنان حساس اند که اغلب بیش از ۷۰ درصد از فوتون های نور را آشکار می کنند. در نتیجه، پژوهش های بسیار بیش تری در زمان کوتاه تری و به صورت کامل تری انجام می شود.



اگر تصویر CCD را بزرگ کنیم به مربع های رنگی یا پیکسل، تقسیم می شود و نشان می دهد که تصویری دیجیتالی است.


تصویر CCD از کهکشان مارپیچی NGC ۵۲۵۷

تصاویر کهکشان NGC ۵۴۵۷ را، که با فیلترهای رنگی گرفته شده است، می توان با هم ترکیب کرد تا تصویر تمام رنگی بالا بدست آید.




ابزار مزدوج کننده ی بار الکتریکی (CCD)

اساس دوربین های فیلم برداری خانگی و بسیاری از دوربین های تلویزیونی و دوربین های عکاسی دیجیتالی، CCD است. CCD تراشه ی سیلیکونی نازکی با سطح حساس به نور است که به هزاران یا میلیون ها پیکسل مربعی (اجزای سازنده ی تصویر) تقسیم شده است. وقتی نور به پیکسل می رسد، بار الکتریکی تولید می شود؛ هرچه نور بیش تر باشد، بار بزرگ تر است. در پایان زمان نوردهی، مدارهایی الکتریکی که پشت تراشه ساخته شده اند، بارهای رهاسده و مکان مربوط به آن ها را ردیف به ردیف می خوانند و شمارش می کنند. سپس آمار را به رایانه ی متصل به CCD می فرستند تا به صورت تصویر دیجیتالی در آن ذخیره شود.




CCD نصب شده بر یک تلسکوپ شامل ۵۲۴,۲۸۸ پیکسل بر تراشه ی به اندازه ی یک تمپر پستی است.

نور آمده از تلسکوپ



CCD سه بار، هر بار از یک فیلتر، نور می گیرد.

پیکسل های CCD، مربع سیلیکونی اند که با دیواره های عایق بسیار نازکی از هم جدا شده اند. وقتی نور با پیکسل برخورد می کند، الکترون هایی با بار منفی از سیلیکون رها و بار مثبت در پیکسل تولید می شود.



پیکسل باردار

علامت به رایانه می رود

رنگی دیدن

CCD ها فقط سیاه و سفید می بینند؛ اما رنگ، اطلاعات ارزشمندی هم چون دمای ستاره ها، در اختیار ما می گذارد. اخترشناسان، برای به دست آوردن تصویری تمام رنگی، از جسم مورد نظر چندین بار با فیلترهای رنگی عکس می گیرند. سپس این تصاویر را با هم ترکیب می کنند. همه ی اخترشناسان از فیلترهای رنگی یکسان سبز، آبی و قرمز استفاده می کنند. به این ترتیب، مقایسه ی تصاویر گرفته شده با تلسکوپ های متفاوت، ساده تر می شود.

کهکشان NGC ۵۴۵۷ آن قدر کم فروغ است که چشم انسان از درون تلسکوپ فقط درخشانترین بخش‌های آن را می‌بیند.

طیف‌سنجی

نور ترکیبی از طول موج‌های گوناگون است که هر یک با رنگ متفاوتی متناظر است. کوتاه‌ترین طول موج‌های نور مرئی، بنفش و بلندترین آن‌ها قرمز است. اخترشناسان برای طیف‌سنجی، از منشور یا توری پراش (صفحه‌ای شیشه‌ای که بر سطحش هزاران خط بسیار نزدیک و متقاطع حکاکی شده است)، جهت شکستن نور به طیفی از رنگ‌ها استفاده می‌کنند. وقتی طیف اجرام آسمان گرفته می‌شود، خطوط تیره یا روشنی در طول موج‌های گوناگون دیده می‌شوند که طیف را قطع کرده‌اند. به خطوط تیره، جذبی و به خطوط روشن، نشری می‌گویند. قدرت طیف‌سنجی در تحلیل این خطوط نهفته است تا عناصر موجود در جسم آسمانی و میزان حرارت آن را مشخص کند.



رایانه‌ها در اخترشناسی

رایانه‌ها کار رسیدگی به داده‌های نجومی را به عهده گرفته‌اند. امروزه بیش‌تر داده‌ها، مانند خروجی CCDها و طیف‌نگارها، به صورت دیجیتالی به دست می‌آیند و تحلیل آن‌ها با رایانه کار ساده‌ای است. از رایانه برای پردازش تصاویر و برجسته‌سازی برخی جزئیات مطلوب تصویر نیز استفاده می‌شود. به علاوه، با رایانه‌ها می‌توان در صفحه‌های عکاسی، به دنبال موضوعات گوناگون گشت. به این ترتیب، ساعت‌ها در وقت اخترشناسان صرفه‌جویی می‌شود.




▲ تلسکوپ انگلو - استرالیایی پیش از تسلط CCDها، برخی از زیباترین عکس‌های نجومی را بر صفحه‌های عکاسی، که در کانون آن قرار می‌گرفت، ثبت می‌کرد. اکنون آرایه‌ای از CCDها جای‌گزین این صفحه‌ها شده است.

روش جداسازی رنگ‌ها: سه صفحه‌ی عکاسی سیاه و سفید را با فیلترهای متفاوت، نور می‌دهیم. سپس آن‌ها را با کمک همان فیلترها، اما روی یک صفحه کاعد عکاسی، چاپ می‌کنیم تا تصویری تمام‌رنگی به دست آید.

صفحه‌های عکاسی

پیش از ظهور CCDها، کار اخترشناسان با صفحه‌های سیاه و سفید عکاسی پیش می‌رفت. صفحه‌های عکاسی هنوز هم برای برخی اهداف ضروری‌اند مثلاً تلسکوپ زاویه‌باز اشعیت در هر نوردهی، میلیون‌ها ستاره و کهکشان را ثبت می‌کند؛ اما به ابتکار ساز بوری حمیده‌ای به طول ۳۰۰ میلی‌متر (بسیار بزرگ‌تر از CCD) نیاز دارد. می‌توان صفحه‌ی عکاسی بزرگی را با قدر خمیده کرد تا بر کانون تلسکوپ اشعیت منطبق شود. البته امروزه با پیش‌رفت فن‌آوری ساخت CCDها در کانون تلسکوپ‌های اشعیت بزرگ نیز آرایه‌ای از چندین CCD کنار هم و با زاویه‌ی مناسب قرار می‌گیرند.



خطوط طیفی عناصر		
عناصر	طول موج‌ها (نانومتر)	
آلومینیوم	۳۹۴	-
کلسیم	۳۹۳	۳۹۷
هلیوم	۴۶۷	۵۸۸
هیدروژن	۴۳۴	۴۸۶
آهن	۳۷۳	۳۷۵
منیزیم	۳۸۳	۳۸۴
نیتروژن	۶۵۵	۶۵۸
اکسیژن	۵۰۱	۶۳۰
سیلیکون	۳۹۰	-
سدیم	۵۸۹	۵۹۰

بیش‌تر بدانیم

تلسکوپ چگونه کار می‌کند؟ ۱۸، تابش‌هایی از فضا ۲۶ اندازه‌های ستاره‌ها ۱۸۲، ویژگی‌های ستاره‌ها ۱۸۸

تابش‌هایی از فضا

در اواخر قرن بیستم، ابداعی به اهمیت اختراع تلسکوپ، دانش اخترشناسی را زیرورو کرد. این فناوری جدید به اخترشناسان امکان داد همه‌ی تابش‌هایی را که از اجسام در فضا می‌رسد و نه فقط نور مرئی را بگیرند. دریافت نور مرئی فقط بخشی از داستان را بازگو می‌کند. این کار شبیه داشتن یک قطعه از یک پازل بزرگ یا شنیدن فقط یک نت از تمام یک قطعه‌ی موسیقی است.

برای این که موسیقی را کامل درک کنید، باید به همه‌ی نت‌ها، از ریزترین تا بم‌ترین، گوش کنید. نور مرئی فقط بخشی از کل تابش الکترومغناطیس است. با دریافت امواج نامرئی، هم‌چون امواج رادیویی و پرتو ایکس، تصویری از عالم پیش چشمان ما نقش می‌بندد که به نحو شگفت‌آوری با تصویر نور مرئی متفاوت است. فقط با کنار هم چیدن تصاویر و اطلاعات تمام این تابش‌ها، چهره‌ی واقعی کیهان پیرامون ما تا حدی مشخص می‌شود.

فراسوی جو

ستاره‌ها، کهکشان‌ها و دیگر اجسام در فضا، تابش الکترومغناطیس ارسال می‌کنند. این تابش، چه به صورت نور و چه به صورت امواج رادیویی، شامل جریانی از میدان‌های مرتعش الکتریکی و مغناطیسی است که رو به بیرون منتشر می‌شوند. این تابش، با سرعت ۳۰۰ هزار کیلومتر بر ثانیه (سرعت نور)، هزاران یا حتی میلیون‌ها سال نوری راه را طی می‌کند تا به ما برسد. اما وقتی به ما رسید، بیش‌تر آن در جو زمین جذب می‌شود. اخترشناسی نامرئی زمانی متولد شد که اخترشناسان قادر به دریافت این تابش‌ها در فضا شدند.

خوشه کهکشان‌ها
(پرتو ایکس)

هسته اختروش
(پرتو گاما)

منابع نرژژی

طول موج‌های کوتاه در طیف الکترومغناطیس، تابش‌های نرژژی و طول موج‌های بلندتر تابش‌های کم نرژژی برید. بواهی نرژژی در عالم، تابش‌هایی با طول موج کوتاه می‌فرستند. وقتی الکترون‌ها و پادماده یک‌دیگر را نابود می‌کنند، ممکن است پرتو گاما تابش سود که نرژژی‌ترین تابش است. گازهای سیار دای در خوشه‌های کهکشانی پرتو ایکس و جود دای طراف ستاره‌ها، تابش فرست می‌فرستند در زیر، ارتفاع مداری برخی ماهواره‌های کارآمد گذشته، که علم را در بین طول موج‌ها کوش کردند، نشان داده شده است در نرژژی‌های زیاد اکنون رصدخانه‌ی فضایی پرتو ایکس چاندرا و ماهواره‌ی سوئیفت، فعال‌ترین‌اند.

رصدخانه پرتو
گاما کامپون

ماهواره روست
(پرتو ایکس)

رصدخانه‌های مداری

گازهای جو زمین بیش‌تر طول موج‌ها را، به‌جز مرئی، رادیویی و بخش کوچکی از فرسرخ جذب می‌کنند. بنابراین، ماهواره‌ها، که این تابش‌ها را مستقیم از فضا می‌گیرند، آن‌ها را بهتر بررسی می‌کنند. تلسکوپ فضایی هابل نیز به فراز جو رفت تا بدون اثر محوکننده‌ی هوای متلاطم لایه‌های پایینی جو، دید واضح‌تری داشته باشد و فارغ از شب و روز، هوای ابری یا صاف، همواره آسمان را کاوش کند.


تلسکوپ خورشیدی اسکای
لب (فرابنفش شدید)

ارتفاعی که جو تا
آنجا همگی تابش را
جذب کرده است.

بالن حامل آشکارسازهای
پرتو ایکس و گاما

طول موج‌های درون بخش آبی روشن
از سطح زمین رصد نمی‌شوند.

طیف هیچ انتهایی ندارد؛ اما
پرتوهای گاما با طول موج
کوتاه و کوتاه‌تر (و انرژی
بیش‌تر) در عالم نادرند.



طیف الکترومغناطیس

همه‌ی امواج تابشی مانند امواج دریا حرکت می‌کنند؛ اما در محیط خلأ با فضای بدون ماده هم منتقل می‌شوند. به فاصله‌ی بین دو قله‌ی موج، طول موج می‌گویند. تابش‌های متفاوت را طول موج‌های گوناگون از هم متمایز می‌کند. آن‌هایی که طول موج کوتاه‌تری دارند، بسامد (فرکانس یا تعداد موج در ثانیه) بلندتری دارند و حامل انرژی بیش‌تری هستند.

پرتوهای گاما کوتاه‌ترین طول موج - کمتر از ۰/۰۱ نانومتر (یک میلیاردم با ۱۰^{-۱۱} متر) - را دارند. آن‌ها نرژژی‌ترین شکل تابش‌اند. برخی از بارزترین منابع این تابش فوران‌گرهای اسرارآمیز پرتو گاما هستند که ممکن است ستاره‌های منفجرشونده‌ی (ابرناخته‌ها) ابر قدرت‌مند در دورست‌های کیهان باشند.

پرتو ایکس را بیش از هر جای دیگر گازهای داغ کیهانی، همان‌طور که بین کهکشان‌ها و نزدیک سیاهچاله‌ها یافت شده‌اند، با دمای بین یک میلیون تا ۱۰۰ میلیون درجه‌ی سانتی‌گراد تابش می‌کنند. آشکارسازهای پرتو ایکس بیش از تلسکوپ به شمارش‌گر گایگر شباهت دارند. لایمی بالایی جو زمین پرتو ایکس را جذب می‌کند.

تابش فرابنفش: داغ‌ترین ستاره‌ها بیش‌تر انرژی خود را در این طول موج می‌فرستند. لایمی از آن در جو زمین ما را از تابش فرابنفش آسیب‌زای خورشید در امان نگه می‌دارد؛ اما مانع دید اخترشناسان از عالم فرابنفش نیز می‌شود.

منابع کم انرژی

بوی خنک تر عالم تابش هایی با طول موج بلندتر می فرستند. ستاره ها نور مرئی و اجسام خنک تری مانند ستاره های تازه متولد شده و سیارات و ابرهای غباری، امواج فروسرخ تابش می کنند. بخش بزرگی از موج رادیویی را بره های کیهانی و الکترون هایی تولید می کنند که با سرعت از میان میدان مغناطیسی کهکشان های رادیویی دور دست می گذرند.

ابر نمره ی سارنده ی
ساره ها (فروسرخ)

ستاره ها (مرئی)

ستاره جوان با فوران
گاز (فروسرخ)

تاج خورشید
(فرابنفش)

تلسکوپ نجومی سوار
بر شاتل (فرابنفش)

بقایای ابرنواختر
(امواج رادیویی)

لبه های کهکشان رادیویی
(امواج رادیویی)

تابش زمینه کیهانی باقی مانده از
انفجار بزرگ (امواج رادیویی)



کوسی (امواج
رادیویی)



رصدخانه فضایی
فروسرخ (ISO)



تلسکوپ فضایی هابل
(عمدتاً نور مرئی)



مانع جو

ملکول های جو زمین، برخی طول موج ها، مانند فرابنفش را بیش تر از دیگر طول موج ها جذب می کنند. پرتوهای ایکس و گاما به حد کافی به جو نفوذ می کنند که آشکار سازهای سوار بر بالن ها آنها را ثبت کنند. نور فروسرخ را هم تلسکوپ های سوار بر هواپیماهای بلند پرواز آشکار می کنند.

رصدخانه های زمینی

فقط دو نوع تابش الکترومغناطیس، بدون جذب شدن در جو، به سطح زمین می رسد: نور مرئی و امواج رادیویی با طول موج های کوتاه تر. تلسکوپ های رادیویی در دشت های پست و گاهی هم سطح دریا قرار می گیرند؛ اما تلسکوپ های نور مرئی بر فراز کوهستان های بلند، بر فراز بیش تر جریان های هوا که نور رسیده از فضا را آشفته می کنند، ساخته می شوند.

رصدخانه هوانبرد
سوفیا (فروسرخ)

هیچ طول موجی کوتاه تر
از ۳۱۰ نانومتر به سطح
زمین نمی رسد.

تلسکوپ های نور مرئی
و فروسرخ بر فراز
کوهستان های بلند

رصدخانه آرسیبو
(امواج رادیویی)

آرایه بسیار بزرگ VLA
(امواج رادیویی)

۲۰۰ کیلومتر

۱۰۰ کیلومتر

سطح دریا

امواج رادیویی

فروسرخ

نور مرئی

۱ KM ۱۰۰ M ۱۰ M ۱ M ۱۰ CM ۱ CM ۱ MM ۰.۱ MM ۰.۰۱ MM ۱۰۰۰ NM ۱۰۰ NM

امواج رادیویی را بسیاری از اجسام، از ابرهای کیهانی، بقایای انفجارهای ابرنواختری و کهکشان های فعال تا خود انفجار بزرگ (مهانگ)، می فرستند. «پنجره ای» در جو زمین به امواج رادیویی، با طول موج کوتاه تر از حدود ۱۰۰ متر، اجازه می عبور می دهد و این تابش هم به سطح زمین می رسد. امواج بلندتر از لایه های بالایی جو به فضا بازتاب می شوند.

فروسرخ، یا تابش حرارتی، بیش تر از اجسامی تا دمای حداکثر یکی دو هزار درجه ی سانتی گراد، از سحابی ها تا ستاره های در حال تولد و کوتوله های لوه های می رسد. این تابش در لایه های پایین جو جذب می شود؛ اما بخش هایی از آن را می توان از فراز کوهستان ها یا سوار بر هواپیماها رصد کرد

تابش مرئی، یا پرتو نور، طول موجی بین ۳۹۰ تا ۷۰۰ نانومتر دارد. این تابش، از میان «پنجره ی» بار جو، به سطح زمین می رسد. تا همین اواخر، این نوار باریک در طیف گسترده ی پرتوهای الکترومغناطیس تنها روزنه ی بررسی عالم برای اخترشناسان بود.

بیش تر بدانیم

- اخترشناسی فروسرخ ۲۸
- اخترشناسی رادیویی ۳۰
- اخترشناسی فرابنفش ۳۲
- اخترشناسی پرتو ایکس ۳۴
- اخترشناسی پرتو گاما ۳۶

اخترشناسی فروسرخ

تفاوت‌های حرارتی

آشکارسازها، حرارت متفاوتی را از بخش‌های گوناگون یک جسم ثبت می‌کنند: در تصویر فروسرخ فیل، تفاوت دما حدود یک درجه‌ی سانتی‌گراد است. اخترشناسان به کمک نور فروسرخ، می‌توانند گستره‌ی دمایی وسیع‌تری، از ستاره‌هایی با دمای چند هزار درجه‌ی سانتی‌گراد تا ابرهای غباری بسیار سرد با دمای ۲۵۰- درجه‌ی سانتی‌گراد را رصد کنند. این اجسام، در عالمی که دمای ابرهای گازی ممکن است به میلیون‌ها درجه برسد، اجسام خنکی‌اند.




طول موج‌های فروسرخ

تابش فروسرخ، همان‌طور که از نامش پیداست، درست پس از انتهای سرخ طیف مرئی قرار دارد. این تابش در مقایسه با نور مرئی بخش وسیع‌تری از طیف الکترومغناطیس را می‌پوشاند: از ۷۰۰ نانومتر (یک میلیارد یک متر) تا یک میلی‌متر، جایی که امواج رادیویی آغاز می‌شوند.

اخترشناسان تابش فروسرخ را به چهار ناحیه تقسیم می‌کنند: فروسرخ نزدیک، میانی و دور، و امواج زیر میلی‌متری (امواج مایکروویو یا ریزموج). رصد تابش فروسرخ همیشه نبردی با جو زمین است، زیرا دی‌اکسید کربن و بخار آب، نور فروسرخ را جذب می‌کنند. اما برخی طول موج‌های بلندتر و کوتاه‌تر فروسرخ به قله‌های کوهستانی می‌رسند.



هلیوم مایع که به درون محفظه‌ی دوربین فروسرخ ریخته می‌شود، آن را تا ۲۷۰- درجه‌ی سانتی‌گراد خنک نگه می‌دارد.




تلسکوپ‌های فروسرخ زمینی

تلسکوپ‌های فروسرخ شبیه تلسکوپ‌های نور مرئی‌اند: دز حقیقت، جدیدترین تلسکوپ‌های بازتابی بزرگ را برای رصد هم‌زمان نور مرئی و فروسرخ طراحی کرده‌اند. البته رصدخانه باید در ارتفاعات باشد. دورین فروسرخ باید دستگاه سردکننده‌ای داشته باشد تا تابش فروسرخ حاصل از حرارت خودش با امواج ضعیف فروسرخ فضایی تداخل پیدا نکند. رصدگاه در قاره‌ی سردسیر، خشک و مرتفع جنوبگان یکی از بهترین مناطق شناخته شده‌ی روی زمین برای مشاهده‌ی فروسرخ کیهانی است.


تلسکوپ‌های مهم فروسرخ

نام	قطر آینه	مکان	ارتفاع به کیلومتر	تاریخ فعالیت
تلسکوپ قطب جنوب	۱۰ متر	جنوبگان	۳	۲۰۰۷-
تلسکوپ فروسرخ انگلستان	۳/۸ متر	هاوایی	۴/۲	۱۹۷۹-
تلسکوپ فروسرخ ITF ناسا	۳ متر	هاوایی	۴/۲	۱۹۷۹-
زیر میلی‌متری گلنگ	۱۰ متر	هاوایی	۴/۲	۱۹۸۷-
جیمز کلرک مکسول	۱۵ متر	هاوایی	۴/۲	۱۹۸۷-
رصدخانه‌ی هوانبرد کوپری	۰/۹ متر	لکه‌ی C141	۱۲/۵	۱۹۷۴-۱۹۹۵
سوفیا	۲/۵ متر	یوپیونگ SPV47	۱۳	۲۰۱۰-
ایراس	۰/۶ متر	مدار قطبی	۹۰۰	۱۹۸۳
ISO	۰/۶ متر	مدار استوایی	۱۰۰۰	۱۹۹۵-۱۹۹۸
رصدخانه‌ی فضایی اسپیتزر ناسا	۰/۸۵ متر	مدار خورشیدی	۵۰ میلیون	۲۰۰۳-
آکاری	۰/۶۷ متر	مدار	۷۰۰	۲۰۰۶-
هرشل	۳/۵ متر	نقطه‌ی لاگرانژی	۱/۵ میلیون	۲۰۰۹-۲۰۱۰
ویستا	۴/۱ متر	شیلی	۲/۵	۲۰۰۹-

این ابرهای غباری عظیم و سرد در این تصویر ماهواره‌ای نجومی فروسرخ (ایراس) همان ناحیه را نشان می‌دهد.



صورت فلکی جبار در طول موج‌های مرئی با هفت ستاره، که شکل کلی شکارچی را می‌سازند، مشخص می‌شود.




در مدار

رصدخانه‌ی فضایی فروسرخ اروپایی (ISO)، درست بر فراز حوَرِ زمین، ماهواره‌ای بود که افق‌های جدیدی در بررسی کهکشان‌های تصادم‌کننده، راینک‌های ستاره‌ای پنهان و ابرهای میان‌ستاره‌ای پیش چشم ما را رسم کرد. این تلسکوپ در درون فلاسک عظیمی جاسازی کرده بود که آن را تا ۲۷۰- درجه‌ی سانتی‌گراد خنک نگه می‌داشت تا حرارت خودش با امواج فضایی تداخلی ایجاد نکند. پس از سه سال، که هلم مایع خنک‌کننده‌ی تلسکوپ به پایان رسید، رصدخانه‌ی ISO هم تمام شد. اکنون رصدخانه‌ی فضایی فروسرخ پیش‌رو تلسکوپ اسپیتزر یا SIRT است که در سال ۲۰۰۳ میلادی در مداری به فاصله‌ی بسیار دور از زمین قرار گرفت و تاکنون دست‌اوردهای سگفتی داشته است.



ابرهای میان‌ستاره‌ای در جبار

تلسکوپ‌های فروسرخ به مواد سرد و ولرم، از جمله‌ی ابرهای وسیع گرد و غبار، که صدها سال نوری در سرتاسر صورت فلکی جبار گسترده شده‌اند، حساس‌اند. آن‌ها عموماً دمایی حدود ۲۰۰- درجه‌ی سانتی‌گراد دارند (قرمز در تصویر ماهواره‌ای ایراس). در نواحی چگال‌تر، حرارت ستاره‌های تازه متولد شده گاز و غبار اطراف را تا هزار درجه‌ی سانتی‌گراد گرم می‌کند (نواحی سفید). از دید تلسکوپ‌های نور مرئی این ابرها فقط مانند اشباحی تیره دیده می‌شوند. در عوض، بیش‌تر ستاره‌هایی که در نور مرئی دیده می‌شوند، داغ‌تر از آن‌اند که در نور فروسرخ خود را نشان دهند.



سال‌شمار اخترشناسی فروسرخ

• در سال ۱۸۰۰، سر ویلیام هرشل دریافت که اگر حرارت‌سنجی را پشت انتهای قرمز طیف خورشید قرار دهیم، حرارتی را ثبت می‌کند. او این تابش نامرئی را فروسرخ نامید.

• در سال ۱۹۶۹، در نخستین جست‌وجوی فروسرخ آسمان از روی زمین، تعداد ۵۶۱۲ ستاره‌ی سرد شناسایی شد.

• ماهواره‌ی ایراس، که در سال ۱۹۸۳ پرتاب شد، ۲۵۰ هزار منبع فروسرخ کیهانی کشف کرد. این منابع شامل کهکشان‌های بسیار ستاره‌ساز هم بودند. این کهکشان‌ها با متولد کردن هزاران ستاره، بیش‌تر از تابش نور مرئی، از خود تابش فروسرخ یا حرارت می‌فرستادند.

• در سال ۱۹۹۴، تلسکوپ‌های فروسرخ در زمان برخورد دنباله‌دار شومیکر-لوی ۹ با مشتری، توده‌های گازی بسیار داغی به وسعت ۳ هزار کیلومتر آشکار کردند.

• در سال ۱۹۹۸، رصدخانه‌ی فضایی فروسرخ (ISO) کشف کرد که آب به‌طور گسترده در فضا، از برخی امار تا ابرهای میان‌ستاره‌ای، پراکنده است.

• در سال ۲۰۰۳، چهارمین رصدخانه‌ی فضایی بزرگ ناسا (تلسکوپ اسپیتزر) با هدف کاوش دنیای فروسرخ به فضا رفت. یافته‌های بسیار آن تاکنون در دانش ما از زمینه‌های گوناگون، از سیارات فراخورشیدی و کوتوله‌های قهوه‌ای تا ابرهای غبار کیهانی، تولد نخستین ستاره‌ها و خوشه‌های کهکشانی دور دست، تحولاتی پدید آورده است.

بیش‌تر بدانیم

تلسکوپ چگونه کار می‌کند؟ ۱۸ تحلیل نور ۲۴، تابش‌هایی از فضا ۲۶ چرخه‌ی زندگی ستاره‌ها ۱۹۰، فضای میان ستاره‌ای ۲۱۶



رصدخانه‌ی هابوند سوفیا

رصدخانه‌ی پوش کره‌ای برای اخترشناسی فروسرخ (سوفیا - SOFIA) یک بویینگ SPV۴۷ تغییر یافته است که تلسکوپ فروسرخ را بر فراز جو جذب‌کننده‌ی نور فروسرخ حمل می‌کند. استفاده از این هواپیما کم‌هزینه‌تر و انعطاف‌پذیرتر از ماهواره است و می‌توان تلسکوپ بزرگ‌تری را با آن حمل کرد. آینه‌ی ۲/۵ متری این رصدخانه بسیار بزرگ‌تر از آینه‌ی رصدخانه ISO است.

اخترشناسی رادیویی

اخترشناسان با دریافت امواج رادیویی از فضا، بسیاری از پُرانرژی‌ترین اجسام و انفجاری‌ترین وقایع را در عالم کشف کرده‌اند. این کشف‌ها عبارت‌اند از بقایای انفجارهای ابرنواختری، گرداب‌های ماده در اطراف سیاه‌چاله‌های ابرپُر جرم، و حتی تابش بازمانده‌ای از انفجار بزرگ که عالم از آن متولد شد. آنان می‌توانند با تلسکوپ‌های رادیویی، ملکول‌ها، یعنی مواد اولیه‌ی ساخت سیارات جدید و حتی حیات را در فضا دنبال کنند. طبق قوانین بین‌المللی، هیچ‌کس حق ندارد در طول موج‌هایی که برای بررسی عالم استفاده می‌شوند، برنامه‌ی رادیویی ارسال کند. البته حتی با وجود این نیز تلسکوپ‌های رادیویی هم‌چنان در معرض آلودگی رادیویی، مثلاً از سوی تلفن‌های همراه، قرار دارند. صداهای حاصل از زندگی ماشینی انسان، «سکوت» مورد نیاز اخترشناسی رادیویی را برهم زده است.


طیف رادیویی

امواج رادیویی در میان تمام تابش‌های الکترومغناطیس بلندترین طول موج را دارند که همه‌ی طول موج‌های بلندتر از یک میلی‌متر را شامل می‌شوند. بیش‌تر امواج رادیویی به درون جو زمین نفوذ می‌کنند و به سطح زمین می‌رسند. در حالی‌که امواج رادیویی بلندتر از ۱۰۰ متر از لایه‌ی یون‌کره، بر فراز جو، به فضا بازتاب می‌شوند. دانشمندان اغلب با واحد فرکانس به امواج رادیویی اشاره می‌کنند. فرکانس یا بسامد تعداد موج‌هایی است که در هر ثانیه می‌گذرد. هرچه طول موج کوتاه‌تر باشد، فرکانس بیش‌تر است.



بشقاب رادیویی


تلسکوپ رادیویی بزرگ رصدخانه‌ی رادیویی نویپاما در ژاپن بشقاب خمیده‌ای به قطر ۴۵ متر دارد که ۱۰ برابر بزرگ‌تر از زمین تنیس است. با این حال، سطح آن چنان صیقلی و هموار است که با خطا و ناهمواری کمتر از پهنای یک برگ علف ساخته شده است. این سطح دقیق موجب می‌شود که این بشقاب، تابش‌هایی با طول موج میلی‌متری را از ملکول‌های گاز در فضای بین ستاره‌ها کانونی کند.



تلسکوپ‌های مهم رادیویی		
نام	اندازه	مکان
تک‌بشقاب‌ها		
آرسیبو	۳۰۵ متر	پُرتوریکو
گرین‌بنک	۱۰۰ × ۱۱ متر	ایالات متحده
افلزبرگ	۱۰۰ متر	آلمان
جودول‌بنک	۷۶ متر	انگلستان
پارکز	۶۴ متر	استرالیا
نویپاما	۴۵ متر	ژاپن
ایرام (IRAM)	۳۰ متر	اسپانیا
جیمز کلرک مکسول	۱۵ متر	هاوایی
ESO - سوندی	۱۵ متر	شیلی
تلسکوپ امواج میلی‌متری کیت پیک	۱۱ متر	ایالات متحده
فضایپای پلانک	—	فضا؛ نقطه‌ی دوم لاگرانژی
آرایه‌ها		
آرایه با خط مبنا بسیار طولانی (VLBA)	۸۰۰۰ کیلومتر/۱۰ بشقاب	سرتاسر ایالات متحده
تلسکوپ استرالیا	۳۲۰ کیلومتر/۸ بشقاب	استرالیا
مرلین (MERLIN)	۲۳۰ کیلومتر/۷ بشقاب	انگلستان
آرایه‌ی بسیار بزرگ (VLA)	۳۶ کیلومتر/۲۷ بشقاب	ایالات متحده
بیما (BIMA)	۲ کیلومتر/۱۰ بشقاب	ایالات متحده
پلاندوبور	۰/۴ کیلومتر/۵ بشقاب	فرانسه
آرایه‌ی زیر میلی‌متری	۰/۵ کیلومتر/۸ بشقاب	هاوایی
تلسکوپ رادیویی غول‌پیکر متر موج (GMRT)	۲۵ کیلومتر/۱۴ بشقاب	هند

آرایه‌های تلسکوپ

وصوح تصاویر تلسکوپ‌های رادیویی، کمتر از تصاویر تلسکوپ‌های نور مرئی است. زیرا امواج رادیویی، بلندتر از امواج نور مرئی‌اند و توان تفکیک حریمیت به طول موج نور دریافتی نیز و سته است. هرچه طول موج بیشتر باشد، قدرت تفکیک ما کمتر است. مگر این‌که از تلسکوپ بزرگ‌تری استفاده کنیم. در امواج رادیویی، برای ثبت همان حریمیتی که با تلسکوپی کوچک در نور مرئی می‌بینیم، به تلسکوپی ۱۰ دهه‌ای چند کیلومتری نیاز داریم. اخترشناسان برای آشکارسازی حریمیت بیش‌تر، به متصل کردن چند تلسکوپ کوچک به هم، تلسکوپ بزرگ‌تری می‌سازند. ۲۷ بشقاب آرایه‌ی بسیار بزرگ (VLA) روی ریل‌هایی در امتداد ۷۰ کیلومتر حرکت می‌کنند و دورترین بشقاب‌ها حداکثر به فاصله‌ی ۳۶ کیلومتر از هم می‌رسند. آرایه با خط مبنای بسیار بلند (VLBA) در سراسر ایالات متحده گسترده شده است و در امواج رادیویی تصویری با تفکیک بیش‌تر از تصویر تلسکوپ فضایی هابل در نور مرئی به دست می‌دهد؛ البته علاوه بر محدودیت‌های بسیار اجرایی، با این بشقاب‌های دور، به سبب شمار کم بشقاب‌ها و فاصله‌ی بسیار زیاد آن‌ها تابش بسیار کمی در مقایسه با این «بزرگ‌نمایی» گردآوری می‌شود و فقط می‌توان به بررسی منابع رادیویی در حاشان پرداخت.



آرایه‌ی بسیار بزرگ (VLA) در نومتزیکو.

سال‌شمار

اخترشناسی رادیویی



آنتن ابتدایی تلسکوپ رادیویی یانسنکی.

- اخترشناسی رادیویی در سال ۱۹۳۲ آغاز شد که کارل یانسنکی «پارازیت»‌های رادیویی‌ای را کشف کرد که از راه شیری می‌آمدند.

- در سال ۱۹۴۲، استنلی هی (۱۹۰۹ - ۲۰۰۵)، دانشمند انگلیسی، در خورشید فوران‌های قوی رادیویی یافت.

- در سال ۱۹۴۹، اخترشناسان نجوم رادیویی در استرالیا نخستین منبع رادیویی خارج از منظومه‌ی شمسی را شناسایی کردند.

- در سال ۱۹۵۱، دانشمندان هاروارد تابش ۲۱ سانتی‌متر را، که از گاز هیدروژن در راه شیری ساطع می‌شد، دریافت کردند.

- نخستین اختروش (کوازار) به نام ۳C ۲۷۳، در سال ۱۹۶۳ شناسایی شد؛ این جرم منبع رادیویی قدرتمندی بود. در همین زمان، نخستین ملکول میان‌ستاره‌ای (هیدروکسیل) از تابش ۱۸ سانتی‌متری آن کشف شد.

- در سال ۱۹۶۵، آرنو پنزیاس و وابر و ویلسون پژواک رادیویی کم‌فروغی از تابش بازمانده از انفجار بزرگ (مهبانگ) را کشف کردند که به تابش زمینه‌ی کیهانی مشهور است.

- در سال ۱۹۶۷، تونی هوبیش و جاسلین بل بریل نخستین تپ‌اختر، به نام PSR ۱۹۱۹+۲۱، را کشف کردند.

- در سال ۱۹۹۲، ماهواره‌ی کاوشگر زمینه‌ی کیهانی برخی آشفته‌گی‌ها را در تابش زمینه‌ی کیهانی ثبت کرد؛ این آشفته‌گی‌ها نخستین نشانه‌های شکل‌گیری کهکشان‌هاست.




بیش‌تر بدانیم

تحلیل نور ۲۴ تابش‌هایی از فضا ۲۶ فضای میان‌ستاره‌ای ۲۱۶ کهکشان‌های فعال ۲۳۶

ترکیب زمین - چرخش

خطی از تلسکوپ‌ها در یک امتداد یا حتی ترکیب ۷۰ شکل آرایه‌ی بسیار بزرگ (VLA)، در آینده‌ی بزرگ نهایی شکاف‌هایی باقی می‌گذارد که ممکن است تصویر رادیویی حاصل را مغشوش کند. در دهه‌ی ۱۹۵۰ میلادی، مارتین رایل راه‌حلی پیشنهاد کرد که به جای گرفتن عکس‌های تک‌پُر از حفره، تلسکوپ‌ها ۱۲ ساعت یک منبع رادیویی را رصد کنند. با چرخش زمین به دور خود، هر تلسکوپ در نیم‌دایره‌ای به دور تلسکوپ‌های دیگر می‌گردد. به این ترتیب، تلسکوپی بسیار بزرگ‌تر ساخته می‌شود.

نحوه‌ی عملکرد ترکیب تلسکوپ‌ها در روس زمین - چرخش



تابش سینکروترون

در بسیاری از منابع رادیویی، از بقایای ابرنواخترها تا کهکشان‌ها، امواج رادیویی را الکترون‌های پرسرعتی تولید می‌کنند که در میدان‌های مغناطیسی به دام افتاده‌اند. آن‌ها امواج رادیویی از نوعی به نام تابش سینکروترون تولید می‌کنند که در میان طول موج‌های بلندتر، قوی‌ترین تابش است. در این تصویر از کهکشان کوره A، دو بخش تابش‌کننده‌ی امواج رادیویی در دو سوی کهکشان (لب‌های رادیویی) جایی را نشان می‌دهند که الکترون‌ها مثل برق در میان میدان‌های مغناطیسی درهم تنیده شده و در رفت و آمدند. این الکترون‌ها از ستون‌های ذراتی سرچشمه می‌گیرند که از دو سوی سیاه‌چاله‌ی مرکزی و بسیار پُر جرم کهکشان فوران می‌کنند.

کهکسان کوره‌ی A: ترکیب تصاویر نور مرئی و رادیویی.

اخترشناسی فرابنفش

اخترشناسان برای ردیابی داغ‌ترین ستاره‌ها (بارها داغ‌تر از خورشید)، باید از تابش فرابنفش استفاده کنند. ستاره‌ای که از دمای ۱۰ هزار درجه‌ی سانتی‌گراد داغ‌تر است، در طول موج‌های فرابنفش درخشان‌تر می‌درخشد. هم‌چنین تابش فرابنفش آشکار می‌کند که درون ابرهای گازی داغ و نامرئی بین ستاره‌ها چه خبر است. البته ملکول اوزن در جو زمین، رصد در این نور را مشکل می‌کند. در زندگی روزمره لایه‌ی اوزن ما را در برابر تابش فرابنفش خورشید حفاظت می‌کند و ما نگران حفرة‌ی لایه‌ی اوزن هستیم. در صورتی که لایه‌ی اوزن مانع اخترشناسان از رصد منابع تابش فرابنفش در عالم می‌شود.

طول موج‌های فرابنفش

تابش فرابنفش، طول موج‌هایی کوتاه‌تر از نور مرئی دارد که از انتهای بنفش طیف مرئی (۳۹۰ نانومتر) تا آغاز بخش پرتو ایکس (۱۰ نانومتر) گسترده شده‌اند. طول موج‌های بین ۱۰ تا ۹۱ نانومتر را فرابنفش کرانه یا فرابنفش دور می‌نامیم. تلسکوپ‌های فرابنفش باید فراتر از جو زمین پرواز کنند. اتم‌های اکسیژن و نیتروژن در ارتفاعات بالا، راه طول موج‌های فرابنفش کوتاه‌تر را سد می‌کنند؛ در حالی که لایه‌ی ازن، بین ۱۰ تا ۵۰ کیلومتری سطح زمین، راه بقیه‌ی طول موج‌های فرابنفش را سد می‌کند.

مه هیدروژن

بسیاری از اتم‌ها در فضا در جذب تابش فرابنفش بسیار مؤثرند. هیدروژن، فراوان‌ترین عنصر در فضا، طول موج‌های فرابنفش کرانه را چنان قوی جذب می‌کنند که هم‌چون مه غلیظی بیش‌تر عالم دوردست را پشت خود پنهان می‌کند.

رصدخانه‌ی فرابنفش آسترو

تلسکوپ‌های کوچک آسترو را به‌سوی هدف نشانه می‌روند. تلسکوپ فرابنفش بزرگ



کف آن بر بخش بار شاتل نصب می‌شود.

تلسکوپ‌هایی در مدار

بیش‌تر تلسکوپ‌های فرابنفش سوار بر ماهواره‌هایی هستند که بسیار دورتر از مراکز هدایت روی زمین کار می‌کنند. نخستین ماهواره‌ی موفقیت‌آمیز در این زمینه، کوپرنیک بود که در سال ۱۹۷۲ پرتاب شد. رصدخانه‌ی فرابنفش آسترو چند بار به همراه شاتل فضایی به مدار رفته است و فضانوردان با آن کار کرده‌اند. این رصدخانه با شاتل به زمین بازمی‌گردد و هر بار بازمینی و تعمیر می‌شود.

رصدخانه‌ی فرابنفش آسترو با سه تلسکوپ که هم‌زمان به ستاره یا کهکشان یکسانی نگاه می‌کردند. این رصدخانه تصویر فرابنفش می‌گرفت و هم‌زمان طیف جسم را در طول موج‌های فرابنفش بررسی می‌کرد.



نام	اندازه‌ی آینده	مدار	تاریخ	تلسکوپ‌های اصلی فرابنفش
کوپرنیک	۰/۸ متر	پایین	۱۹۷۲ - ۱۹۸۱	
کاوشگر فرابنفش بین‌المللی (IUE)	۰/۴۵ متر	۲۶۰۰۰ تا ۴۲۰۰۰ کیلومتر	۱۹۷۸ - ۱۹۹۶	
آسترون (متعلق به شوروی)	۰/۸ متر	۱۸۵ هزار کیلومتر	۱۹۸۳ - ۱۹۸۹	
آسترو	۰/۳۸ متر	پایین	۱۹۹۰ - ۱۹۹۵	
هابل (مرئی، فرابنفش نزدیک)	۲/۴ متر	پایین	۱۹۹۰ -	
روسات	۰/۵۸ متر	پایین	۱۹۹۰ - ۱۹۹۸	
کاوشگر فرابنفش کرانه (EUVE)	۲ × ۰/۴ متر	پایین	۱۹۹۲ - ۲۰۰۱	
سوو (ایزار EIT)	۰/۱۲ متر	۱/۵ میلیون کیلومتری (نقطه‌ی L۱)	۱۹۹۵ -	
کاوشگر طیف سنجی	۴ آینده‌ی	پایین	۱۹۹۹ - ۲۰۰۷	
فرابنفش دور (FUSE)	۳۹ × ۳۵ سانتی‌متری	پایین	۲۰۰۳ -	
کاوشگر تحول کهکشان (GALEX)	۰/۵ متر	پایین		

گازهای درخشان در جو خورشید

تصویر خورشید در طول موج فرابنفش کرانه، پوسته‌ای نازک و وصله‌وصله از گاز درختان را نشان می‌دهد که کره‌ای سیاه را حاطه کرده است. تصویر، کدبندی رنگی شده است تا درخشندگی‌های متفاوت را نمایان کند. سطح مرئی خورشید، با دمای ۵۵۰۰ درجه سانتی‌گراد، حرکتی را نشان می‌دهد که فرابنفش کرانه به هم می‌رسد، تیره به نظر می‌رسد. فراتر از سطح، در فضا دمای گاز به مرور افزایش می‌یابد. در لایه‌های بالایی آن به بیش از ۱۰۰ هزار درجه سانتی‌گراد هم می‌رسد و در طول موج فرابنفش سیاه درخشان می‌تابد. دم و چگالی گاز با تغییرات میدان مغناطیسی خورشید تغییر می‌کند.



در کدبندی رنگی (رنگ آمیزی کاذب برای نشان دادن داده‌های علمی) تصاویر فرابنفش، قرمز کم‌فروغ‌ترین گاز و سفید درخشان‌ترین است.

هاله‌ی زمین

اگر زمین را با تلسکوپ فرابنفش نگاه کنیم، اصراف آن را هاله‌ی درخشانی حاطه کرده است. تمه در جو بالایی ما دردت باردار باد خورشیدی برخورد می‌کند؛ به همین سبب، بسیار گرم و درخشنده می‌شوند. روی نیمه‌ی تاریک زمین (چپ) نوارهای درخشان به شفق‌های قطبی مربوط اند.



سال‌شمار اخترشناسی

فرابنفش

• در سال ۱۸۰۱، یوهان ریتر (۱۷۷۶-۱۸۱۵)، فیزیکدان آلمانی، کشف کرد که ماده‌ی شیمیایی کلرید نقره، که به نور حساس است، در برابر تابش نامرئی از بخش بنفش طیف نور خورشید سیاه می‌شود.

• نخستین طیف فرابنفش خورشید را در سال ۱۹۳۶ ابزار سوار بر موشک V۲ آلمانی تهیه کرد.

• فضانوردان مأموریت آپولو ۱۶ در سال ۱۹۷۲، رصدخانه‌ی فرابنفش کوچکی روی ماه نصب کردند و به رصد زمین و ستاره‌های داغ پرداختند.

• در سال ۱۹۷۳، ماهواره‌ی کوپرنیک میزان دوتریم (هیدروژن سنگین) باقی‌مانده از انفجار بزرگ را سنجید. در همین حال، ایستگاه فضایی اسکای‌لب (SKYLAB) کشف کرد که جو خورشید با «حفره‌های تاجی» خالی لکه شده است.

• پروتوهای فرابنفش کرانه از چشمه‌های کیهانی در مأموریت فضایی آپولو-سایوز در سال ۱۹۷۵ کشف شدند.

• در سال ۱۹۷۸، ماهواره‌ی بین‌المللی کاوشگر فرابنفش (IUE) مقادیر عظیمی نیتروژن در ستاره‌ی متفجر شده‌ی نوآختر دجاجه-۱۹۷۸ کشف کرد.


• در سال ۱۹۸۷، کاوشگر فرابنفش بین‌المللی فوران تابشی را از ابرنواختر ۱۹۸۷A ثبت کرد که فاصله‌ی دقیق ابرنواختر را به دست می‌داد. به این ترتیب، فاصله تا کهکشان میزبان آن، ابربزرگ ماژلان، نیز به دست آمد.

• در طرح نقشه‌برداری فرابنفش روسات در سال ۱۹۹۰، بیش از هزار ستاره‌ی داغ کشف شد که در طول موج فرابنفش کرانه تابش می‌کردند.

بیش‌تر بدانیم

تحلیل نور ۲۴ تابش‌هایی از فضا ۲۶ شاتل فضایی ۷۴ جو خورشید ۱۷۸ کهکشان‌ها ۲۳۰


گاز داغ در هسته مرکزی



ستاره‌های پرجرم منفرد

ستاره‌های داغ در کهکشان‌ها

دیدنی‌ترین حالت کهکشان‌های مارپیچی، تصویر آن‌ها در طول موج فرابنفش است که در آن، فقط داغ‌ترین ستاره‌ها نمایان می‌شوند. در این جا، تلسکوپ آسترو نگاه‌ی به کهکشان M۸۱ انداخته است. این کهکشان مارپیچی در فاصله‌ی ۱۲ میلیون سال نوری از ما، در صورت فلکی دب اکبر قرار دارد. نقاط درخشان، حوضه‌هایی از ستارگان پرجرم‌اند. ستاره‌های ۱۰ بار داغ‌تر از خورشید که سوخت عظیمشان را سریع مصرف می‌کنند و عمرشان رود تمام می‌شود.



ستاره‌های پیر خنک

تصویر M۹۴ در فرابنفش



ستاره‌های جوان داغ

تصویر M۹۴ در نور مرئی

کهکشان فوران ستاره (بسیار ستاره‌ساز)

کهکشان M۹۴ کهکشانی است که به‌تازگی در آن فوران پیدایش تعداد عظیمی ستاره رخ داده است. البته گر آن را با تلسکوپ نور مرئی تماشا کنیم، فقط برآمدگی درخشان مرکزی آن دیده می‌شود که بیش‌تر از ستاره‌های پیر و سرد تشکیل شده است. تصویر فرابنفش این کهکشان، که با تلسکوپ آسترو گرفته شده است، ساختاری کاملاً متفاوت نشان می‌دهد. به جای برآمدگی مرکزی حلقه‌ی عظیمی از ستاره‌های داغ جوان دیده می‌شود که در ۱۰ میلیون سال گذشته شکل گرفته‌اند.

۲۰۰ کیلومتر

تلسکوپ‌های سوار بر موشک، نخستین تصاویر کوتاه فرابنفش را تهیه کردند.

۱۰۰ کیلومتر

سطح دریا

فرابنفش

۳۰۰ NM


۲۵۰ NM

اخترشناسی پرتو ایکس

آسمان در طول موج‌های پرتو ایکس کاملاً ناآشنا به نظر می‌رسد. در این طول موج، آسمان پر از توده‌های عظیم و درخشان گاز و ستاره‌های پرتو ایکس عجیب و متغیر است. پرتو ایکس نوعی از تابش با انرژی زیاد و طول موج کوتاه است که اغلب اجسامی داغ‌تر از یک میلیون درجه از خود ارسال می‌کنند و نقاط داغ عالم را نشان می‌دهند. جو خورشید و جو ستاره‌های مشابه آن نیز چنان داغ است که پرتو ایکس با فروغ بسیار کمی می‌درخشد. بقایای ابرنواخترها و گازهای اطراف تپ‌اخترها و سیاه‌چاله‌ها، جایی که دما ممکن است به ۱۰۰ میلیون درجه‌ی سانتی‌گراد برسد، منابع بسیار قوی‌تر پرتو ایکس هستند.


طیف پرتو ایکس

پرتو ایکس تابشی پُرانرژی با طول موج بین ۰/۰۱ تا ۱۰ نانومتر است؛ یعنی طول موجی بسیار کوتاه‌تر از نور مرئی. پرتوهای ایکس با کوتاه‌ترین طول موج، بیش‌ترین انرژی را حمل می‌کنند. پرتو ایکس روی زمین به شدت نفوذکننده است و پزشکان از آن برای دیدن درون بدن استفاده می‌کنند؛ اما جو بالای، همه‌ی پرتو ایکس فضایی را جذب می‌کند و حیات را در برابر این پرتوهای مرگبار ایمن نگه‌می‌دارد. بنابراین باید آشکارسازهای پرتو ایکس را، به کمک موشک‌ها یا ماهواره‌ها، به فراتر از جو زمین حمل کنیم.




رصدخانه‌ی اینشتین

نخستین تلسکوپ بزرگ پرتو ایکس با آینه‌های برخورد مماسی، رصدخانه‌ی اینشتین بود که در سال ۱۹۷۸ به فضا پرتاب شد. این رصدخانه از بیش از ۵ هزار منبع پرتو ایکس تصویربرداری کرد.



آینه‌ی برخورد مماسی




تلسکوپ‌های پرتو ایکس

کانونی کردن پرتوهای ایکس بسیار مشکل است؛ زیرا آینه‌های منحنی معمولی آن‌ها را جذب می‌کنند و بازتاب نمی‌دهند. این پرتو فقط در صورتی بازتاب می‌شوند که با زاویه‌ای بسیار کند با سطحی فلزی برخورد کنند؛ در حقیقت، مانند گلوله‌ای که از سطح دیوار کمانه می‌کند، نور باید با این سطح فقط مماس شود. در تلسکوپ‌های پرتو ایکس از استوانه‌های فلزی بسیار صیقلی در هم‌رونده‌ای برای کانونی کردن نور استفاده می‌کنند که در حقیقت، همین آینه‌های برخورد مماسی‌اند.

آشکارسازی پرتو ایکس

اخترشناسان در کانون تلسکوپ پرتو ایکس از دو نوع آشکارساز استفاده می‌کنند: CCD، آشکارسازی الکترونیک است که در پیش‌تر تلسکوپ‌های مرئی هم از آن استفاده می‌شود و به سادگی تعداد پرتوهای ایکسی را که با آن برخورد دارد، ثبت می‌کند. شمارش‌گر نسبی، نسخه‌ی حساس شمارش‌گر گایگر که برای آشکار کردن تابش‌ها روی زمین از آن استفاده می‌شود، معادل پرتو ایکس دریافتی در نقاط آشکارساز یک تصویر رنگی را می‌سازد.



سال‌شمار

اخترشناسی پرتو ایکس

• پرتوهای ایکس خورشید، نخستین بار در سال ۱۹۴۹ کشف شد.

• در سال ۱۹۶۲، یک آشکارساز پرتو ایکس سوار بر موشک، نخستین منبع پرتو ایکس فراتر از منظومه شمسی، عقرب X-۱، را یافت.


• در سال ۱۹۷۱، ماهواره‌ی اهورو نخستین شواهد وجود سیاهچاله‌ها را کشف کرد؛ این شواهد پرتوهای ایکس از دجابه X-۱ بودند. این ماهواره همچنین پرتوهای ایکسی از گاز در خوشه‌های کهکشانی دور دست یافت.

• رصدخانه‌ی اینشتین، که در سال ۱۹۷۸ به فضا پرتاب شد، کشف کرد که اختروش‌ها و برخی ستارگان جوان، پرتو ایکس می‌تابانند.

• در سال ۱۹۸۷، تلسکوپ پرتو ایکس سوار بر ایستگاه فضایی میر پرتوهای ایکس یک ابرنواختر را آشکار کرد.

• روسات در سال ۱۹۹۰ به فضا پرتاب شد. این تلسکوپ ۱۰۰ هزار منبع پرتو ایکس کشف کرد.

• چاندرا در سال ۱۹۹۹ به فضا پرتاب شد. این رصدخانه‌ی پرتو ایکس در این رشته از اخترشناسی، انقلابی ایجاد کرد.



تلسکوپ پرتو ایکس روسات

بیش‌تر بدانیم

تلسکوپ چگونه کار می‌کند؟ ۱۸ تابش‌هایی از فضا ۲۶، ابرنواخترها ۲۰۴ ستاره‌های نوترونی ۲۰۶، سیاهچاله‌ها ۲۰۸

نگاه روسات به ماه

در این تصویر شج مانند، سمت راست ماه با پرتوهای ایکس خورشید روشن شده است و می‌درخشد. سمت تیره‌ی ماه به شکل شجی در میان انبوه نقاط پراکنده دیده می‌شود. اغلب این نقاط نشان‌دهنده‌ی منابع پرتو ایکس اند و بسیاری از آن‌ها از کهکشان‌های دور دست می‌آیند. اما تمام نقاط درخشان روی بخش تیره‌ی ماه و برخی از نقاط زمینه‌ی تصویر نوفه (نویز)‌های الکترونیک در آشکارساز پرتو ایکس هستند که باید از چشمه‌های واقعی ایکس جدا شوند.

تصویر روسات از بقایای انفجار ابرنواختری در بادبان

منبع کشتیدم A، ۶ هزار سال نوری از خورشید فاصله دارد. عمر این منبع ۴ هزار سال است و دمای گاز آن هنوز ۱۰ میلیون درجه‌ی سانتیگراد است.

نواحی کم فروغ دماهای کمتر گاز را نشان می‌دهد - حدود یک میلیون درجه سانتیگراد

تپ اختر بادبان باقی‌مانده‌ی ستاره‌ای است که منفجر شد.

ماهواره‌های مهم پرتو ایکس

نام	ابعاد آینه به متر	تاریخ کار	کشور
اهورو	۰/۲۸	۱۹۷۰ - ۱۹۷۳	ایالات متحده
اریل ۵	۰/۱۷	۱۹۷۴ - ۱۹۸۰	انگلستان
MEAO-1	۱	۱۹۷۷ - ۱۹۷۹	ایالات متحده
رصدخانه‌ی اینشتین	۰/۵۸	۱۹۷۸ - ۱۹۸۱	ایالات متحده
اگزوست	۲ x ۰/۳	۱۹۸۳ - ۱۹۸۶	اروپایی
گینگا	۰/۶۳	۱۹۸۷ - ۱۹۹۱	ژاپن
کوانت-۱	۰/۲۵	۱۹۸۷ - ۱۹۹۹	روسیه
روسات	۰/۸	۱۹۹۰ - ۱۹۹۹	ایالات متحده - آلمان
یوهکو (YOHKOH) تلسکوپ خورشیدی	—	۱۹۹۱ - ۲۰۰۱	ژاپن
رصدخانه‌ی پرتو ایکس چاندرا	۱/۲	۱۹۹۹ -	ایالات متحده
رصدخانه‌ی پرتو ایکس چندآینه‌ای (XMM - نیوتن)	۳ x ۰/۷	۱۹۹۹ -	اروپا
کاشگر زمان‌سنج ایکس راسی (RXTE)	—	۱۹۹۹ -	اروپا
ایتگرال (ایکس و گاما)	—	۲۰۰۲ -	اروپا
سویفت (SWIFT)، رصدخانه‌ی چند طول موجی	—	۲۰۰۴ -	ایالات متحده
هینوده (Hinode)	—	۲۰۰۶ -	ژاپن

ایستگاه فضایی میر

تلسکوپ میر ایستگاه فضایی سرنشین‌دار میر طی سال‌های فعالیت خود رصدخانه‌ای در مدار نیز بود. آزمایشگر علمی کوانت-۱ سوار بر آن یک تلسکوپ پرتو ایکس را حمل می‌کرد که با استفاده از نقابی پوشاننده، که بخش‌هایی از تصویر را می‌پوشاند، تصویر را واضح‌تر می‌کرد. این تلسکوپ، با رصد ابرنواختر ۸۱۹۸۷، خطوط نشری را در طیف پرتو ایکس کشف کرد که ثابت می‌کرد ستاره‌ی منفجر شده عناصر رادیواکتیو ایجاد کرده است.



بقایای ابرنواختر


حدود ۱۱ هزار سال پیش، ابرنواختری در صورت فلکی بادبان (شراع) ظاهر شد که مربوط به ستاره‌ای در فاصله‌ی ۱۶۰۰ سال نوری از ما بود. این انفجار، در درخشان‌ترین حالت، احتمالاً به اندازه‌ی ماه کامل در آسمان ما می‌درخشیده است. اما همه‌ی آنچه امروز از آن باقی است، توده‌ای عظیم از گاز داغ به قطر ۱۴۰ سال نوری است. تلسکوپ‌های نور مرئی به ندرت می‌توانند آن را آشکار کنند؛ اما تلسکوپ پرتو ایکس حساس روسات این گاز را آشکار کرد که در برخی نقاط نشان می‌دهد. دمای آن ۸ میلیون درجه‌ی سانتیگراد است. روسات هم‌چنین باقی‌مانده‌ی ابرنواختر دیگری به نام کشتیدم A را کشف کرده که بسیار کوچک‌تر و دورتر است.

اخترشناسی پرتو گاما

پرتوهای گاما مهیب‌ترین و فاجعه‌بارترین روی‌دادها و اجرام، مانند تپ‌آخترها، اختروش‌ها و سیاه‌چاله‌ها را در گوشه و کنار عالم نمایان می‌کند. این تابش کوتاه‌ترین طول موج و بیش‌ترین انرژی را در میان انواع تابش‌ها دارد. هیچ ابر گاز یا ستاره‌ای آن‌قدر داغ نیست که در این طول موج‌ها تابش کند، با آن‌که واکنش‌های هم‌جوشی هسته‌ای در مرکز تمام ستاره‌ها فقط پرتو گاما تولید می‌کنند، سطح ستاره برای تولید چنین پرتوی به اندازه‌ی کافی داغ نیست. عوض، اتم‌های رادیواکتیو در فضا پرتوهای گاما تولید می‌کنند. به‌علاوه، بر اثر برخورد شدید ذراتی که با سرعت حدود سرعت نور به یک‌دیگر می‌خورند یا وقتی ماده و پادماده یک‌دیگر را نابود می‌کنند، این پرتو تولید می‌شود. اخترشناسی پرتو گاما هنوز در دوره‌ی نوزادی است و اخترشناسان باید منابع بسیاری را در این تابش پُرانرژی شناسایی کنند.

طیف پرتو گاما

حتی بلندترین طول موج‌های پرتو گاما، که با پرتو ایکس هم‌مرز است، طول موجی کوتاه‌تر از قطر یک اتم دارد. هیچ حد پایینی برای طول موج‌های پرتو گاما وجود ندارد: کوتاه‌ترین تابشی که تا به حال کشف شده، یک میلیون میلیارد بار کوتاه‌تر از طول موج نور عادی است. چنین پرتوهای گامایی با این طول موج کوتاه معمولی نیستند؛ زیرا اجرامی چنان پُرانرژی، که آن‌ها را ایجاد کنند، در عالم بسیار نادرند. تمام پرتو گامای آمده از فضا در جو زمین جذب می‌شود. جو زمین در این جا هم سپر نجات‌بخش حیات در مقابل عامل تهدیدکننده‌ای از فضای بی‌کران است.




رصدخانه‌ی پرتو گامای کامپتون


رصدخانه‌ی پرتو گامای ۱۷ تنی کامپتون سنگین‌ترین رصدخانه‌ای است که تا به حال به فضا پرتاب شده است و دومین «رصدخانه‌ی بزرگ» ناسا بود (تلسکوپ فضایی هابل نخستین آن‌ها بود). این ماهواره چهار آشکارساز حمل می‌کرد و از روش‌های گوناگونی برای تهیه‌ی تصاویر گاما از آسمان در دو طیف متفاوت و برای بررسی طیف و فوران‌های پرتو گاما استفاده می‌کرد. این رصدخانه از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰ فعال بود و سرانجام در پایان مأموریت خود، در جو زمین سوخت. در این مدت شمار چشمه‌های گامای شناخته شده ده برابر شد (حدود ۴۰۰ عدد) و حدود ۲۵۰۰ فوران گذرای گاما نیز ثبت گردید.

آشکارساز چرنکوف

پرتوهای گامای فضایی هرگز به زمین نمی‌رسند. اما ابزارهای زمینی آن‌ها را آشکار می‌کنند؛ زیرا با برخورد هر پرتو پُرانرژی گاما با جو زمین، ذرات ثانویه‌ی بسیاری به پایین سرازیر و سبب تابشی ضعیف در اتم‌های هوا می‌شوند که با بررسی آن می‌توان اطلاعاتی از پرتو گامای اولیه به‌دست آورد. یک آشکارساز چرنکوف نور را مانند تلسکوپی عادی جمع‌آوری می‌کند؛ اما مترصد شکار تابش‌های ثانویه‌ی حاصل از ورود پرتو گاما به جو زمین است. هر تابش، در فشی کوتاه است که فقط چند میلیارد ثانیه دوام می‌آورد.




آشکارساز چرنکوف در آریزونا




آشکارسازی پرتو گاما

پرتوهای گاما مستقیم از میان آینه یا عدسی می‌گذرند و بازتاب نمی‌شوند. پس در آشکارسازهای فضایی گاما برای تشکیل تصویر، از روش‌های غیرمستقیم استفاده می‌شود. در آشکارساز اِگرت پرتوهای گاما از میان لایه‌های نازک تنگستن فلزی می‌گذرند و هنگام برخورد با اتم تنگستن، دو ذره (یک الکترون و یک پوزیترون) تولید می‌کنند. مسیر این ذرات به کمک قفسه‌ای از محفظه‌های جرقه، که مانند شمارشگر در آشکارسازهای پرتو ایکس عمل می‌کنند، محاسبه می‌شود.



آسمان در پرتو گاما

آسمان در طول موج‌های گاما بسیار متفاوت است. هیچ یک از ستاره‌ها و صورت‌های فلکی معمول را نمی‌بینیم. در عوض، ابرهای گازی وسیع و درخشان در سراسر دید گسترده شده‌اند. در میان آن‌ها، نقاط درخشانی به چشم می‌آید که مانند فلاش روشن و خاموش می‌شوند. برخی از آن‌ها، تپ‌اخترهایی هستند که فلاش زدن‌هایشان تناوب منظمی دارد. بقیه، که فوران‌گر پرتو گاما نامیده می‌شوند، فقط چند ثانیه بسیار شدید می‌درخشند و نورشان در آن مدت کوتاه، هر چیز دیگری را در آسمان پرتو گاما تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. منشأ این فوران‌های زودگذر حوادث مهیبی مانند ابرنواختر در کهکشان‌های بسیار دوردست است. فوران‌گرهای گاما چنان انفجارهای پُرانرژی‌ای هستند که اگر در کهکشان ما رخ دهند، به پدیده‌ی بی‌نظیری در آسمان تبدیل می‌شوند و اگر در همسایگی کهکشان ما باشند، حتی ممکن است جو زمین و حیات را در خطر قرار دهند.



سال‌شمار اخترشناسی پرتو گاما

- نخستین آزمایش‌های اخترشناسی پرتو گاما سوار بر موشک‌ها و ماهواره‌های رصدخانه‌ی مداري خورشیدشناس ناسا در دهه‌ی ۱۹۶۰ انجام شد.
- فوران‌های پرتو گاما را ماهواره‌های نظامی ولای آمریکا، که برای ثبت آزمایش‌های هسته‌ای روی زمین طراحی شده بودند، در سال ۱۹۶۹ کشف کردند. در ابتدا تصور می‌شد این‌ها آزمایش‌های هسته‌ای شوروی در مدار زمین هستند.
- در سال ۱۹۷۲، ماهواره‌ی SAS-۲ تپ‌های پرتو گامایی از تپ‌اخترهای سحابی خرنجک و سحابی بازمانده‌ی ابرنواختری بادبان دریافت کرد.
- در سال ۱۹۷۷، گمینگا، سومین منبع قوی پرتو گاما کشف شد که در دیگر طول موج‌ها تقریباً اثری از آن نبود. گمینگا نزدیک‌ترین ستاره‌ی نوترونی به ماست.
- در سال ۱۹۷۸، ماهواره‌ی COS-B نخستین بار پرتوهای گامایی از یک اخترش به نام ۳۰۲۷۳ دریافت کرد.
- در سال ۱۹۷۹، طی آزمایشی در یک بالن بلند پرواز، پرتوهای گامای حاصل از نابودی ماده و پادماده در نزدیکی مرکز کهکشان راه شیری کشف شد.
- در سال ۱۹۸۱، اخترشناسان با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده به وسیله‌ی رصدخانه‌ی پرتو گامای کامپتون، فوران‌های انفجاری پرتو گاما (GRB) را در کهکشان‌های بسیار دوردست کشف کردند.
- در سال‌های اول دهه‌ی ۲۰۰۰ میلادی، نشانه‌های بسیاری دال بر ارتباط ابرنواخترها و فوران‌های گاما به‌دست آمد و مشخص شد دست کم منشأ شماری از این فوران‌ها، انفجارهای ابرنواختری است.



آشکارساز پرتو گاما نقاب رمزگذاری شده



نقاب‌های رمزگذاری شده

پرتوهای گاما کانونی نمی‌شوند؛ اما ماسک یا نقاب‌های رمزگذاری شده راهی برای ایجاد تصاویر پرتو گاما با وضوح زیاد هستند. این نقاب شبکه‌ای از ماده‌ی جذب‌کننده‌ی پرتو گاما با الگوی خاص است که بالای محفظه‌ی جرقه قرار می‌گیرد. وقتی این نقاب در معرض تابشی از یک منبع پرتو گاما قرار می‌گیرد، سایه‌ای از آن بر نقابی می‌افتد که در آن‌ها هیچ پرتو گامایی آشکار نشده است. موقعیت این سایه، موقعیت منبع پرتو گاما را بسیار به دقت نشان می‌دهد.

تلسکوپ‌های مهم پرتو گاما


نام	مدار	تاریخ
ولا ۵ و ۵B	مرتفع	۱۹۶۹-۱۹۷۹
SAS-۲	پایین	۱۹۷۲-۱۹۷۳
COS-B	بیضوی	۱۹۷۵-۱۹۸۲
HEAO-۳	پایین	۱۹۸۱-۱۹۷۹
گرانات - سیگما	بیضوی	۱۹۸۹ -
رصدخانه‌ی پرتو گامای کامپتون	پایین	۱۹۹۱-۲۰۰۰
HETE-۲ (کاوشگر درخشش‌های گذرای پُرانرژی)	-	۲۰۰۰ -
ایتگرال	بیضوی	۲۰۰۲ -
سوئیفت (SWIFT)	پایین	۲۰۰۴ -
AGILE (متعلق به ایتالیا)	-	۲۰۰۷ -
GLAST (تلسکوپ فضایی مساحت بزرگ پرتو گاما)	-	۲۰۰۸ -

بیش‌تر بدانیم

تابش‌هایی از فضا ۲۶، اخترشناسی پرتو ایکس ۳۴، ستاره‌های نوترونی ۲۰۶ سیاهچاله‌ها ۲۰۸، کهکشان‌های فعال ۲۳۶

جلوه‌هایی از اخترشناسی نامرئی



در سال‌های اخیر، با رشد اخترشناسی در طول موج‌های غیر مرئی، دانشمندان بسیاری به کمک مقایسه‌ی داده‌ها و تصاویر جرم‌های آسمانی در بخش‌های متفاوت طیف، به کشف‌های بزرگی دست زده‌اند. تلسکوپ‌هایی که در زمین و فضا در بیش‌تر طیف الکترومغناطیس به کیهان می‌نگرند، امکان این پژوهش‌های جدید را فراهم آورده‌اند.



کهکشان آندرومدا

نزدیک‌ترین همسایه‌ی بزرگ راه شیری است. این جزیره‌ی کیهانی، اجتماعی از حدود ۴۰۰ میلیارد ستاره است. در تصویر نور مرئی (بالا) ستاره‌های جوان و آبی در بازوها و صفحه‌ی کهکشان مشخص‌ترند؛ در حالی که تصویر فروسرخ تلسکوپ فضایی اسپیتزر (پایین) آمیزی کاذب) ستاره‌های آبی را نشان می‌دهد که در فرابنفش و مرئی خوب می‌درخشند. اما به جای آن، انبوه سحابی‌های سردتر در بازوها و نواحی مرکزی کهکشان دیده می‌شوند.


سحابی خرچنگ بازمانده‌ی انفجار ستاره یا ابرواختاری است که حدود هزار سال پیش، در صورت فلکی ثور دیده شد. گاز ستاره‌ی نابود شده با سرعت بسیاری در حال پخش شدن در فضا است. چهار تصویر کوچک، همگی سحابی را در نور مرئی، فرابنفش، فروسرخ و امواج رادیویی نشان می‌دهد. اما ماهیت واقعی قلب سحابی خرچنگ، در تصویر بزرگ در پرتو ایکس از نگاه تلسکوپ چاندرا دیده می‌شود. هسته‌ی بازمانده از ستاره، که پس از فروریزش به ستاره‌ی نوترونی تبدیل شده، گرمی از گازهای داغ را به دور خود جمع کرده و فورانی جت‌مانند از ذرات از دو سوی مرکز به بیرون پرتاب شده است.



تلسکوپ فضایی چاندرا

رصدخانه‌ی فضایی چاندرا

یکی از چهار رصدخانه‌ی فضایی بزرگ ناسا، که در سال ۱۹۹۹ با شاتل فضایی به فضا رفت، رصدخانه‌ی چاندرا بود. این تلسکوپ بزرگ پرتو ایکس در مداری کشیده به فاصله‌ی ۱۰ هزار تا ۱۴ هزار کیلومتری زمین است. این رصدخانه، به یاد چاندرا سکار، اخترشناس سرگ هندی قرن بیستم، نامیده شده است. آینه‌های استوانه‌ای و تو در توی تلسکوپ، دهانه‌ای به قطر ۱۲ متر دارند. اما در مجموع توان گردآوری بوری آن‌ها معادل یک آینه‌ی ۰.۴ متری است. این نخستین تلسکوپ به توان تفکیک کمتر از یک نایه‌ی قوس در پرتو ایکس تحول بزرگی را در این بخش از اخترشناسی ایجاد کرد. برخی از مهم‌ترین تصاویر و داده‌های آن به این ترتیب است: نخستین تصویر پرتو ایکس از بازمانده‌ی ابرواختاری ذات‌الکرسی - A، اولین تصاویر ایکس از منبع قوس - A که سیاه‌چاله‌ی مرکزی کهکشان راه شیری است، ثبت انبوه گازهای داغ و درخشان در فضای میان‌کهکشانی، کمک به کشف نشانه‌های ماده‌ی تاریک، کشف سیاه‌چاله‌های ابرپرحرم در مرکز کهکشان‌های دور و نزدیک و تصویری از شفق‌های قطبی در حوض سیارک رحل و مشتری.



رصد کیهان تنها در نور مرئی، مانند لمس کردن سنگ‌های یک کوه بزرگ با چشمان بسته است! واقعیت کیهان فقط زمانی دیده می‌شود که جرم‌ها را در تمام تابش‌های نوری ببینیم. در این تصویر، مجموعه‌ای از تلسکوپ‌های زمینی و فضایی، خورشید را در طیف الکترومغناطیس نشان می‌دهند: از پرتو ایکس در ردیف بالا تا بخش مرئی در وسط و فروسرخ و رادیویی در پایین.

رصدگران ایرانی پرتو گاما


دکتر حلال صمیمی، استاد دانشگاه صنعتی شریف تهران، از دانشمندان همکار در تحقیقات رصدخانهی پرتو گامای کامیتون ناسا (پُرثمرترین تلسکوپ پرتو گاما تا مرور) است. پژوهش‌های او در زمینه‌ی شناخت چشمه‌های پرتو گاما و ماهیت آن‌ها، موجی در فعالیت‌های تحقیقی ر در دانشگاه شریف آغاز کرد که به پدید آمدن پژوهشگران جوانی در این زمینه منجر شد. این گروه نمونه‌ای از آشکارسازهای ذرات ثانویه حاصل از ورود پرتوهای گاما به جو زمین را ساخته‌اند و قرار است طرح تکمیل آن، به نام رصدخانهی البرز، در دشتی میان تهران و کرج پرتوهای گامای کیهانی را جست‌وجو کند.



منجم آماتوری که تلسکوپ رادیویی مبتکرانه‌ای برای دریافت امواج کیهانی ساخته است.

دانشمند ایرانی اخترشناسی رادیویی


دکتر فرهاد یوسف‌زاده اخترشناسی است که به کمک آرایه‌ی بسیار بزرگ (VLA) به کشف‌های برجگی در زمینه‌ی فوران‌های ستاره‌ای در قلب کهکشان ما و در زمینه‌ی سیاه‌چاله‌ی بسیار پُر جرم مرکز کهکشان دست یافته است. او متولد و بزرگ شده‌ی تهران و استاد دانشگاه نوردوسترن در ایالات متحده است. محیط پُر آشوب و بسیار شگفت مرکز کهکشان در فاصله‌ی بیش از ۲۰ هزار سال نوری از ما در نور مرئی و بسیاری طول موج‌های دیگر چندان پیدا نیست و یوسف‌زاده به کمک امواج عبورکننده‌ی رادیویی به قلب کهکشان نگاه می‌کند.



تصویری که از کهکشان راه شیری در آسمان می‌بینیم ناحیه‌ی مرکزی پرنورتری را نشان می‌دهد که اجتماع هزاران هزار ستاره و اشیاء گاز و غبار مانع دیدن مرکز اصلی است. اخترشناسان رادیویی مانند فرهاد یوسف‌زاده به کمک این امواج عبورکننده محیط اطراف سیاه‌چاله‌ی قلب کهکشان را بررسی می‌کنند.

سحابی بزرگ جبار

پرنورترین و بارزترین سحابی آسمان، توده ابر کیهانی عظیمی در فاصله‌ی حدود ۱۵۰۰ سال نوری از زمین است. تصویر راست، نمایی آشنا از این سحابی است که تلسکوپی ریمینی در نور مرئی تهیه کرده است. اما در تصویر چپ، بخش‌های سردتر و گسترده‌تر سحابی در نور فرسرخ از دید تلسکوپ فضایی اسپیتزر دیده می‌شود.



کهکشان کله مژگی با $M104$ از دید سه تلسکوپ فضایی چاندر، هابل و اسپیتزر در پرتو ایکس، نور مرئی و فرسرخ. ترکیب این سه تصویر (عکس بزرگ)، ناحیه‌های متفاوت کهکشان را یکجا نشان می‌دهد که هر کدام در طول موج خاصی دیده می‌شوند.



منجمان آماتور رادیویی

با آن‌که اخترشناسی رادیویی از بخش‌های پیشرو اخترشناسی حرفه‌ای امروز است، منجمان آماتور و غیر دانشگاهی نیز به گیرنده‌های ساده‌تر رادیویی به منابع قوی رادیویی آسمان گوش می‌کنند. ساخت گیرنده‌ی رادیویی برای شنیدن صدای امواج حاصل از ورود شهاب‌ها به جو زمین، گیرنده‌ی امواج رادیویی مشتری یا خورشید یا مرکز کهکشان، از متداول‌ترین فعالیت‌های آماتوری اخترشناسی رادیویی است.

تلسکوپ‌های عجیب

تقریباً تمام دانش ما درباره‌ی کیهان دوردست، از بررسی تابش‌ها به‌دست آمده است. تابش‌هایی مانند نور مرئی، امواج رادیویی، پرتوهای فرسرخ، فرابنفش، ایکس و گاما که از فضا به ما می‌رسند. اما پیام‌آوران عجیب‌تری نیز در سراسر کیهان در گشت‌وگذارند و اطلاعاتی درباره‌ی مهیب‌ترین روی‌دادهای کیهان حمل می‌کنند. چند دهه است که اخترشناسان به بررسی پرتوهای کیهانی (یا در حقیقت ذرات پُرانرژی کیهانی) مشغول‌اند و به تازگی نوترینوهای گریزپا را کشف کرده‌اند. دیگر پیام‌آوران نیز در نظریه‌ها پیش‌بینی می‌شوند؛ اما هنوز کشف نشده‌اند. آن‌ها شامل ذرات ماده‌ی تاریک و امواج گرانشی‌اند. ماده‌ی تاریک، همان‌طور که اثر گرانشی آن نشان می‌دهد، بیش‌ترین جرم کیهان را تشکیل می‌دهد و امواج گرانشی نیز در تار و پود خود فضا موج می‌زنند.

آغاز مهیب

وقتی در فضا انفجاری عظیم رخ می‌دهد، ممکن است ستاره‌ای باشد که عمرش با انفجار اَبَرنواختی به پایان رسیده یا دو ستاره‌ی نوترونی باشند که در هم ادغام می‌شوند یا گاز بسیار داغی باشد که در سفری یک‌طرفه وارد سیاه‌چاله‌ای می‌شود. چنین انفجارهایی همه‌ی انواع تابش‌ها، از جمله نور مرئی، امواج رادیویی و پرتوهای گاما را تولید می‌کنند؛ اما انبوهی از ذرات و امواج عجیب‌تر را به فضا می‌فرستند که حامل اطلاعاتی منحصر به فرد درباره‌ی این آشفته‌گی‌های اخت‌فیزیکی است.

پرتوهای کیهانی

پرتوهای کیهانی، برخلاف نامشان، نوعی تابش نیستند؛ بلکه تکه‌های اتم‌هایی هستند که طی انفجارهای پُرانرژی از هم پاشیده‌اند و با سرعتی نزدیک به سرعت نور، در فضا در حرکت‌اند. بیش‌تر آن‌ها هسته‌ی هیدروژن (ذره‌ی پروتون) و مقدار کمی هسته‌ی عناصر سنگین‌تر و الکترون‌ها هستند. منشأ پُرانرژی‌ترین پرتوهای کیهانی احتمالاً سیاه‌چاله‌های اَبَرجرم مرکز اختروش‌هاست. بقیه‌ی این پرتوها عموماً طی انفجارهای اَبَرنواختی به فضا فرستاده می‌شوند.

بارش ذرات کیهانی

یک ذره‌ی پرتو کیهانی، پس از سفر طولانی خود در فضا، در برخورد با اتمی در جوّ بالایی زمین نابود می‌شود. انرژی حاصل از این برخورد، چند ذره‌ی کم‌انرژی‌تر تولید می‌کند که آن‌قدر انرژی دارند که در برخورد با اتم‌های دیگر در لایه‌های پایینی جوّ، ذرات بیش‌تری تولید کنند. نتیجه، بارشی از ذرات است که به آن آبشار می‌گویند و بر چندین کیلومتر مربع از سطح زمین می‌بارد.

پرتو کیهانی
رسیده از فضا


تصادم با
اتم در هوا

آشکارسازهای
سوار بر بالن

ذرات کم‌انرژی‌تر
شامل الکترون‌ها
و نوترینوها

آشکارسازهای روی زمین
کم‌انرژی‌ترین ذرات را ثبت می‌کنند.

آشکارسازهای زیر زمین ذرات
نفوذ کنندۀتر را ثبت می‌کنند.



آشکارسازی پرتوهای کیهانی

ذرات پرتو کیهانی آن‌قدر نادرند که یک آشکارساز، به تنهایی تعداد بسیار کمی از آن‌ها را در فضا به دام می‌اندازد. در عوض، اخترشناسان در تلاش‌اند بارش‌های ذرات کم‌انرژی‌تر را در نزدیکی زمین با استفاده از آرایه‌ای از آشکارسازهای ذرات، مانند این آرایه در لاپالما در جزایر قناری آشکار کنند. اگر پرتو کیهانی عمودی به سوی پایین بیاید، بارش ذرات در پهنه‌ای دایره‌ای به زمین می‌رسد. در غیر این صورت، بارش شکلی بیضوی دارد که جهت اصلی پرتو کیهانی را آشکار می‌کند.



کاوش فضا

موشک‌ها ۴۴-۵۳

ماهواره‌ها ۵۴-۶۹

سفرهای فضایی ۷۰-۹۱

بزرگ‌ترین انقلاب در تاریخ ما، در ۵۰ سال گذشته رخ داده است: ما توانسته‌ایم سیاره‌ی خود را ترک کنیم و به کاوش فضا بپردازیم. این کاوش‌ها زندگی ما را به‌طور کلی تغییر داده‌اند. در حقیقت، بسیاری از ما دنیا را آن‌طور که پیش از پرتاب ماهواره‌ی اسپوتنیک در سال ۱۹۵۷ بود، به‌خاطر نمی‌آوریم. حالا ناوگانی از ماهواره‌ها، که به دور زمین می‌گردند، هیاهوی ارتباطات را وارد خانه‌های ما می‌کنند و در همان حال، وضعیت آب و هوا، منابع طبیعی و حتی جنگ‌ها را از فضا زیر نظر دارند. هر کس که یک رایانه‌ی شخصی داشته باشد، قدر پیشرفت‌های این رشته و اثر قدرت‌مند رایانه را در زندگی ما می‌داند. پیشرفت‌هایی که نتیجه‌ی توسعه‌ی علوم فضایی است.

فضا مرزی برای انسان است. صدها انسان تا به حال به فضا سفر کرده و حتی چند نفر بر ماه قدم گذاشته‌اند و با تکمیل ایستگاه فضایی بین‌المللی، در آینده‌ی نزدیک، شمار فضانوردان به هزاران نفر خواهد رسید. افزون بر این، فضاپیماهای بدون سرنشین پیش‌رفته، همه‌ی سیارات منظومه‌ی شمسی (به‌جز پلوتون که در سال ۲۰۱۴ میلادی ملاقات می‌شود) را کاوش کرده‌اند و قدم بعدی در دهه‌های آینده، سفر فضاپیماهای سرنشین‌دار به مریخ و مقاصد دیگر و ارسال کاوشگرهای بسیار تیزپایی به مقصد ستاره‌هاست؛ هدفی که تا چند سال پیش فقط در تخیل دانشمندان بلندپرواز وجود داشت.

موشک‌ها چگونه کار می‌کنند؟

آریان ۵

موشک‌های آریان حدود نیمی از مایه‌های تجاری بزرگ دنیا را پرتاب کرده‌اند. پیش‌ران آریان ۵ در هنگام پرتاب از یک موتور اصلی و دو موتور تقویتی کمکی تأمین می‌شود که همه با هم پیش‌رانی برابر وزن ۱۲۰۰ تن تولید می‌کنند؛ یعنی این نیرو حداکثر چنین وزنی را از زمین بلند می‌کند. جرم موشک روی زمین ۷۴۰ تن است. ۴۶۰ تن پیش‌ران اضافی که موجود است به بلند شدن سریع پرتاب‌گر کمک می‌کند. پس از حدود ۲ دقیقه، سوخت موتورهای کمکی تمام می‌شود و با جدا شدن از پیکره‌ی موشک از دور خارج می‌شوند. سپس سوخت موتور اصلی تمام می‌شود و سقوط می‌کند. سرانجام، موتور کوچکی می‌ماند و مایه‌واره را به مدار می‌رساند.

محموله‌های آریان ۵

آریان یک، دو یا چند مایه‌واره را پرتاب می‌کند و تعداد آن‌ها به وزن مایه‌واره‌ها در سطح زمین و مداری که باید بروند، بستگی دارد.

سوخت پیش‌ران جامد در سه بخش درون محفظه.

موشک‌های سوخت جامد در ۱۳۰ ثانیه سوخت را مصرف می‌کنند.

پیش از پرتاب، موتور اصلی روشن می‌شود. اگر موتور به درستی کار نکند، موشک‌های سوخت جامد روشن می‌شوند.

لوله‌ی آگزوز موتور کمکی زاویهی ثابتی دارد.

محفظه‌ی احتراق اصلی موتور

موتور اصلی ۵۷۰ ثانیه کار می‌کند.

لوله‌ی آگزوز موتور اصلی می‌گردد تا موشک را هدایت کند.

هلیوم مایع، مخازن سوخت را تحت فشار قرار می‌دهد.

شعله‌های پُر خروش آتش، در بیستم ژوئیه سال ۱۹۶۹، فضاانوردان آپولو را به سوی تجربه‌ی تاریخی خود رهسپار کرد و نیل آرمسترانگ نخستین انسانی شد که بر سطح ماه قدم گذاشت. در هر ثانیه از نخستین ۱۲۰ ثانیه‌ی سفر فضاانوردان، حدود ۳ تن نفت سفید به داخل محفظه‌های احتراق پنج موتور F۱ موشک عظیم ساترن ۵ سرازیر می‌شد. این موتورها در هنگام بلند شدن موشک از زمین نیروی پیش‌رانی برابر ۳۲ هواپیمای بویینگ ۷۴۷ در هنگام پرواز تولید کردند. امروزه واکنش‌های توان‌مند شیمیایی همچنان نیروی موشک‌ها را فراهم می‌آورند. رایانه‌ها در هر لحظه صعود پرتاب‌گرها را زیر نظر دارند تا زاویه‌ی صعود را تصحیح کنند. همه‌ی این اتفاقات بر اساس قوانین فیزیک، به‌خصوص سه قانون حرکت نیوتن، رخ می‌دهند.

موشک در حالت ساکن

جرم و وزن

جرم یک جسم مقدار ماده‌ی موجود در آن است. جرم همه جا یکسان است. وزن یک جسم نتیجه‌ی اثر نیروی گرانش بر جرم جسم است. گرانش (و در نتیجه وزن)، با دور شدن از زمین کاهش می‌یابد.

گرانش

پیش‌ران و شتاب


یک پرتاب‌گر برای بلند کردن جرمش از سطح زمین و غلبه بر گرانش، به نیروی پیش‌ران کافی نیاز دارد. با سوختن سوخت در حین صعود، جرم کاهش می‌یابد. با افزایش فاصله تا زمین، هم جرم و هم کشش گرانش، کم می‌شود و موشک به سوی فضا سرعت می‌گیرد.

نیروی پیش‌ران

گرانش زمین

کشش و واکنش

نیروی پیش‌رانی که پرتاب‌گر را از زمین بلند می‌کند، از سوختن سوخت در محفظه‌ی احتراق تأمین می‌شود. اگر محفظه راهی به بیرون نداشته باشد، منفجر می‌شود. گازها از طریق لوله‌ای به خارج از محفظه می‌رسند. چون راه خروج گازها رو به پایین است، نیرویی به سوی بالا وارد می‌کند (واکنش یا عکس‌العمل) که برابر و در خلاف جهت نیروی آگزوز خروجی (کشش، عمل) است. این همان نیرویی است که وقتی سر بادکنک پُر از بادی را باز می‌کنیم، آن را به جلو می‌رانند. به این نیرو، که موشک‌ها را از زمین بلند می‌کند، پیش‌ران می‌گویند.



محموله‌ی ماهواره

باری که یک پرتاب‌گر حمل می‌کند، محموله نام دارد. احتراق‌های شدید و نیروهای پُر قدرت با هم کار می‌کنند تا چند تَن محموله از روی سطح زمین بلند شود. برخی پرتاب‌گرها محموله‌های سنگین‌تری را به فضا می‌برند.

مرحله اصلی آریان ۵

محفظه‌ی تجهیزات شامل همهی تجهیزات الکتریکی، یک راننده و دسکگاه تنظیم ارتفاع است

جره‌زن، سوختن سوخت جامد را آغاز می‌کند.

دماغه‌ی گلوله‌مانند، مقاومت هوا را در هنگام پرتاب موشک به میان جو کاهش می‌دهد. این بخش مانند یک سپر گرمایی محافظ محموله‌ی موشک است.

محموله‌ی بالایی

محموله‌ی پایینی


موتوری کوچک، اما کارآمد و دقیق، ماهواره را دقیقاً در زاویه و سرعت درست رها می‌کند تا وارد مدار خود شود.

مخزن اکسیژن مایع

مخزن هیدروژن مایع

فرار از گرانش

موشک پرتاب در ارتفاع ۲۰۰ کیلومتری باید به ماهواره‌ای که قرار است وارد مدار شود، نیروی افقی کافی بدهد تا به سرعت ۷/۸ کیلومتر بر ثانیه برسد. اگر سرعت ماهواره به کمی بیش از ۱۱ کیلومتر بر ثانیه برسد، از دام گرانش زمین فرار می‌کند و در فضا می‌رود. به این سرعت، سرعت فرار می‌گویند.



موشک ۱۱۰ متری سائران ۵ برای فرستادن فضانوردان به ماه ساخته شد.

مراحل رسیدن به مدار

پیش‌ترین پیش‌ران در لایه‌های پایینی جو لازم است. موشک‌ها به روش‌های متفاوتی به این پیش‌ران دست می‌یابند. موشک آریان ۵ یک مرحله‌ی اصلی دارد که با دو موشک سوخت جامد تقویت می‌شود. پس از دو دقیقه، این‌ها سقوط می‌کنند و موتور اصلی با بار سبک‌تری سفر به فضا را تکمیل می‌کند. اما در پرتاب‌گر عظیم سائران ۵، وقتی سوخت به اتمام رسید، مرحله‌ی اول سقوط می‌کند و مرحله‌ی دوم آغاز می‌شود. پس از آن هم نوبت به مرحله‌ی سوم می‌رسد.

قوانین حرکت نیوتن

• یک جسم در حالت سکون باقی می‌ماند یا به حرکت یک‌نواخت مستقیم‌الخط خود ادامه می‌دهد؛ مگر این‌که نیرویی به آن وارد شود. برای یک ماهواره، نیروهای اصلی گرانش و نیروی افقی ابزار پرتاب‌گر است.

• شتاب یک جسم برابر است با کل نیروی وارد شده بر جسم تقسیم بر جرم آن. برای یک موشک، دو نیروی اصلی پیش‌ران به سوی بالا و گرانش به سوی پایین است.

• برای هر عملی عکس‌العملی برابر و در خلاف جهت آن وجود دارد. عمل رهاسازی گاز پُرفشار حامل از احتراق در موتور عکس‌العملی در پی دارد که موجب پرتاب موشک می‌شود.

پیش‌تر بدانیم

پیش‌ران موشک ۴۶ پرتاب‌گرهای فضایی ۴۸ شمارش معکوس ۵۲ ماهواره‌ها و مدارها ۵۴ پرواز به فضا ۷۰

اطلاعات پرتاب آریان ۵

داده	موشک‌های کمکی (بالا برنده)	موشک اصلی
طول	هر یک ۳۰ متر	۳۰/۵ متر
ماده‌ی پیش‌ران	هر یک ۲۳۷ تَن	اکسیژن مایع ۱۳۰ تَن، هیدروژن مایع ۲۲۵ تَن
جرم	هر یک ۲۷۰ تَن	۱۷۰ تَن
حداکثر نیروی پیش‌ران	هر یک ۶۳۰ تَن	پیش‌ران در خلا ۱۲۰ تَن

لوله‌های سوخت، اکسیژن مایع را به محفظه‌ی احتراق موتور اصلی می‌رسانند؛ جایی که با هیدروژن مایع ترکیب می‌شود.

پیش‌رانش موشک


شاتل فضایی

در آغاز عصر فضا، موشک‌ها سرانجام مانند تویی از آتش می‌سوختند یا به جای رسیدن به مدار صحیح، از مسیر اصلی منحرف می‌شدند. اما امروزه قابل اطمینان‌ترند؛ زیرا مهندسان فضایی بهترین روش‌ها را برای ساختن، ترکیب ماده‌ی پیش‌ران و تزریق آن به موتورهای یافته‌اند. ماده‌ی پیش‌ران شامل سوخت اصلی و اکسیدکننده‌ی لازم برای سوختن و آزاد کردن انرژی است. موشک‌ها اکسیدکننده‌های خود را به فضا حمل می‌کنند؛ برخلاف هواپیماها که از اکسیژن موجود در جو استفاده می‌کنند. ممکن است سوخت و اکسیدکننده جامد یا مایع باشند؛ توان سوخت‌های مایع پیش‌تر است؛ یعنی در هر ثانیه بیش از مواد پیش‌ران جامد نیروی پیش‌ران تولید می‌کنند.

سوخت شاتل فضایی

در هنگام پرتاب، ماده‌ی پیش‌ران تقریباً ۹۰ درصد وزن مجموعه‌ی شاتل فضایی را تشکیل می‌دهد. مواد پیش‌ران مایع و جامد با هم استفاده می‌شوند. مخزن خارجی حامل هیدروژن مایع و به‌طور جداگانه، اکسیژن مایع لازم برای احتراق است. در هر ثانیه حدود ۴۷۰ کیلوگرم ماده‌ی پیش‌ران به هر یک از سه موتور اصلی می‌رسد. سوخت جامد داخل موشک‌های کمکی در دو طرف مدارگرد قرار دارد. هر موشک کمکی ۸۳ تن وزن دارد و ۵۰۴ تن ماده‌ی پیش‌ران حمل می‌کند.

فضانوردی در کابین پرواز شاتل



پرتاب به فضا

شاتل‌ها، در مقایسه با پرتاب‌گرهای قدیمی‌تر، ورود بسیار آرامی به فضا دارند. بیش‌ترین شتاب آن‌ها سه برابر گرانش (۳g) است کمی پیش از سقوط موشک‌های کمکی و ۵ دقیقه پیش از جدا شدن مخزن بیرونی سوخت از مدارگرد، شاتل به این شتاب می‌رسد.

مخزن بیرونی سوخت رمانی که تقریباً شاتل وارد مدار شده است، جدا می‌شود و در جو زمین می‌سوزد.

موشک‌های کمکی سوخت جامد فقط ۲ دقیقه می‌سوزند. به‌علاوه، پس از روشن کردن، دیگر نمی‌توان سوختن آن‌ها را متوقف کرد و باید تا آخر بسوزند.

نیروی پیش‌ران موشک‌های کمکی را می‌توان به سرعت، با تخلیه‌ی گازهای اگزوز از سوراخ‌هایی روی کنارها، کاهش داد.

مدارگرد به کمک پست‌های مخصوص، به موشک‌های کمکی و مخزن خارجی متصل شده است.

مدارگرد موتورهای سوخت مایع کوچک‌تری سوار بر خود دارد که برای مانور دادن در فضا و بازگشت به زمین استفاده می‌شوند.

سه موتور اصلی مدارگرد باید از لرزه‌های شدید حاصل از موتورهای کمکی جان سالم به‌در ببرند.

شکل لوله‌ی خروجی گاز چگونه رها شدن گازها و کارایی موشک را مشخص می‌کند

اگزوز موتور اصلی شاتل، سونی تقریباً نامرئی از بخار آب بیرون می‌دهد.

موتور کمکی ابری از مواد شیمیایی تولید می‌کند که در زمان بلند شدن موشک از زمین دیده می‌شود.

سوخت جامد موشک


ماده‌ی پیش‌ران در موشک‌های سوخت جامد به شکل قرص‌هایی است که هم اکسیدکننده و هم سوخت را شامل می‌شود. این قرص‌ها حاوی موادی هستند که از تجزیه شدن آن‌ها در زمان انبار شدن جلوگیری می‌کند. شیوه‌ی جاسازی ماده‌ی پیش‌ران در محفظه، مشخص می‌کند که انرژی چگونه رها شود. اگر ماده به گونه‌ای جاسازی شده باشد که در یک سطح، با سرعتی ثابت بسوزد (سوختن طبیعی)، نیروی پیش‌ران یک‌نواختی تولید می‌کند. اگر قرص‌ها به نحوی جاسازی شوند که مساحت سطحی که سوختن در آن رخ می‌دهد، به تدریج افزایش یابد، نیروی پیش‌ران هم به تدریج افزایش می‌یابد (سوختن پیش‌رونده). اگر سطح سوختن کاهش پیدا کند، نیروی پیش‌ران هم به تدریج کاهش می‌یابد (سوختن پس‌رونده).

موشک‌ها از گذشته تا امروز

موشک گارد	شاتل فضایی
نخستین پرواز آزمایشی	۱۲ مارس ۱۹۲۶
طول	۱۲-۱۴ آوریل ۱۹۸۱
جرم در حین پرتاب	۲/۷ کیلوگرم
جرم ماده‌ی پیش‌ران	۲ کیلوگرم
زمان پرواز	۲/۵ ثانیه
ارتفاع پرواز	۱۲/۵ متر
فاصله	۵۶ متر
سرعت	۹۶ کیلومتر بر ساعت
نیروی پیش‌ران در هنگام پرتاب	۴۰ نیوتن
	۳۵ مگانیوتن

• نیوتن واحدی برای نیرو است. هر نیوتن نیرویی است که جرم یک کیلوگرم را با شتاب یک متر بر مجذور ثانیه حرکت دهد.
• یک مگانیوتن یک میلیون نیوتن است.


سوخت مایع موشک



برای سوزاندن سوخت به اکسیژن مایع نیاز داریم.
هیدروژن مایع جدا از اکسیژن مایع، انبار می‌شود.
هیدروژن و اکسیژن مایع در محفظه احتراق با هم ترکیب می‌شوند و می‌سوزند.

نیروی پیش‌ران یک‌نواخت - ماده‌ی پیش‌ران، مانند وسایل آتش‌بازی در محفظه جاسازی می‌شود. سرعت سوختن و نیروی پیش‌ران ثابت باقی می‌ماند.


سوختن ختبی



سوختن پیش‌رونده



سوختن پس‌رونده



تکانه‌ی ویژه

کارایی ماده‌ی پیش‌ران را با کمیتی به نام تکانه‌ی ویژه (رانس ویژه) نشان می‌دهند که چنین تعریف می‌شود: مدت زمانی که در آن یک کیلوگرم از ماده‌ی پیش‌ران، به طور مداوم یک کیلوگرم نیروی پیش‌ران تولید می‌کند. پس یک کیلوگرم از ماده‌ی پیش‌رانی با تکانه‌ی ویژه ۲۶۲ ثانیه، مانند ماده‌ی پیش‌ران درون موشک‌های کمکی سوخت جامد شاتل فضایی، در تمام مدت ۲۶۲ ثانیه، نیروی پیش‌رانی معادل یک کیلوگرم تولید می‌کند. هرچه تکانه‌ی ویژه بیشتر باشد، ترکیب سوخت مؤثرتر است. مواد پیش‌ران مایع در مقایسه با سوخت‌های جامد، تکانه‌ی ویژه‌ی بیشتری دارند.

سوخت مایع موشک

نقطه‌ی تبخیر اکسیژن مایع ۱۸۳- درجه‌ی سانتی‌گراد و به حد کافی سرد است که فلز در آن دما ترک می‌خورد و لاستیک خرد می‌شود. هیدروژن مایع در دمای ۲۵۳- درجه‌ی سانتی‌گراد به جوش می‌آید. دماهایی این چنین پایین، کار کردن با این مواد را بسیار مشکل می‌کند؛ اما هر دو آن‌ها مواد پیش‌ران مؤثری هستند.

ارزاق تکانه‌ی ویژه

ماده‌ی پیش‌ران	تکانه‌ی ویژه
سوخت جامد (استفاده شده در شاتل فضایی)	۲۶۲ ثانیه
تتروکسید نیتروژن مایع / UDMH	۳۶۰ ثانیه
سوخت (استفاده شده در موشک پروتون روسی)	۳۶۳ ثانیه
اکسیژن مایع / نفت سفید (استفاده شده در ساترن ۵)	۴۶۲ ثانیه
اکسیژن مایع / هیدروژن مایع (استفاده شده در شاتل و آریان ۵)	۴۶۲ ثانیه

• UDMH = دی‌متیل هیدرازین نامتقارن

سال‌شمار تاریخ موشک

• در قرن دهم، چینی‌ها از شوره (نیترات پتاسیم)، زغال چوب و گوگرد، باروت ساختند. این نخستین سوخت جامد موشک بود.

• رابرت گارد، پیش‌گام آمریکایی دانش فضایی، در پیست و ششم مارس سال ۱۹۲۶، زمانی که نخستین موشک سوخت مایع را پرتاب کرد، تاریخ‌ساز شد.



گارد با موشک خودش

• ورنر فون برلون، دانشمند آلمانی، در جریان جنگ دوم جهانی، موشک V-۲ را ساخت. کار او بعدها بر نخستین پرتابگرهای فضایی ایالات متحده تأثیر گذاشت.

• اتحاد جماهیر شوروی سابق روز چهارم اکتبر سال ۱۹۵۷، نخستین ماهواره‌ی دنیا، اسپوتنیک ۱، را به فضا فرستاد. این ماهواره با پرتابگری به فضا رفت که ابتدا موشکی نظامی بود.

بیش‌تر بدانیم

موشک‌ها چگونه کار می‌کنند؟ ۴۴
پرتابگرهای فضایی ۴۸
شمارش معکوس ۵۲
شاتل فضایی ۷۴


پرتاب‌گرهای فضایی

هیچ‌کس برای بُردن بچه‌ها به مدرسه و برگرداندن آن‌ها، اتومبیلی به گرانی رولزرویس نمی‌خرد و هیچ‌کس هم موشک نیرومند ساترن ۵ را فقط برای فرستادن ماهواره‌ای به اندازه‌ی یک سبد به مداری نزدیک زمین نساخته است. یکی از مهم‌ترین تصمیماتی که پیش روی صاحبان فضایی‌ها قرار دارد، این است که کدام ابزار پرتاب‌گر باید فضایی‌های آن‌ها را در مدار قرار دهد. قابل اطمینان بودن، هزینه و توانایی‌های فنی، مهم هستند. شرکت‌های پرتاب‌کننده‌ی فضایی‌ها، مانند سازندگان اتومبیل، مدل‌های متفاوتی پیشنهاد می‌دهند. پرتاب‌گرهای سنگین‌تر برای فرستادن فضایی‌ها به سفرهای میان‌سیاره‌ای یا ارسال ماهواره‌ها به مدارهای مرتفع «زمین‌ثابت» (جایگاه ماهواره‌ای تلویزیونی و رادیویی) مناسب‌اند. موشک‌های هواپرتابه، بُکسل‌های فضایی‌اند که برای حمل محموله‌های کوچک به مدارهای نزدیک زمین بسیار مناسب هستند. اغلب پرتاب‌گرهای فضایی، موشک‌های چندمرحله‌ای، شامل چند تکه‌اند که هر یک با اتمام سوخت، در بین راه صعود از بدنه‌ی موشک جدا می‌شوند تا وزن آن را کاهش دهند. به هر یک از این تکه‌ها یک مرحله می‌گویند.

موشک‌های سنگین‌تر

موشک پروتون روس‌ها و آریان ۵ اروپایی‌ها را می‌توان موشک‌هایی با عضله (نیرومند) نامید. زیرا می‌توانند محموله‌ای به وزن ۲۰ تن (برابر با ۲۰ اتومبیل) را به مداری نزدیک زمین ببرند. پروتون برای چنین پرتابی سه مرحله دارد. برای پرتاب فضایی‌ها به سفرهای میان‌سیاره‌ای نوع چهار مرحله‌ای هم وجود دارد.

دل‌تا ۲



موشک‌های دل‌تا ماهواره‌های بزرگ، مانند ماهواره‌های مخابراتی نور ۳ را به مدار حمل می‌کنند.

اسب بارکش صنایع موشکی

از سال ۱۹۶۰ خانواده‌ی موشک‌های دل‌تا و از سال ۱۹۸۹ دل‌تا ۲، ماهواره‌ها را پرتاب کرده‌اند. دل‌تا ۲ می‌تواند ۱/۸ تن بار را به مدار انتقال به مدار «زمین‌ثابت» پرتاب کند. رکورد موفقیت‌های دل‌تا ۲ به این موضوع منجر شد که موشک‌های خانواده‌ی دل‌تا را «اسب بارکش» صنایع موشکی بنامند. دل‌تا ۳ آخرین عضو اضافه شده به این خانواده است و می‌تواند ۸ تن بار را به مدار نزدیک زمین، یا ۴ تن بار را به مدار انتقال به مدار زمین‌ثابت، پرتاب کند.

هواپیمای L1۰۱۱ با موشک پگاسوس در زیر آن




موشک‌های هواپرتابه

یک هواپیمای استارگیزر L1۰۱۱ موشک پگاسوس را تا ارتفاع ۱۲/۲ کیلومتری حمل می‌کند. هواپیمای موشک را بر فراز اقیانوسی پهناور رها می‌کند. بال‌های موشک نیروی بالابر آیرودینامیکی را فراهم می‌آورد که پگاسوس را در پرواز نگه‌دارد. پس از پنج ثانیه، نخستین مرحله از سه مرحله‌ی موشک روشن می‌شود. ده دقیقه بعد، محموله در مدار است. پگاسوس می‌تواند ۵۰۰ کیلوگرم بار را به مدار نزدیک زمین حمل کند.



پگاسوس می‌تواند چند ماهواره‌ی کوچک پرتاب کند. این قابلیت برای ارسال ناوگانی از ماهواره‌های مخابراتی تلفن‌های همراه، ماهواره‌ی بسیار مهمی است.

پروتون ماهواره‌های بزرگ، مانند آسیاست ۱-HSG، را به مدار نزدیک زمین حمل می‌کند. ماهواره‌ی آسیاست امواج تلویزیونی و تلفنی را در سراسر آسیا و منطقه‌ی اقیانوسیه مخابره می‌کند.



خانواده‌ی پرتاب‌گرهای پروتون از سال ۱۹۶۵، ماهواره‌های بزرگی را به فضا پرتاب کرده‌اند.





هدف: ایستگاه فضایی

شاتل‌های فضایی ایالات متحده و پروتون روس‌ها قطعات سنگین ایستگاه فضایی بین‌المللی را به مدار حمل کردند. دیگر

پرتابگرها هم در مقام پشتیبان خدمت می‌کردند. اروپا تصمیم گرفت برای پرتاب وسیله‌ی نقل و انتقال خودکار (ATV) از آریان ۵ استفاده کند. ATV برای مانورهای ایستگاه، سوخت و تجهیزات حمل می‌کرد. ژاپن هم تصمیم گرفت از پرتابگر H-۲ برای ارسال هواپیمای فضایی HOPE (امید) به ایستگاه فضایی استفاده کند.

توانایی موشک‌های فضانورد

نام	مدار نزدیک زمین	مقدار محموله مدار زمین ثابت	سیارات	طول به متر
آریان ۵	بله	بله	بله	۵۱
خانواده‌ی اطلس	بله	بله	بله	۵۳ - ۲۸
خانواده‌ی دلتا	بله	بله	بله	۳۹ (دلتا ۲)
H-۲	بله	بله	بله	۴۸
خانواده‌ی مارچ بلند	بله	بله	بله	۵۲ - ۲۸
پگاسوس	بله	بله	بله	۱۵/۵
خانواده‌ی پروتون	بله	بله	بله	۶۰ - ۵۰
وسیلای پرتاب ماهواره‌ی قطبی	بله	خیر	خیر	۴۴
V-R	بله	خیر	خیر	۲۹
ساترن ۵	طراحی شده برای مأموریت آپولو به ماه			۱۱۰
خانواده‌ی تیتان	بله	بله	بله	۶۵ تا

پرتابگرهای تاریخ‌ساز

• ابزار پرتابگر روسی R-۷ از موشک مرکزی و موشک‌های کمکی تشکیل شده بود. این پرتابگر در سال ۱۹۵۷ نخستین ماهواره، اسپوتنیک، را در مدار قرار داد.

• ساترن ۵ موشک عظیمی به ارتفاع یک برج ۳۵ طبقه بود که فضاییماهای آپولو را به سوی ماه پرتاب کرد. این موشک آخرین پرواز خود را در ۱۴ مه سال ۱۹۷۳ انجام داد و ایستگاه فضایی اسکای‌لب را به مدار برد.

• در سال ۱۹۷۴، ناسا یک موشک تیتان را با مرحله‌ی بالایی موشک ستانور (CENTAUR) ترکیب کرد. این ترکیب، فضاییماهای وینچ را به فضا برد تا به گشت‌وگذار تاریخی خود در میان سیارات بیرونی و تا خارج از مرزهای سیاره‌ای منظومه‌ی شمسی بپردازند.



ساترن ۵


نخستین پرواز: ۹ نوامبر سال ۱۹۶۷.

موشک عظیم ساترن ۵ آپولو را پرتاب و راهی نخستین فرودش بر ماه کرد؛ ۱۶ ژوئیه سال ۱۹۶۹.


در ۱۴ مه سال ۱۹۷۳، یازدهمین و آخرین پروازش را انجام داد.

• با توجه به فرسودگی شاتل‌های فضایی و فن‌آوری نسبتاً قدیمی در بیشتر پرتابگرهای اصلی، سازمان فضایی ناسا پرتابگرهای جدیدی را برای دهه‌ی ۲۰۱۰ میلادی آماده می‌کند. پرتابگر آرس ۱ برای پرتاب فضاییما سرنشین‌دار اوریون به ماه و پرتابگر باربری آرس ۵ برای پرتاب بخش‌های دیگر فضاییما سفر به ماه و ارتباط با ایستگاه فضایی طراحی شده‌اند.

موشک بلند چینی‌ها: مارچ



موشک‌های بلند مارچ، ماهواره‌های کوچکی مانند ساماندهی مخابراتی تلفن همراه آسیا-اقیانوسیه را به مدار برده است.



رقبای موشک‌ساز

فضاییماها پیچیده‌اند و امکان دارد اشتباهی کوچک، مأموریتی چند میلیون دلاری را نابود کند. تقریباً تمام سفارش‌های پرتابگرها (معمولاً در ایالات متحده، روسیه، اروپا و ژاپن) به شرکت‌هایی با سابقه‌ی بیش‌تر در زمینه‌ی تولید فن‌آوری فضایی ارجاع می‌شود. دیگر کشورها نیز موشک‌های خود را پرتاب می‌کنند؛ اما فروختن فن‌آوری به کشورهای دیگر برای آن‌ها سخت است. چین اکنون در تلاش است موشک‌هایش را به خارج بفروشد. چین در سال‌های اخیر با این پرتابگرها ماهواره‌های بسیاری را به مدار برده و حتی چند فضا‌نورد چینی را نیز به فضا رسانده است.



ماهواره‌های شناخت زمین به نام ERS-۲ به‌خوبی در موشک آریان ۵ جای گرفت.

همانگی محموله با پرتابگر

مهم‌ترین پرسشی که صاحبان ماهواره‌ها هنگام انتخاب وسیله‌ی پرتابگر می‌پرسند، این است که: «چه‌قدر بار حمل می‌کند؟» حتی اگر پرتابگر ظرفیت بار را داشته باشد، شکل دماغه‌ی آن هم باید به‌گونه‌ای باشد که ماهواره داخلش جای بگیرد. همچنین ماهواره باید در برابر نیروهایی که بر محموله در حین پرتاب وارد می‌شود، مقاومت کند. هر موشک به گونه‌ای متفاوت عمل و نیروهای متفاوتی را به محموله وارد می‌کند.


مراکز پرتاب

مراکز پرتاب، دروازه‌هایی به سوی فضا هستند. ممکن است این مراکز پایگاه‌هایی کوچک یا مجموعه‌های گسترده و گران‌قیمتی به وسعت چند هکتار باشند. بزرگ‌ترین بندرگاه‌های فضایی دنیا، چند سکوی پرتاب دارند. در هفته‌های پیش از پرتاب، مهندسان ابزارهای پرتاب را در ساختمان‌های چند طبقه سرهم می‌کنند. سپس سکوهای عظیم، در حالی که پرتاب‌گر مونتاژ شده را حمل می‌کنند، آرام آرام به سوی سکوی پرتاب به حرکت درمی‌آیند. در اطراف پایگاه، اتاق‌های گوناگونی پراکنده‌اند: اتاق هدایت که متخصصان مأموریت فضایی از آن‌جا شمارش معکوس نهایی را زیر نظر دارند؛ مخزن‌های عظیم برای ماده‌ی پیش‌ران، ایستگاه‌های هواشناسی که وضعیت پایگاه را در روز پرتاب می‌سنجند و ایستگاه‌های ردیابی که بخش‌های نخستین صعود به فضا را زیر نظر دارند.



مرکز پرواز فضایی کندی

این مرکز، به وسعت ۵۶۶۰۰ هکتار در کیپ کاناورال فلوریدا در ایالات متحده، پایگاه پرتاب شاتل‌های فضایی ناساست. این پایگاه نزدیک به منطقه‌ی حفاظت‌شده‌ی طبیعی است و باندی ۴/۵ کیلومتری دارد که خدمه‌ی پایگاه پیش از پرواز، آن‌جا را به دنبال تسماع‌های سرگردان و سیاه‌گوش‌ها می‌گردند.



مرکز پرواز فضایی کورو

کورو، در گویان فرانسه (کشوری کوچک در آمریکای جنوبی)، جایی است که آریان اسپیس (مسئول بیش از نیمی از ماهره‌های تجاری بزرگ دنیا) و سازمان فضایی اروپا (اسا) ماهره‌های خود را از آن‌جا پرتاب می‌کنند. این پایگاه نزدیک استواست و برای جای‌گزینی ماهره‌ها در مدارهای زمین‌ثابت، که درست بالای استوا قرار دارد، بسیار مناسب است.

مراکز اصلی پروازهای فضایی در دنیا

نام پایگاه	موقعیت	صاحب پایگاه
آلکاتارا	برزیل	برزیل
بایک‌نور	قزاقستان	روسیه
جیوکوان	چین	چین
کاکوشیما	ژاپن	ژاپن
کاپوستین یار	روسیه	روسیه
کندی	فلوریدا	ایالات متحده
کورو	گویان فرانسه (آمریکای جنوبی)	فرانسه
پلستشک	روسیه	روسیه
سن‌مارکو	سکویی در آب‌های سواحل کنیا	ایتالیا
سری هاریکوتا	آندراپردیش، هند	هند
تانگشیما	ژاپن	ژاپن
واندنبرگ	کالیفرنیا	ایالات متحده
ژیچانگ	سی‌شوان، چین	چین
زیت	سوار بر کشتی اقیانوس‌پیما	کنسرسیوم تجاری

پلستشک، در نزدیکی قطب شمال برای پرتاب به مدارهای قطبی استفاده می‌شود.


پایگاه فضایی چین برای پرتاب ماهواره‌های غیرنظامی که در صحرای گبی است.

از پایگاه‌های کاکوشیما و تانگشیما فقط در مواقع محدودی پرتاب انجام می‌شود تا به صنعت ماهیگیری ژاپن آسیبی وارد نشود.



مرکز پرواز فضایی بایک‌نور


پایگاه بایک‌نور در قزاقستان، بزرگ‌ترین مرکز پروازهای فضایی جهان و یکی از قدیمی‌ترین مراکز است. هواپیماهای جاسوسی آمریکا از سال ۱۹۵۵، گزارش ساختن این مرکز را می‌دادند. نخستین ماهره، اسپوتنیک، در سال ۱۹۵۷ از پایگاه بایک‌نور راهی فضا شد. موشک‌های روسی، که ایستگاه فضایی بین‌المللی را تغذیه می‌کنند، از این پایگاه پرتاب می‌شوند.



موقعیت‌های پرتاب

عوامل متعددی بر انتخاب پایگاه پرتاب تأثیر می‌گذارند. در ۴۰ سال نخست عصر فضا، حوادث وحشتناک نشان داد تا چه اندازه مهم است که پرتاب‌های فضایی را از نواحی پُرجمعیت دور نگه‌دارند. البته پایگاه باید در دسترس باشد؛ زیرا برای هر پرتاب، تجهیزات سنگینی لازم است. ایالات متحده و اروپا این مشکلات را با قرار دادن پایگاه‌های فضایی در نواحی ساحلی در دسترس و با انجام‌دادن پرتاب‌ها از طریق سکوها یا کشتی‌هایی در اقیانوس، حل کردند. جغرافیا نیز مهم است. مثلاً پرتاب به سوی شرق ترجیح داده می‌شود؛ زیرا از چرخش رو به شرق زمین سود می‌برد. اما بهترین حالت آن است که پایگاه به استوا نزدیک باشد؛ زیرا در استوا چرخش زمین بیش‌ترین اثر را دارد و از سوی دیگر، ماهواره‌های بسیاری مانند تمام ماهواره‌های تلویزیونی و رادیویی مدار زمین‌ثابت در مدارهای استوایی قرار می‌گیرند. برای ارسال ماهواره‌های قطبی نیز پرتاب از نواحی دور از استوا بهتر است.

نام پایگاه	نخستین پرتاب	محموله‌ها
آلکاتارا	۱۹۹۹	تجاری، علمی
بایکانور	۴ نوامبر ۱۹۵۷	سرشنین‌دار، علمی، تجاری
جیوکوآن	۲۶ ژوئیه ۱۹۷۵	تجاری
کانکوشیما	۱۱ فوریه ۱۹۷۰	تجاری، علمی
کاپوستین یار	۱۶ مارس ۱۹۶۲	علمی
کندی	۹ نوامبر ۱۹۶۷	سرشنین‌دار، علمی، تجاری
کورو	۱۰ مارس ۱۹۷۰	تجاری، علمی
پلستسک	۱۷ مارس ۱۹۶۶	نظامی، کاربرد چندگانه
سن مارکو	۲۶ آوریل ۱۹۶۷ (در ۱۹۸۸ متوقف شد)	موشک‌ها
سری‌هایریکوتا	۱۸ ژوئیه ۱۹۸۰	علمی، کاربرد چندگانه
تانگشیما	۱۱ فوریه ۱۹۷۵	علمی، تجاری
واندنبرگ	۲۸ فوریه ۱۹۵۹	نظامی
ژیچانگ	۲۹ ژانویه ۱۹۸۴	علمی، کاربرد چندگانه
پایگاه متحرک دریایی زینیت	۲۷ مارس ۱۹۹۹	تجاری



مرکز پرواز فضایی
آلکاتارا در برزیل یکی
از جدیدترین مراکز
فضایی دنیاست.

سکوه‌های پرتاب

پایگاه‌های فضایی در خشکی، بسیار پُرهزینه‌اند و سود قابل توجهی از آن‌ها عاید نمی‌شود تا توجیه مناسبی برای سرمایه‌گذاری بخش صنعتی باشد. اما چهار شرکت از ایالات متحده، روسیه، اوکراین و نروژ، در ساخت سکوی پرتاب دریایی زینیت با هم مشارکت کردند. این پرتاب‌گر با کشتی اقیانوس پیما به مکان استوایی ایمنی در میان اقیانوس بکسپل می‌شود و به موقعیت آغاز پرتاب می‌رسد. این پرتاب‌گر ماهواره‌ای به وزن ۵۸۰۰ کیلوگرم را به مدار زمین‌ثابت پرتاب می‌کند.

بیش‌تر بدانیم

پرتاب‌گرهای فضایی ۴۸
شمارش معکوس ۵۲
ماهواره‌ها و مدارها ۵۴




شمارش معکوس



حمل و نقل موشک‌ها

کشتی حامل قطعات گوناگون موشک آریان ۵ به گویان فرانسه، سفر خود را از برمن آلمان آغاز می‌کند. در آن نقطه، مرحله‌ی بالایی موشک بار زده می‌شود. دیگر بخش‌ها با کشتی در مسیر رودهای اروپا تا روتردام در هلند یا تالوهار در فرانسه می‌آیند و به کشتی عازم کورو ملحق می‌شوند. سفر از لوهار تا کورو ۱۱ روز طول می‌کشد.



ماهواره‌ی مخابراتی در حال آماده شدن برای پرتاب با آریان ۵.

الحاق محموله

برای پرتاب با آریان ۵، ماهواره‌ها و دماغه‌ی محافظ آن‌ها در آخرین اتاق مونتاز حدود ۸ روز پیش از پرتاب، روی پرتاب‌گر نصب می‌شوند. ماهواره از طریق آریان ۵ به اتاق هدایت ژوپیتر متصل می‌شود و به این ترتیب، محموله در مراحل نهایی شمارش معکوس، زیر نظر است.

این صفحه مسیر پرتاب را نمایش می‌دهد.

گروه تلکام (ارتباط تلفنی) با ایستگاه‌هایی که صعود پرتاب‌گر را ردیابی می‌کنند. در ارتباط است.

گروه محموله وضعیت ماهواره را زیر نظر دارد و اطمینان حاصل می‌کند که ایستگاه‌های ردیابی صاحبان محموله آماده‌ی دریافت علامت ماهواره، هنگام ورود آن به مدار هستند.




جانشین مدیر گروه پرتاب، برای DDO مانند پشتیبان عمل می‌کند.

مدیر گروه پرتاب، اطلاعات مربوط به وضعیت پرتاب‌گر را به DDO می‌رساند.

مدیر عملیات (DDO) اجازه‌ی شمارش معکوس نهایی را این چنین صادر می‌کند: «از DDO به همه، توجه کنید، آغاز سلسله عملیات هماهنگ.»

چهار رایانه جلوی کارمندان رده‌بالای سازمان‌های فضایی اروپا و فرانسه، صاحب ماهواره و نماینده‌ی آریان اسپیس قرار دارد.



سالن تماشای اتاق هدایت ژوپیتر.


هدایت مأموریت

اتاق هدایت ژوپیتر در کورو، گویان فرانسه (آمریکای جنوبی)، پرتاب آریان ۵ را هدایت می‌کند. سه گروه وضعیت پرتاب‌گر و محموله را زیر نظر دارند. ایستگاه‌های ردیابی نیز صعود موشک را دنبال می‌کنند و در همین حال، گروه‌های هواشناسی و امنیت هم جداگانه مشغول‌اند. وقتی همه‌ی این گروه‌ها وضعیت را سبز اعلام کردند، مدیر عملیات اجازه‌ی شروع بخش نهایی شمارش معکوس را صادر می‌کند.

اتاق هدایت ژوپیتر در یکی از پرتاب‌های موشک آریان

مدیر گروه ردیابی، مسیر پرتاب‌گر را با رادار زیر نظر دارد.

هدایت‌گران، مأموریت تجهیزات پشتیبانی پرتاب را در سکوی پرتاب و نزدیکی آن زیر نظر دارند.



به سوی سکوی پرتاب

یک میز پرتاب ۸۷۰ تنی پرتاب‌گر را در زمان مونتاژ پشتیبانی می‌کند. روز پیش از پرتاب، کامیونی پرتاب‌گر و میز پرتاب را در ریل‌هایی به سوی سکوی پرتاب یدک می‌کشد. کامیون و میز با هم ۱۵۰۰ تن (برابر با ۱۵۰۰ اتومبیل) وزن دارند. ماده‌ی پیش‌ران (سوخت و اکسیدکننده) در سکو به پرتاب‌گر تزریق می‌شود.



واحد خدمات روی میز پرتاب، آریان ۵ را حین سفر به سکوی پرتاب خنک نگه می‌دارد.

روی سکوی پرتاب

در محوطه‌ی پرتاب، سه مجرای خنقدمانند وجود دارد که شعله‌های موتور اصلی و موتورهای کمکی در حین پرتاب از آن‌ها می‌گریزند. برج آب نیز در هنگام پرتاب، آب را ۳۰ متر مکعب در ثانیه روی محوطه می‌ریزد تا هم سروصدا را کاهش دهد و هم خنقد و میز پرتاب را خنک کند. بدون آب، لرزه‌ی حاصل از سروصدا ممکن است به پرتاب‌گر و محموله‌ی آن آسیب برساند.



شمارش معکوس برای پرتاب

۳۶۰ ثانیه	آغاز دنباله‌ی زمان‌بندی شده منجر به احتراق اصلی
۳۰ ثانیه	شیرهای فلکه باز می‌شوند تا خنقدی‌های شعله از آب پر شوند.
۱۳ ثانیه	به رایانه‌های سوار بر موشک اجازه داده می‌شود مأموریت را به‌عهده بگیرند.
احتراق اصلی	رشته‌ی احتراق‌های موتور اصلی آغاز و عملکرد آن بررسی می‌شود. سرانجام هر دو موشک کمکی سوخت جامد روشن می‌شوند.
۷ ثانیه پس از احتراق اصلی	پرتاب آغاز شد.

پرتاب

محوطه‌ی پرتاب از ۶ ساعت پیش از پرتاب کاملاً آماده است. برنامه‌ی پرواز روی دو رایانه‌ی سوار بر موشک ریخته شده است و بررسی ارتباطات رادیویی بین پرتاب‌گر و زمین را آغاز می‌کند. پنج ساعت پیش از پرتاب، مخزن‌های مرحله‌ی اصلی موشک از ماده‌ی پیش‌ران پر می‌شوند. شش دقیقه پیش از پرتاب، دنباله‌ی هماهنگی از روی داده‌ها، که به پرتاب منجر می‌گردد، آغاز می‌شود.

بیش‌تر بدانیم

موشک‌ها چگونه کار می‌کنند؟ ۴۴
پرتاب‌گرهای فضایی ۴۸
پیش‌رانش موشک ۴۶
مراکز پرتاب ۵۰

ماهواره‌ها و مدارها

تثبیت ماهواره‌ها

اگر مدار ماهواره‌ها پایدار نباشد یا اگر به گونه‌ی پیش‌بینی‌ناپذیری به دور خود بچرخند، نمی‌توانند وظیفه‌ی خود را انجام دهند. مثلاً بشقاب یک ماهواره‌ی مخابراتی همواره باید به سوی ایستگاه گیرنده باشد یا اگر در حال مخابره‌ی علائم تلویزیونی است، باید به سوی کشور هدف خود نشانه برود. دو روشی که معمولاً برای حفظ ثبات ماهواره‌ها و جلوگیری از چرخش خارج از کنترل آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، تثبیت چرخشی و تثبیت سه محوری است.

ماهواره‌ی مخابراتی HS۳۷۶ به روش چرخشی تثبیت شده است.

بشقاب آنتن نمی‌چرخد.

فرستنده از این آنتن علائم رادیویی را ارسال می‌کند که از بشقاب به سوی زمین بازتاب می‌شود

تجهیزات به گونه‌ای طراحی شده‌اند که داخل شکل استوانه‌ای ماهواره جای بگیرند.

اگر حس‌گرها لرزشی را در ماهواره آشکار کنند، موتورهای تغییر جهت، چرخش را تصحیح و ثبات ماهواره را حفظ می‌کنند.

وقتی ماهواره به مدار رسید، صفحه‌های خارجی به صورت کشویی پایین می‌روند تا صفحه‌های خورشیدی زیر آن‌ها نمایان شود به این ترتیب، توان الکتریکی ماهواره افزایش می‌یابد.

صفحه‌های سلول‌های خورشیدی


تثبیت چرخشی

طبیعتاً اغلب اجسامی که می‌چرخند، پایدارند. فرفره‌ای چرخان، اگر به حد کافی سریع چرخانده شده باشد، در وضعیتی پایدار می‌ماند. دو چرخه هم به سبب چرخش چرخ‌ها صاف می‌ایستد. در نخستین روزهای عصر ماهواره‌ها، طراحان تصمیم گرفتند از این اصل بهره ببرند. حاصل کار، ماهواره‌های تثبیت‌شده از طریق چرخش بود. معمولاً این ماهواره‌ها استوانه‌ای شکل‌اند و تقریباً در هر ثانیه یک دور می‌زنند. بشقاب آنتن ماهواره باید همواره به سوی زمین باشد؛ بنابراین، نباید مانند ماهواره، به دور خود بچرخد. از سوی دیگر، طراحان باید توجه کنند که بشقاب ماهواره سبب ناپایداری چرخش آن نشود.

می‌توان هر چیزی را که در مداری به دور جسم دیگری بگردد، قمر نامید. برای مثال، ماه قمر طبیعی زمین است. از سال ۱۹۵۷، چند هزار قمر مصنوعی (یا ماهواره) به مداری به گرد زمین پرتاب شده‌اند. اندازه‌ها و شکل‌های آن‌ها بسیار متنوع است و در مدارهای متفاوتی جای می‌گیرند که به اهداف و کاربردهای آن‌ها بستگی دارد. مثلاً بسیاری از ماهواره‌های مخابراتی در مدارهای زمین‌ثابت و بسیاری از ماهواره‌های هواشناسی در مدارهای قطبی جای می‌گیرند. ماهواره‌ها، در هر مداری که باشند، باید ثابت باقی بمانند تا ابزارهایشان همواره به یک جهت نشانه رود.

انواع مدار


بیشتر ماهواره‌ها به یکی از ۴ مدار اصلی پرتاب می‌شوند. مدار نزدیک زمین تقریباً دایره‌ای تا حدود ۲۵۰ کیلومتر بالاتر از زمین است. ارتفاع مدارهای قطبی معمولاً ۸۰۰ کیلومتر است. مداری بسیار بیضوی، ماهواره را از زمین دور و به آن نزدیک می‌کند؛ به طوری که ارتفاع ماهواره در حضیض مداری، بسیار کم‌تر از زمانی است که در اوج مداری قرار می‌گیرد. مدار زمین‌ثابت حدود ۳۶ هزار کیلومتر بالاتر از استوا قرار گرفته و جایگاهی بسیار استثنایی است.



در مقیاس اغراق شده تا تصویر واضح باشد.

تله‌متری، ردیابی و فرمان‌دهی

تله‌متری، به معنی دورسنجی یا مسافت‌سنجی، به افراد روی زمین کمک می‌کند اندازه‌گیری‌های متفاوتی را از ماهواره‌های در مدار دریافت کنند. این اندازه‌گیری‌ها، که به صورت علائم رادیویی ارسال می‌شوند، ممکن است شامل اطلاعاتی باشند که به متصدیان ماهواره امکان مشخص کردن موقعیت آن را بدهند. به این ترتیب، می‌توان ماهواره را ردیابی کرد و برای تغییر یا تصحیح موقعیت آن، فرمان‌هایی با علائم رادیویی فرستاد. تله‌متری شامل داده‌هایی است که به هدایت‌گران زمینی امکان می‌دهد درست کار کردن ماهواره را بررسی کنند.



آنتن رادیویی بزرگ برای ارسال و دریافت امواج به ماهواره

تله‌متری، ردیابی و فرمان‌دهی

ماهواره‌ی مخابراتی HS ۶۰۱ به روش سه محوری تثبیت شده است.



تثبیت سه محوری

ماهواره‌هایی که به روش سه محوری تثبیت شده‌اند، چرخ‌های کوچک چرخشی دارند و به ترتیبی می‌چرخند که همواره ماهواره را در جهت یکسانی نسبت به زمین و خورشید نگه می‌دارند. اگر حسگرهای ماهواره انحرافی را در هر یک از سه محور مکعب شش‌سایه کنند، علامتی به چرخ‌ها ارسال می‌شود که سریع‌تر یا آهسته‌تر بچرخند. این تغییرات ماهواره را به جهت‌گیری صحیح بازمی‌گرداند.

داده‌های مداری ماهواره

مدار	محمولی متداول
نزدیک زمین	ارتباطات سیار (مانند تلفن‌های ماهواره‌ای)، شناسایی
زمین‌ثابت	آب و هوا، مخابرات (ماهواره‌های رادیو-تلویزیونی)، ناوبری
قطبی	آب و هوا، ناوبری
بسیار بیضوی	ارتباطات در عرض‌های شمالی‌تر

دیگر روش‌های تثبیت

می‌توان از نیروهایی که به ماهواره وارد می‌شوند، استفاده کرد و ماهواره را در فضا پایدار نگه‌داشت. مثلاً ماهواره‌های بزرگ می‌توانند از گرانش بهره ببرند و خود را به نحوی هم‌خط کنند که تجهیزاتشان همواره به سوی زمین باشد (مثلاً تلسکوپ فضایی هابل نشانه‌گیری‌های دقیق خود را با این روش و به کمک ژيروسکوپ‌ها انجام می‌دهد). برخی هم با میدان مغناطیسی زمین برهم‌کنش دارند تا در وضعیتی پایدار بمانند. روش تثبیت ماهواره به هدف ماهواره و مداری که در آن حرکت می‌کند، بستگی دارد.

نخستین ماهواره‌ها


- اسپوتنیک ۱ (که در چهارم اکتبر سال ۱۹۵۷ پرتاب شد)، نخستین ماهواره‌ی انسان بود. این ماهواره‌ی روسی فقط «بیپ»هایی پیوسته به زمین مخابره می‌کرد و هیچ نوع داده تلمتری نمی‌فرستاد.
- اکسپلورر ۱ (که در اول فوریه سال ۱۹۵۸ پرتاب شد)، نخستین ماهواره‌ی ایالات متحده بود. این ماهواره شواهدی بر وجود کمربند تابشی وان آلن در میدان مغناطیسی زمین یافت.
- اکسپلورر ۷ (که در هفتم اوت سال ۱۹۵۹ پرتاب شد)، ماهواره‌ی آمریکایی و حامل نخستین ابزارها برای سنجش از دور و بررسی آب و هوا بود.
- ماهواره‌ی آمریکایی ترانزیت ۱B (که در سیزدهم آوریل سال ۱۹۶۰ پرتاب شد) نخستین ماهواره‌ی ناوبری دنیا بود.
- نخستین ماهواره‌ی هواشناسی دنیا، ماهواره‌ی آمریکایی تیروس ۱ بود که در اول آوریل سال ۱۹۶۰ پرتاب شد. این ماهواره به مدت ۲ ماه تصاویری به زمین ارسال می‌کرد.
- ماهواره‌ی ارلی‌برد (سرخ‌پز) از سلسله ماهواره‌های ایتل‌سنت (که در ۶ آوریل سال ۱۹۶۵ پرتاب شد)، نخستین ماهواره‌ی مخابراتی بود که برای استفاده‌ی تجاری کار می‌کرد.

بیش‌تر بدانیم

- پرتاب‌گرهای فضایی ۴۸
- ماهواره‌های مخابراتی ۵۸
- ماهواره‌های هواشناسی ۶۲
- ماهواره‌های منابع زمینی ۶۴
- ماهواره‌های نظامی ۶۶

سلول‌های خورشیدی

وقتی نور به سلول‌های خورشیدی می‌رسد، انرژی الکتریکی تولید می‌کنند. در ماهواره، این سلول‌ها در صفحه‌های خورشیدی تعبیه شده‌اند که گاه آرایه‌ی خورشیدی نامیده می‌شوند. آرایه‌های خورشیدی، توانی را که ماهواره‌ها برای انجام دادن وظایف خود نیاز دارند، تأمین می‌کنند. افزون بر این، این سلول‌ها توان الکتریکی لازم را برای تصحیح مدار و حفظ ماهواره و محموله در آن مدار، تولید می‌کند.



عملیات نجات ماهواره‌ی وسنار

در سال ۱۹۸۴، اطلاعات تلمتری ماهواره‌ی وسنار نشان داد که ماهواره پس از پرتاب، وارد مدار صحیح نشده است.



فضانورد شاتل فضایی، ماهواره‌ی وسنار را از فضا گرفت تا به محفظه‌ی بار شاتل منتقل و برای تعمیر به زمین بازگرداند.

داده‌های خانه‌داری

اطلاعات درباره‌ی سلامت ماهواره را «داده‌های خانه‌داری» می‌نامند. اگر اشتباهی در کار ماهواره رخ دهد، مثلاً اگر ناپایدار شود، این داده‌ها به هدایت گران زمینی هشدار می‌دهند. متصدیان ماهواره روی زمین معمولاً می‌توانند فرمانی ارسال کنند تا مشکل حل شود یا اگر ماهواره بسیار ارزشمند باشد، یک مأموریت نجات تدارک ببینند.

سازمان‌های فضایی و جایگاه ایران


امروزه حدود ۵۰ کشور جهان، نمادهایی ملی به نام آژانس یا سازمان فضایی دارند. در حالی که پیش‌گامان عصر فضا افراد یا مراکزی از کشورهای شوروی سابق، آلمان و ایالات متحده بودند، اکنون در فهرست فعالان فضایی نام کشورهای در حال توسعه‌ای مانند کره‌ی شمالی، بنگلادش، تایوان، پاکستان، پرو، نیجریه و برزیل هم دیده می‌شود.

در ایران نیز پس از چند سال پژوهش، مراکزی مانند پژوهشگاه هوافضا، مرکز سنجش از دور و گروه و دانشکده‌های هوافضا در دانشگاه‌هایی مانند صنعتی شریف، امیرکبیر و خواجه نصیرالدین توسی آن‌قدر رشد کرد که سازمان فضایی ایران (ISA)، در خرداد ۱۳۸۴ (۲۰۰۵ میلادی) تأسیس شد. این سازمان زیر نظر وزارت ارتباطات و اطلاعات و شورای عالی فضایی ایران فعالیت می‌کند. پیش‌برد طرح‌های مخابراتی، طراحی و همکاری دریافت ماهواره‌های مورد نیاز ایران، اطلاع‌رسانی و ترویج دانش فضایی در میان ایرانیان و جست‌وجوی پژوهش‌های مشترک اخترشناسی و علوم فضا از جمله فعالیت‌های این سازمان است. پرتاب ماهواره‌ی سینا در سال ۱۳۸۴ ایران را صاحب ماهواره‌ای داخلی کرد و کشور ما را در مقام چهل و دومین کشور عضو باشگاه فضایی قرار داد.


سنجش از دور

یکی از گسترده‌ترین فعالیت‌های سازمان فضایی ایران، سنجش از دور، شامل تهیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌های زمین برای پیش‌بینی وقایع طبیعی، بررسی منابع طبیعی و زمین‌های کشاورزی و جاده‌ها، همکاری با سازمان‌هایی مانند هواشناسی، زمین‌شناسی و اقیانوس‌شناسی برای ارائه‌ی اطلاعات و تصاویر فضایی مورد نیاز، بررسی تصاویر ماهواره‌ای از شهرهای ایران و جهان برای کمک به مدیریت شهری و مدیریت بحران و...


دریای خزر، رشته‌کوه البرز و مخروط عظیم دماوند در فصل تابستان، در این نمای رایانه‌ای حاصل از داده‌های ماهواره‌ای، دیده می‌شود.



سنجش از دور یکی از فعالیت‌های اصلی سازمان‌های فضایی است.



تصویر ماهواره‌ای از میدان آزادی تهران. چنین تصاویری به بهبود مدیریت شهری و مدیریت بحران کمک فراوانی می‌کند.



فعالیت‌های فضایی سرنشین‌دار

کار برخی سازمان‌های فضایی، بیش‌تر بر سنجش از دور و ماهواره‌ها و کاوش‌گرهای بدون سرنشین متمرکز است. برخی کشورها مانند روسیه، ایالات متحده، اتحادیه‌ی اروپا و چین، برای مأموریت‌های ارسال و اقامت انسان در فضا، سرمایه‌گذاری بسیاری انجام داده‌اند. بنا بر اعلام مسئولان فضایی ایران، ارسال موجود زنده و سرانجام انسان به فضا نیز در برنامه‌های بلندمدت پژوهش‌های فضایی کشور قرار گرفته است که پیش‌نیاز آن، سال‌ها آزمایش و تحقیق، آموزش‌های دانشگاهی و همکاری با سازمان‌های فضایی پیش‌رفته در فضاوردی است.

امید ایران



در جهان، کشورهای کمی توانایی پرتاب ماهواره به مدار زمین را دارند. در بهمن ۱۳۸۷ شمسی / فوریه ۲۰۰۹ میلادی، موشک ماهواره‌بر سفیر، نخستین ماهواره‌ی ساخته‌ی متخصصان ایرانی را به فضا برد و ایران را در جمع ۱۰ کشور توانا در پرتاب ماهواره قرار داد. سفیر موشکی ۲۲ متری و دومرحله‌ای است. امید ماهواره‌ای ساده و کوچک برای فعالیت‌های مخابراتی و پژوهشی به پهنای ۴۰ سانتی‌متر و وزن ۲۷ کیلوگرم بود که طی ۷ هفته فعالیت، مداری به ارتفاع حدود ۳۰۰ کیلومتر را دور می‌زد. پس از پایان مأموریت و افت مداری، به سبب اصطکاک لایه‌های بالایی جو زمین طبق برنامه در اقیانوس اطلس سقوط کرد.

موشک ماهواره بر سفیر که ماهواره‌ی امید را به فضا برد.



میزان خسارت

در فعالیت‌های سنجش از دور، همواره بررسی فاجعه‌ها و رخداد‌های طبیعی بزرگ در زمین مهم است. این دو تصویر ماهواره‌ای ارگ بم در استان کرمان را پیش (راست) و پس از زلزله‌ی ویران‌گر سال ۱۳۸۲ نشان می‌دهد. چنین تصاویری برای شناخت میزان خسارت وارد شده و مرمت و بازسازی درست، اهمیت بسیار دارند.



رقابت تازه میان چین و هند

سازمان‌های فضایی چین و هند از سریع‌ترین مراکز فضایی در حال رشدند. چین نخستین فضاوردان خود را در سال‌های اخیر با فضاپیماهای ساخت این کشور به مدار برد و اکنون طرح ساخت یک ایستگاه فضایی و سفر به مریخ را دنبال می‌کند. هند علاوه بر ارسال ماهواره‌هایی به مدار، کاوش‌گر موفقی را به ماه رساند و در اندیشه‌ی سفر انسان به ماه است. رقابت میان این دو کشور در تسخیر فضا، یادآور مسابقه‌ی فضایی میان شوروی و ایالات متحده در آغاز عصر فضا است.

ماهواره‌های فعال و از کار افتاده

روسیه و ایالات متحده به ترتیب با پرتاب بیش از ۱۴۰۰ و ۱۰۰۰ ماهواره، بیش‌ترین سهم را در چند هزار فضاپیما و ماهواره‌ی ارسال شده به فضا دارند. پس از آن‌ها، ژاپن با حدود ۱۳۰ و چین با حدود ۹۰ ماهواره، با تفاوت زیادی قرار دارند. اکنون بیش از ۹۰۰ ماهواره در مدار زمین فعال‌اند؛ اما تعداد کل ماهواره‌ها و تکه‌های خراب شده و رها شده، که زیاده یا پس‌مانده‌های فضایی خوانده می‌شوند، بسیار بیش‌تر است. آمار نسبتاً دقیقی از زیاده‌های فضایی بزرگ‌تر از ده سانتی‌متر در مدارهای نزدیک به زمین در دست است. تعداد آن‌ها حدود ۲۰ سال پیش، چند هزار عدد بود؛ اما اکنون نزدیک به ۲۰ هزار تکه است. چین و روسیه با آزمایش موشک‌های ضدماهواره‌ی خود، در تولید زیاده‌های فضایی سهم زیادی دارند. این تکه‌های سرگردان در مدارهای پایین به مرور در جو سقوط می‌کنند و می‌سوزند؛ اما در مدارهای بالاتر، قرن‌ها باقی می‌مانند و برای ماهواره‌های دیگر و فضاوردان بسیار خطرناک‌اند.

بزرگ‌ترین سازمان‌های فضایی جهان به ترتیب بودجه‌ی سالانه

عنوان	کشور	سال تأسیس	پایگاه اینترنتی
ناسا (NASA)	ایالات متحده	۱۹۵۸	WWW.NASA.GOV
اسا (ESA)	اتحادیه‌ی اروپا	۱۹۷۵	WWW.ESA.INT
CNES	فرانسه	۱۹۶۱	WWW.CNES.FR
جاکسا (JAXA)	ژاپن	۲۰۰۳	WWW.JAXA.JP
RKA	روسیه	۱۹۹۲ و پیش از آن به نام‌های دیگر در شوروی سابق	WWW.FEDERALSPACE.RU
DLR	آلمان	۱۹۶۹	WWW.DLR.DE
ASI	ایتالیا	۱۹۸۸	WWW.USI.IT
ISRO	هند	۱۹۶۹	WWW.ISRO.ORG
CNSA	چین	۱۹۹۳	WWW.CNSA.GOV.CN
BNSC	انگلستان	۱۹۸۵	WWW.BNSC.GOV.UK
CSA	کانادا	۱۹۸۹	WWW.SPACE.GC.CA

ماهواره‌های مخابراتی

بازفرستنده‌ی ماهواره‌ی مخابراتی




بازفرستنده‌ها
ابزارهایی به نام بازفرستنده‌ها یا فرستنده - گیرنده‌های خودکار، قلب ماهواره‌های مخابراتی و شامل زنجیره‌ای از اجزای الکترونیک‌اند. این اجزاء، علائم رادیویی را، که ممکن است پس از سفر از درون جو آشفته شده باشند، سروسامان می‌دهند و آن‌ها را به فرکانس‌هایی، که برای ارسال مجدد به سوی زمین لازم است، تبدیل می‌کنند. به‌علاوه، علائم را پیش از ارسال، تقویت می‌کنند.

ماهواره‌ی اینترنت - ۵

ماهواره‌های زمین ثابت

همواره به‌نظر می‌رسد ماهواره‌هایی در مدار GEO یا زمین ثابت بر فراز استوا بالای یک نقطه‌ی زمین ثابت‌اند. آن‌ها به این دلیل ثابت به‌نظر می‌رسند، که مدت یک دور گردش ماهواره در ارتفاع ۳۶ هزار کیلومتری بالای زمین، برابر با مدت یک بار چرخش زمین به دور محور خود است. آن‌ها در میدان دید یک ایستگاه زمینی یا گیرنده‌ای، مانند بشقاب گیرنده‌ی ماهواره‌ای، همواره ثابت باقی می‌مانند.



سه ماهواره، که با فاصله‌های برابر در مدار GEO قرار دارند، می‌توانند تمام سیاره، به‌جز نواحی قطبی را زیر نظر بگیرند.

آرتور سی. کلارک، نویسنده‌ی داستان‌های علمی - تخیلی، نخستین بار در سال ۱۹۴۵ از مدار زمین ثابت برای ماهواره‌های مخابراتی سخن گفت.

به مدد ماهواره‌های مخابراتی، برقراری تماس‌های تلفنی بین هواپیما و زمین امکان‌پذیر شده است.



علم رادیویی در طی سفر در فضا، به سبب پراکندگی و دریافت ماهواره‌ای بخشی از جبهه‌ی موج ارسال شده، قدرت خود را از دست می‌دهند.

رد پای ماهواره

درست مثل نور چراغ قوه، که به شکل‌ها و زوایای متفاوتی می‌تابد، امواج رادیویی نیز، که از ماهواره‌ای ارسال می‌شوند، طبق الگویی خاص روی زمین می‌افتند. این الگو را رد پای ماهواره می‌نامند. آنتن‌هایی که درون این رد پا یا منطقه‌ی زیر پوشش باشند، علائمی را به ماهواره ارسال یا از آن دریافت می‌کنند.

آنتن‌ها علم را ارسال و دریافت می‌کنند. آن‌ها، صرف نظر از این‌که ایستگاه زمینی روی خشکی، در دریا یا در هوا باشد، برای هر ایستگاه بخشی ضروری به‌شمار می‌آیند.

ممکن است رد پای ماهواره، تمام یک قاره یا فقط یک کشور را پوشش دهد.

حلقه‌ی ارتباطات

آنتن‌های روی زمین و سوار بر ماهواره‌ها، امواج رادیویی حامل تماس‌های تلفنی، امواج رادیویی رادیو - تلویزیون یا داده‌ها را ارسال و دریافت می‌کنند. برای مثال، یک تماس تلفنی از ایران به اروپا از شبکه‌ی تلفن عمومی به یک ایستگاه زمینی نزدیک می‌رود و از آن‌جا به صورت امواج رادیویی به ماهواره‌ای در مدار زمین ثابت (GEO) ارسال می‌شود. سپس این ماهواره امواج رادیویی را تقویت و به آنتنی در اروپا ارسال می‌کند و علائم از آن‌جا وارد شبکه‌ی تلفن عمومی اروپا می‌شود و به مقصد می‌رسد. تمام این مراحل معمولاً در کسری از ثانیه انجام می‌شود.

ایستگاه‌های زمینی

آنتن‌ها و دیگر تجهیزات را که روی زمین برای ارسال و دریافت امواج به ماهواره و از آن لازم است، ایستگاه زمینی می‌نامند. ممکن است ایستگاه‌های زمینی در ساختمان‌های بزرگ جاسازی شوند. آنتن‌های آن‌ها مانند دروازه‌هایی عمل می‌کنند که مثلاً هزاران تماس تلفنی از آن‌ها به سوی ماهواره ارسال یا از آن دریافت می‌شود. در عین حال، امکان دارد ایستگاه‌های زمینی واحدهای کوچکی باشند که روی کشتی یا داخل هواپیما سوار شوند.




آنتن‌های ماهواره

نخستین آنتن‌ها علامت را در همه‌ی جهات پخش می‌کردند و قدرت محدود ماهواره را به هدر می‌دادند. امروزه، آن‌ها بسیار ظریف‌تر و پیچیده‌تر شده‌اند و پرتوهای باریک بسیار قدرت‌مندی را به ناحیه‌ای خاص از زمین ارسال می‌کنند. این آنتن‌ها معمولاً بزرگ‌تر از آن‌اند که در دماغه‌ی موشک پرتاب‌گر جای بگیرند؛ به این سبب، آنتن در مدار باز می‌شود و به آرایش نهایی خود می‌رسد.

سال‌شمار تاریخ ارتباطات

• در سال ۱۹۵۴، نیروی دریایی ایالات متحده با استفاده از بازتاب علامت از سطح ماه، از واشنگتن به هاوایی پیغام فرستاد.



• در سال ۱۹۶۰، سازمان فضایی ناسا و شرکت مخابرات بل بلن آلومینیوم اندودشده‌ای به نام اگو را به فضا فرستادند که علامت را در سراسر آمریکای شمالی مخابره می‌کرد.

• نخستین ماهواره‌ی زمین‌ثابت دنیا برای مقاصد تجاری ماهواره‌ی سحرخیز (اینتل‌ست-۱) بود که در آوریل ۱۹۶۵ پرتاب شد.

توانایی در حال رشد


ماهواره	نخستین پرتاب	قابلیت انتقال	دور صدا
سحرخیز	۱۹۶۵	۱	یا ۲۴۰
اینتل‌ست ۳	۱۹۶۸	۴	یا ۱۵۰۰
اینتل‌ست ۵	۱۹۸۰	۲	۱۲۰۰۰
اینتل‌ست ۸	۱۹۹۷	۳	۲۲۵۰۰

شبکه‌ی ماهواره‌ها

در اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰، ناوگان‌هایی از ماهواره‌ها، مانند گلوبال استار و ایریدیوم، به مدارهای نزدیک زمین (LEO) ارسال شدند. این ماهواره‌ها، در مقایسه با ماهواره‌های مدار GEO بسیار به زمین نزدیک‌ترند. به این سبب، برای ارسال پیام به تجهیزات کوچک‌تر و ارزان‌تری نیاز دارند. ماهواره‌های مخابراتی در مدار LEO برای کاربردهایی نظیر منتقل کردن علامت تلفن‌های همراه از سامانه‌ای بر پایه‌ی ماهواره‌های GEO کم‌هزینه‌تر می‌شود. در شبکه‌ی ماهواره ایریدیوم بیش از ۶۰ ماهواره در مدارهای گوناگون با گردش به دور زمین تقریباً سراسر سیاره را پوشش می‌دهند و در آسمان هر ناظر زمینی، در هر لحظه دست کم یکی دو ماهواره ایریدیوم وجود دارد تا پیام را بگیرد و به ماهواره‌ی دیگری در شبکه انتقال دهد و به گیرنده‌ی مورد نظر در جای دیگری از زمین برساند.

ماهواره‌های اینتل‌ست بیش از سه دهه، سامانه‌های مخابراتی بین‌المللی فراهم آوردند.

آنتن علامت را بر ناحیه‌ای خاص روی زمین متمرکز می‌کند



ارتباطات به سمت پایین

بشقاب آنتن علامت را ارسال و دریافت می‌کند.

ارتباطات به سمت پایین

باز فرستنده درون ماهواره جاسازی شده است.

برای اتصال به بالا و اتصال به پایین از فرکانس‌های متفاوت استفاده می‌شود.

فرکانس

امواج رادیویی بخشی از طیف الکترومغناطیس‌اند. ماهواره‌های مخابراتی امواج رادیویی را در فرکانس یا بسامدهایی ارسال می‌کنند که از میان جو بگذرند و بخار آب آن‌ها را جذب نکند.

ارتباطات به سمت بالا

مجموعه ایریدیوم ۶۶ ماهواره دارد.

مجموعه گلوبال استار ۴۸ ماهواره دارد.

نیم دور حلقه‌ی ارتباطی دوطرفه‌ای بین یک ایستگاه زمینی و یک ماهواره است.

دایره‌های سفید ردیای ماهواره‌اند. خود ماهواره‌ها به رنگ سبز و مدارها به رنگ قرمز نمایش داده شده‌اند. ردیاب‌ها هم‌پوشانی دارند تا کل زمین را پوشش دهند.

ماهواره‌های ایریدیوم علامت را میان خود ردوبدل می‌کنند. این کار به به آن‌ها، در حکم سامانه‌ی ارتباطات سیار، انتعاطی‌پذیری بسیاری می‌دهد.



سلن همراه

تمام دور، حلقه‌ی ارتباطی دوطرفه‌ای بین ماهواره و دو ایستگاه زمینی است.

کانال ارتباط یک طرفه‌ای بین ماهواره و یک ایستگاه یا گیرنده‌ی زمینی است.



بیشتر بدانیم
تابش‌هایی از فضا ۲۶
اخترشناسی رادیویی ۳۰

کشتی‌ها با استفاده از ماهواره‌ها، به‌طور دائم با خشکی ارتباط دارند.



ماهواره‌های ناوبری

GPS چگونه کار می‌کند؟

سامانه‌ی GPS شامل ۲۴ ماهواره و تجهیزات روی زمین است. ماهواره‌ها مدار موقعت خود و زمان را مخابره می‌کنند. آن‌ها به گونه‌ای در مدار قرار گرفته‌اند که گیرنده‌ای در هر کجای زمین، در هر لحظه دست کم از چهار ماهواره‌ی این سامانه علائمی دریافت می‌کند. گیرنده‌ی GPS دقیقاً می‌داند علائم چه وقت ارسال و چه زمانی دریافت شده‌اند. در نتیجه، با توجه به سرعت مشخص نور، می‌تواند فاصله‌ی بین خود و هر یک از ماهواره‌ها را محاسبه کند. به این ترتیب، گیرنده با استفاده از این اطلاعات، موقعت دقیق خود و از جمله ارتفاع محل از سطح دریا را مشخص می‌کند.

طرحی هنری از مدارهای GPS


ماهواره‌ها به شش مدار دایره‌ای متفاوت پرتاب شدند تا پوشش جهانی درست کنند.

ماهواره‌های GPS

هر ماهواره‌ی GPS جرمی حدود ۸۴۴ کیلوگرم، معادل یک اتومبیل کوچک دارد. وقتی صفحه‌های خورشیدی کاملاً باز می‌شوند، پهنای ماهواره به ۵/۳ متر می‌رسد. هر ماهواره حامل ساعت‌های اتمی است که زمان را به دقت می‌سنجند. این ماهواره‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که ۷/۵ سال دوام می‌آورند و مدارشان در ارتفاع ۲۰۲۰۰ کیلومتری است.

ماهواره‌ی گلوناس


مونورهای تنظیم جهت، ماهواره را درست به سوی زمین نگاه می‌دارند.



گلوناس و گالیله

سامانه‌ی مدارهای ماهواره‌ی جهت‌یابی جهانی (GLONASS) متعلق به روسیه است. کاربران گلوناس می‌توانند موقعت خود را با دقت بین ۲۰ تا ۱۰۰ متر بسنجند. اگر لازم باشد، با استفاده از روش‌های خاصی می‌توان به دقت‌های بیش‌تری رسید. ماهواره‌های گلوناس پوشش جهانی دارند. سازمان فضایی اروپا پوشش اروپا را با ساختن تجهیزاتی که برای دریافت علائم از گلوناس و GPS با هم طراحی شده‌اند، افزایش می‌دهد. اما هدف اصلی اروپاییان تکمیل طرح بزرگ سامانه‌ی موقعت‌سنجی گالیله، شامل ۳۰ ماهواره در مدار ۲۳۲۲۲ کیلومتری است. هر یک از این ماهواره‌ها ۷۵ کیلوگرم وزن و ۱۲ سال طول عمر دارند. تکمیل این سامانه دست کم تا سال ۲۰۱۲ میلادی طول می‌کشد. دقت مکان‌سنجی این سامانه به کمتر از یک متر نیز می‌رسد.

برای این‌که وسیله‌ای مسیر دقیقی را میان دو مکان طی کند، ابتدا باید موقعت دقیق و درست خود را بداند. هزاران سال دریانوردان موقعت خود را به کمک ماه، ستاره‌ها و خورشید محاسبه می‌کردند. البته وقتی آسمان از ابر پوشیده می‌شد، گم کردن راه هم کار ساده‌ای بود! اما در روزگار ما، سامانه‌ی جهت‌یابی ماهواره‌ای این مشکل را حل کرده است. ماهواره‌ها امواج رادیویی‌ای به زمین ارسال می‌کنند که حتی در هنگام ابری بودن هوا نیز روی زمین آشکار می‌شوند. در نتیجه، امروزه جهت‌یابی در هر آب و هوایی امکان‌پذیر است. در اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰، سامانه‌ی جهانی موقعت‌سنجی (GPS)، که در ایالات متحده شکل گرفته بود، دقیق‌ترین و اعتمادپذیرترین سامانه‌ی جهت‌یابی در دنیا شد. اکنون سامانه‌ی گلوناس روسیه نیز فعالیت می‌کند و در سال‌های آینده، سامانه‌ی گالیله متعلق به اتحادیه‌ی اروپا نیز به سامانه‌های موقعت‌سنجی جهانی افزوده می‌شود.



هدایت‌گر زمینی GPS


نیروی هوایی ایالات متحده سرعت، موقعت و ارتفاع ماهواره‌های GPS را زیر نظر دارد. ایستگاه‌های ردیابی، این اطلاعات را به مرکز هدایت اصلی می‌فرستند. این مرکز، با استفاده از این داده‌ها، موقعت ماهواره را در مدار برای ۱۲ ساعت بعدی پیش‌بینی می‌کند. آنتن‌های زمینی این موقعت‌ها را به ماهواره‌ها مخابره می‌کنند تا به زمین ارسال شوند. داده‌های ردیابی به مرکز هدایت امکان می‌دهد دائماً پیش‌بینی موقعت‌های ماهواره را به‌روز کند.

ممکن است گیرنده‌های GPS به کوچکی یک تلفن همراه باشند.

گیرنده‌های GPS

نخستین گیرنده‌ها موقعت کاربر را به صورت عرض و طول جغرافیایی نمایش می‌دادند که باید روی نقشه پیاده می‌شد. اما مدل‌های جدید نقشه‌ای را نشان می‌دهند و موقعت کاربر را با تفاوت چند متر، روی آن مشخص می‌کنند. این گیرنده‌ها، علاوه بر موقعت، سرعت و جهت حرکت کاربر را (اگر متحرک باشد) محاسبه می‌کنند.





ساعت اتمی سزیم


ساعت‌های اتمی

ساعت‌های اتمی حساب زمان را با دقت بسیار دارند. ساعت‌های سزیم در هر چند میلیون سال، فقط یک ثانیه خطا دارند. ساعت‌های اتمی کوچک‌تر سوار بر ماهواره‌های GPS و گلوئاس، زمان را با خطای کم‌تر از یک ثانیه در هر ۳۰۰ هزار سال می‌سنجند و علائم زمانی بسیار دقیقی به زمین ارسال می‌دارند.

داده‌های سامانه‌ی جهت‌یابی یا ناوبری		
GPS	گلوئاس	
۲۴	۲۴	تعداد ماهواره
۶	۳	تعداد مدار
۲۰۲۰۰ کیلومتر	۱۹۰۰۰ کیلومتر	ارتفاع
مارس ۱۹۹۴	ژانویه ۱۹۹۶	زمان تکمیل سامانه

در هر مدار GPS چهار ماهواره وجود دارد.

سال‌شمار فنّ جهت‌یابی



موشک زیردریایی پولاریس

• نخستین سامانه‌ی ناوبری یا جهت‌یابی ماهواره‌ای ترانزیت نام داشت. ایالات متحده در ژانویه سال ۱۹۶۴ این ماهواره را پرتاب کرد تا موقعیت‌سنجی زیردریایی‌های اتمی پولاریس را بهبود ببخشد.

• در ژوئیه سال ۱۹۶۷، نیروی دریایی ایالات متحده استفاده از ماهواره‌ی ترانزیت را عمومی کرد.

• در اکتبر سال ۱۹۷۸، نیروی هوایی ایالات متحده نخستین ماهواره‌ی سامانه‌ی GPS را به مدار فرستاد.

• در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، ماهواره‌های GPS و گلوئاس بیش‌تری پرتاب شدند و به این ترتیب، تعداد مکان‌هایی که علائم در آن‌ها در هر دقیقه از روز دریافت می‌شوند، افزایش یافت.

• در اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰، سازمان فضایی اروپا تجهیزاتی را آزمایش کرد که علائم GPS و گلوئاس را با هم دریافت می‌کرد.

بیش‌تر بدانیم

پرتابگرهای فضایی ۴۸
شمارش معکوس ۵۲
ماهواره‌ها و مدارها ۵۴
ماهواره‌های نظامی ۶۶
پس‌مانده‌های فضایی ۶۸

نقشه‌ی راه‌یابی داخل اتومبیل



جهت‌یابی در اتومبیل‌ها


سازندگان اتومبیل از فرانسه تا ژاپن، بر خودروهای خود گیرنده‌های GPS نصب می‌کنند تا به مسیر یابی کمک کنند. تاکنون چند میلیون خودرو به این سامانه مجهز شده‌اند. برخی خودروهای امدادی نیز از علائم GPS برای مشخص کردن موقعیت خود استفاده می‌کنند. با اتصال گیرنده‌ی GPS به یک رایانه، پیرایشکان، پلیس‌ها و مأموران آتش‌نشانی می‌توانند به سرعت، سریع‌ترین راه را برای رسیدن به محل حادثه پیدا کنند.

هواپیمای بذریاش



جهت‌یابی در هوا

تا اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰، خلبانان هواپیماهای سم‌پاش یا بذریاش در صحرای آفریقا، برای هدایت هواپیما فقط یک نقشه و یک قطب‌نما در اختیار داشتند. اما از آن‌جا که صحرای آفریقا عوارض مشخص بسیار کمی دارد، جهت‌یابی مشکل بود. در سال ۱۹۹۱، گیرنده‌های کوچک GPS در دسترس قرار گرفت و خلبانان این هواپیماها توانستند موقعیت دقیق خود را با دقت ۳۰ متر مشخص کنند.



ماهواره‌های هواشناسی




مرکز تندباد

طی فصل توفان‌های استوایی، بین اردیبهشت تا آبان، مرکز ملی تندبادشناسی ایالات متحده در میامی ۲۴ ساعته داده‌های همه‌ی ماهواره‌ها را زیر نظر دارد. با شکل‌گیری و رشد توفان‌ها، ماهواره‌ها مسیر آن‌ها را در سراسر اقیانوس دنبال می‌کنند. این مرکز هشدارهای مربوط به توفان‌ها و تندبادها را در سراسر سواحل ایالات متحده، دریای کارائیب و خلیج مکزیک ارسال می‌دارد.

کره‌ی زمین زیر نظر ماهواره‌ها


ماهواره‌های زمین‌تابث هر ۳۰ دقیقه نواحی زیر پای خود را به دقت از نظر می‌گذرانند. اگر یک توفان استوایی شکل بگیرد، آن‌ها آن ناحیه را هر ۱۵ دقیقه با جزئیات بیش‌تری بررسی می‌کنند. این ماهواره‌ها دما را نیز اندازه می‌گیرند که به پیش‌بینی‌کننده‌ها در پیش‌بینی قدرت تندباد کمک می‌کند.



تندباد فران در سال ۱۹۹۶

پرواز در دل تندباد

وقتی توفان استوایی به تندباد تبدیل و به خشکی نزدیک شود، نیروی هوایی ایالات متحده، اسکادران هواشناسی یا شکارچیان تندباد خود را به پرواز درمی‌آورد. آن‌ها به درون توفان هجوم می‌برند و اندازه‌گیری‌های خود را به داده‌های رادارهای ساحلی و ماهواره‌ها می‌افزایند.



تندباد الن در سال ۱۹۸۰

چشم تندباد

تندباد فلورانس در سال ۱۹۹۴

ایجاد و حرکت سامانه‌های آب و هوا در سراسر کره‌ی زمین را می‌توان با ماهواره‌های هواشناسی زیر نظر گرفت. آن‌ها همان تصاویری را ضبط می‌کنند که در برنامه‌ی هواشناسی از تلویزیون پخش می‌شود و پوشش ابرها و رشد و حرکت توفان‌ها را در سرزمین ما، جهان و سراسر اقیانوس‌ها نمایش می‌دهند. ماهواره‌های هواشناسی ابزارهای داده‌خوانی را حمل می‌کنند که داده‌هایشان به اعداد نشان‌دهنده‌ی دما، فشار و رطوبت لازم برای پیش‌بینی‌های هواشناسی تبدیل می‌شوند. این داده‌ها، همراه با اطلاعاتی از منابعی مانند بویه‌های (سنجش‌گرهای شناور هواشناسی در دریاها و اقیانوس‌ها) هواشناسی، بالن‌ها و کشتی‌ها به پیش‌بینی‌کنندگان کمک می‌کنند پیش‌بینی‌های خود را بهبود بخشند.

پیش‌بینی تندبادها

پیش از ماهواره‌های هواشناسی، تندبادها، بدون این‌که دیده شوند، روی اقیانوس‌ها شکل می‌گرفتند و با هشدار اندکی، با خشکی برخورد و همه را غافل‌گیر می‌کردند. در سال ۱۹۰۶ میلادی، تندباد عظیمی ۶ هزار نفر را در تگزاس کشت. تندبادها توفان‌های استوایی بسیار شدیدی همراه با بادهایی با سرعت بیش از ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت‌اند که به شکل مجموعه ابر عظیم گرداب‌مانندی، در جو شکل می‌گیرند. در توفان‌های استوایی، بادهای به‌گِرد بخش چشم‌مانند آرامی از هوای کم‌فشار می‌گردند. امروزه، ماهواره‌های هواشناسی، به‌طور دائم اقیانوس‌ها، جایی را که چنین توفان‌هایی قدرت می‌گیرند، زیر نظر دارند. به این دلیل، مردم نباید به سبب نبود هشدارهای کافی، جان خود را از دست بدهند. چنین تهدیدهای طبیعی در سواحل جنوب شرقی ایران نیز وجود دارد؛ جایی که تندبادهایی از سواحل هند به دریای عمان و سواحل ایران می‌رسند.





ماهواره‌های متبوست، داده‌های هواشناسی را بر فراز اروپا و آفریقا جمع‌آوری می‌کنند و آن‌ها را به مراکز محاسبات و پیش‌بینی‌های رایانه‌ای در سراسر اروپا می‌فرستند.

ابزارهای متبوست هم تصاویر و هم دما را در جو ثبت می‌کنند.

ماهواره‌ها و رایانه‌ها

رایانه ابزار ضروری برای دانشمندان است تا به کمک آن، اندازه‌گیری‌های ماهواره را به دما، فشار، رطوبت و سرعت باد، که برای گزارش هواشناسی لازم است، تبدیل کنند. رایانه‌ها داده‌هایی از رادارها، کشتی‌ها، بویه‌های هواشناسی، هواپیماها و ماهواره‌ها را ترکیب می‌کنند تا پیش‌بینی‌های دقیق و به‌هنگامی ارائه دهند.


ماهواره GOES



ماهواره‌های GOES در مدارهای زمین‌ثابت قرار گرفته‌اند تا ایالات متحده و یکی از دو اقیانوس اطلس یا آرام را زیر نظر داشته باشند.

ماهواره‌ها در مدار زمین‌ثابت، ۳۶ هزار کیلومتر بالاتر از زمین، می‌مانند به‌طور مرتب، ناحیه‌ی وسیعی را زیر نظر داشته باشند.

مقیاس برای وضوح پیش‌تر تصویر اعراق شده است.




ماهواره‌ای در مدار قطبی، ۹۰۰ کیلومتر بالاتر از زمین، در مقایسه با ماهواره‌ای در مدار زمین‌ثابت، جزئیات بیشتری را می‌بیند.

مدارهای هواشناسی


ماهواره‌های هواشناسی در مدارهای زمین‌ثابت و قطبی قرار دارند. ماهواره‌های زمین‌ثابت، مانند GEO، بر فراز یک نقطه از استوا ثابت می‌مانند و به‌طور مرتب، تغییرات را ثبت می‌کنند. هر یک از آن‌ها یک سوم کره‌ی زمین را می‌بینند؛ اما دیدشان از نواحی شمالی محدود است. ماهواره‌های مدار قطبی، مانند NOAA ۱۰، در برابر زمین زیر پایشان متحرک‌اند و نمای ثابتی از یک ناحیه ندارند. اما از فراز قطب‌ها می‌گذرند و این مناطق را زیر نظر دارند. به‌علاوه؛ به سبب قرارگرفتن در مداری پایین‌تر، دیدشان در مقایسه با مدار زمین‌ثابت، جزئیات بیشتری دارد.

ماهواره NOAA ۱۰



ماهواره‌ی NOAA ۱۰ در هر ۱۰۰ دقیقه، یک بار دور زمین می‌گردد. با توجه به چرخش زمین، این ماهواره تقریباً در هر ۱۲ ساعت دوبار از فراز هر منطقه می‌گذرد.

تنبه‌ی که به ژاپن نزدیک می‌شود. ژاپن



پیش‌بینی زمان و مکان ورود به خشکی

پیش‌بینی مسیر یک تندباد بسیار مشکل است؛ اما در طی ۲۰ سال گذشته، هر سال ماهواره‌ها بین ۰/۵ تا ۱ درصد به دقت پیش‌بینی‌ها افزوده‌اند. امروزه می‌توانیم مکانی را که تندبادی به خشکی می‌رسد، با خطای کمتر از صد کیلومتر پیش‌بینی کنیم.

سال‌شمار علم هواشناسی

• ماهواره‌ی آمریکایی، که در سال ۱۹۵۹ پرتاب شده بود، یک آزمایش هواشناسی در فضا انجام داد. این ماهواره به اندازه‌گیری تابش دریافتی زمین از خورشید و بازتابش آن به فضا پرداخت. تعادل تابشی زمین مهم است؛ زیرا بر آب و هوای جهان تاثیر می‌گذارد.

• ماهواره‌ی تیروس ایالات متحده، نخستین ماهواره‌ی هواشناسی دنیا، در سال ۱۹۶۰ پرتاب شد. این ماهواره ۲۳ هزار تصویر از ابرها از مداری ۷۵۰ کیلومتری تهیه کرد که شامل نخستین تصاویر از حرکت ابرها نیز بود.

• اتحاد جماهیر شوروی سابق، ماهواره‌ی کاسموس ۱۲۲، نخستین ماهواره‌ی هواشناسی خود را در سال ۱۹۶۶ در مدار قرار داد.


• در آوریل ۱۹۷۰، ناسا ماهواره‌ی نیمبوس را پرتاب کرد که نخستین ابزارهای اندازه‌گیری دما در ارتفاعات گوناگون جو را حمل می‌کرد.

• ایالات متحده نخستین ماهواره‌ی هواشناسی زمین‌ثابت را در سال ۱۹۷۴ پرتاب کرد.

• نخستین ماهواره‌ی هواشناسی اروپا، متبوست، در سال ۱۹۷۷ به مدار زمین‌ثابت رفت. این ماهواره، به کمک همراهان ژاپنی و آمریکایی خود، نخستین نمای کلی آب و هوای زمین را از مدار زمین‌ثابت تهیه کرد.

ال‌نینو

در جریان پدیده‌ی ال‌نینو، آب گرم با آب معمولاً سرد آب‌های آمریکای جنوبی، جابه‌جا می‌شود و به نوعی بر آب و هوا در سراسر دنیا تأثیر می‌گذارد. در این تصاویر ماهواره‌ای، جریان‌های گرم به شکل نواحی قرمز / سفید و در حال حرکت به سوی شرق در نزدیکی استوا نشان داده شده است. نواحی سیاه، خشکی هستند و دیگر رنگ‌ها نشان‌دهنده‌ی آب خنک‌ترند که جریان گرم را احاطه کرده است. دانشمندان امیدوارند که با تحلیل چنین تصاویری، به ارتباط میان پدیده‌ی ال‌نینو و تغییرات آب و هوا در جهان پی ببرند.



ال‌نینوی که در سال ۱۹۹۷ شکل گرفت.

بیش‌تر بدانیم


- پرتاب‌گرهای فضایی ۴۸
- شمارش معکوس ۵۲
- ماهواره‌ها و مدارها ۵۴
- ماهواره‌های منابع زمینی ۶۴
- پس‌مانده‌های فضایی ۶۸

ماهواره‌های منابع زمینی

نظارت بر اقیانوس‌ها

اقیانوس‌ها بیش از دو سوم کره‌ی زمین را پوشانده‌اند. پس، برای درک زمین و آب و هوای آن، مهم است که بدانیم درون و بر سطح اقیانوس‌ها چه می‌گذرد؛ برای مثال، جریان‌ها کجا هستند و سطح دما و باد چه قدر است. هواپیماها و کشتی‌ها نمی‌توانند بر همه‌ی مناطق آبی زمین نظارت دائم داشته باشند؛ اما ماهواره‌ها می‌توانند این کار را انجام دهند. یکی از نخستین ماهواره‌هایی که برای نظارت بر اقیانوس‌ها طراحی شد ERS-۱ بود.

ماهواره‌ی ERS-۱ ابزارهایی برای اندازه‌گیری تابش فروسرخ و ریزموج حمل می‌کند. این طول موج‌ها باندهایی اند که بیش‌ترین اطلاعات را درباره‌ی وضعیت اقیانوس‌ها و جو به ما می‌دهند.



ارتفاع‌سنج راداری سوار بر ERS-۱، ارتفاع امواج و شکل سطحی اقیانوس را ثبت می‌کند و به این ترتیب، سرعت بادهای محاسبه می‌شود.

ERS-۱

ماهواره‌هایی را که به دانشمندان در بررسی سطح زمین کمک می‌کنند، ماهواره‌های منابع زمینی می‌نامند. این ماهواره‌های سنجنش از دور، تغییرات زیست‌محیطی بزرگ، خراب شدن محصولات کشاورزی یا ذوب شدن کلاهک‌های یخی قطب را نشان می‌دهند. به‌علاوه، محل منابعی مانند فلزات و زغال‌سنگ را نیز مشخص می‌کنند. ابزارهای این ماهواره‌ها، نور یا دیگر تابش‌هایی را که از عوارض سطحی زمین بازتاب یا تابش می‌شوند، تحلیل می‌کنند. هر عارضه‌ی سطحی، مثلاً یک جنگل یا یک ساختمان، در بازتاب یا تابش امواج، مشخصه‌ی متفاوتی دارد. ماهواره‌ها به‌طور مرتب از فراز همه‌ی کره‌ی زمین می‌گذرند و نقشه‌هایی برای دانشمندان تهیه می‌کنند که می‌توان به کمک آن‌ها، ردپای تغییرات خاصی مانند نابودی جنگل‌ها، فعالیت‌های آتش‌فشانی و حتی تغییر پراکندگی مرجان‌های بستر دریا را در نواحی گوناگون در طول زمان دنبال کرد.

نقشه‌برداری موضوعی

انواع تابش‌ها، طول موج‌های متفاوتی دارند. مثلاً طول موج نور آبی از نور قرمز کوتاه‌تر است. نقشه‌برداری موضوعی ابزاری سوار بر ماهواره‌ی لندست است که شدت تابش را در هفت باند طول موج متفاوت،

شامل ۴ باند در بخش فروسرخ طیف الکترومغناطیس، اندازه

می‌گیرد دانشمندان با


سبب دادر رنگ‌های

متفاوت به هر باند،

می‌توانند نقشه‌ای از یک

ناحیه‌ی خاص بسازند.

نقشه‌برداری موضوعی



ماهواره‌ی لندست ۴

ابزار فروسرخ، که زیر ماهواره به سوی زمین نشانه رفته است، دمای سطح دریاها و ابرها را اندازه می‌گیرد.

نقشه‌برداری چه چیزی را آشکار می‌کند؟


هر یک از باندهای طول موج نقشه‌برداری موضوعی، چیز متفاوتی را درباره‌ی زمین آشکار می‌کند. مثلاً باند ۵ در محدوده‌ی طول موج فروسرخ آشکارسازی می‌کند که نشان‌دهنده‌ی حضور رطوبت در گیاهان است. اگر شدت این باند کم باشد، احتمالاً گیاهان، حتی اگر همچنان سبزرنگ به نظر برسند، در خطر نابودی قرار دارند.

ماهواره‌ی تحقیقاتی اقیانوس‌نگاری تاپکس - پوسایدون

ماهواره‌ی تاپکس - پوسایدون
به دانشمندان کمک کرد جزئیات
چگونگی تغییرات جریان‌ها و
جزرومد را بررسی کنند.

تحقیقات اقیانوس‌شناسی

یکی از اندازه‌گیری‌های پایه در تحقیقات اقیانوس‌شناسی و آب و هوا، ارتفاع سطح آب اقیانوس است که به دانشمندان اطلاعاتی درباره‌ی جریان‌ها و جزرومد می‌دهد. ماهواره‌ی تاپکس - پوسایدون، از مدار ۱۳۳۰ کیلومتری خود، اندازه‌گیری‌هایی با دقت $\frac{4}{3}$ سانتی‌متر انجام داده است. این ماهواره در عرض یک ماه، بیش از همدی کشتی‌های تحقیقاتی در صد سال گذشته، اطلاعات جمع‌آوری کرده است.



این رادار با دو نوع آتش کار می‌کند که
تصویری در محدوده‌ی ریزموج طیف از
اقیانوس و نواحی ساحلی تهیه می‌کند
و به این ترتیب، ناآرامی (و بادهای)
اقیانوس را نشان می‌دهد.



آنتن‌ها ناآرامی اقیانوس
را به تصویر می‌کشند.

آنتن‌ها داده‌هایی برای تصویر
ریز موج از اقیانوس و نواحی
ساحلی جمع‌آوری می‌کنند.

تخریب جنگل

تصویری از ماهواره‌ی لندست جنگل‌های
ساحل عاج در آفریقا را نشان می‌دهد.
رنگ‌ها نشان‌دهنده‌ی انواع متفاوت سطح‌ها
هستند: قرمز جنگل، آبی روشن خاک و
قهوه‌ای، محصولات کشاورزی است. در
تصاویر بعدی، که طی ماه‌ها یا سال‌های بعد
گرفته شدند، نواحی قرمز، به سبب قطع
درختان، کاهش یافته بود.


رسوب مواد معدنی در شبلی



داده‌های نقشه‌بردار موضوعی

باند	طول موج به نانومتر	کاربردها
۱	۴۵۰ - ۵۲۰ (آبی / سبز)	نقشه‌برداری از آب‌های ساحلی و تفکیک خاک از گیاهان
۲	۵۲۰ - ۶۰۰ (سبز / زرد)	نمایان ساختن گیاهان سالم
۳	۶۳۰ - ۶۹۰ (قرمز)	کمک به شناسایی گیاهان
۴	۷۶۰ - ۹۰۰ (فروسرخ)	نمایان کردن زهکشی و مرز آب‌ها
۵	۱۵۵۰ - ۱۷۵۰ (فروسرخ)	اندازه‌گیری رطوبت گیاهان
۶	۱۰۴۰۰ - ۱۲۵۰۰ (فروسرخ)	اندازه‌گیری تابش حرارتی گیاهان
۷	۲۳۵۰ - ۲۴۸۰ (فروسرخ)	نقشه‌برداری از منابع آب گرم

سال‌شمار شناسایی منابع




آنتن برای ارسال
داده‌ها به زمین و
ذکر آنتن.

لندست ۱

تفکیک طیفی

نقشه‌بردار طیفی چندمنظوره (MSS) سوار بر
لندست یک، نخستین ابزار ماهواره‌ای بود
که شدت تابش یک منطقه را هم‌زمان در
باند‌های طول موج‌های متفاوت (قرمز، سبز و
دو ناحیه‌ی فروسرخ) اندازه گرفت. این ابزار
نیز، مانند نقشه‌بردار موضوعی، برای کسب
اطلاعات درباره‌ی وجوه متفاوت سطح زمین،
از گستره‌ای از طول موج‌ها بهره می‌برد.



تصویر ماهواره‌ای از ساحل عاج

رنگ‌های کاذب

انسان نمی‌تواند تابش فروسرخ را ببیند. در
نتیجه، وقتی دانشمندان نقشه‌های فروسرخ تهیه
می‌کنند، به هر باند طول موج فروسرخ، رنگی
برای شناسایی نسبت می‌دهند. چنین نقشه‌هایی
را تصاویر رنگ کاذب می‌نامند. در این تصویر،
رنگ کاذب، خاک آتش‌فشانی، قهوه‌ای، گیاهان
قرمز و آب آبی تیره نشان داده شده‌اند. رنگ
سفید نیز نشان‌دهنده‌ی حضور رسوب مواد
معدنی است.

• در سال ۱۹۷۲، ایالات متحده
ماهواره‌ی لندست یک را پرتاب کرد.
این ماهواره نخستین تصویر ترکیبی نور
مرئی و فروسرخ را از سطح زمین گرفت.

• در سال ۱۹۷۸، ماهواره‌ی آمریکایی
سیست نخستین اندازه‌گیری‌های
ارزش‌مند را به کمک رادار از
اقیانوس‌ها انجام داد.

• در سال ۱۹۸۶، فرانسه ماهواره‌ی
SPOT-۱ را پرتاب کرد. این نخستین
ماهواره‌ی منابع زمینی بود که در آن،
برای آشکارسازی تابش‌ها، از تراش‌های
کوچک سیلیکونی یا نوعی CCD استفاده
شده بود.

• در سپتامبر سال ۱۹۹۲، ماهواره
تاپکس - پوسایدون به جمع‌آوری
داده‌هایی با جزئیات بی‌نظیر از
اقیانوس‌ها پرداخت.

• اکنون ده‌ها ماهواره در حال
برنامه‌ریزی شدن هستند. بسیاری از
آنها ابزارهایی حمل می‌کنند که ۳۲ تا
۲۵۶ باند طول موج متفاوت را شناسایی
خواهند کرد.

پیش‌تر بدانیم

تابش‌هایی از فضا ۲۶
اخترشناسی فروسرخ ۲۸
ماهواره‌ها و مدارها ۵۴
زمین ۱۰۲
سطح زمین ۱۰۴

ماهواره‌های نظامی

جهت‌یابی نظامی

سامانه‌ی موقعیت‌یابی جهانی (GPS)، که امروزه در سراسر جهان کاربران عمومی بسیاری دارد، در اصل برای ارتش ایالات متحده ساخته شده بود. افراد می‌توانند با استفاده از وسیله‌ای دستی، که علائمی از چهار ماهواره‌ی GPS دریافت می‌کند، موقعیت خود، ارتفاع، طول و عرض جغرافیایی را با دقت چند متر بسنجند. در جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱، سامانه‌ی GPS به نیروهای متفق کمک کرد راهشان را در وسعت بی‌کران و خالی صحرای عربستان بیابند.

مسئله‌های خورشیدی نیروی لازم را برای ارسال علائم جهت‌یابی تأمین می‌کنند.

ماهواره GPS

تلسکوپ با تمپیک بالا

ماهواره‌ی هلیوس - ۱

از آتن‌ها و حس‌گرها، برای اهداف خاص نظامی، مانند شناسایی انفجارهای هسته‌ای، استفاده می‌شود.

ماهواره‌های جاسوسی

بسیاری از کشورها، ماهواره‌های جاسوسی پیش‌رفته‌ای دارند که ماهواره‌ی فرانسوی هلیوس، نمونه‌ای بارز است: این ماهواره از مداری نزدیک زمین، جسمی به کوچکی یک دوچرخه را تشخیص می‌دهد. برخی تلسکوپ‌ها و آشکارسازهای ماهواره‌ای جاسوسی، توان تفکیک اندازه‌های سانتی‌متری را نیز در وضعیت نوری و زاویه‌ی مناسب دارند. درباره‌ی ماهواره‌هایی که حامل ابزارهای جاسوسی‌اند، مطالب زیادی نمی‌دانیم؛ زیرا بیش‌تر اطلاعات درباره‌ی آن‌ها کاملاً محرمانه است و تعجبی هم ندارد!

جست‌وجو و نجات

در ژوئن سال ۱۹۹۵، نیروهای صرب، هواپیمای اسکات آگریدی، کاپیتان نیروی هوایی ایالات متحده را بر فراز بوسنی سرنگون کردند. آگریدی، با استفاده از گیرنده‌ی GPS خود، موقعیتش را روی زمین تشخیص داد و مختصات را به هواپیماهای F۱۶ بالای سرش مخابره کرد. تکاوران نیروی دریایی هم او را نجات دادند.

کاپیتان آگریدی

موشک بین قاره‌ای بالستیک

بسیاری از نخستین ماهواره‌هایی که ایالات متحده و روسیه می‌ساختند، برای خدمات نظامی بود. ماهواره‌های نظامی امروزه نیز استفاده‌ی گسترده‌ای دارند. این ماهواره‌ها، از مدارهای امن، اطلاعاتی درباره‌ی میدان‌های جنگ به‌دست می‌دهند، تصاویری با جزئیات بسیار می‌گیرند که حتی مکان ایستادن یک فرد را هم نشان می‌دهد، سربازان گمشده را پیدا می‌کنند و ارتباطات مخفی را امکان‌پذیر می‌سازند. برخی ماهواره‌ها همه‌ی کره‌ی زمین را زیر نظر دارند و مترصد علائم پرتاب یک موشک هسته‌ای یا یک انفجار هسته‌ای هستند.

ماهواره‌ها و دفاع

از دهه‌ی ۱۹۷۰، ایالات متحده ماهواره‌های برنامه‌ی پشتیبانی دفاعی (DSP) را به مدارهای زمین‌ثابت فرستاد. هر ماهواره بخش‌های وسیعی از سطح زمین را به تصویر می‌کشد. آن‌ها حامل حس‌گرهای شناسایی پرتاب موشک‌های بالستیک هستند و در نخستین ثانیه‌های روشن شدن یک موشک، هشدار به زمین ارسال می‌دارند. این ماهواره‌ها و ماهواره‌های مشابهی که روسیه پرتاب می‌کند، امتیاز حمله‌ی ناگهانی کشور متخاصم را کاهش داده است.

ماهواره DSP

ارتباطات بین ماهواره‌های تک در ناوگان DSP به کمک لیزر انجام می‌شود.

حس‌گرهای فروسرخ، حرارت اگزوز موشکی را که پرتاب می‌شود، آشکار می‌کنند.

ماهواره‌های DSP، با شناسایی سریع پرتاب موشک‌های بالستیک، زمان کافی برای حملات تلافی‌جویانه در جریان یک نبرد را در اختیار قرار می‌دهند.




پرونده SBIRS

- ماهواره‌های SBIRS موشک‌ها را شناسایی و ردیابی می‌کنند. به علاوه، موشک‌های دفاعی را، که باید هدف حمله‌کننده را نابود کنند، به راه می‌اندازند.
- وزارت دفاع ایالات متحده نخستین ماهواره‌های SBIRS را به مدار زمین ثابت و مدار بسیار بیضوی فرستاد. این مدارها با هم تمام کره‌ی زمین را پوشش می‌دهند.
- ماهواره‌های SBIRS در مدارهای نزدیک زمین با ماهواره‌هایی در مدارهای بالاتر کار می‌کنند تا کار هشدار موشک‌ها را بهتر انجام دهند و بر میدان‌های جنگ نظارت دقیق‌تری داشته باشند.
- حسگرهایی که قادرند سه باند فرکانسی داخل تابش‌های فروسرخ و مرئی را شناسایی کنند، موشکی را در تمام مراحل پرواز ردیابی می‌کنند.

ماهواره‌های SBIRS

اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰، دولت ایالات متحده برنامه‌ی ۱۰ ساله‌ای را برای جای‌گزینی ماهواره‌های DSP با ناوگانی در ماهواره‌ها به نام سامانه‌ی فروسرخ فضایی (SBIRS) آغاز کرد. ماهواره‌های SBIRS نیز، مانند ماهواره‌های DSP، آشکارسازهایی برای شناسایی پرتاب موشک‌ها حمل می‌کنند. این سری ماهواره‌ها، پس از تکمیل، کار شناسایی را هم انجام می‌دهند. پرتاب ماهواره‌های این سامانه به مدار زمین آغاز و از سال ۲۰۰۷ مرحله‌ی اول آن فعال شده است. احتمال می‌رود از سال ۲۰۱۲ نیز همه‌ی آن فعال شود.




طرح هنری از آرایش ماهواره‌های SBIRS، آن طور که در سه مدار متفاوت کار می‌کنند.

ماهواره‌های ارتباطات نظامی، مانند ماهواره‌ی اسکای نت - ۴، به انگلستان، سامانه‌ی ارتباطی ایمنی برای نیروهای ارتش مهیا می‌کنند.

آنتن برای مخابره‌ی امواج در فرکانس‌های نظامی طراحی شده است. فرکانس‌ها و آنتن‌های نظامی، با آن‌هایی که در ماهواره‌های ارتباطی غیرنظامی مورد استفاده قرار می‌گیرند، تفاوت دارند.


اسکای نت ۴

آنتن‌های دو سوی ماهواره، علامت جهت‌یابی را مخابره می‌کنند که در موارد نظامی و غیرنظامی از آن‌ها استفاده می‌شود.



انفجارهای هسته‌ای

بسیاری از کشورها با امضای معاهده‌های بین‌المللی، مانند پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، موافقت خود را با محدودیت گسترش و آزمایش سلاح‌های هسته‌ای اعلام کرده‌اند. حسگرهایی سوار بر انواع ماهواره به کنترل این موضوع که آیا هیچ‌یک از اعضای معاهده تخلفی انجام می‌دهند، کمک می‌کنند. مثلاً ماهواره‌های GPS و DSP حسگرهایی دارند که نور مرئی، پرتو ایکس و علائم الکترومغناطیس دیگر را، که از انفجار هسته‌ای گسیل می‌شود، آشکار می‌کنند.



ارتباطات ایمن
نیروهای ارتش نیازمند حلقه‌ی ارتباطی قابل اعتمادی میان کشتی‌ها، هواپیماها و گیرنده‌های کوچک تلفن همراه روی خشکی هستند. این حلقه‌ها در جریان جنگ‌ها یا مانورهای نظامی با ترافیک ارتباطی بسیار مشغول‌اند؛ اما در دیگر زمان‌ها کمتر مشغول‌اند. ماهواره‌های مخابراتی عادی، برخلاف ماهواره‌های ارتباطی نظامی، در همه‌ی زمان‌ها حجم عظیمی از ترافیک ارتباطی دارند. ارتباطات نظامی به‌روز درمی‌آیند تا از شنود آن‌ها جلوگیری شود.



سربازان در حال نصب سامانه‌ی تلفن همراه

بیشتر بدانیم

- ماهواره‌ها و مدارها ۵۴
- ماهواره‌های مخابراتی ۵۸
- ماهواره‌های هواشناسی ۶۲

پس‌مانده‌های فضایی

طرحی هنری از
پس‌مانده‌های فضایی در
مداری به دور زمین.

هر چیزی در فضا که استفاده‌ای ندارد، زباله یا پس‌ماند فضایی است. مانند موشک‌های از دور خارج شده و ماهواره‌های از رده خارج شده، که ممکن است میلیون‌ها سال در مدار باقی بمانند یا قطعاتی از ماهواره‌هایی که منفجر یا نابود شده‌اند. نیم قرن پس از پرتاب نخستین ماهواره، بیش از ۹۰ درصد از اجسامی که دور زمین می‌گردند، زباله‌ی فضایی هستند. هر نابودی و انهدامی به افزایش پس‌مانده‌ها و افزایش خطر برخورد یکی از آن‌ها با فضاپیماها منجر می‌شود. حتی برخورد با تکه‌ای از رنگ بدنه‌ی ماهواره یا فضاپیمای نابود شده، ممکن است فضاپیمایی را از کار بیندازد. کشورهای عضو باشگاه فضایی در این اندیشه‌اند که چگونه تعداد پس‌مانده‌های فضایی را کاهش دهند.

خطر در فضا

به طور تخمینی، حدود ۲۰ هزار قطعه پس‌ماند فضایی بزرگ‌تر از ۱۰ سانتی‌متر (و در مجموع صدها هزار قطعه‌ی بزرگ‌تر از یک سانتی‌متر) در مدارهایی به دور زمین می‌گردند. امکان دارد این پس‌مانده‌ها در بسیاری از مراحل یک مأموریت فضایی تولید شوند؛ مثلاً در زمان جدا شدن، یعنی وقتی ماهواره در مدار جای گرفت و مخروط سر موشک بالابرنده از آن رها شد، ماهواره‌های از کار افتاده که هنوز در جو نسوخته‌اند، به پس‌ماند تبدیل می‌شوند. پس‌مانده‌های فضایی در مدارهایی که بیش‌تر استفاده می‌شوند، سریع‌تر انباشته می‌شوند. ممکن است ماهواره‌ها و پس‌مانده‌ها با سرعت ۴ هزار کیلومتر بر ساعت با یک‌دیگر برخورد و آسیب‌های جدی ایجاد کنند. زباله‌سازترین فعالیت فضایی که تاکنون انجام شده، پرتاب آزمایشی موشک ضدماهواره‌ی چین در یازدهم ژانویه سال ۲۰۰۷ بوده است. انفجار این ماهواره‌ی چینی ۱۹۰۰ پس‌ماند قابل ردیابی تولید کرد و تخمین رده می‌شود که سبب تولید ۳۵۰۰۰ جرم بزرگ‌تر از یک سانتی‌متر شده است. به علت نوع مدار این پس‌مانده‌های چینی، بیش از ۳۵ سال طول می‌کشد تا در جو بسوزند.

هر نقطه‌ی زردرنگ تکه‌ای
پس‌ماند فضایی است که
به دور زمین می‌گردد.

پس‌مانده‌ها در مدار زمین ثابت، مانند
حلقه‌ای به گرد زمین مشخص شده‌اند.

بیشتر پس‌مانده‌های
فضایی در مدارهای
نزدیک زمین قرار دارند

کوچک‌تر از آن‌که ردیابی شود

کوچک‌ترین قطعاتی که معمولاً مرکز نوراد (مرکز فرماندهی دفاعی هوای آمریکا شمالی) NORAD ردیابی می‌کند، اندازه‌ی انگشت یک دستکش فضانورد است. اغلب پس‌مانده‌های کوچک‌تر از آن، مثلاً به اندازه‌ی هسته‌ی گیلان، هنوز شناسایی نشده‌اند. هر یک از این خرده‌پس‌مانده‌ها وقتی با سرعت ۳۰ تا ۴۰ هزار کیلومتر بر ساعت با فضاپیمایی برخورد کند، سرویی به اندازه‌ی یک نارنجک دستی تولید می‌کند.

تمیز کردن فضا

جو محسوس زمین تا ارتفاع حدود ۱۰۰ کیلومتری، گسترده شده است. ما تا صدها کیلومتر بالاتر نیز گارها به صورت بسیار رقیق و نامحسوس وجود داریم. برخلاف برخی ماهواره‌ها، که تصحیح مداری می‌شوند، صطکاک حاصل رآیه‌های بسیار رقیق جو پس‌مانده‌ها را به مرور به مدارهای پایین‌تر می‌کشاند تا در نهایت، در جو بسوزند. اما ممکن است این روند سال‌ها یا قرن‌ها طول بکشد. به این سبب، دستمندان فکری‌های گری‌تری تمیز کردن فضا از پس‌مانده‌ها دارند. یک پیشنهاد این است که روباتی در مدار پرتاب شود و هر فضاپیمایی که از مدار خارج شد، به دم بیندازد. سپس سوزی، که قدرش را از نور خورشید کسب می‌کند، ماهواره را به قطعات کوچک‌تر تقسیم کند و آن‌ها را برای بارفت به یستگاه فضایی بین‌المللی ببرد.



صفحه‌های نمایش در مرکز
اصلی نوراد، اطلاعاتی درباره‌ی
موقعیت پس‌مانده‌های فضایی
مردمت می‌دهند

ردیابی زباله‌ها

شکله‌ی رداری جهانی به مرکز فرماندهی نوراد حسام را در مدار زیر نظر دارد. تکه‌هایی به کوچکی یک نوپ تبس، معمولاً در مدار نزدیک زمین و تکه‌هایی دست‌کم به نهایی یک متر در مدار زمین‌تابت شکار می‌شوند. رآیه‌ها از س اطلاعات بری بین‌بینی احتمال وقوع برخورد با یک فضاپیما استفاده می‌کند.

پس‌ماندهایی در مدار زمین			
اندازه‌ی جسم	تعداد	درصد از کل	درصد از جرم
بزرگتر از ۱۰ سانتی‌متر	۲۰۰۰۰	۰/۰۲	۹۹/۹۳
۱ تا ۱۰ سانتی‌متر	۲۰۰۰۰۰	۰/۳۱	۰/۰۳۵
۰/۱ تا ۱ سانتی‌متر	۶۰ میلیون	۹۹/۶۷	۰/۰۳۵

از میان حدود ۲۰ هزار جسم فضایی قابل
رصد بزرگتر از ۱۰ سانتی‌متر، فقط
حدود ۹۰۰ جرم، ماهواره‌های
در حال کارند.

اتاناک آزمایش برخورد فراسرعتی



برخورد با زباله‌ها

ممکن است پس‌ماندها با سرعت‌های بسیار زیاد، که به فراسرعت مشهورند، با فضاپیما برخورد کنند. نیروی برخورد به این بستگی دارد که برخورد از روبه‌رو، کناره‌ها یا پشت سر اتفاق بیفتد. سازمان‌های فضایی از اتاناک‌های آزمایش خاصی استفاده می‌کنند تا تأثیر برخوردهای فراسرعت با مواد گوناگون را بسنجند. زمانی که تفنگ‌های مخصوص، گلوله‌ها را با سرعت ۲۵ هزار کیلومتر بر ساعت شلیک می‌کنند، دوربین‌های فوق سریع، آسیب را ثبت می‌کنند. امکان دارد در فضا، اجسام حتی از این هم سریع‌تر با هم برخورد کنند.

اثر برخورد تویی فولادی به اندازه‌ی یک نخود سبز با
سرعت ۱۵ هزار کیلومتر بر ساعت با صفحه‌ای فولادی.


مرکز نوراد
پس‌ماندهای ۱۰
سانتی‌متری یا کوچک‌تر را
با اطمینان شناسایی نمی‌کند.

آسیب‌های حاصل از پس‌ماند

• حتی برخورد با ذرات طبیعی نیز ممکن است آسیب برساند. در سال ۱۹۸۲، یک ذره‌ی غبار، سوراخ نسبتاً بزرگی روی بدنه‌ی ایستگاه فضایی سالیوت ایجاد کرد.

• کوچک‌ترین تقسیم‌بندی روی خطکش، یک میلی‌متر است. در سال ۱۹۸۳، تکه‌ای رنگ به اندازه‌ی یک‌پنجم یک میلی‌متر، سوراخی ۴ میلی‌متری روی پنجره‌ی شاتل فضایی ایجاد کرد.

• در ژوئن سال ۱۹۹۶، مرحله‌ی بالایی یک موشک پگاسوس شکست. از این حادثه ۷۰۰ جسم بزرگتر از ۱۰ سانتی‌متر و ۳۰۰ هزار جسم ۴ میلی‌متری تا ۱۰ سانتی‌متری، بر جای ماند.



سوراخ حاصل از برخورد تکه رنگ با بدنه شاتل فضایی


بیش‌تر بدانیم

ماهواره‌ها و مدارها ۵۴
پرواز به فضا ۷۰
شاتل فضایی ۷۴
ایستگاه فضایی بین‌المللی ۸۲
شهاب‌سنگ‌ها ۱۶۸


مهار آسیب

بهترین شکل مهار آسیب‌ها این است که در وهله‌ی نخست، برخوردی صورت نگیرد. به این سبب، ایستگاه فضایی بین‌المللی (ISS) به گونه‌ای طراحی شده است که خارج از مسیر تکه‌های بزرگ پس‌ماند حرکت کند. این ایستگاه به مقدار جزئی تغییر مدار می‌دهد. در گذشته، آزمایش‌هایی مانند سنجش‌گر آثار محیطی مسیر (MEEP)، داده‌هایی درباره‌ی خطرهایی که ISS با آن‌ها مواجه است، به دست داد. هدف این است که ایستگاه فضایی بین‌المللی بیش از شش بار در سال در مدار جابه‌جا نشود.

ایستگاه فضایی
بین‌المللی




مدول میپ در ایستگاه فضایی میر



محافظت

یکی از راه‌های محافظت از بخش‌های حساس بدنه‌ی فضاپیما، پیچیدن آن در لایه‌هایی از الیاف سرامیک سبک است. هر لایه، انرژی یک ذره را، که بیش از برخورد با دیواره‌ی فضاپیما از هم می‌باشد، پخش می‌کند. این ضربه‌گیرهای سرامیک در ایستگاه فضایی مورد استفاده قرار می‌گیرند تا ایستگاه از وقوع انواع آسیب‌ها، که در اتاناک‌های آزمایش فراسرعت ثبت شده‌اند، در امان باشد.

آیولو ۱۲ پس از سقوط از مدار به آب‌ها



بازگشت به جو زمین

بر اثر اصطکاک با لایه‌های رقیق جو در فضای اطراف زمین، ماهواره‌ها، به‌جز آن‌هایی که مدارشان تصحیح می‌شود، به آرامی به زمین می‌گردند. وقتی ماهواره‌ها وارد جو زمین می‌شوند، اصطکاک با هوا آن‌ها را گرم می‌کند. برخی تکه‌تکه و کاملاً نابود می‌شوند و برخی هم کاملاً نمی‌سوزند و با زمین دریا برخورد می‌کنند. در آینده، شاید صاحبان ماهواره‌ها مجبور باشند بخش پایانی عمر ماهواره خود را بیش‌تر زیر نظر داشته باشند و آن‌ها را به طریقی از مدار خارج کنند که به صورت پس‌ماند فضایی باقی نمانند.

پرواز به فضا

اکنون در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که حتی تصور زمانی بدون پروازهای فضایی مشکل است. اما فقط نیم قرن پیش، بیش‌تر مردم ماهواره‌ها و پروازهای فضایی را موضوعاتی علمی - تخیلی و رؤیایی دست نیافتنی می‌دانستند. در آن زمان، عده‌ی کمی از دانشمندان و مهندسان در سراسر دنیا بر این باور بودند که فن‌آوری به‌زودی به جایی می‌رسد که ماهواره‌ها و انسان‌ها را به فضا ببرد. مسئولان نظامی در ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی سابق، به پیشرفت فضاپیماها علاقه‌ی زیادی داشتند؛ زیرا می‌توانستند موشک‌ها و ماهواره‌ها را پرتاب کنند. در پاییز سال ۱۹۵۷، باور کسانی که به کاوش‌های فضایی عقیده داشتند، به حقیقت پیوست.

برنامه‌ی فضایی سرتشین‌دار
برنامه‌ی فضایی سرتشین‌دار ایالات متحده کمتر از یک ماه پس از پرواز تاریخی گاکرین، با پرواز آلن شپارد به ارتفاع ۱۸۰ کیلومتری و بازگشت به زمین، آغاز شد. پرواز ریمرداری و بخشی از برنامه‌ی فضایی مرکوری (۱۹۶۳ - ۱۹۵۸) بود. هدف برنامه‌ی مرکوری فرستادن فضاوردی به فضا، بررسی واکنش‌های او و بازگرداندن او به سلامت به زمین بود.



۱۹۶۱ ۵۵

بازیابی

دو سگ به نام‌های پلکا و استرلکا، با فضاپیما اسپوتنیک ۵ به فضا رفتند. هدایت‌کنندگان زمینی، ماهواره را پس از یک روز گردش در مدار، به زمین بازگرداندند. این سگ‌ها نخستین موجودات زنده‌ای بودند که از بی‌وزنی در فضا و فشارهای بازگشت به جو زمین جان سالم به‌در بردند.



۲۰ اوت ۱۹۶۰

سراغاز عصر فضا

زمانی که مردم دریافتند اتحاد جماهیر شوروی نخستین ماهواره‌ی ساخت انسان به نام اسپوتنیک را به فضا فرستاده است، شگفت‌زده و هیجان‌زده شدند و ترسیدند. ماهواره‌ی اسپوتنیک ابتکار سرگئی کرولف، معمار برنامه‌های فضایی شوروی سابق، بود. این ماهواره ۲۱ روز تمام علائمی به زمین ارسال کرد.

۴ اکتبر ۱۹۵۷



۱۲ آوریل ۱۹۶۱



نخستین انسان در فضا

یوری گاکارین نخستین انسان مسافر فضا بود. در دوازدهم آوریل سال ۱۹۶۱، او سوار بر فضاپیماي گروبی و ستوک، در حالی به فضا رفت که روی یک صندلی پرتاب با چتر نجات نشسته بود. پس از پرواز موفقیت‌آمیز گاکارین، دو فاجعه در برنامه‌های فضایی شوروی رخ داد. یکی از این حوادث، که افراد بسیاری در آن کشته شدند، اهمیت قرارگیری مراکز پرتاب در مکان‌های دور و کم‌جمعیت را نشان داد.

نخستین حیوان در فضا

وقتی اسپوتنیک ۲ پرتاب شد، توجه جهان به لایکا، سگ مسافر فضا، معطوف بود. این سگ ماده، نخستین موجود زنده‌ای بود که به فضا پرواز کرد. لایکا هنگام پرتاب هیچ مشکلی نداشت؛ اما زمانی که اکسیژن در مدار به پایان رسید، مُرد.

۳ نوامبر ۱۹۵۷



۲۵ ۱۹۶۱ ۵۵



مسابقه برای فتح ماه

جان اف. کِنِدی، رئیس جمهوری آمریکا، با برپا کردن برنامه‌ی آپولو برای کاوش ماه، جاه‌طلبی آمریکایی‌ها را در فضا تقویت کرد. آمریکایی‌ها در تلاش برای پیش افتادن از روس‌ها در مسابقه‌ی فضایی بودند. اواخر همان سال، کِنِدی در میان جمعی از دانشجویان گفت: «ما رفتن به ماه در این دهه را انتخاب کرده‌ایم؛ نه به این سبب که آسان است، بلکه به این سبب که سخت است!» برنامه‌ی آپولو از نظر فنی یکی از پیچیده‌ترین برنامه‌های قرن بیستم بود.

راهپیمایی فضایی

فضانورد شوروی، الکسی لئونوف، نخستین راهپیمایی فضایی را از راهپیمایی وسخود ۲ انجام داد. لباس لئونوف در راهپیمایی فضایی منبسط شد. به علاوه، وقتی سعی کرد از راه دریچه‌ی فضاپیما به داخل بازگردد، مجبور شد برای بستن دریچه‌ی بیرونی، کوشش بسیاری بکند. اما سرانجام وقتی به داخل وسخود ۲ بازگشت، ۲۰ دقیقه در فضا راهپیمایی کرده بود.



فضاپیمای سایوز

فضانورد شوروی، ولادیمیر کوموروف، نخستین انسانی بود که در فضا و داخل فضاپیماش، سایوز ۱، کشته شد. چهار ماه پیش از آن نیز سه فضانورد آمریکایی روی سکوی پرتاب، هنگام آزمایش آپولو ۱، در آتش سوختند. همگی این چهار نفر قربانیان مسابقه‌ی فتح ماه بودند.



۲۴ آوریل ۱۹۶۷

ایستگاه‌های فضایی

اتحاد جماهیر شوروی ایستگاه‌های فضایی را برپا کرد تا آزمایشگاهی مداری برای انجام دادن آزمایش‌هایی در فضا داشته باشد. نخستین آن‌ها، سالیوت ۱، به طول ۱۴/۴ متر موتوری برای تغییر مدار و یک واحد اتصال به فضاپیما داشت. دو فضاپیما سایوز ۱۰ و سایوز ۱، به ملاقات سالیوت ۱ رفتند. سرنشینان سایوز ۱۱ هنگام بازگشت به زمین، به سبب خرابی یکی از واشرهای آب‌بندی مدول فرود، جان باختند. با وجود همه‌ی این‌ها، مأموریت‌های سایوز نشان دادند که با پیش‌رفت فن‌آوری می‌توان به حمل و نقل مردم بین زمین و فضا پرداخت.


۱۹ آوریل ۱۹۷۱



۱۵ تا ۲۴ ژوئیه ۱۹۷۵




۴ تا ۱۸ دسامبر ۱۹۶۵



جمینی ۷

جمینی ۷ مدت ۱۴ روز در فضا بود و نخستین پرواز فضایی بود که بیش از چند روز دوام داشت. برنامه‌ی فضایی جمینی آمریکا سکوی پرشی بین برنامه‌ی مرکوری و آپولو بود. این فضاپیما کابینی برای دو فضانورد و یک مدول امکانات شامل اکسیژن و سوخت و غذا داشت. هدف جمینی نمایش امکان پرواز فضایی طولانی و ملاقات و اتصال در فضا بود. همگی این موارد برای کاوش ماه ضروری بود.



۲۰ ژوئیه ۱۹۶۹

ملاقات در فضا

جمینی ۶ و ۷ نخستین فضاپیماهایی بودند که در فضا به ملاقات هم رفتند. آن‌ها در ارتفاع ۳۶۰ کیلومتری و سرعت ۳۰ هزار کیلومتر بر ساعت تا فاصله‌ی ۳۰ سانتی‌متری (یعنی تقریباً به اندازه‌ی طول این کتاب) به هم نزدیک شدند.

فرود بر سطح ماه

نیل آرمسترانگ، فرمان‌دهی فضاپیمای آمریکایی آپولو ۱۱، با بیان عبارت «عقاب فرود آمد» رسیدن انسان به دنیایی به‌جز زمین را اعلام کرد. آرمسترانگ همراه با آلدن مِ‌نشین عقاب را به سوی سطح ماه هدایت کرد در همین حال مایکل کالیتز در مدارگرد فرمان‌دهی باقی ماند. آرمسترانگ و آلدن ۲ ساعت روی سطح ماه و ۲ ساعت و تیم خارج از مِ‌نشین عقاب به‌سر بردند. آن‌ها ۲۲ کیلوگرم نمونه سنگ و غبار از سطح ماه جمع‌آوری کردند.



نخستین ایرانی در فضا

ایرانیان بسیاری در مراکز فضایی گوناگون مشغول به کارند و در مواردی، به مدیریت طرح‌های کلان فضایی می‌پردازند. نخستین سفر یک ایرانی به فضا، در بیست‌وهفتم شهریورماه سال ۱۳۸۵ (سپتامبر ۲۰۰۶) انجام شد؛ انوشه انصاری، ایرانی مقیم ایالات متحده، با سفر به ایستگاه فضایی بین‌المللی نخستین بانوی گردشگر فضایی شد. او برای این سفر چند ماه تمرین کرد و آموزش دید. سفر او با پرناب موشک سایوز از قزاقستان آغاز شد و ۱۲ روز طول کشید که ۹ روز آن در ایستگاه فضایی سپری شد. با آن‌که در این سفر انوشه انصاری گردشگر فضایی بود، به خواست سازمان فضایی اروپا آزمایش‌های علمی نیز انجام داد و با روزنوشت‌های خود از ایستگاه و حتی ارتباط زنده با دانش‌آموزان، سعی کرد تجارب خود را از این سفر استثنایی با جهانیان تقسیم کند.

اتصال آپولو - سایوز

در میانه‌ی جنگ سرد، ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی یک مأموریت فضایی انجام دادند: ملاقات آپولو و سایوز در فضا. اعضای هر دو گروه از فضانوردان، ضمن اجرای مانوری با فضاپیماهای خود، دو فضاپیما را به هم متصل کردند. اعضای هر گروه چند روز در فضاپیمای دیگری به آزمایش‌های علمی پرداختند و سپس مأموریت‌های خود را به‌طور جداگانه تکمیل کردند.

بیش‌تر بدانیم

- پرتابگرهای فضایی ۴۸
- ماهواره‌ها و مدارها ۵۴
- زندگی در فضا ۷۸
- علم در فضا ۸۰
- سفر میان سیاره‌ای ۸۸
- کاوش‌گرهایی به سوی سیاره‌ها ۹۶
- کاوش ماه ۱۱۶

حرفه‌ی فضانوردی



فضانورد روس در ایستگاه فضایی بین‌المللی، کتاب فضانوردی سیروس برزو، محقق و نویسنده‌ی ایرانی علوم فضایی را به سبب آشنایی با او، به مدار زمین برد. روس‌ها بیش‌ترین تجربه را در مأموریت‌های سرشنشین‌دار کسب کرده‌اند و فضانوردان روس از باتجربه‌ترین و تواناترین‌ها در مأموریت‌های دشوار مانند اقامت‌های طولانی در فضا و راه‌پیمایی‌های فضایی‌اند.

چگونه فضانورد شویم

نخستین فضانوردان تاریخ، از میان هوانوردان جوان، تیزهوش و کارآموخته انتخاب شدند. هنوز هم بسیاری از فضانوردان از رشته‌هایی مانند هوانوردی و هوا - فضا وارد این عرصه می‌شوند. برخی فضانوردان نیز دانشمندان و پژوهشگران رشته‌های گوناگون علم و فن‌آوری‌اند که با آموختن دوره‌های فضانوردی، آزمایش‌های رشته‌ی خود را در محیط بی‌وزنی انجام می‌دهند. ممکن است آنان زیست‌شناس، شیمی‌دان، فیزیک‌دان، پزشک، یا اخترشناس باشند. با آن‌که اغلب فضانوردان جوان و میان‌سال‌اند، گاه افراد پیرتری نیز به فضا رفته‌اند؛ مانند جان گلن ۷۷ ساله، فضانورد باتجربه‌ای که در دوره‌ی بازنشتگی نیز به فضا رفت.

در برخی کشورهای دنیا، مانند روسیه، ایالات متحده و فرانسه، مراکزی برای تمرین فضانوردان وجود دارد. برای مثال، بسیاری در شهر ستارگان یا مرکز فضایی گاکارین در حومه‌ی مسکو تمرین می‌کنند.

در ایران، سابقه‌ای برای فعالیت‌های حرفه‌ای فضانوردی وجود ندارد و بیش‌تر تلاش‌های انجام شده در علوم فضا، مربوط به تحقیقات ماهواره‌ای و بدون سرشنشین است. با وجود این، آغاز به کار مراکزی مانند سازمان فضایی ایران، زمینه‌ی ارتباط رشته‌های دانشگاهی هوانوردی و هوا - فضا را با گرایش فضانوردی فراهم خواهد آورد.



فضانورد در اتاقک کروی قرار می‌گیرد و این دستگاه عظیم، بازوی خود را با سرعت زیاد می‌چرخاند. اتاقک کروی نیز جهت‌های متفاوتی به خود می‌گیرد و فضانوردان فشار گراشی هنگام پرتاب و فرود را تجربه می‌کنند.

شهر ستارگان، مرکز آموزش فضانوردان، در روسیه.

فضانوردان دولتی

تعریف عمومی فضانورد شخصی است که به ارتفاع بیش از ۱۰۰ کیلومتری زمین سفر کند. بیش‌تر فضانوردان از سوی مراکز فضایی ملی یا دولتی انتخاب و حمایت می‌شوند. تاکنون بیش از ۵۰۰ نفر از حدود ۴۰ ملیت متفاوت به فضا رفته‌اند. بنابراین در مقایسه با جمعیت ۷ میلیارد نفری زمین، از هر ۱۴ میلیون نفر فقط یک نفر راهی فضا شده است. بیش‌تر فضانوردان به ایستگاه‌های فضایی در مدارهای پایین (چند صد کیلومتری زمین) می‌روند. فقط ۲۴ فضانورد به ورای این محدوده، یعنی به مدار و سطح ماه رفته‌اند. در مجموع، اقامت تمام فضانوردان در فضا معادل ۳۰ هزار نفر روز بوده است. سرگئی کریکالوف، فضانورد روسی، به تنهایی ۸۰۳ روز طی چندین سفر فضایی خارج از زمین بوده که رکوردی جهانی است. سفرهای فضایی خطرهای بسیاری نیز دارد. در سانحه‌های فضایی، از جمله در انفجار دو شاتل فضایی چلنجر و کلمبیا، در مجموع حدود ۲۰ فضانورد کشته شده‌اند.

تاکنون، بیش‌تر فضانوردان روس و آمریکایی بوده‌اند. به فضانوردان روس معمولاً کیهان‌نورد می‌گویند. نخستین فضانورد در تاریخ عصر فضا، یوری گاگارین، کیهان‌نورد روس، بود که در سال ۱۹۶۱ حدود ۱۰۸ دقیقه در مدار زمین ماند. دو سال پس از او، روس‌ها نخستین فضانورد زن، والتینا ترشکوا را نیز به مدار زمین فرستادند. در سال ۱۹۶۵، کیهان‌نورد دیگری به نام آلکسی لئونف نخستین راه‌پیمایی فضایی را در بیرون از فضایی‌های وُسخود ۲ انجام داد. در سال ۱۹۶۹ نیل آرمسترانگ، فضانورد ناسا، نخستین انسانی بود که بر سطح کروی دیگری به جز زمین قدم گذاشت. اقامت او و باز آلدترین بر سطح ماه، حدود ۲/۵ ساعت طول کشید و طی ماه‌های بعد، با مأموریت‌های طولانی‌تر آپولو ادامه یافت. تا به حال، جوان‌ترین فضانورد، گرمان تیتوف ۲۵ ساله است که فقط چند ماه پس از گاگارین در سال ۱۹۶۱ با فضایی‌های وستوک ۲ پرواز کرد. او نخستین کسی بود که در فضا خوابید و نیز دچار بیماری حرکت در فضا شد. پیرترین فردی که تاکنون به فضا رفته، فضانورد باتجربه‌ی ناسا جان گلن است که در ۷۷ سالگی با شاتل فضایی پرواز کرد.

فضانوردان خصوصی

از سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۰)، فضانوردان غیر دولتی نیز به مرزهای ورای زمین راه یافته‌اند. گردش‌گران فضایی از طریق سازمان فضایی روسیه برای اقامتی چند روزه در ایستگاه فضایی، بیش از ۲۰ میلیون دلار پرداخت می‌کنند و چندین ماه تمرین می‌بینند. در سال ۲۰۰۴ (۱۳۸۳)، نخستین فضایی‌های خصوصی با یک سرنشین پرواز آزمایشی خود را با موفقیت به ورای صد کیلومتری زمین انجام داد. فضانانو شماره‌ی ۱، بیش‌تر شبیه یک هواپیماست که به مرور ارتفاع می‌گیرد. در سال‌های آینده، چنین فضایی‌های فضانوردی را متحول می‌کنند و انسان‌های بیش‌تری راهی فضا می‌شوند؛ چه آن‌هایی که فضانوردان محقق در بخش خصوصی خواهند بود و چه گردش‌گرانی که چند ساعت یا چندین روز را با هزینه‌ای بسیار کمتر از امروز، در فضا می‌گذرانند.



باردید فضانورد روسی، گنورگی گرچکو، از مرکز علوم و ستاره‌شناسی تهران (دی‌ماه ۱۳۸۶). گنورگی گرچکو متولد لنینگراد یا سن‌پترزبورگ (۱۹۳۱) و عضو فعال آکادمی فضانوردی روسیه است. نخستین پرواز او در سال ۱۹۷۵ با فضایی‌های سایوز ۱۷ و سالیوت ۴ و دو پرواز بعدی او با سایوز ۲۶ و سایوز تی-۱۴ بود. گرچکو مجموعاً ۳۸ شبانه‌روز در فضا زندگی کرده است.

بی‌وزنی اما نه در فضا

سازمان‌های فضایی برای تمرین فضانوردان حرفه‌ای و شرکت‌ها برای توسعه‌ی گردش‌گری فضایی، از هواپیماهای معروف به گرانش صفر یا Zero G استفاده می‌کنند. این هواپیماها پیوسته در هوا با زاویه‌ای تند اوج می‌گیرند و شیرجه می‌روند تا به کمک اثر سقوط آزاد، بی‌وزنی را مانند مدار زمین، در محیط درون خود ایجاد کنند.

استیون هاوکینگ، فیزیک‌دان مشهور، که کاملاً فلج است، در یکی از پروازهای گرانش صفر، بی‌وزنی را تجربه می‌کند.



شاتل فضایی

محافظت حرارتی

وقتی مدارگردی وارد جو زمین می‌شود، اصطکاک برخورد با ملکول‌های جو، بدنه‌ی خارجی آن را بین ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ درجه‌ی سانتی‌گراد گرم می‌کند. به این سبب، پوشش محافظی لازم است تا از ذوب شدن مدارگرد جلوگیری کند. انواع متفاوتی از حفاظ‌ها، از بخش‌های متفاوت محافظت می‌کنند. لپه‌های بال‌ها و سر دماغه‌ی شاتل، داغ‌ترین بخش‌ها هستند. حدود ۷۰ درصد از سطح را کاشی‌های مخصوصی پوشانده‌اند که حرارت بین ۳۷۰ تا ۱۲۶۰ درجه‌ی سانتی‌گراد را جذب می‌کنند. این قطعات سرامیک، عایق‌های کاملی هستند و حرارت را چنان به آرامی منتقل می‌کنند که به مدارگرد نرسد.

بالای مدارگرد، که در آن دما از ۳۷۰ درجه‌ی سانتی‌گراد بالاتر نمی‌رود، با ترکیباتی از نمد محافظت می‌شود.

ماده‌ی عایق کربن-کربن تقویت شده، از داغ‌ترین بخش‌های مدارگرد (با دمای بیش از ۱۲۶۰ درجه‌ی سانتی‌گراد) محافظت می‌کند.

مدارگرد شاتل

بخش بار

نردبانی به عرشه‌ی میانی که شامل تخت‌خواب‌های دیواری، دست‌شویی، آشپزخانه و دریچه‌ی خروج به فضا است.

عرشه‌ی پرواز که خلبان و فرمان‌ده در آن می‌نشینند

عرشه‌ی زیرین محل تجهیزاتی است که مدارگرد را به محیطی سکونت‌پذیر برای خدمه تبدیل می‌کند.

شش فضانورد شاتل فضایی در شرایط بی‌وزنی مدار زمین




نخستین پرواز آزمایشی سامانه‌ی حمل و نقل فضایی (STS) در سال ۱۹۸۱ انجام شد. STS، که معمولاً به آن شاتل فضایی می‌گویند، از یک مدارگرد با سه موتور اصلی و از یک مخزن خارجی و دو موشک کمکی سوخت جامد تشکیل شده است. بار شاتل سوار بر بخش محموله‌ی مدارگرد به فضا ارسال می‌شود. ماده‌ی پیش‌ران برای موتورهای اصلی از مخزن خارجی تأمین می‌شود. مدارگرد، پس از هر مأموریت، به زمین بازمی‌گردد و روی باندی بسیار طولانی، مانند هواپیمای فرود می‌آید. شاتل‌ها، ماهواره‌ها و کاوش‌گری فضایی را به مدار می‌برند. شاتل فضایی، ایستگاه فضایی اسپیس لب و تکه‌های ایستگاه فضایی بین‌المللی را به مدار برده و علاوه بر این، شامل سکویی فضایی برای ساخت‌وساز و تعمیرات در فضا و انجام دادن آزمایش‌های علمی در محیط بی‌وزنی است.

پس از انفجار شاتل چلنجر در سال ۱۹۸۶ و شاتل کلمبیا در سال ۲۰۰۳، فقط سه شاتل فعال باقی مانده است. فن‌آوری ساخت شاتل‌ها به دهه‌ی ۱۹۷۰ برمی‌گردد. با وجود کارایی بسیار این سامانه در سال‌های گذشته، اکنون نیازی جدی به طراحی و ساخت نسل جدیدی از سامانه‌های حمل و نقل وجود دارد. شاتل‌ها تا پایان این دهه‌ی میلادی، پس از تکمیل ساخت ایستگاه فضایی بین‌المللی، بازنشته خواهند شد.

مدارگرد شاتل


مدارگرد، هواپیمای فضایی است. در هر مأموریت شاتل، یکی از سه مدارگرد دیسک‌آوری، ایندیور و آتلانتیس به مدار می‌روند (اغلب به خود این مدارگردها شاتل گفته می‌شود). هر یک از این مدارگردها، تا ۷ فضانورد را با خود به فضا می‌برند و امکان دارد حدود ۲ هفته در فضا بمانند. کابین مدارگرد سه عرشه دارد: عرشه‌ی پرواز، عرشه‌ی میانی و عرشه‌ی زیرین که محل نگهداری تجهیزات حیاتی است.



مخزن خارجی
موشک کمکی
سوخت جامد

مخزن خارجی

مخزن خارجی، مدارگرد و موشک‌های کمکی را در حین صعود به مدار، به هم متصل می‌کنند و حامل سوخت هیدروژن مایع و اکسیژن مایع است. این مخزن پس از هر پرواز به جو می‌سوزد و از رده خارج می‌شود.



لوله سوخت هیدروژن مایع به مدارگرد

لوله اکروز

موشک‌های کمکی سوخت جامد

موشک‌های کمکی سوخت جامد مدارگرد را تا ارتفاع ۴۵ کیلومتری پیش می‌رانند و طوری طراحی شده‌اند که تا ۲۰ پرواز دوام بیاورند. پس از هر پرواز، آن‌ها را از اقیانوس‌ها بازیابی و برای پرواز بعدی آماده می‌کنند. این موشک‌ها کل وزن STS را روی زمین تحمل می‌کنند.

خصوصیات مداری

ارتفاع مدارگرد
متر ۱۷/۲۷

طول مدارگرد
متر ۳۲/۲۲

بیش بار
متر ۱۸/۳۴/۶

پیش پای
متر ۲۹/۷۹

تعمل دما تا ۱۵۰۰ درجه


سرعت مداری ۲۸۸۰۰
کیلومتر بر ساعت

طول مأموریت ۱۰ تا ۱۶
روز

ارتفاع در مدار بین
۱۰۰ تا ۱۸۵ کیلومتر

انفجار شاتل‌ها

روز بیست و هشتم ژانویه سال ۱۹۸۶، مدارگرد چلنجر منفجر شد و هر هفت فضانورد آن کشته شدند. اتصالی بین دو بخش یکی از موشک‌های کمکی خراب بود. گازهای داغ، محفظه‌ی موشک کمکی را سوزانده و به مخزن خارجی رسیده بود. مخزن شکافت، هیدروژن مایع به شدت در هوا سوخت و شاتل در عرض ۱۵ ثانیه از هم پاشید. دومین فاجعه‌ی شاتل‌ها اول فوریه سال ۲۰۰۳ به وقوع پیوست؛ زمانی که مدارگرد کلمبیا در پایان مأموریت ۱۶ روزه‌ی خود وارد جو زمین شد. ناگهان ۱۶ دقیقه پیش از فرود، در برابر چشمان صدها تماشاگر، شاتل به هزاران قطعه تبدیل شد. در این حادثه نیز هفت فضانورد جان خود را از دست دادند. دلیل حادثه، کنده شدن بخشی از فوم بدنه‌ی مخزن بیرونی سوخت در حین پرتاب و سقوط این تکه بر گوشه‌ای از بال شاتل بود. این نقص جزئی در بال شاتل در هنگام بازگشت سبب شد فضاپیما در زاویه‌ای نامناسب وارد جو شود و بسوزد. حادثه‌ی کلمبیا به تعویق مأموریت‌های بعدی شاتل تا تابستان سال ۲۰۰۵ منجر شد.



بال مثلث‌شکل در فضا هیچ کاربردی ندارد؛ اما در هنگام فرود به مدارگرد کمک می‌کند.

پیش‌تر بدانیم

سفر شاتل فضایی ۷۶ موشک‌ها چگونه کار می‌کنند؟ ۴۴ پیش‌ران‌ش موشک ۴۶ زندگی در فضا ۷۸ علم در فضا ۸۰ ایستگاه فضایی بین‌المللی ۸۲

کاشی‌هایی از جنس الیاف سیلیس، حرارت را از ۳۷۰ تا ۶۴۸ درجه‌ی سانتی‌گراد جذب می‌کنند. همگی کاشی‌های سطح مدارگرد طوری شکل داده شده‌اند که روی سطح خمیده‌ی مدارگرد بنشینند.

فلز یا شیشه بدون حفاظت حرارتی.

کاشی‌هایی از جنس الیاف سیلیس، حرارت را از ۶۴۸ تا ۱۲۶۰ درجه‌ی سانتی‌گراد جذب می‌کنند. آن‌ها پوشش سیاه برآبی دارند تا حرارت ورود به جو را بازتاب دهند.

بازوی هدایت از دور به حرکت دادن ماهواره‌ها، درون و بیرون از بخش بار، کمک می‌کند.

دم عمودی

سه موتور اصلی

موتورهای مانور مداری

موتورهای هدایت‌کننده برای تنظیمات کوچک مداری

درهای بخش بار زمانی باز می‌شود که مدارگرد، از جو خارج می‌شود و به مدار نزدیک زمین می‌رسد. با این کار، از زیاد گرم شدن درون بخش بار جلوگیری می‌شود.

مأموریت‌های مهم شاتل

• مدارگرد دیسکاوری، در مأموریت بیست و چهارم تا بیست و نهم آوریل ۱۹۹۰ خود، تلسکوپ فضایی هابل را به مدار برد.

• از سال ۱۹۹۸ به بعد، بیش‌تر مأموریت‌های شاتل فضایی برای تکمیل ایستگاه فضایی بین‌المللی در ارتفاع حدود ۳۵۰ کیلومتری زمین بود.

• چهارم دسامبر ۱۹۹۸، فضانوردان شاتل فضایی ایندیور مدول مهم یونیتی (اتحاد) را به نخستین بخش در مدار قرار گرفت. ایستگاه رساندند.

• هفتم فوریه سال ۲۰۰۱، در مأموریت شاتل فضایی آتلانتیس مدول دستی (سرنوشت) به ایستگاه فضایی متصل شد.

• نخستین پرواز شاتل با مدارگرد کلمبیا در روزهای دوازدهم تا چهاردهم آوریل ۱۹۸۱ صورت گرفت.

• سه پرواز بعدی با کلمبیا، بین نوامبر ۱۹۸۱ و ژوئیه سال ۱۹۸۲ انجام و در آن‌ها بازوی کنترل از دور دست آزمایش شد.


• بین ششم تا سیزدهم آوریل سال ۱۹۸۴، فضانوردان شاتل چلنجر مأموریتی انجام دادند تا به تأثیر سفرهای طولانی فضایی بر مواد و نمونه‌های زیست‌شناختی پی ببرند.

• فضانوردان شاتل آتلانتیس، فضاپیماي گالیله را در فضا رها کردند. یک موشک، مرحله‌ی بالایی این فضاپیما را به سوی مسیر آن تا مشتری راند.


سفر شاتل فضایی


پیکره‌ی عظیم شاتل‌های فضایی و سوخت عظیمی که برای گریز از زمین مصرف می‌کنند، این تصویر عمومی را ایجاد می‌کند که این فضاپیماها تا اعماق فضا پیش می‌روند. اما مقصد بیش‌تر پروازهای شاتل، ایستگاه فضایی در فاصله‌ی ۳۵۰ کیلومتری زمین، یعنی برابر فاصله‌ی تهران تا اصفهان، اما در خلاف جهت نیروی گرانش زمین است. این سفر فضایی، طی فقط چند دقیقه، فضاءنوردان را از جو زمین خارج می‌کند. آن‌ها باید برای فشار گرانشی زیادی که در این لحظات به آن‌ها وارد می‌شود، مدت‌ها تمرین کرده باشند. پس از رسیدن به فضا، شاتل طی یک تا دو روز به مرور در مدار ایستگاه فضایی و مسیر اتصال به آن قرار می‌گیرد.

۱ پیکره‌ی ۵۶ متری شاتل از ساختمان مونتاژ به سوی سکوی پرتاب خارج می‌شود.



۲ شاتل فضایی سوار بر بزرگ‌ترین خودرو جهان، کرالر، با سرعت کند ۲ کیلومتر بر ساعت مسیر مخصوص ۶ کیلومتری تا سکوی پرتاب را طی می‌کند. این مسیر با شن‌ریزه و قلوه‌سنگ طوری درست شده است که وزن عظیم کرالر را تحمل کند و دست‌اندازی در مسیر به‌وجود نیاید.





۹ فضانوردان با راه‌پیمایی فضایی در بیرون از ایستگاه، سازه‌های جدید ایستگاه را به کمک بازوهای رباتی سر هم و مراحل را در فضا بازبینی می‌کنند.



۷ منظره‌ی ایستگاه فضایی بین‌المللی از نگاه فضانوردان شاتل، ساعتی پیش از الحاق آن دو در مدار زمین.




۵ فقط ۲ دقیقه پس از پرتاب، موشک‌های کمکی با سوخت جامد، که ۸۰ درصد نیروی پیش‌ران اولیه را ایجاد می‌کنند، از سوخت خالی و در ارتفاع ۴۵ کیلومتری سطح زمین از شاتل جدا می‌شوند. سپس با چتر نجات در اقیانوس فرود می‌آیند.




۳ فضاپیما از زمین کنده می‌شود. وزن شاتل همراه با موشک‌های بالابرنده و مخزن بیرونی سوخت در این لحظه ۲ هزار تن است و فضاپیما با توان ۱۴۰ میلیون اسب بخار، معادل توان ۱۵ میلیون دستگاه اتومبیل شهری، بر گرانج زمین علبه می‌کند




۱۰ پس از پایان مأموریت، شاتل سفر دو هفته‌ای خود را مانند یک هواپیما، با عبور از جو زمین و فرود به پایگاه فضایی به پایان می‌رساند. با آن‌که شاتل در حال مأموریت فقط چند صد کیلومتر از زمین دور شده بود، با حدود ۲۰۰ بار گردش به دور زمین، میلیون‌ها کیلومتر را در فضای اطراف سیاره با نیروی رایگان گرانج زمین پیمود.



۸ پس از الحاق، هفت فضانورد شاتل فضایی و سه خدمه‌ی ایستگاه فضایی گرد هم می‌آیند. شاتل فضانورد در هر مأموریت، خدمه‌ی جدیدی را با خود به ایستگاه می‌آورد و فضانورد قبلی را برمی‌گرداند. به‌علاوه، وسایل مورد نیاز و قطعات جدید ایستگاه را به مدار حمل می‌کند.



۶ کمتر از ۱۰ دقیقه پس از پرتاب، فضاپیما به ارتفاع بیش از صد کیلومتری، یعنی به مرز قراردادی فضا می‌رسد. مخزن بیرونی سوخت، که خالی شده است، رها می‌شود تا در جو بسوزد و مدارگرد شاتل فضایی طی یک تا دو روز بعدی، به مرور خود را به مدار ایستگاه فضایی بین‌المللی در ارتفاع حدود ۳۵۰ کیلومتری می‌رساند تا شاتل از پنجره‌ی ایستگاه دیده شود.




۴ فضاپیما از پایگاه فضایی کنده می‌شود و در کرانه‌ی اقیانوس اطلس، بلند می‌شود و سفری تقریباً ۲ هفته‌ای را به مدار زمین آغاز می‌کند



۱۱ وقتی شاتل فضایی ناچار شود به سبب بدی آب و هوا، در فلوریدا در پایگاه فضایی ادوین در غرب آمریکا فرود نیاید، با هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ مخصوصی به پایگاه فضایی کنده می‌شود. در شرق آمریکا منتقل می‌شود.

پرونده پرواز




بیش‌تر بدانیم

پرواز به فضا ۷۰
شاتل فضایی ۷۴
ایستگاه فضایی بین‌المللی ۸۲

زندگی در فضا

دلیل بی‌وزنی چیست؟

بی‌وزنی در مدار به سبب کاهش یا نبود گرانش زمین نیست. زیرا در چند صد کیلومتری زمین، کمکان گرانش قابل توجهی بر ما وارد می‌شود. اما چون در مداری به دور زمین قرار گرفته‌ایم، با سرعت در حال حرکت‌ایم و مانند سقوط آزاد از یک بلندی، حالت بی‌وزنی به وجود می‌آید.



میر بر فراز اقیانوس آرام

بهداشت شخصی

داخل میر دوشی برای فضانوردان وجود داشت؛ اما دوش گرفتن در فضا کار ساده‌ای نیست. چون آب به راحتی فرار می‌کند و به قطره‌های شناور در محیط تبدیل می‌شود. فضانوردان در شاتل فضایی با اسفنج خیس حمام می‌کنند. برای مردان فضانورد اصلاح صورت با ماشین ریش تراش برقی اصلاً فکر جالبی نیست. چون خُرده‌های ریش و سیل در هوا پراکنده و وارد چشم آن‌ها می‌شود. اصلاح کردن با تیغ دستی بهتر است و اصلاً ریش گذاشتن و اصلاح نکردن از همه ساده‌تر است.



فضانورد شاتل فضایی در حال اصلاح صورت.

ایستگاه فضایی میر

میر بیش‌تر از همه‌ی ایستگاه‌های فضایی عمر کرد. این ایستگاه شامل بخش مرکزی و شش بخش جانبی بود که به مرور طی ۱۰ سال ابتدای ساخت، به آن اضافه شدند. از فوریه‌ی سال ۱۹۸۶ تا اوت سال ۱۹۹۹، فضانوردان گوناگونی به این ایستگاه سفر کردند و برخی فضانوردان روس، در هر سفر گاه تا بیش از یک سال در آن اقامت داشتند. در مجموع، ۱۰۴ فضانورد به میر سفر کردند. نیروی مورد نیاز ایستگاه از طریق صفحه‌های خورشیدی و باتری‌ها تأمین می‌شد. هر روز ساعتی، خدمه را رأس ساعت ۸ صبح به وقت مسکو بیدار می‌کرد و مسئولان مأموریت برنامه‌ی آن روز را برای فضانوردان می‌فرستادند. میر هر ۹۰ دقیقه، که زمین را دور می‌زد و از فراز ایستگاه گیرنده‌ای می‌گذشت، با هدایت‌کنندگان زمینی تماس برقرار می‌کرد.



آسیب وارد شده به بخش اسپکتر

خطرها

روز بیست‌وپنجم ژوئن سال ۱۹۹۷، فضایی‌ای بی‌سرنشین و باربری پروگرس، که مشغول حمل مایحتاج به میر بود، با بخش (مدول) علمی اسپکتر برخورد و خطوط برق را قطع کرد. مایک فول، فضانورد آمریکایی و همکار روس او ساعت‌ها برای ذخیره‌ی برق و جلوگیری از وقوع یک حادثه مبارزه کردند.

سال‌شمار عمر میر

شد و حامل تجهیزاتی برای رصد زمین بود. در ژوئن همان سال، یک مدول اتصال به ایستگاه اضافه شد تا اتصال میر با شاتل راحت‌تر انجام شود.

• در بیست‌وششم آوریل سال ۱۹۹۶، مدول پریرودا به مدار رفت. این مدول زمین را از فضا زیر نظر داشت.

• در مارس سال ۲۰۰۱، ایستگاه فضایی میر، که چند ماه پیش از آن بی‌سکنه شده بود، با ورود به جو زمین به زندگی خود پایان داد. برخی تکه‌های ایستگاه، که کاملاً در جو نسوختند، به اقیانوس سقوط کردند.

• هسته‌ی مرکزی ایستگاه فضایی میر در فوریه‌ی سال ۱۹۸۶ پرتاب شد.

• در ژوئیه‌ی سال ۱۹۸۷، بخش کوانت-۱ به هسته متصل شد. در دسامبر همان سال، کوانت-۲ نیز به آن پیوست که حامل تجهیزاتی برای آزمایش‌های زیستی بود.

• در ژوئیه‌ی سال ۱۹۹۰، بخش کریستال به مدار رفت. این مدول درگاهی برای اتصال به شاتل فضایی داشت و حامل تجهیزاتی برای تحقیقات اثر بی‌وزنی بر خواص مواد بود.

• بخش اسپکتر در مه سال ۱۹۹۵ به میر متصل

غذای فضایی

یکی از فضانوردان، که ساندویچ همبرگری را پنهانی به فضا برده بود، بعدها به جان گلن، نخستین آمریکایی که در سال ۱۹۶۲ به فضا رفت، گفت که این غذا چه قدر در فضا بد مزه بود.

همه‌ی غذاهایی که از زمین به فضا حمل می‌شوند، باید سبک باشند. تکه‌های غذا به راحتی در فضا شناور می‌شوند. به این سبب، گاه آن‌ها را با ژلاتین خوردنی می‌پوشانند تا کثیف نشود. معمولاً غذاها به صورت خشک‌شده‌اند و در هنگام نیاز به آن‌ها آب اضافه می‌کنند. فضاییماهای پشتیبان تا ۱۰ لیتر آب به میر می‌برند؛ اما شاتل فضایی قسمتی از آب مورد نیاز را تولید می‌کند.



میز هدایت جایی است که خدمه، وضعیت، آزمایش‌ها و مدار میر را از آن‌جا زیر نظر داشتند و آن را هدایت می‌کردند.

بخش مرکزی ایستگاه فضایی میر

ورودی به درگاه اتصال

دیوارها، سقف و کف ایستگاه به رنگ‌های متفاوتی هستند تا خدمه برای جهت‌یابی با مشکلی مواجه نشوند.

فضانوردان از دوچرخه ثابت ایستگاه برای حفظ تناسب اندام خود استفاده می‌کنند.

کابین‌ها شامل دستشویی و فضای خواب هستند.

میر گنجایش حمل ۶ فضانورد را داشت.

آنتن کوچک، با فضاییمایی که می‌خواهد به ایستگاه متصل شود، ارتباط برقرار می‌کند.

آنتن بزرگ پیام‌ها را به ماهواره‌ها ارسال می‌کند.

میل‌های هدف، راهنمای فضایی‌های در حال الحاق هستند


صورت غذای فضایی

صبحانه	میوه یا غلات، پیراشکی گوشت یا تخم‌مرغ، نیم‌روی زده شده، ککائو و آب میوه
ناهار	مکaronونی یوقلمون یا هات‌داگ، نان، موز یا مغز بادام، آب میوه
شام	سوپ یا مخلوط میوه، پلو یا استیک، گراتینه‌ی کلم بروکلی، پودینگ و آب میوه

آنتن ملاقات در نوک صفحه‌ی خورشیدی، فضاییما را برای الحاق در فضا (با فضاییمای سایوز، پروگرس یا شاتل فضایی) هدایت می‌کند.

توالی فضایی

گیره‌هایی فضانورد را در جای مخصوص نگه می‌دارند تا او بتواند از توالت استفاده کند. یک دستگاه مکنده بین بدن و قسمت نشیمن توالت روشن می‌شود تا فضولات مکیده شود. در شاتل فضایی، مدفوع خشک و به گونه‌ای نگه‌داری می‌شود که باکتری درون آن رشد نکند. ادرار با آب‌های کثیف جمع و هر چند وقت یک‌بار، تخلیه می‌شود. تخلیه‌ی مدفوع سبب تولید زباله‌های خطرناک فضایی می‌شود که ممکن است با برخورد به ماهواره‌ها و مدارگرها سبب حادثه شود. به همین دلیل، بسیاری از زباله‌های ایستگاه در فضاییمای پروگرس بارگذاری می‌شوند و در جو زمین می‌سوزند.



دکمه تنظیم برای خاموش کردن دستگاه

حفظ تناسب اندام

انسان در فضا مجبور نیست به سختی روی زمین کار کند. چون در وضعیت بی‌وزنی، نیروی گرانش بسیار کمی بر آن وارد می‌شود. در نتیجه، ماهیچه‌ها به مرور تحلیل می‌روند. به این سبب، همه‌ی خدمه‌ی پرواز در فضا باید هر روز برنامه‌ی نرمشی دقیقی اجرا کنند تا ماهیچه‌های خود را قوی نگه‌دارند. همه‌ی ایستگاه‌های فضایی نیز باید به تجهیزات حفظ اندام، مانند دوچرخه‌ی ثابت، مجهز باشند.



تسمه‌های مخصوصی فضانوردان را به نقاله‌های متحرک پیاده‌روی متصل می‌کند.

استفاده از نقاله‌های متحرک پیاده‌روی یکی از راه‌های حفظ تناسب اندام برای فضانوردان است.

بیش‌تر بدانیم

پرواز به فضا ۷۰
شاتل فضایی ۷۴
علم در فضا ۸۰
ایستگاه فضایی بین‌المللی ۸۲



کمربند

خواب ایمن

اگر فضانوردان در هر گوشه‌ای از ایستگاه یا فضاییما بخوابند، در فضا شناور می‌شوند و مدام سر راه دیگران قرار می‌گیرند. برای جلوگیری از این اتفاق، مکان‌های مخصوصی برای خواب طراحی شده که مجهز به کمربند است و فضانورد را سر جای خود نگه می‌دارد. فضانوردان از چشم‌بند هم استفاده می‌کنند؛ زیرا در فضاییمایی نزدیک زمین، خورشید هر ۱/۵ ساعت طلوع و غروب می‌کند. اگر دیگر اعضای فضاییما در آن نزدیکی مشغول کار باشند، آن‌ها حتی به روگوشی هم احتیاج دارند.

علم در فضا

داخل آزمایشگاه فضایی

خدمه در مدارگرد شاتل می‌خوابیدند و به حالت شناور، وارد تونل دسترسی به اسپیس لب می‌شدند تا برای کار وارد مدول‌های با فشار تنظیم شده شوند. آزمایش‌ها در واحدهایی با طراحی مخصوص به نام رِف، انجام می‌شد که حامل تجهیزات برای انواع تحقیقات، از بررسی رشد پلورها تا مشاهده تکامل سلول‌ها بود. این رِف‌ها مشخصاً برای هر مأموریت مجهز می‌شدند. برخی رِف‌ها برای انواع خاصی از آزمایش‌ها، مانند زیست‌شناسی سلولی، طراحی شده بودند. با آن‌که با آغاز طرح ساخت ایستگاه فضایی بین‌المللی، شاتل فضایی دیگر نتوانست آزمایشگاه فضایی را به مدار ببرد، چنین آزمایش‌هایی به صورت کامل‌تر، در ایستگاه فضایی پی‌گیری خواهد شد.



در مدار درهای بخش بار، که حامل اسپیس لب بوده است، باز می‌ماند.

اسپیس لب (آزمایشگاه فضایی) درون بخش بار شاتل فضایی جای می‌گرفت.

آزمایشگاه فضایی

آزمایشگاه فضایی طوری طراحی شده بود که محفظه‌ای با سقف، کف و دیواره به‌منظر ببرد.

پهنای مدول‌های با فشار تنظیم شده ۴ متر بود. طول یکی از آن‌ها ۷ و دیگری ۴/۳ متر بود.

تونل دسترسی بین مدارگرد شاتل و آزمایشگاه فضایی.

مدارگرد شاتل

گیره‌های یا سبب می‌شدند فضانوردان حین کار صاف بایستند.

سه گروه فضانورد بین مه ۱۹۷۳ و فوریه سال ۱۹۷۴ در ایستگاه فضایی اسکای لب کار می‌کردند.




اسکای لب

اسکای لب، نخستین ایستگاه فضایی ایالات متحده، در سال ۱۹۷۳ به مدار رفت (نخستین ایستگاه فضایی دنیا ایستگاه روسی سالیوت - ۱ بود که در سال ۱۹۷۱ به مدار رفت). در این ایستگاه وضعیت بدن انسان در صورت اقامت طولانی در فضا بررسی شد. دانشمندان طرح اسکای لب مطالب بسیاری درباره‌ی شراره‌های خورشیدی آموختند که فوران‌های عظیم ماده و انرژی از خورشیدند که بر فضای اطراف زمین تأثیر می‌گذارد.

اخترشناسی در میر


ایستگاه فضایی میر مدولی به نام کوآنت - ۱ داشت که مخصوص بررسی کهکشان‌ها، اخترش‌ها و ستاره‌های نوترونی بود. طول این مدول حدود ۶ و عرض آن ۴ متر بود. یکی از تلسکوپ‌های سوار بر آن به رصد اجرام تابش‌کننده‌ی امواج فرابنفش در آسمان مشغول بود و تلسکوپ دیگر تابش‌های پرتو ایکس را آشکار می‌کرد. با این تلسکوپ‌ها می‌شد مدتی طولانی، بدون آن‌که کارهای دیگر در میر تحت تأثیر قرار بگیرد، رصد کرد.

ایستگاه میر



زیست‌رَف و انسان‌رَف

آزمایشگاه فضایی اسپیس لب در چند مأموریت، حامل زیست‌رَف، شامل گرم‌خانه‌هایی برای نگهداری صدها نمونه سلول و موجودات زنده‌ی ریز بود. دانشمندان به بررسی اثر ریزگرانش بر رشد و رفتار آن‌ها می‌پرداختند. رَف دیگری، به نام انسان‌رَف، شامل تجهیزاتی برای بررسی اثر ریزگرانش بر بدن انسان بود.




واحد آزمایشات بیورک در اسپیس لب

این پرواز اسپیس لب شامل یک مدول با فشار تنظیم شده و در بخش خارجی بود.

هر طبق خارجی نیروی الکتریکی و سامانه‌ی خنک‌کننده‌ی خود را داشت.

عرض طبق‌های خارجی ۳ متر بود و تا ۳ تن تجهیزات را حمل می‌کرد.




تلسکوپ
فروسرخ

ابزاری برای بررسی میدان مغناطیسی زمین.

بخش خارجی

برخی ابزارها، مانند تلسکوپ‌ها، برای رصد زمین یا تابش‌هایی در فضا باید خارج از آزمایشگاه قرار می‌گرفتند. این ابزارها را در طبق‌های خارجی جای می‌دادند. تجهیزات هدایت این ابزارها عموماً درون مدول‌های با فشار تنظیم شده قرار می‌گرفتند. وقتی آزمایشگاه فضایی فقط به صورت طبق بیرونی فرستاده می‌شد، این ابزارها را درون محفظه‌ای استوانه‌ای شکل در جلو نخستین طبق قرار می‌دادند.



طبق خارجی تک

شنون لوسید، فضانورد آمریکایی، در حال کار در میر



زیست‌شناسی در وضعیت ریزگرانش

زیست‌شناسان مایل‌اند بدانند که چه چیزی بر روش رشد تخمک‌های بارور شده اثر می‌گذارند. در سال ۱۹۹۶، شنون لوسید، فضانورد ناسا در میر، تخمک‌هایی را داخل گرم‌خانه‌ی میر قرار داد و هر روز آن‌هایی را که رشدشان متوقف شده بود، خارج می‌کرد. این تخمک‌ها با تخمک‌هایی در مرحله‌ی مشابه رشد روی زمین، مقایسه می‌شدند. تخمک‌ها در میر ناهنجاری‌های بیش‌تری داشتند که شاید به سبب تابش‌های محیط فضا بود و نه بی‌وزنی.

آزمایش ریزگرانش

- دانشمندان روسی به بررسی وضعیت قلب و ریه‌ها در اقامت بلندمدت در فضا پرداختند و در پی آن بودند که دریابند آیا آهنگ انجام شدن فرآیندهایی مانند عمل گوارش در بدن تغییر می‌کند یا خیر.
- فضانوردان میر، دانه‌های گندم را در فضا پرورش دادند تا دریابند آن‌ها در شرایط ریزگرانش چگونه رشد می‌کنند.
- آزمایش احتراق در وضعیت ریزگرانش، اطلاعاتی در اختیار دانشمندان روسی و آمریکایی گذاشت که به طراحی موتورهای جت کمک خواهد کرد.
- آزمایش‌های رشد بلور در میر و اسکای لب به محققان امکان داد راه‌های موثرتری را برای تولید نیمه‌رساناها برای رایانه‌ها امتحان کنند.



آزمایشگاه بین‌المللی ریزگرانش

در آزمایشگاه فضایی اسپیس لب، دو مأموریت طرح آزمایشگاه بین‌المللی ریزگرانش انجام شد. دانشمندان در سراسر دنیا آزمایش‌های ریزگرانش را برای وضعیت ریزگرانش طراحی کردند و فضانوردان شاتل و اسپیس لب آن‌ها را انجام دادند. این پروژه‌ها شامل کشف اثر ریزگرانش بر دستگاه عصبی انسان و بر رشد تخم میگو، جوانه‌ی عدس و باکتری بود. نتایج جهت تحلیل، برای دانشمندان روی زمین ارسال شد.

ایستگاه‌های فضایی		
نام	ملیت	سال پرتاب
سالیوت-۱	اتحاد جماهیر شوروی	۱۹۷۱
اسکای لب	ایالات متحده‌ی آمریکا	۱۹۷۳
اسپیس لب (آزمایشگاه همراه شاتل)	اروپا	۱۹۸۳
میر	روسیه	۱۹۸۶
ایستگاه فضایی بین‌المللی	بین‌المللی	۱۹۹۸

بیش‌تر بدانیم

شاتل فضایی ۷۴
زندگی در فضا ۷۸
ایستگاه فضایی بین‌المللی ۸۲

ایستگاه فضایی بین‌المللی

بخش‌های ایستگاه

ایستگاه فضایی بین‌المللی تکمیل شده، از بیش از ۱۰۰ بخش تشکیل می‌شود. بزرگ‌ترین بخش‌ها گره‌های اتصال، صفحه‌های خورشیدی، مدول سکونت، مدول بدون فشار تنظیم شده (بدون هوای مناسب) و دو آزمایشگاه، ساختمانی ایالات متحده، است. مدول مرکزی شامل اقامت‌گاه‌هایی برای چند سال ابتدایی است و روسیه آن را ساخته است. کانادا بازوی خودکار ایستگاه را ساخته است. دو گره اتصالی دیگر از اروپا آمده‌اند. بیش‌تر سازمان‌های فضایی مشارکت‌کننده، در حمل و نقل تجهیزات به ایستگاه نیز کمک می‌کنند.

ایستگاه فضایی بین‌المللی یکی از درخشان‌ترین اجسام در آسمان شب است که گاهی به درخشش سیاره‌ی زهره می‌رسد (دومین جرم پرنور آسمان شب پس از ماه).

ایستگاه فضایی بین‌المللی



وقتی ایستگاه فضایی بین‌المللی تکمیل شود، به اندازه‌ی یک زمین فوتبال خواهد شد.

صفحه‌های خورشیدی برای تامین توان الکتریکی مورد نیاز ایستگاه، انرژی خورشید را به برقی تبدیل می‌کنند.

ایالات متحده‌ی آمریکا و روسیه نخستین قطعات ایستگاه فضایی بین‌المللی (ISS) را در سال ۱۹۹۸ به مدار فرستادند. برزیل، کانادا، سازمان فضایی اروپا و ژاپن نیز بخش‌هایی از ایستگاه را اهدا کردند. برنامه چنین بود که تا سال ۲۰۰۴، ایستگاه کامل شود؛ اما به سبب بودجه‌ی عظیم مورد نیاز برای ساخت ایستگاه (بیش از ۷۰ میلیارد دلار) و توقف پروازهای شاتل (به دلیل حادثه‌ی کلمبیا) تا تابستان ۲۰۰۵ کار تکمیل ایستگاه فضایی به تعویق افتاد. وقتی ISS در دهه‌ی ۲۰۱۰ میلادی تکمیل شود، طول بال‌هایش به ۱۱۰ متر، طول ایستگاه به ۸۰ متر و وزنش به حدود ۵۰۰ تن می‌رسد. ایستگاه فضایی بین‌المللی همواره میزبان عده‌ای فضانورد موقت است. سه فضانورد نخستین بار در ژانویه‌ی سال ۲۰۰۰ به این ایستگاه سفر کردند. فضانوردانی از بسیاری از کشورها برنامه‌ی گسترده‌ای از انواع تحقیقات را در این ایستگاه انجام داده‌اند.

آزمایشگاه اروپایی



درون آزمایشگاه اروپایی

آزمایشگاه‌ها

ایستگاه فضایی بین‌المللی، مجموعه‌ای تحقیقاتی همراه با آزمایشگاه‌هایی است که ایالات متحده، روسیه، اروپا و ژاپن آن‌ها را مجهز کرده‌اند. دانشمندان در این آزمایشگاه‌ها مواد و سیالات را در وضعیت بی‌وزنی (ریزگرانش) بررسی می‌کنند. به علاوه، پیش‌رفت فن‌آوری و علوم زیستی را نیز زیر نظر می‌گیرند. ژاپن در حال تدارک سکوی خارجی است تا آزمایش‌هایی انجام دهد که باید به مدت طولانی در محیط فضا انجام شوند.

موتور سخت‌افزاری در مرکز پروازهای فضایی مارشال در آلاباما.




ترکیب سخت‌افزاری

فرآیند کنار هم آوردن تجهیزات برای یک ایستگاه فضایی را ترکیب سخت‌افزاری می‌نامند. بسیاری از خدمات نظیر کابل‌کشی برقی، که مدول‌های گوناگون ایستگاه لازم داشتند، زمانی که مدول‌ها هنوز روی زمین بودند به دست مهندسان نصب شدند. رف‌های آزمایشگاهی و دیگر تجهیزات علمی برای آزمایشگاه‌ها در مدار نصب شدند. یکی از بخش‌های بسیار مهم ساخته‌شده‌ی روی زمین، که شاتل فضایی با خود به مدار برد، دستگاه تغذیه‌ی الکتریکی بود. مدیر گروه سازنده‌ی این ابزار، شهریار صقری، مهندس برق ایرانی همکار ناسا بود.

سکونت‌گاه

با آن‌که ارسال مدول ۸ متری سکونت‌گاه به ایستگاه فضایی، به سبب مشکلات گوناگون لغو شد، با تکمیل بخش‌های دیگر ایستگاه ظرفیت آن به بیش از سه نفر خواهد رسید. ایستگاه با جایگاهی برای خواب، دست‌شویی، آشپزخانه، حمام و تجهیزات پزشکی (که برخی از آن‌ها اکنون نیز برای استفاده ۳ نفر وجود دارد) اقامت‌گاه مناسبی در فضا خواهد بود.



سالن ورزش ایستگاه

فضانوردان دور میز در حال استراحت‌اند.

طبقه‌ی بالا


تحقیقات در ISS

دانشمندان مایل‌اند از وضعیت ریزگرانش در ISS برای بررسی چگونگی تأثیر گرانش بر بسیاری از فرآیندها استفاده کنند. شکل شعله‌ای در فضا مثال خوبی از تأثیر وضعیت ریزگرانش است. شعله‌ی تصویر سمت راست در مقایسه با تصویر شعله‌ی روی زمین غیرعادی به نظر می‌رسد؛ زیرا بی‌وزنی موجب کاهش جریان‌های هم‌رفتی، (جریان‌هایی که سبب بالا رفتن هوای گرم و پایین آمدن هوای سرد می‌شوند)، شده است.




سرمه کردن ایستگاه فضایی

برای سرمه کردن قطعات ایستگاه فضایی، شاتل فضایی و دو نوع موشک پرتون، ۴۵ پرواز انجام خوانند داد. ابتدا تجهیزات خودکار، بخش‌های متفاوت را به هم متصل می‌کنند و سپس فضانوردان با دست، تنظیمات نهایی را انجام می‌دهند. طی سال‌های انجام شدن عملیات مونتاژ، فضانوردان جمعاً ۸۵۰ ساعت راه‌پیمایی فضایی انجام می‌دهند. دوربینی که از راه دور هدایت می‌شود، اطراف ایستگاه پرسه می‌زند و به دنبال ایرادهایی در مونتاژ می‌گردد.



فضانوردان در مخزن آب بزرگی روی زمین، وضعیت بی‌وزنی را شبیه‌سازی و روش‌های مونتاژ را تمرین می‌کنند.

نام بخش / مرحله	هدف	سال پرتاب
زاریا	هدایت ایستگاه، منبع ابتدایی مواد پیش‌ران / نیرو	۱۹۹۸
یونیتی	گره‌های اتصال زاریا به ISS	۱۹۹۸
هستدئ روسی	اقامت‌گاه‌ها، هدایت	۱۹۹۹
تراس	سازه خارجی	۱۹۹۹
صفحه‌های خورشیدی	تولیدکننده انرژی	۱۹۹۹
نخستین خدمه	آغاز اقامت موقت انسان در ISS	۲۰۰۰
آزمایشگاه	تحقیقات	۲۰۰۰
بازوی خودکار	کمک به سرمه کردن ایستگاه	۲۰۰۰
دریچه خروجی (AI-LOCK)	راه‌پیمایی فضایی را بدون نیاز به شاتل فضایی امکان‌پذیر می‌کند	۲۰۰۰



طرحی از ایستگاه فضایی کامل شده، اتاق‌های کار و سکونت در ایستگاه، به اندازه‌ی فضای مسافران در دو هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ است.

صفحه‌های حرارتی یا باتتاب نور خورشید بر بخش‌های گوناگون ایستگاه، به تعدیل تفاوت دمای شدید بخش‌های در سایه و در نور می‌پردازند.

مساحت صفحه‌های خورشیدی ایستگاه فضایی کامل شده ۴ هزار متر مربع است.

توان الکتریکی ایستگاه فضایی بین‌المللی، که صرف تحقیقات می‌شود، ۶۰ برابر میر است.

بخش تراس مانند اسکلت ISS عمل می‌کند.

سکوی خارجی آزمایش‌ها، متعلق به ژاپنی‌ها، به ایستگاه متصل شده است.


آزمایشگاه اروپایی

آزمایشگاه آمریکایی تحقیقات عمومی

فضایماهای حامل تجهیزات به ISS متصل می‌شوند.

لباس فضانوردی

ناسا لباس‌های فضانوردی پیشین خود را برای استفاده در راه‌پیمایی‌های فضایی سرنشینان ایستگاه فضایی اصلاح کرد. لباس‌های فضانوردی خدمه‌ی شاتل فضایی معمولاً بین پروازها تعمیر می‌شود و برای استفاده‌ی فضانورد بعدی تغییراتی پیدا می‌کند. البته لباس فضایی ایستگاه درون خود ISS برای اندازه‌های متفاوت تنظیم می‌شود. این لباس‌ها، پیش از این که برای تعمیر به زمین بازگردند، در ۲۵ راه‌پیمایی فضایی مورد استفاده قرار می‌گیرند.



گره‌های ایستگاه فضایی

وقتی ایستگاه فضایی بین‌المللی کامل شود، سه گره یا بخش اتصال‌دهنده خواهد داشت که نقاط لگرا نداشتن هستند و بخش‌های متفاوت ایستگاه فضایی را به هم متصل می‌کنند. نخستین گره، یونیتی ۱، در سال ۱۹۹۸ پرتاب شد. این گره شامل ۲۱۶ خط انتقال مایعات و گازها به مدول‌های گوناگون و ۱۲۱ کابل برق است.

پیش‌تر بدانیم

پرتاب‌گرهای فضایی ۴۸
زندگی در فضا ۷۸
شاتل فضایی ۷۴
علم در فضا ۸۰

فضاپیمای مدار آینه

ستاره‌ی ماجراجو (X-33)


شکل مبتکرانه‌ی گوه‌مانند به طرح ستاره‌ی ماجراجوی ناسا، X-33، ظاهری متفاوت بخشیده است. اما به پرواز آن نیز کمک می‌کند. این فضاپیما به صورت عمودی از روی زمین بلند می‌شود. ولی در ضمن فرود، مانند هواپیما، سر می‌خورد و به زمین می‌نشیند. این طرح، که در سال ۲۰۰۱ لغو شد، نمونه‌ای ابتدایی از فضاپیماهای SSTO بود. مشکل اصلی در فضاپیماهای تک‌مرحله‌ای، گنجایش کم برای ساخت و نیاز به کاهش وزن است. فقط ۱۰ درصد وزن فضاپیما باید مربوط به خود آن باشد و ۹۰ درصد دیگر وزن سوخت است. در غیر این صورت باید مانند موشک‌های چندمرحله‌ای، مخزن‌های خالی شده و تکه‌های اضافه در راه از آن جدا شوند یا مثل شاتل با موشک‌های جانبی و جداشونده‌ای بالا برود.

رفتن به فضا پُرهزینه است. معمولاً برای هر یک کیلوگرم باری که حمل می‌شود، بیش از ۲۰ هزار دلار (حدود ۲۰ میلیون تومان) هزینه می‌شود. وقتی از یک موشک چندمرحله‌ای برای رسیدن به مدار استفاده می‌شود، سرمایه‌ی عظیمی به هدر می‌رود؛ زیرا بخش بزرگی از فضاپیما عملاً از بین می‌رود. یکی از راه‌های کاهش هزینه، استفاده از فضاپیماهایی است که طی یک مرحله به مدار می‌رسند. به این فضاپیماها SSTO یا فضاپیماهای تک‌مرحله‌ای می‌گویند. با آن‌که چنین طرحی هنوز عملی نشده است، فن‌آوری‌های جدیدی مانند مواد سبک و مقاوم و موتورهای با طراحی جدید، فضاپیماهای تک‌مرحله‌ای را به واقعیت تبدیل خواهند کرد. طرح فضاپیماهای X-33 و X-34 در سال‌های اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰ آزمایش‌های بسیاری را از سر گذراند؛ اما طراحان ناسا به سبب مشکلاتی در سوخت آن‌ها و کمبود بودجه‌ی لازم، این طرح را در سال ۲۰۰۱ لغو کردند. با وجود این، طرح‌های مشابهی در ایالات متحده، اروپا و ژاپن بر این پایه آغاز شده است.

بال‌های کوتاه

موتور آیروسپایک

گازهای احتراق از لوله‌های ریز خارج می‌شوند.



گازها، با جریان یافتن در امتداد سطح صلب، مقاوم و بارسانی بدنه‌ی موتور، نیروی پیش‌ران رو به بالایی وارد می‌کنند.

فشار هوا گازهای احتراق را محبوس به حرکت در امتداد بدنه‌ی موتور می‌کند.

طرح‌هایی مانند ستاره‌ی ماجراجو به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به سرعت‌های ۱۳ تا ۱۵ ماخ برسند.



پرواز آزمایشی X-34



فن‌آوری X-34، پلی بین DC-XA و ستاره‌ی ماجراجو (X-33) است.

X-34 با چرخ فرود می‌آید.

طرح X-34

در سال ۱۹۹۹، X-34 شروع به آزمایش مواد سبک، حفاظت حرارتی و سامانه‌های فرود لازم برای فضاپیماهای SSTO کرد. این موشک، در مقایسه با ستاره‌ی ماجراجو (X-33)، کوچک است و طوری طراحی شده که در هوا از زیر یک هواپیما به مدار پرتاب شود. ۲۷ پرواز آزمایشی برای آن برنامه‌ریزی شده بود تا سرعت ۸ برابر سرعت صوت (۸ ماخ) نیز آزمایش شود اما این طرح نیز در سال ۲۰۰۱ لغو و تمام اطلاعات آن بایگانی شد تا در آینده، در اختیار طراحان دیگری قرار بگیرد.

کلپر گراهام (DC-XA)

کلپر گراهام آزمایشی برای فن‌آوری فضاپیماهای آینده بود. این فضاپیما از مواد ترکیبی (کامپوزیت) سبک و پیش‌رفته ساخته شده بود و در برابر دماها و فشارهایی، که یک فضاپیماهای SSTO با آن مواجه می‌شود، مقاومت می‌کرد. این فضاپیما در سال ۱۹۹۶، پس از چهار پرواز، بر اثر تصادفی از بین رفت. این طرح با نام جدید BLUE ORIGIN (منشأ آبی) ادامه می‌یابد و طراحان امیدوارند به مبنایی برای مهندسی و مریخ‌نشین‌های سرشنین‌دار آینده تبدیل شود.




DC-XA فضاپیما
آزمایشی زیر
صوتی بود



کلپر گراهام (DC-XA)

طرح رایج موتور موشک

اکسیژن مایع هیدروژن مایع





گازهای اکزوز در حال فرار نیروی پیش‌ران را فراهم می‌کنند

امید ژاپنی

مهندسان ژاپنی هواپیمای مداری H-II (HOPE) به معنی امید را برای حمل تجهیزات به ایستگاه فضایی بین‌المللی و بازگرداندن بار به زمین طراحی کردند. نخستین پرواز آزمایشی آن در سال ۱۹۹۹ انجام شد و این طرح با نام HTV دنبال می‌شود. ژاپن طرحی به نام کانکومارو (KANKOH-MARU) را نیز پیش می‌برد که موشکی مخروطی شکل برای رساندن فضاوردان و گردش گران فضایی به مدارهای پایین است.

فضاپیمای ژاپنی‌ها



سامانه‌ی حفاظت حرارتی بادوام

موتورهای آبروسپایک برای همی ارتفاعات طراحی شده است.

مواد کامپوزیت سبک و پیشرفته باعث می‌شوند که طرح‌های مشابه X-۳۳ راحت‌تر به سوی مدار بلند شوند

بدنه‌ی گوه‌مانند فضاپیما موجب صعودی آیرودینامیک می‌شود.

پیشرفت‌های تاریخی

هوایی ایالات متحده آموختند، به آن‌ها کمک کرد در دهه‌ی ۱۹۷۰ شاتل فضایی را طراحی کنند.

در سال ۲۰۰۴، فضاپیماهای خصوصی فضا ناو ۱ (SPACE SHIP ۱) چند پرواز با یک سرنشین به مدارهای حدود ۱۰۰ کیلومتری زمین انجام داد و آغازکننده‌ی پروازهای موفقیت‌آمیز فضاپیماهای خصوصی و تجاری به فضا شد.

در سال ۱۹۴۴، اویگن زانگر (۱۹۶۴-۱۹۵۵) پیشنهاد فضاپیما را مطرح کرد که با موشک به سوی مدار پرتاب شود و سپس مانند هواپیما روی زمین فرود آید.

نخستین فضاپیما طرح آینده‌ی ایالات متحده که آزمایش شد، X-۱۵ بود. این فضاپیما از سال ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۸، ۹۹ بار پرواز کرد و به سرعت ۶/۷ ماخ رسید.

درس‌هایی که مهندسان ناسا از X-۱۵ و برنامه‌های دایناسور (X-۲۰۸) نیروی

روتون

یکی از پیشنهادهای عالی برای سبک کردن کافی موشک‌ها برای پرتاب فضاپیما تک‌مرحله‌ای، طراحی آن بدون تجهیزات سنگین پمپ مواد پیش‌ران به داخل موتور است. در طرح موشک روتون (ROTON) دستگاهی روی سکوی پرتاب، موتورهای آن را با چنان دوری می‌چرخاند که مواد پیش‌ران به داخل اتاقک‌های احتراق کشیده می‌شوند. دور موتور کم‌اکان تا لایه‌های بالایی جو چنان قوی است که احتراق ادامه می‌یابد. همچنین برای حفظ ثبات حین ورود به جو و برای فرودی آرام، پره‌هایی مانند پره‌های هلی‌کوپتر، باز می‌شوند. با وجود موفقیت پروازهای آزمایشی روتون، این طرح به سبب کمبود بودجه در سال ۲۰۰۰ متوقف شد. اما فن‌آوری آن احتمالاً ادامه می‌یابد.



فضاپیمای SSTO پره‌دار پیشنهادی

پرواز آزمایشی موتور آبروسپایک



کارایی فضاپیماها

بیش‌تر وقت‌ها، کارایی موتورهای موشک قدیمی مطلوب نیست. یکی از دلایل این است که شکل لوله‌ی آگزوز، که گازهای اضافی را از موتور خارج می‌کند، تغییری نمی‌کند. در موتورهای رایج، قیف آگزوز چنان بزرگ و البته سنگین است که سبب خروج شدید و پُرفشار گازهای احتراق و تولید نیروی پیش‌ران شود. اما در سطح زمین و لایه‌های پایین، وزن این بخش و مقاومت فشار هوا در برابر گاز خروجی، ۲۵ تا ۳۰ درصد از بازده مطلوب می‌کاهد. این نوع قیف بزرگ برای

ارتفاعات بالا در وزن و فشار کم مناسب است. در موتورهای آبروسپایک (هواسوزنی)

قیف بزرگ وجود ندارد. موتور سبک‌تر و کوچک‌تر و گوه‌مانند است. مجموعه‌ای آگزوز ریز (سوزنی) در بالای گوه‌ی موتور، گاز احتراق را بیرون می‌دهند. این گاز به سبب فشار هوا، در امتداد دیواره‌ی منحنی موتور حرکت می‌کند. دیواره‌ی موتور از یک سو و فشار هوا از سوی دیگر، قیف فرضی آگزوز را برای موتور فراهم می‌آورند. در کنار بازده مطلوب این موتور، مشکلاتی مانند گرمای بیش از حدی که به آن وارد می‌شود و نیاز به سردکننده‌ی قوی، وجود دارد.

پیش‌تر بدانیم

پرتابگرهای فضایی ۴۸
ایستگاه فضایی بین‌المللی ۸۲
شاتل فضایی ۷۴
سفر میان‌سیاره‌ای ۸۸

نسل جدید موشک‌های چند مرحله‌ای




با آن‌که فضاییماهای تک‌مرحله‌ای، آینده‌ی سفرهای فضایی را رقم می‌زنند، طرح‌های نو و آزمون و خطاهای مورد نیاز، آن‌چنان پُرهزینه است که فعلاً بسیاری از سازمان‌های فضایی راه اقتصادی سفرهای مداری کم‌هزینه‌تر را برگزیده‌اند: تولید انبوه پرتاب‌گرهای چندمرحله‌ای برای کاهش هزینه‌ی ساخت که اغلب بخش‌های آن‌ها یک‌بار مصرف است. تکه‌ها در مسیر صعود جدا می‌شوند و در اقیانوس سقوط می‌کنند. ناسا و سازمان فضایی اروپا نیز پرتاب‌گرهای چندمرحله‌ای جدیدی را طراحی کرده‌اند که محموله و خدمه را به ایستگاه فضایی و در آینده به ماه برسانند.

جانشین شاتل فضایی

آرس (ARES) طرح ناسا برای جای‌گزینی شاتل فضایی است. موشک آرس ۱، که در دهه‌ی ۲۰۱۰ میلادی آماده می‌شود، خدمه را داخل فضاییمای کوچک اوریون در رأس موشک به مدار می‌رساند. این فضاییما، که طرح آن نخست با نام CEV مطرح شد، در دهه‌ی ۲۰۲۰ میلادی برای سفرهای سرنشین‌دار ناسا به ماه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. موشک غول‌پیکر آرس ۵ (به طول ۱۰۹ متر) نیز در دهه‌ی آینده‌ی میلادی

فضاییمای باربری به ایستگاه فضایی است. این موشک می‌تواند تا ۱۸۸ تن بار به مدارهای پایین و ۷۱ تن بار به ماه ببرد. ظرفیت حمل بار این موشک تا ۶ بار بیش‌تر از فضاییماهای باربر امروز است. هم‌چنین فضاییمای نقل و انتقال خودکار یا ATV طرح سازمان فضایی اروپا برای رساندن محموله به ایستگاه فضایی و جای‌گزین کپسول‌های کوچک و قدیمی پروگرس روسیه است. این فضاییماهای بی‌سرنشین، سوار بر موشک‌های آریان ۵ به مدار می‌روند. نخستین پرواز این طرح، که ژول ورن نام گرفته است، در مارس سال ۲۰۰۸ انجام شد. ژاپن نیز وسیله‌ی مشابه پیش‌رفته‌تری به نام HTV طراحی می‌کند و سازمان‌های دیگری نیز در حال طراحی وسایل حمل و نقل بازرگانی و گردش‌گری به ایستگاه فضایی هستند.

طرحی گرافیکی از خروج موشک عظیم آرس ۵ از جو زمین که در دهه‌ی ۲۰۱۰ میلادی انجام می‌شود.






طرح‌هایی مانند فشانو یک شامل فضاییایی بسیار کوچک و سبک است که سوار بر هواپیمایی کوچک به ارتفاعات بالای جو می‌رود و از آنجا به مرزهای فضا در ارتفاع بالای صد کیلومتری زمین نفوذ می‌کند. این طرح‌ها راهی برای سفرهای کم‌هزینه و کوتاه مدت گردش‌گران فضایی به مدار زمین است.


گردش‌گری فضایی

زمانی که سفر به فضا به حد کافی آسان و کم‌هزینه شود، بسیاری که رؤیای چنین سفری را همیشه در ذهن می‌پروراندند، سوار بر فضاییماهای تجاری به ورای جو زمین می‌روند. سفرهای غیر تخصصی به فضا با چند سفر کوتاه در دوره‌ی ایستگاه فضایی میر شروع شد. سپس در سال ۲۰۰۱، نخستین گردش‌گر فضایی، دنیس تیتو، با پرداخت ۲۰ میلیون دلار حدود یک هفته در ایستگاه فضایی بود. چهارمین گردش‌گر فضایی، اوشه انصاری (ایرانی مقیم ایالات متحده)، علاوه بر تحقق رؤیای خود برای سفر به فضا، به توسعه‌ی صنعت گردش‌گری فضایی پرداخت. علاوه بر برنامه‌ریزی برای ساخت بندرگاه‌های فضایی خصوصی، او و خانواده‌ی انصاری، جایزه‌ی بزرگ انصاری ایکس پرایز را بنیان گذاشتند که انگیزه‌ای قوی برای رشد پروازهای فضایی خصوصی شد. در سال ۲۰۰۴، این جایزه به پرواز فضاییای ابتکاری به نام فشانو ۱ (SPACE SHIP ۱) تعلق گرفت که گروه سازنده فضاییای تک‌سرنشین را با باری به وزن سه نفر، طی ۲ هفته دوبار به ارتفاع ۱۰۰ کیلومتری ببرند. این فضاییای هواپیمایمانند، به کمک هواپیمایی به نام شوالیه‌ی سفید تا ارتفاع بلندی می‌رفت و سپس به سوی فضا رها می‌شد. پس از چند پرواز زیرمداری

تا ارتفاع ۱۱۲ کیلومتری، «فشانو ۱» در موزه جای گرفت و اکنون طراحان آن فشانو دیگری می‌سازند تا ۵ فروند از آن‌ها در دهه‌ی آینده‌ی میلادی سفرهای چند دقیقه‌ای تا چند ساعته‌ی گردش‌گران را به ارتفاعات زیرمداری امکان‌پذیر سازند. این طراحان، طرح فضاییماهای زیرمداری و موشک‌مانند فالکون (FALCON) را نیز پیش می‌برند. در رقابت بزرگ شرکت‌های خصوصی برای سفر به فضا، شرکت‌های هتل‌داری بزرگ، مانند هلتون و بایگلو نیز، در فکر ساخت هتل‌هایی در مدارند. بایگلو مدارگرهای ابتدایی بادشونده‌ای به نام جنسیس به مدار می‌فرستد تا احتمالاً در دهه‌ی آینده‌ی میلادی، نمونه‌ی واقعی این هتل‌های کوچک فضایی آماده شود. با چنین توسعه‌ای، در دهه‌ی آینده هزینه‌های میلیون دلاری گردش در فضا برای بسیاری به رقمی قابل پرداخت تبدیل خواهد شد. در سال‌های بسیار دورتر، ایستگاه‌های فضایی تجاری بزرگ میزبان فضاگردان خواهند بود. نمونه‌ی آن طرح هتلی در مدار ۱۲۰۰ کیلومتری است که با ساختار بندهمانندی به طول حدود هزار کیلومتر به بندرگاه فضایی در مدار ۲۵۰ کیلومتری متصل است. فضاگردان پس از سفر به این بندرگاه، از طریق آسانسور فضایی درون بند اتصال به هتل «پرستاره»ی خود می‌رسند.



نخستین پرواز فضاییای باربری ATV اروپا که به نام ژول ورن نام‌گذاری شد (سال ۲۰۰۸ میلادی). این تصویر را فضاگردان ایستگاه فضایی در حین رسیدن ژول ورن گرفته‌اند.



طرح خیالی از هتل‌های فضایی آینده در مدار زمین

سفر میان سیاره‌ای

در مقایسه با مدارهای اطراف زمین، سیاره‌ها بسیار دورند. فضاپیمایی که با سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت (سرعت عادی خودرویی در بزرگراه‌های شهری) حرکت کند تا مریخ ۶۰ سال در راه خواهد بود. خوش‌بختانه موشک‌ها بسیار سریع‌تر از این حرکت می‌کنند. کاوش‌گرهای وِیجر با سرعت ۵۲ هزار کیلومتر بر ساعت زمین را ترک کردند. اما حتی با این سرعت‌ها هم سفر به سیاره‌ها، ماه‌ها یا سال‌ها طول می‌کشد. در نتیجه، با آن‌که کاوش‌گرهای بی‌سرنشین به سراسر منظومه سفر کرده‌اند، انسان فقط تا ماه پیش رفته است. دانشمندان علوم فضایی از کاوش‌گرهای امروزی برای آزمایش فناوری‌های ضروری جهت سفرهای میان سیاره‌ای آینده استفاده می‌کنند. آن‌ها چگونگی پرورش دادن دانه‌های گیاهی در فضا و زندگی طولانی با منابع محدود را نیز بررسی می‌کنند. این کار به خودکفا شدن مسافران میان‌سیاره‌ای کمک می‌کند. چیزی که برای سپری کردن چند سال در فضا لازم است.

دیپ اسپیس - ۱

سری جدیدی از فضاپیماهای کوچک ناسا، به نام کاوش‌گرهای دیپ اسپیس (اعماق فضا)، مشغول آزمایش فناوری‌هایی هستند که پیش از این از آن‌ها در فضا استفاده نشده بود. نخستین آن‌ها، دیپ - اسپیس - ۱ (DS-1)، در سال ۱۹۹۸ پرتاب شد. این فضاپیما به کمک دستگاه جهت‌یابی خودکار، خود را از روی ستاره‌های دوردست هدایت کرد و یک سال بعد به سیارک بریلی یا KD1۹۹۲ رسید و در سال ۲۰۰۱ از کنار دنباله‌دار بوریلی گذشت. این فضاپیما سلول‌های خورشیدی مؤثرتری داشت و نوع جدیدی از موتورهای پیش‌ران به نام موتور یونی را آزمایش کرد.

دیپ اسپیس - ۱ برای رسیدن به سیارک هدف، ۱۸۸ میلیون کیلومتر راه طی کرد.

ترک زمین

فضاپیمای میان‌سیاره‌ای ابتدا در مداری به دور زمین قرار می‌گیرد. هدایت‌کنندگان مأموریت، موشک‌هایی را روشن می‌کنند که سبب می‌شود کاوش‌گر مدار زمین را ترک کند و وارد مداری به دور خورشید شود. مدار خورشیدی فضاپیما چنان دقیق محاسبه می‌شود که حتماً از مدار سیاره‌ی هدف بگذرد. هدایت‌کنندگان مأموریت، زمان پرتاب کاوش‌گر به مدار خورشیدی را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که فضاپیما و سیاره‌ی هدف در یک زمان به یک نقطه برسند. این مسیر با توجه به حرکت سیاره و فضاپیما در مدار به جای خطی مستقیم، منحنی است. زمان پرتاب کاوش‌گر نیز به مکان زمین و سیاره‌ی مقصد در مدارشان به دور خورشید بستگی دارد تا کوتاه‌ترین راه طی شود.

خورشید


عطارد

زهره

زمین

مریخ

منظومه شمسی



فضاپیمای ماریمر ۱۰ از گرانش زهره استفاده کرد تا به مداری به دور خورشید وارد شود که هر ۱۷۶ روز آن را نزدیک عطارد می‌برد.

برای این‌که فضاپیمایی به سیاره‌های عطارد و زهره برسد، باید در خلاف جهت حرکت زمین شتاب بگیرد.

پیش‌ران یونی


یون، همان اتم باردار است. داخل موتور یونی، گازی شامل یون‌ها به درون توری باردار یا میدان مغناطیسی نیرومندی کشیده و با سرعت بسیار خارج می‌شود. این پرتاب ذرات، فضاپیما را در جهت مخالف هل می‌دهد. فضاپیمایی با موتور یونی، به سرعتی ۱۰ برابر سرعت وِیجر می‌رسد. البته چون به مرور شتاب می‌گیرد، ممکن است چند ماه طول بکشد تا به این سرعت برسد. اما در عوض سوختی که با خود می‌برد، بسیار سبک‌تر، کوچک‌تر، کم‌هزینه‌تر و ایمن‌تر است. پس از موفقیت دیپ اسپیس - ۱ فضاپیماهای پیش‌تری با موتور یونی به کاوش منظومه‌ی شمسی می‌پردازند.

دیپ اسپیس ۱

دستگاه جهت‌یابی خودکار فضاپیمای دیپ اسپیس - ۱ را تا فاصله‌ی کمتر از ۱۰ کیلومتری سیارک KD ۱۹۹۲ هدایت کرد.

دیپ اسپیس - ۱ یکی از نزدیک‌ترین گذرها از کنار یک جسم فضایی را انجام داد.

موتور یونی



اورانوس

وقتی کاوش‌گری به سیاره‌ای می‌رسد، گرانش سیاره آن را به دام می‌اندازد. موشک‌های کمکی روشن می‌شوند تا کاوش‌گر را وارد مدار کنند. در سفرهای کم‌هزینه‌تر، فضاپیما از اصطکاک حاصل از ورود به لایه‌های بالایی جو سیاره نیز کمک می‌گیرد تا مدار خود را تصحیح کند.

خطرهای سفر میان سیاره‌ای

جو زمین و میدان مغناطیسی آن، انسان‌ها و تجهیزات الکترونیک را از آسیب تابش‌ها و ذرات پُرانرژی کیهان محفوظ می‌دارد. بنابراین، مهم است که دانشمندان علوم فضایی سپری مؤثر را به اندازه‌ی حفاظت طبیعی زمین، برای مأموریت‌های سرشنین‌دار آینده به سیاره‌های دیگر پیدا کنند. فضاپیماها باید در برابر برخورد ریزشهاب‌واره‌ها هم مقاوم باشند. امکان دارد این اجسام سوراخ‌هایی در بدنه‌ی فضاپیما ایجاد کنند و موجب کشته شدن یا آسیب دیدن فضانوردان شوند. همچنین باید با تحقیقات بیش‌تر، راه حل مشکلات جدی اقامت طولانی در فضا، مانند کاهش کلسیم و پوکی استخوان یا تغییر فشار خون و کاهش گلبول‌های سفید و مشکلات روان‌شناختی شناخته شود.

زیست‌کره - ۲ آریزونا



دانشمندان با اکوسیستم‌های درون زیست‌کره - ۲، که مانند اقامتگاهی فضایی از محیط اطرافش کاملاً مجزا شده بود، آزمایش انجام می‌دادند.

روان‌شناسی و کاوش فضا

اگر قرار است که اجتماع انسان در فضا به موفقیت برسد، روان‌شناسان باید دریاهای چگونگی تقابل افراد در گروه‌های کوچک، زمانی که از همه چیز و همه کس جدا می‌شوند، بیش‌تر بدانند از نظر افرادی که در پروژه‌ی زیست‌کره - ۲ در سال ۱۹۹۱ شرکت داشتند، این انزوا بسیار مشکل بود. اعضای طرح زیست‌کره از کاوش گران فضایی خوش‌اقبال‌تر بودند؛ زیرا می‌توانستند سرانجام انزوا را بشکنند و بیرون بروند. اما چنین انتخابی برای مستعمره نشین‌های فضایی وجود ندارد.

برای اینکه فضاپیماهای به مریخ و سیاره‌های بعدی برسد، باید در جهت یکسان یا جهت گردش زمین به دور خورشید شتاب بگیرد.


فضانوردان ایستگاه فضایی میر موفق شدند در فضا لوبیا بکارند.



کشاورزی در فضا

در ایستگاه فضایی میر، دانشمندان تلاشی ابتدایی برای پرورش گیاهان کردند و آزمایش‌هایی نیز در ایستگاه فضایی بین‌المللی انجام شده است. جامعه‌ی انسان در فضا یا به اصطلاح، فضانشینان، باید بیش از این‌ها کشت و کار کند. گیاهان زیر کشت برای فضانشینان بسیار حیاتی‌اند؛ زیرا نه تنها اکسیژن برای تنفس تولید می‌کنند، غذای انسان‌ها و حیوان‌های اهلی را هم فراهم می‌آورند. گیاهان هم مهم‌اند؛ زیرا گیاهان سبز سلامت ذهن را افزایش می‌دهند و به انسان برای برخورد با تنش‌ها و نگرانی‌ها کمک می‌کنند.

پلوتون



دوراندیشان فضا

• ژول ورن (۱۸۲۸-۱۹۰۵) نخستین نویسنده‌ای بود که به‌گونه‌ای داستان می‌نوشت که گویی سفر به فضا واقعیتی امکان‌پذیر بوده است؛ در حالی که نیم قرن پس از درگذشت او عصر فضا آغاز شد.

• ه. گ. ولز (۱۸۶۶-۱۹۴۶) در کتاب خود، جنگ دنیاها، موجوداتی را تصویر کرده است که از مریخ به زمین حمله می‌کنند.

• در بیش‌تر کتاب‌های آرتور سی. کلارک، به سفرهای میان‌سیاره‌ای پرداخته شده است. در کتاب نغمه‌های زمین دور دست (که در ایران به نام عملیات آخر؛ تالاسا نیز منتشر شده است)، انسان‌ها سال‌هاست که زمین را ترک کرده‌اند.

• جین رادنبری (۱۹۲۱-۱۹۹۱)، خالق مجموعه‌ی تلویزیونی پیش‌تازان فضا (STARTREK)، فراتر از سفرهای میان‌سیاره‌ای را می‌دید و سفرهای معمول میان ستاره‌ها را تصویر می‌کرد.

سفر به مریخ

پس از سفر به ماه، گام بعدی انسان سفر به مریخ است که در دهه‌ی سوم تا پنجم سده‌ی بیست و یکم میلادی انجام خواهد شد. تا آن زمان، فضاپیماهای بی‌سرنشین بسیاری به مریخ می‌روند و در دهه‌ی آینده میلادی، فضاپیماهایی پس از سفر به این سیاره به زمین باز می‌گردند. سفر آینده‌ی انسان به مریخ سفری ۲/۵ تا ۳ ساله خواهد بود. چند ماه برای رفت و چند ماه برای برگشت و حدود ۲ سال نیز باید در مریخ منتظر ماند تا موقعیت مداری مریخ و زمین دوباره به گونه‌ای شود که فضاپیما کوتاه‌ترین راه را طی کند. اگر مسافران مریخ نتوانند سوخت مورد نیاز خود را روی مریخ تأمین کنند، هرگز نمی‌توانند به زمین بازگردند. یک پیشنهاد برای رسیدن به این هدف، فرستادن نیروگاه کوچک تولید سوخت همراه فضاپیما به مریخ است. در این نیروگاه، دی‌اکسید کربن از جو مریخ با هیدروژن برده شده از زمین ترکیب می‌شود و آب و متان تولید می‌کند. آب به هیدروژن و اکسیژن می‌شکند. سپس می‌توان از متان و اکسیژن به جای سوخت و اکسیدکننده برای بازگشت استفاده کرد. راه دیگر، استفاده از منابع یخ‌آب در مریخ است. مقادیر عظیم یخ‌آب در زیر لایه‌های سطحی مریخ شناسایی شده است. اگر چنین منبعی در دسترس فضانوردان باشد، سوخت و احتمالاً آب مورد نیاز برای نوشیدن و شستن فراهم خواهد شد.



تصویرسازی یک هنرمند از تولید سوخت

فضاپیما با شش سرنشین برای بازگشت به زمین به چند تن اکسیژن و متان از جو یا منابع یخ‌آب مریخ نیاز دارد تا پیش‌بران کاهی برای بلند شدن از سطح تولید شود.

بیش‌تر بدانیم

علم در فضا ۸۰

ایستگاه فضایی بین‌المللی ۸۲

ناوهای فضایی آینده: سفر به ستاره‌ها ۹۰

ناوهای فضایی آینده: سفر به ستاره‌ها

محدودیت‌های ماده‌ی پیش‌ران

موشک‌ها باید تمام سوخت و اکسیدکننده‌ها را با خود حمل کنند. تفاوتی ندارد که موشک چقدر کارآمد باشد، به هر حال، مقدار کافی ماده‌ی پیش‌ران برای سفرهای میان‌ستاره‌ای غیرممکن است. ناسا تخمین زده است که حتی موتور یونی با مصرف سوختی بسیار کم، که به ۱۰ برابر سرعت ویجر ۲ می‌رسد، برای رسیدن به آلفا - قنطورس در عرض یک قرن به ۱۵۰۰ اترانکر ماده‌ی پیش‌ران احتیاج دارد. این موضوع حتی برای موتورهای هسته‌ای نیز همین اندازه دور از دسترس است.



ایرئانکر

ویجر ۲

پیش‌رانش لیزری

لیزر نیاز به ماده‌ی پیش‌ران را برطرف می‌کند. رابرت فوروارد (۲۰۰۲ - ۱۹۳۲)، دانشمند آمریکایی، نخستین کسی بود که ساخت فضاپیماهایی با پیش‌رانش لیزری را پیشنهاد کرد. یکی از پیشنهادهای او، پرباب فضاپیمايي حامل لیزر به مدار زمین بود. پرنو لیزر به بادبان‌هایی متصل به کاوش‌گر ستاره‌ای می‌تابد. فشار ناشی از پرتو قدرت‌مند لیزر، فضاپیما را به جلو می‌راند و به مرور سرعت آن را به ۲۰ درصد سرعت نور می‌رساند.



کاوش‌گر ستاره‌ای پیشنهادی فوروارد

محدودیت‌های سرعت

در سال ۱۹۰۵، آلبرت اینشتین نخستین نظریه‌ی بزرگ خود، نظریه‌ی نسبیت خاص، را منتشر کرد. این نظریه نشان می‌دهد که سفر با سرعت نور غیرممکن است. مثلاً هرچه جسمی سریع‌تر حرکت کند، سنگین‌تر می‌شود. پس جرم فضاپیمايي که با سرعت نور حرکت کند، بی‌نهایت می‌شود. در نظریه‌ی اینشتین، فقط تابش الکترومغناطیس، که هیچ جرمی ندارد، با سرعت نور (۳۰۰ هزار کیلومتر بر ثانیه) حرکت می‌کند. اما حتی سرعت‌های دست‌نیافتنی نزدیک به سرعت نور نیز برای سفر به ستاره‌های دور و نزدیک در کهکشان سرعتی بسیار کند است.


محدودیت‌های موشک‌ها

فضاپیماي ویجر با سرعت ۶۰ هزار کیلومتر بر ساعت مرزهای سیاره‌ای منظومه‌ی شمسی را ترک کرد. با این سرعت، ۸۰ هزار سال طول می‌کشد تا ویجر به منظومه‌ی آلفا - قنطورس برسد. اگر بخواهیم این سفر را با موشک‌ها و شاتل‌های فضایی وابسته به سوخت شیمیایی، که رایج‌ترین نوع سفرهای انسان به فضا است، ترتیب بدهیم، در تمام کهکشان جرم کافی وجود ندارد که به ماده‌ی پیش‌ران مورد نیاز تبدیل شود.

کهکشان راه شیری

بازگشت به خانه

رسیدن به ستاره‌ای دوردست، فقط بخشی از داستان است. فضاوردان باید سرعت فضاپیما را برای کاوش‌ها کاهش دهند. کاوش‌گر پیشنهادی آقای فوروارد، از سه بادبان داخل هم استفاده می‌شود. در لحظه‌ی رسیدن، بادبان خال‌جی جدا و پرتو لیزر از زمین بازتاب می‌شود، به دو بادبان درونی می‌تابد و کاوش‌گر را متوقف می‌کند. سپس فشاری از سوی پرتو نور دیگری به درونی‌ترین بادبان شتاب می‌دهد تا فضاپیما به زمین بازگردد.




طرح فوروارد از بادبان‌های دورشدی.

منظومه‌ی شمسی و ستاره‌ی آلفا - قنطورس در فاصله‌ی ۴/۴ سال نوری از هم در بازوی چپ و در فاصله‌ی ۲۵ هزار سال نوری از مرکز کهکشان راه شیری قرار دارند.

رانش گر انحنادهندهی فضا - زمان

در سال ۱۹۱۵، آلبرت اینشتین نظریه‌ی نسبیت عام خود را منتشر کرد که درباره‌ی انحنای فضا - زمان در بردهای اجسام بزرگ بود. فضاییما ایستریار در مجموعه‌ی پیش‌تاران فضا سریع‌تر از نور حرکت می‌کرد؛ ما به علت، موتورهای پدماده‌ی اختراع کرده بود که فضاییما را به پیش می‌راند. با وجود این، مجموعه‌ی پیش‌تازان فضا الهام‌بخش دانشمند مکزیک، میگل آلكووی‌یزه (متولد ۱۹۶۴)، شد تا درباره‌ی امکان ساخت رانش گر انحنادهندهی فضا - زمان تحقیقاتی انجام دهد.



بادبان خورشیدی

بازگشت به روش دریانوردان گذشته، یکی از راه‌های نوآورانه‌ی سفرهای ستاره‌ای است. طرح فضاییماهای بادبان خورشیدی بر پایه‌ی استفاده از نیروی رانش نور خورشید است. بادبان عظیم فضاییما، که از جنس ورقه‌ی فیلم مانند بسیار نازک و سبک است، پس از رسیدن به فضا باز می‌شود و با گذر از بردهای خورشید، از تک‌صربه‌های ناچیز برخورد فوتون‌های خورشیدی، آنقدر شتاب می‌گیرد که به سرعت حدود ۱۰ درصد سرعت نور برسد. این فشار ناشی تا دور دست‌ها ادامه دارد. نخستین مأموریت آزمایشی این طرح، به سبب مشکل موشک پرتاب‌گر آن، شکست خورد اما بدون شک یکی از راه‌های مصفی برای سفرهای فضایی طولانی در آینده است.

تصویری هنری از سفر در انحنای فضا - زمان



رانش گر آلكووی‌یزه

موتور بحثی فضا - زمان پیشنهادی آلكووی‌یزه تاروپود یا انحنای ممری فضا را در برابر فضاییما منقص و در پشت سر آن مسط می‌کند. فضاییما با رانش گر انحنادهندهی فضا - زمان، در فضایی خود آهسته‌تر به سرعت نور حرکت می‌کند، اما خود این معاض و انساط فضا مسیر فضاییما را کوتاه‌تر می‌کند و به نظر می‌رسد که فضاییما با سرعتی بیش از سرعت نور سفر کرده است.

فضاییماهای احتمالی اینتربراس



نویسندگان داستان پیش‌تازان فضا نخستین بار عبارت «رانش گر انحنادهندهی فضا - زمان» را برای سفر سریع‌تر از نور به کار بردند.

کرم‌چاله‌ها

کیپ تون (متولد ۱۹۴۰)، فیزیک‌دان آمریکایی، مفهوم کرم‌چاله‌ها را در فیزیک مطرح کرد؛ مفهومی که هنوز فقط در روابط ریاضی و پیش‌بینی فیزیک‌دانان وجود دارد. ممکن است این کرم‌چاله‌ها میان‌برهایی در فضا و زمان باشند. یک کرم‌چاله، تنیه‌تونی که در دل کوهی کنده شده است، ما را از یک موقعیت در فضا به موقعیت دیگری وصل می‌کند؛ اما مشکل این حاست که کرم‌چاله‌ها پدیده‌هایی اتفاقی و کوتاه عمرند و هر آن امکان دارد بسته شوند و هر که را در درونشان باشد، دانشمندان بر این باورند که انرژی منفی، که با جرم منفی مرتبط است، کرم‌چاله‌ها را باز نگه می‌دارد. آن‌گاه آن‌چه مسافران میان‌ستاره‌ای و میان‌کهکشانی باید نگران آن باشند، فقط این است که آیا تنه‌ی کرم‌چاله به فضا و زمان مناسب می‌رسد یا خیر؟

آندرومدا نزدیک‌ترین کهکشان مارپیچی به راه شیری است.

آندرومدا ۲/۵ میلیون سال نوری از زمین فاصله دارد

دور اندیش‌شان سفر به ستاره‌ها

• در سال ۱۹۶۰، رابرت باسارد، فیزیک‌دان آمریکایی، عنوان کرد که یک میدان مغناطیسی به پهنای ۳۲۰۰ کیلومتر، هیدروژن را از فضای میان‌ستاره‌ای جمع می‌کند تا برای یک موشک هم‌جوشی هسته‌ای سوخت کافی مهیا شود.

• در اوایل دهه‌ی ۱۹۶۰، مشتاقان سفرهای فضایی در آمریکا طرحی پیشنهاد کردند که با انفجار یک بمب اتم پشت سر یک فضاییما، آن را راه بیندازند. آن‌ها نام آن را طرح اورینون گذاشتند.

• در سال ۱۹۷۰، طرح انگلیسی دانه دالوس، طرح اورینون را به‌روز کرد. در این طرح ریزبمب‌هایی پیشنهاد شد که فضاییما را به سوی ستاره‌ی بارنارد (کوئله‌ی سرخی در نزدیکی خورشید)، در فاصله‌ی ۵/۹ سال نوری از ما، به پیش برانند.

تصویرپردازی طرح دانه‌دالوس



پیش‌تر بدانیم

ناوهای فضایی آینده: سفر به ستاره‌ها ۹۰ سفر میان سیاره‌ای ۸۸ درون سیاه‌چاله ۲۱

تصویرپردازی یک هنرمند از یک کرم‌چاله



سیاره‌ها و قمرها

منظومه‌ی شمسی ۹۴-۱۰۱

زمین و ماه ۱۰۲-۱۲۱

سیاره‌های درونی ۱۲۲-۱۴۱

سیاره‌های بیرونی ۱۴۲-۱۵۷

دنباله‌دارها و سیارک‌ها ۱۵۸-۱۷۱

پیش از انقلاب فضایی، سیاره‌ها اغلب چیزی بیش از نقاطی در آسمان نبودند که وقتی با تلسکوپ نگاهشان می‌کردید، جزییات محوی از آن‌ها دیده می‌شد. حالا، به یمن بررسی‌هایی که کاوش‌گرهای فضایی انجام داده‌اند، سیاره‌ها «دنیا‌های جدید» واقعی با کوه‌ها، دره‌ها، آتشفشان‌ها، حلقه‌ها و جماعتی عظیم از قمرها هستند. حتی قمرها ویژگی‌های خاص خود را دارند. از تریتون با یخ‌فشان‌هایش تا اروپا که شاید اقیانوس آب گرمی دارای شکل‌هایی از حیات، زیر یوسته‌ی یخی آن پنهان باشد. تا به حال فقط پلوتون دوردست را (که دیگر در رده‌ی سیاره‌های اصلی نیست) از نزدیک ملاقات نکرده‌ایم. فضاییماها و فضاانوردان نیز آنچه را ما درباره‌ی سیاره‌ی خودمان و قمر آن می‌دانستیم، بسیار گسترش دادند و کمک کردند که به موقعیت و ویژگی‌های واقعی آن‌ها در میان همسایگانشان پی ببریم. اما سیاره‌ای که بیش از همه زیر ذره‌بین قرار دارد، مریخ است که به احتمال بسیار در دوره‌ی زندگی ما میزبان فضاانوردانی از زمین خواهد بود.

منظومه‌ی شمسی


هشت سیاره‌ی اصلی و تعدادی سیاره‌ی کوتوله، بیش از ۱۶۰ قمر، میلیون‌ها سیارک و اجسام سنگی دیگر و بی‌شمار دنباله‌دار به دور خورشید در گردش‌اند. آن‌ها با هم منظومه‌ی شمسی را می‌سازند که حجمی از فضا به قطر ۱۵ تریلیون (هزار میلیارد) کیلومتر را اشغال کرده است. نزدیک‌ترین بخش به خورشید، بخش قرصی شکل منظومه و شامل سیاره‌هاست. سیار دورتر، در مرزهای خارجی منظومه‌ی شمسی، ابر اورت، ناحیه‌ای کروی شکل از هسته‌های یخی دنباله‌دارها، قرار دارد.

مدارهای سیاره‌ها

سیاره‌ها در مسیرهای کاملاً دایره‌ای به دور خورشید حرکت نمی‌کنند و مسیرشان بیضوی است. البته بیش‌تر مدارها به دایره نزدیک است. یک دور کامل به گرد خورشید را مدار می‌نامیم. طول مدار و زمان کامل کردن یک مدار (دوره‌ی تناوب مداری یا سال سیاره) برای سیاره‌های دورتر به ترتیب فاصله از خورشید، بیش‌تر می‌شود. سیاره‌ها دو گروه مجزای سیاره‌های درونی و بیرونی را تشکیل می‌دهند که کمربند سیارک‌ها میان آن‌ها قرار دارد. کمربند سیارک‌ها منطقه‌ای شامل میلیاردها سنگ کوچک و صخره‌ی فضایی است.

چه قدر دورتر از خورشید

فاصله‌ی هر سیاره از خورشید حین حرکت آن در مدارش تغییر می‌کند؛ چون در مسیری بیضوی حرکت می‌کند. مثلاً پلوتون (سیاره‌ی کوتوله) در نزدیک‌ترین نقطه‌ی مدار به خورشید، یا حضیض، حدود ۳ میلیارد کیلومتر به دورترین نقطه‌ی مدار از خورشید، یا اوج، به خورشید نزدیک‌تر است. در مقیاس زیر فاصله‌ی متوسط سیاره‌ها از خورشید به واحد نجومی (AU) داده شده است.



یک واحد نجومی برابر با ۱۴۹/۶ میلیون کیلومتر است؛ یعنی میانگین فاصله‌ی زمین از خورشید

خورشید بیش از ۹۹ درصد از جرم کل منظومه‌ی شمسی را در خود جای داده است. این نسبت، جرم ستاره‌ای عادی را به سیاره‌ها نشان می‌دهد. کشش گرانش خورشید کل منظومه را نگه داشته است.

زهره تقریباً هم‌اندازه‌ی زمین است. این سیاره داغ‌ترین سطح را در جمع سیاره‌ها دارد.

مریخ سردتر از زمین است. به طور کلی، هرچه سیاره‌ای از خورشید دورتر باشد، سردتر است.

سیاره‌های بیرونی

مشتری، زحل، اورانوس و نپتون سیاره‌های بیرونی‌اند که معمولاً آن‌ها ر غول‌های گازی می‌نامند؛ زیرا این سیاره‌های غول‌پیکر، بیش‌تر از گاز ساخته شده‌اند. هریک از آن‌ها مجموعه‌ای از حلقه‌ها و خانواده‌ای از قمرها دارد. پلوتون نیز پس از نپتون قرار دارد. اندازه، ساختار و ترکیب پلوتون (که در سال ۲۰۰۶ از رده‌ی سیاره‌های اصلی خارج شد) با بقیه تفاوت دارد.

اورانوس، همراه با حلقه‌ها و قمرهایش، به پهلوی خوابیده است و به دور خورشید می‌گردد. تمایل یا کجی محور این سیاره حدود ۹۸ درجه است.


پلوتون کشیده‌ترین مدار را دارد.

اگر سیاره‌ها را از شمال صفحه‌ی منظومه‌ی شمسی، مثلاً از فراز قطب شمال خورشید نگاه کنیم، می‌بینیم که در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت (پادساعت‌گرد) در مدارها حرکت می‌کنند.

اورانوس ۱۹/۱۹ AU


تمایل محور سیاره‌ها

سیاره‌ها، افزون بر گردش به دور خورشید در مدار، به دور خود هم می‌چرخند. سیاره نسبت به خورشید قائم نیست؛ زیرا محور آن، خطی فرضی که به دور آن می‌چرخد، مقداری به حالت عمود بر صفحه‌ی مدار سیاره به دور خورشید تمایل دارد. تمایل محور هر سیاره زاویه‌ای متفاوت است.



فراسوی سیاره‌ها

میلیاردها کیلومتر دورتر از خورشید، فراسوی دورترین سیاره، ابرکروی اورت آغاز می‌شود. این ابر، توده‌ی عظیمی از هسته‌ی یخی دنباله‌دارهاست که به دور خورشید می‌گردند. قطر این ابر حدود ۱/۶ سال نوری (۱۰۰ هزار واحد نجومی) تخمین زده می‌شود.



خورشید و سیارات در بخش مرکزی ابر اورت قرار دارند.

منشا بخشی از دنباله‌دارها، کمربند کوپیر است که بین سیاره‌ها و ابر اورت قرار دارد.

زحل گسترده‌ترین مجموعه حلقه‌ها و یکی از بزرگترین خانواده‌های قمرها را دارد.

نپتون کوچکترین عول گاری است.

مشتری بزرگترین و پرجمع‌ترین سیاره است. از همه سریع‌تر به دور خود می‌چرخد و بزرگترین خانواده قمرها را دارد.

پلوتون در بخش‌هایی از مسیرش، در مقایسه با نپتون، به خورشید نزدیک‌تر می‌شود.

کمربند سیارک‌ها، بین مدار مریخ و مشتری، جایی است که بیشتر سیارک‌ها آنجا یافت می‌شوند. شماری از سیارک‌ها نیز مدارهای دارند که آن‌ها را به درون مدار مریخ یا بیرون مدار مشتری برده است.

اکتشافات منظومه‌ی شمسی

• عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل و ماه در دوران باستان شناخته شده بودند. مردم آن روزگار بر این باور بودند که زمین در مرکز منظومه‌ی شمسی قرار دارد.



• در قرن شانزدهم، نیکلاس کوپرنیک ادعا کرد که سیاره‌ها به دور خورشید می‌گردند.

• اورانوس در سال ۱۷۸۱، نپتون در سال ۱۸۴۶ و پلوتون در سال ۱۹۳۰ کشف شد.

• وجود ابری از دنباله‌دارها، که بخش سیاره‌ای منظومه‌ی شمسی را احاطه کرده است، نخستین بار در سال ۱۹۳۲ پیشنهاد شد.

بیش‌تر بدانیم

کاوش‌گرهایی به سوی سیاره‌ها ۹۶، تولد منظومه‌ی شمسی ۱۰۰ اعضای خرد ۱۶۰، دیگر منظومه‌های شمسی ۱۹۸

ارقام مهم

سیاره	قطر به کیلومتر	دور می‌چرخش محوری (حرکت وضعی)	دور می‌گردش مداری (حرکت انتقالی)	کمترین فاصله از خورشید (حقیقی) به کیلومتر	بیشترین فاصله از خورشید (اوج) به کیلومتر
عطارد	۴۸۸۰	روز ۵۸/۶۵	روز ۸۷/۹۷	۴۶/۰ میلیون	۶۹/۸ میلیون
زهره	۱۲۱۰۴	روز ۲۴۳	روز ۲۲۴/۷۰	۱۰۷/۵ میلیون	۱۰۸/۹ میلیون
زمین	۱۲۷۵۶	ساعت ۲۳/۹۳	روز ۳۶۵/۲۶	۱۴۷/۱ میلیون	۱۵۲/۱ میلیون
مریخ	۶۷۹۴	ساعت ۲۴/۶۲	روز ۶۸۶/۹۸	۲۰۶/۶ میلیون	۲۴۹/۲ میلیون
مشتری	۱۴۲۹۸۴	ساعت ۹/۹۲	سال ۱۱/۸۶	۷۴۰/۶ میلیون	۸۱۶/۰ میلیون
زحل	۱۲۰۵۳۶	ساعت ۱۰/۶۶	سال ۲۹/۴۵	۱/۳۵ میلیارد	۱/۵۱ میلیارد
اورانوس	۵۱۱۱۸	ساعت ۱۷/۲۴	سال ۸۴/۰۲	۲/۷۳ میلیارد	۳/۰۱ میلیارد
نپتون	۴۹۵۲۸	ساعت ۱۶/۱۱	سال ۱۶۴/۷۹	۴/۴۶ میلیارد	۴/۵۴ میلیارد
پلوتون (سیاره کوتوله)	۲۳۰۲	روز ۶/۳۹	سال ۲۴۷/۹	۴/۴۴ میلیارد	۷/۳۸ میلیارد




ستون ۳۰/۱ AU

(سیره کوتوله) پلوتون ۳۹/۵ AU



ابزارها و آزمایش‌ها

ممکن است کاوش گر فضایی دستورالعمل نوع و زمان انجام دادن مأموریت‌های خود را از زمین دریافت کند یا مأموریت‌های از پیش برنامه‌ریزی شده‌ی روی رایانه‌اش را انجام دهد. نیروی فضاپیما نیز از برق تولید شده در صفحه‌های خورشیدی یا یک ژنراتور هسته‌ای تأمین می‌شود. سامانه‌های هدایت، که فضاپیما و ابزارهای علمی آن را به کار می‌اندازند، بر فضاپیما سوارند. فضاپیما مدارگرد کاسینی، که در سال ۱۹۹۷ پرتاب شد، حامل کاوش گری به نام هویگنس بود که بر سطح تیتان، بزرگ‌ترین قمر زحل، فرود آمد و به بررسی سطح و جو آن پرداخت.



فضاپیمای کاسینی در سال ۲۰۰۴ به زحل رسید و هنوز در مداری به دور زحل به کاوش می‌پردازد.

کاوش گر هویگنس از کاسینی رها شد و به بررسی تیتان پرداخت.

سپر مقاوم در برابر حرارت که مانع از سوختن هویگنس در جو تیتان می‌شود.

پیش از کاوش گرها

پیش از به کارگیری کاوش گرهای فضایی، اخترشناسان مجبور بودند به چشمان خود و تلسکوپ‌ها اتکا کنند. سیاره‌ها از دید چشم غیر مسلح کمی بیش از ستاره‌ای درخشان‌اند. دید چشم را می‌توان به کمک تلسکوپ بهبود بخشید؛ اما حتی با بهترین تلسکوپ‌های زمین نیز فقط می‌توان سطح یکی از سیاره‌های سنگی، مریخ، را دید و روشنایی و تاریکی‌های محوی را در وضعیت خاص بر سطح عطارد و به کمک دید فروسرخ بر سطح زهره تشخیص داد. با آن‌که می‌توان ساختارهای بزرگ جو سیاره‌ها گازی را با تلسکوپ‌های بزرگ دید، جزئیات بسیار کمی از قمرها و حلقه‌های بسیار این سیاره‌ها دیده می‌شود. البته در دهه‌های اخیر علاوه بر مشاهده‌های زمینی، رادارها نیز با ارسال امواج و دریافت بازتاب از سطح سیاره‌های نزدیک، اطلاعات ارزشمندی به دریای اطلاعات و تصاویر فضا کاوها افزوده‌اند.

از سکوی آزمایش، که کاوش گر هویگنس را نگهداشته بود، برای آزمایش سطح و جو تیتان استفاده شد.

بسته‌ی علمی آزمایش گر سطح، به اندازه و شکل یک کلاه سیلندر، شامل تعدادی آزمایش جداگانه بود.

این وسیله نخستین قسمت از هویگنس بود که با سطح تیتان برخورد کرد. معلوم نبود که هویگنس روی خشکی یا داخل اقیانوس فرود خواهد آمد.

این ابزارها با ارسال علائم بی‌بیپ به یکدیگر، به اندازه‌گیری چگالی، ترکیبات و دمای جو و سطح تیتان پرداختند.


پیش‌تر بدانیم

- موشک‌ها چگونه کار می‌کنند؟ ۴۴
- پرتاب‌گرهای فضایی ۴۸
- منظومه‌ی شمسی ۹۴
- سطح زهره ۱۳۰
- جست‌وجوی حیات در مریخ ۱۳۴
- قمرهای زحل ۱۵۲


قوانین کپلر درباره‌ی حرکت سیاره‌ها

دانشمندان علوم فضایی بر پایه‌ی این قوانین، که یوهانس کپلر در اوایل قرن هفدهم میلادی تدوین کرد، مسیر کاوش گرهای فضایی و جایگاه دقیق سیاره‌ها و قمرها را محاسبه می‌کنند تا مطمئن باشند که کاوش گر در زمان مناسب به مکان مناسب می‌رسد. قوانین کپلر برای هر منظومه‌ی دیگر، میان قمرها و سیاره‌ها و هر جرمی که به دور دیگری می‌گردد، صدق می‌کند؛ چه در حالتی که مانند ستاره‌های دوتایی دو جرم نسبتاً همسان در گردش باشند و چه مانند خورشید و عطارد که تفاوت جرم یک به ده میلیون است.


قانون اول کپلر می‌گوید که یک سیاره در مداری بیضی شکل به دور خورشید می‌گردد و خورشید در یکی از کانون‌های این بیضی قرار دارد. داخل هر بیضی دو کانون (الف یا ب) وجود دارد. مجموع فاصله از یک کانون (الف) تا هر نقطه‌ای روی بیضی (۱ یا ۲) و بازگشت به کانون بعدی (ب) همواره یکسان است.



مساحت همواره یکسان است



قانون دوم کپلر یا قانون مساحت‌ها درباره‌ی سرعت حرکت سیاره توضیح می‌دهد: زمانی که سیاره به خورشید نزدیکتر است، سریع‌تر و وقتی دورتر است، کندتر حرکت می‌کند. این قانون از نظر ریاضی چنین است: اگر خطی از سیاره به خورشید وصل کنید و پس از مدتی، مثلاً ۱۰۰ روز، خط دیگری بکشید، همواره مساحت بین این خطوط یکسان خواهد بود؛ یعنی خط اتصال سیاره به کانون مدار در زمان‌های برابر، مساحت‌های برابری را در فضا جاروب می‌کند.



قانون سوم کپلر می‌گوید که هرچه سیاره‌ای از خورشید دورتر باشد، آهسته‌تر حرکت می‌کند و طی کردن یک دور به گرد خورشید، بیش‌تر طول می‌کشد. رابطه‌ی بین فاصله و دوره‌ی تناوب مداری همواره یکسان است. به این ترتیب که مربع دوره‌ی تناوب (P^2) بر حسب سال زمینی برابر است با مکعب فاصله‌ی متوسط سیاره از خورشید (A^3) بر حسب واحد نجومی. پس اخترشناسان برای محاسبه‌ی فاصله‌ی سیاره‌ای تا خورشید، فقط باید سرعت زاویه‌ای آن و در نتیجه دوره‌ی تناوب را بدانند.

کاوش‌گران منظومه‌ی شمسی

کاوش‌گرهای فضایی مهم در شناخت منظومه‌ی شمسی (ساخته‌ی ایالات متحده، به‌جز مواردی که کشور سازنده نوشته شده است)

نام	نوع	هدف	تاریخ ملاقات	دست‌آوردها
لونا ۱ (شوروی)	گذرنده	ماه	۱۹۵۹	نخستین کاوشگر انسان که از ۶۰۰ کیلومتری ماه گذشت.
پایونیر ۱۰	گذرنده	مشتری	۱۹۷۳	نخستین کاوشگری که از کمربند سیارک‌ها گذشت؛ تصاویر نمای نزدیک از مشتری
مارینر ۱۰	گذرنده	عطارد	۱۹۷۴ - ۱۹۷۵	نخستین فضایی که به عطارد رفت (دومی فضایی مسنجر است که اکنون در اطراف عطارد است).
ونرا ۹	مدارگرد و سطح‌نشین	زهره	۱۹۷۵	نخستین نماها از سطح زهره
وایکینگ ۱ و ۲	مدارگرد و سطح‌نشین	مریخ	۱۹۷۶	تصویربرداری از سطح مریخ؛ جست‌وجو به دنبال حیات
پایونیر ۱۱	گذرنده	زحل	۱۹۷۹	نخستین تصاویر با جزئیات از زحل
جیوتو (اروپایی)	گذرنده	دنبالمدار هالی	۱۹۸۶	نخستین نماها از هسته‌ی یک دنبالمدار
ویجر ۱ و ۲	گذرنده	مشتری زحل اورانوس نپتون	۱۹۷۹ ۱۹۸۱ - ۱۹۸۰ ۱۹۸۶ ۱۹۸۹	جزئیاتی از هر چهار سیاره‌ی بزرگ گازی و منظومه‌ی اقمار آن‌ها؛ ویجر ۲ نخستین کاوشگری بود که به ملاقات اورانوس و نپتون رفت.
گالیله	گذرنده و مدارگرد	سیارک‌های گاسپرا و آیدا / مشتری	۱۹۹۱ ۱۹۹۵	نخستین گذر از کنار یک سیارک؛ کشف قمر سیارکی آیدا؛ و نخستین فضایی که مدار مشتری
ماژلان	مدارگرد	زهره	۲۰۰۳ - ۱۹۹۵	نقشه‌برداری راداری و عکس‌برداری فروسرخ از سطح سیاره زهره
اولیس (اروپایی)	مدارگرد	خورشید	۱۹۹۴ - ۱۹۹۰	پس از عبور از کنار مشتری در سال ۱۹۹۲ انرژی کافی برای قرارگیری در مداری قطبی به دور خورشید گرفت و از سال ۱۹۹۴ سه بار از فراز دو قطب خورشید گذشته است.
کلمنتاین	مدارگرد	ماه	۱۹۹۴	نقشه‌برداری سطح ماه
رهیاب مریخ (PATHFINDER)	سطح‌نشین و سطح‌نورد	مریخ	۱۹۹۴	طی سه ماه فعالیت هزاران عکس از سطح مریخ فرستاد و خودرو کوچک آن، سوچرنر، نخستین مریخ‌نورد تاریخ بود.
نقشه‌بردار سراسر مریخ (MGS)	مدارگرد	مریخ	۱۹۹۷	نقشه‌برداری و عکس‌برداری از سطح مریخ
پویشگر ماه (LUNAR PROSPECTOR)	مدارگرد	ماه	۲۰۰۶ - ۱۹۹۷	نقشه‌بردار سطح ماه
نیپر-شومیکر	مدارگرد	سیارک اروس	۱۹۹۹ - ۱۹۹۸	یک سال در مدار سیارک بود و در سال ۱۹۹۷ از کنار سیارک متیلدا گذشت.
فضای ژرف ۱ (DEEP SPACE 1)	گذرنده	دنبالمدار یورلی	۲۰۰۱ - ۲۰۰۰	در سال ۱۹۹۹ بدون تصویربرداری از کنار سیارک بریلی گذشت و سپس از کنار هسته‌ی دنبالمدار یورلی عبور کرد.
آدیسه‌ی ۲۰۰۱ مریخ	مدارگرد	مریخ	۲۰۰۱	نقشه‌بردار سطح مریخ، جست‌وجوگر منابع زیرزمینی آب و منتقل‌کننده‌ی داده‌های مریخ‌نوردهای ناسا
جنسیس	مدارگرد	نمونه‌برداری از باد خورشیدی و پرتو کیهانی	۲۰۰۱	کپسول حاوی ذرات در فرود به سطح زمین دچار حادثه شد؛ اما برخی اطلاعات به دست آمد.
مارس اکسپرس (اروپایی)	مدارگرد	مریخ	۲۰۰۱	نقشه‌بردار سطح و منابع یخ‌آب در زیر سطح مریخ، تصویربردار سه پهنی
استارداست	گذرنده	دنبالمدار ویلت - ۲	۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴	از کنار سیارک آن‌فرانک در سال ۲۰۰۲ و از گیسوی دنبالمدار ویلت - ۲ در سال ۲۰۰۴ گذشت و کپسول حاوی ذرات گیسوی دنبالمدار را در سال ۲۰۰۶ به زمین رساند.
مریخ‌نوردهای ناسا	سطح‌نورد	مریخ	۲۰۰۴	جفت مریخ‌نورد اسپریت و آپورتونیتی که بارها بیش‌تر از سه ماه فعالیت پیش‌بینی شده فعال ماندند و کیلومترها در دو سوی مخالف مریخ طی کردند. آنها به نشانه‌های آب در گذشته‌ی مریخ دست یافتند.
اسمارت ۱ (اروپا)	مدارگرد	ماه	۲۰۰۴	نقشه‌بردار سطح ماه
کاسینی-هویگنس (آمریکایی - اروپایی)	مدارگرد / سطح‌نشین	زحل / تیتان	۲۰۰۴	از زمان رسیدن به مدار زحل در ژوئیه ۲۰۰۰ به بررسی این سیاره، حلقه و اقمار آن پرداخته و در دسامبر ۲۰۰۴ کاوشگر هویگنس را به سوی قمر تیتان فرستاد تا طی چند ساعت، از جو و سطح آن داده‌برداری کند.
برخورد عمیق (DEEP IMPACT)	گذرنده و برخوردگر	دنبالمدار تمپل - ۱	۲۰۰۶ - ۲۰۰۴	در نزدیکی هسته‌ی دنبالمدار کاوشگر گلوله‌مانندی به سوی آن رها شد تا از ابر حاصل از انفجار برخورد، داده‌های بی‌نظیری حاصل شود.
هایابوسا (ژاپنی)	مدارگرد و سطح‌نشین	سیارک ایتوکاوا	۲۰۰۵	پس از ماه‌ها گردش به دور سیارک کوچک به سطحش رسید. اما رویوت سطح‌نشین کوچک فضایی از دست رفت. نمونه‌ی ذرات سطح سیارک برای بازگرداندن به زمین (احتمالاً در سال ۲۰۱۰) گرفته خواهد شد.
مدارگرد شناسایی مریخ (MRO)	مدارگرد	مریخ	۲۰۰۶	نقشه‌برداری بسیار دقیق مریخ و تعیین محل‌های مناسب برای کاوش‌های آینده
ونوس اکسپرس (اروپایی)	مدارگرد	زهره	۲۰۰۶	بررسی جو سیاره و محیط اطراف آن، کشف دو گردباد عظیم بر فراز قطب جنوب زهره

کاوش‌گرهای فضایی مهم در شناخت منظومه‌ی شمسی (ساخته‌ی ایالات متحده، به‌جز مواردی که کشور سازنده نوشته شده است)

نام	نوع	هدف	تاریخ ملاقات	دست‌آوردها
ققنوس (PHOENIX)	سطح‌نشین	مریخ	۲۰۰۸	جست‌وجوی نشانه‌های آب و حیات ابتدایی در خاک منطقه‌ی قطبی مریخ که به مدت ۴ ماه انجام شد.
سلن یا کانگویا (ژاپنی)	مدارگرد	ماه	۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹	نقشه‌برداری سطح ماه که پس از ۲۰ ماه کاوش طبق برنامه بر سطح ماه سقوط کرد.
چاندرايان-۱ (هند)	مدارگرد و سطح‌نشین	ماه	۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹	حدود یک سال در مدار ماه به کاوش پرداخت و کاوش‌گر کوچکی را به سوی قطب جنوب ماه فرستاد تا با بررسی غبار و مواد پرتابی حاصل از سقوط آن به جست‌وجوی منابع آب بپردازد.
مدارگرد شناسایی ماه (LRO)	مدارگرد	ماه	۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵	از تابستان ۲۰۰۹ به بررسی ماه به کمک دوربین‌ها، طیف‌سنج‌ها و رادار مشغول است. برای نخستین بار نقشه‌های سه بعدی از ماه تهیه می‌کند و تصاویر نمای نزدیک با جزئیات بسیار زیاد می‌گیرد که برای سفرهای آینده‌ی انسان ضروری است.
LCROSS	مدارگرد و موشک برخوردی	ماه	۲۰۰۹	همراه مدارگرد بزرگ LRO از زمین پرتاب شد و در مدار متفاوتی به دور ماه قرار گرفت تا در مسیر برخورد با گودالی در قطب جنوب ماه قرار گیرد. موشک ۲ تنی قنطور از کاوش‌گر جدا شد و چند دقیقه قبل از آن بر سطح ماه سقوط کرد تا کاوش‌گر پیش از نابودی ابر غبار حاصل از برخورد را تحلیل کند. وجود یخ آب در بستر گودال‌های همیشه در سایه‌ی قطب ماه در این مأموریت تأیید شد.
پیام‌آور (MESSENGER)	مدارگرد	عطارد	۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲	نقشه‌برداری و نخستین مدارگرد عطارد، در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ از کنار زهره گذشت و در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ از کنار عطارد عبور کرد تا سرانجام در ۲۰۱۱ در مدار قرار بگیرد.
سپیده‌دم (DAWN)	مدارگرد	سیارک وستا و سیاره‌ی کوتوله‌ی سرس	۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵	در سال ۲۰۰۹ از کنار مریخ گذشت و در ۲۰۱۱ یک سال در مدار وستا و در ۲۰۱۵ پنج ماه در مدار سرس قرار می‌گیرد.
آزمایشگاه علم مریخ (MSL)	سطح‌نورد	مریخ	۲۰۱۲	مریخ‌نورد بزرگ که در سال ۲۰۱۱ پرتاب می‌شود و نخستین فرود دقیق بر سطح مریخ را امتحان می‌کند. بررسی سنگ و خاک، جست‌وجوی آب و حیات احتمالی میکروبی اهداف اصلی آن است.
رزتا (اروپایی)	مدارگرد و سطح‌نشین	دنبالمدار چوریوموف-گراسیمنکو	۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵	در سال ۲۰۰۷ از کنار مریخ و در سال ۲۰۰۸ از کنار سیارک اشتاینر گذشت در سال ۲۰۱۴ در مدار دنبالمدار هدف قرار می‌گیرد و سطح‌نشین کوچک فیلا را نیز برای نمونه‌برداری از سطح دنبالمدار می‌فرستد.
افق‌های نو (NEW HORIZONS)	گذرنده	پلوتون، کارن و کمر بند کوییپر	۲۰۱۵	در سال ۲۰۰۷ از کنار مشتری گذشت و در ۲۰۱۵ نخستین ملاقات کننده‌ی پلوتون دور دست و قمر آن است. سپس در کمر بند کوییپر اهداف دیگری جست‌وجو می‌کند.



فضایی‌های رزتا در سال ۲۰۱۴ میلادی به یک دنبالمدار می‌رسد و کاوش‌گر کوچکی را به سوی هسته‌ی این کوه یخ فضایی می‌فرستد.



کاوش‌گر LCROSS موشکی ۲ تنی را با سرعت ۱۰ هزار کیلومتر بر ساعت به سوی قطب جنوب ماه فرستاد تا از بررسی مواد پرتابی، رد آب را در ماه پیدا کند.

تولّد منظومه‌ی شمسی

بیش‌تر اخترشناسان بر این باورند که همه‌ی اعضای منظومه‌ی

شمسی، از خورشید غول‌پیکر تا کوچک‌ترین

سیارک‌ها، از ابر عظیم و چرخانی از گاز

و غبار به نام سحابی خورشیدی شکل

گرفته‌اند. این فرآیند حدود همدیزار سال

پیش با شکل‌گیری خورشید آغاز شد. در

حین پیدایش خورشید، سیاره‌ها و دیگر اجسام از مواد

استفاده نشده‌ای مانند قرص گاز و غبار دور ستاره‌ی جنین،

شکل گرفتند. وقتی بی‌شمار خردسنگ و صخره‌ی سنگی -

یخی در لایه‌لای گاز و غبار سحابی خورشیدی شکل گرفت،

باد ستاره‌ای نیرومند، ستاره‌ی نوزاد گاز و غبار را در فضای

خارجی پخش کرد و دیگر اثری از سحابی اولیه باقی نماند.

سحابی خورشیدی

با چرخش و خنک شدن این ابر عظیم، مواد به سوی مرکز ابر کشیده شدند. مرکز

سحابی چگال‌تر و داغ‌تر شد و از گرمای خود می‌تابید و سرانجام آن‌قدر گرم شد

که شروع به تولید انرژی از طریق هم‌جوشی هسته‌ای کرد؛ خورشید متولّد شده بود.

در حین پیدایش خورشید، بقیه‌ی سحابی خورشیدی بر اثر چرخش به دور خود،

از شکل توده‌ای کروی به شکل قرصی درآمدند و بیش‌تر شامل گازهای هیدروژن

و هلیوم، کمی غبار، سنگ، فلز و یخ بودند. مواد سنگی و فلزی نزدیک خورشید

کنار هم جمع شدند تا سیاره‌های داخلی را شکل دهند. در آن محیط نزدیک‌تر به


خورشید، بر اثر تابش و باد خورشیدی گاز کمتری در اطراف پیش‌سیاره‌ها جمع

می‌شد و جوّ رقیقی (در مقایسه با سیاره‌های غول‌گازی) در اطراف آن‌ها شکل


گرفت. در نواحی سردتر و دورتر، یخ یا سنگ و فلز هسته‌های اولیه‌ای ساختند که

با ربودن گاز موجود در محیط، سیاره‌های خارجی غول‌پیکر را شکل دهند.


۱ ابر عظیم و چرخانی از گاز و غبار در
فضا کنار هم جمع شد تا سحابی خورشیدی
را شکل دهد. این همان موادی بود که
سرانجام منظومه‌ی شمسی از آن پدید آمد.



۲ ذرات گاز و غبار درون
این قرص کنار هم جمع
شدند تا ذرات دانه‌مانند
بزرگتری را شکل دهند.



۳ وقتی گرانش موجب
انقباض سحابی خورشیدی شد،
خورشید در مرکز ابر شکل
گرفت و قرصی چرخان از مواد
دورتر از آن باقی ماند.




بادهای ستاره‌ای نیرومند خورشید تازه
متولّد شده، مواد زاید را به اطراف
پراکنده کرد. در حالی که خورشید نوزاد
خود هنوز در حال فشرده شدن بود،
قرص‌مادگی پیرامون آن به حلقه‌هایی از
ماده در مدارهای مجزا تبدیل شده بود
که خردسایرک‌ها، نخستین اجسام سنگی
بزرگ، درون این حلقه‌ها شکل گرفتند تا به
مرور هسته‌های اولیه‌ی سیاره‌ها را بسازند.

دانه‌ها با هم برخورد می‌کنند تا
ذرات سنگی بزرگتری بسازند
که سرانجام خردسایرک‌ها
(سیارک‌ها) را شکل دهند.

گرانش با چنان نیرویی
هسته‌ی ستاره را منقبض
می‌کند که ستاره، موج‌ضربه‌ای
قوی به فضا می‌فرستد.

موج‌ضربه‌ی آبرنواختر

ستاره‌های پُر جرم در پایان عمر با انفجار
آبرنواختری از بین می‌روند. در آبرنواخترها
هسته‌ی ستاره بر سر خود فرومی‌ریزد
(می‌رُمبد) و موج‌ضربه‌ای عظیم و
قدرتمند ایجاد می‌کند که در محیط
میان‌ستاره‌ای به حرکت درمی‌آید و
گاز میان‌ستاره‌ای را در همسایگی
خود آشفته و آماده‌ی ستاره‌سازی
می‌کند. برخی اخترشناسان بر این باورند
که انقباض اولیه‌ی سحابی خورشیدی
احتمالاً نتیجه‌ی موج‌ضربه‌ای از یک آبرنواختر
نزدیک بوده است.



شکل‌گیری سیاره‌ها (بر اساس یکی از مدل‌های شبیه‌سازی شده)

سیاره	ساخته شده از	جرم حلقه‌ی سازنده در قرص اولیه (زمین = ۱)	جرم فعلی سیاره (زمین = ۱)	مدت تقریبی شکل‌گیری به سال
عطارد	سنگ، فلز	۳۰	۰/۰۶	۸۰/۰۰۰
زهره	سنگ، فلز	۱۶۰	۰/۸۲	۴۰/۰۰۰
زمین	سنگ، فلز	۲۰۰	۱/۰۰	۱۱۰/۰۰۰
مریخ	سنگ، فلز	۲۰۰	۰/۱۱	۲۰۰/۰۰۰
مشتری	گاز، سنگ، فلز، یخ	۴۰۰۰	۳۱۸	یک میلیون
زحل	گاز، سنگ، فلز، یخ	۴۰۰	۹۵/۱۶	۹ میلیون
اورانوس	گاز، سنگ، فلز، یخ	۸۰	۱۴/۵۴	۳۰۰ میلیون
نپتون	گاز، سنگ، فلز، یخ	۱۰۰	۱۷/۱۵	یک میلیارد
پلوتون	یخ، سنگ، فلز	-	۰/۰۰۲	یک میلیارد

بیش‌تر جرم موجود در قرص اطراف خورشید نوزاد بر اثر بادهای خورشیدی قوی و نیروهای کشندی گرانشی در
فضای خارجی پخش شدند و فقط بخش جزئی از آن به صورت سیاره‌ها و خردسایرک‌ها باقی ماندند.


بیش‌تر بدانیم

منظومه‌ی شمسی ۹۴، اعضای خُرد ۱۶۰، چرخه‌ی زندگی ستاره‌ها ۱۹۰
جایی که ستاره‌ها متولّد می‌شوند ۱۹۲، دیگر منظومه‌های شمسی ۱۹۸، آبرنواخترها ۲۰۴

نظریه‌های منشأ

• در سال ۱۷۹۶، پیر لاپلاس نظریه‌ی سحابی را بر مبنای ریاضی مطرح کرد: منظومه‌ی شمسی از تخت شدن سحابی چرخانی شکل گرفته است. ابتدا خورشید شکل گرفت و مواد باقی‌مانده، سیاره‌ها را شکل دادند.

• در قرن نوزدهم، چند نظریه درباره‌ی وقوع برخورد وجود داشت. یکی بر این باور بود که برخورد دنباله‌مداری، مواد سیاره‌ای را از خورشید بیرون کشیده است. دیگری چنین عنوان می‌کرد که سحابی خورشیدی از برخورد دو ستاره با هم شکل گرفته است. اما هیچ یک از این نظریه‌ها، پایه‌های محکمی مانند نظریه‌ی سحابی نداشتند.




نظریه برخورد ستاره‌ها

• در سال‌های ۱۹۱۷ تا ۱۹۱۸، اخترشناسان انگلیسی، جیمز جینز (۱۸۷۷-۱۹۴۶) و هرولد جفریز (۱۸۹۱-۱۹۸۹)، نظریه‌ی نیروهای کشندی (جزر و مدی) را مطرح کردند، این‌که ستاره‌ای گذرنده از نزدیکی خورشید موادی را از دل خورشید بیرون کشیده که سیاره‌ها از آن شکل گرفتند. با آن‌که این نظریه سال‌ها مورد قبول بود، بعدها کنار گذاشته شد.

دیگر منظومه‌های شمسی


از دهه‌ی ۱۹۸۰، اخترشناسان تعداد فزاینده‌ای منظومه‌ی ستاره‌ای دیگر یافتند. به نظر می‌رسد ستاره‌های جوانی که قرصی از گاز و غبار آن‌ها را احاطه کرده است، مانند ستاره‌ی پروور فم‌الحوت یا ستاره‌ی بتا - سه پایه در نخستین مراحل شکل‌گیری سیاره‌ها به سر می‌برند. در سال‌های اخیر، علاوه بر کشف قرص‌های اولیه‌ی بسیاری در اطراف ستاره‌های جوان، اخترشناسان ستاره‌هایی نیز پیدا کرده‌اند که سیاره‌های کاملاً تکامل‌یافته‌ای به دور آن‌ها در گردش‌اند (منظومه‌های فراخورشیدی). با آن‌که نتوانسته‌ایم بیش‌ترین سیاره‌های کم‌فروغ را در کنار درخشش ستاره‌ی مادر ببینیم، اثر وجود آن‌ها را در نور و ویژگی‌های طیفی ستاره تشخیص داده‌ایم.



سیاره‌های سنگی، مانند عطارد، در زمان جوانی مذاب بودند. هر یک از آن‌ها زیر پوسته‌ی سنگی خود هسته‌ای فلزی دارند.

بقایای شکل‌گیری منظومه‌ی شمسی بیش‌تر از سنگ‌های فضایی، معروف به سیارک‌ها و خرده‌سیاره‌هایی از یخ و غبار، به نام دنباله‌مدارها تشکیل شده‌اند.

سنگ‌ها و فلزات بین مریخ و مشتری به سیاره تبدیل نشدند؛ اما در عوض گم‌ریختند سیارک‌ها را تشکیل دادند.



نظریه‌ی تسخیر

همه‌ی اخترشناسان با این نظر موافق نیستند که سیاره‌ها و دیگر اجسام، هم‌زمان با خورشید و از همان ابر موادی که خورشید را ساخته است، به وجود آمده‌اند. نظریه‌ی نه چندان پُرطرفدار تسخیر چنین می‌گوید که گرانش خورشید جوان، بخشی از ابر گاز و غبار عظیمی را، که از نزدیکی خورشید می‌گذشته، به سوی خود جذب کرده است. سرانجام این ابر به ابرهای کوچکی تقسیم شد که هر یک منقبض شدند و سیاره‌ای را شکل دادند.

تولد سیاره‌ها

سیاره‌ها ۴/۶ میلیارد سال پیش آغاز به شکل‌گیری کردند. به جز پلوتون، هر سیاره‌ی اصلی از توده‌ای حلقه‌شکل از مواد به دور خورشید تشکیل شد (پلوتون و دیگر خرده‌های کوچک و بزرگ از باقی‌مانده‌ها شکل گرفتند). در جریان شکل‌گیری سیاره‌ها، ذرات ریز به هم چسبیدند و تکه‌هایی به اندازه‌ی دانه‌های غلات شکل دادند. سپس ریگ و قلوه‌سنگ‌ها و تکه‌یخ‌ها و سرانجام بر اثر برخوردهای تصادفی اجسام بزرگ‌تری به نام خرده‌سیارک‌ها یا سیاره‌سازها شکل گرفتند. این اجرام اولیه به پهنای یک یا چند کیلومتر، که به قدر کافی جرم داشتند، به جای بزرگ شدن در پی برخوردهای تصادفی با سنگ‌های پراکنده، با نیروی گرانش اندک خود، مواد بیش‌تر و بیش‌تری را جذب کردند و به مرور برخی از آن‌ها هسته‌های اولیه‌ی سیاره‌ها را شکل دادند.

۴ خرده‌سیارک‌ها به هم می‌پیوندند تا اجسام بزرگ‌تری به نام پیش‌سیاره را شکل دهند. این‌ها هم به هم می‌پیوندند تا سیاره‌های سنگی، مانند عطارد، زهره، زمین و مریخ را شکل دهند.


۵ در نواحی خارج‌تر قرص غبار هم پیش‌سیاره‌هایی شکل گرفتند. آن‌ها همین‌طور که بزرگ می‌شدند، با گرانش قدرتمند خود مقادیر عظیمی از گاز را جذب کردند و سیاره‌های غول‌گازی، یعنی مشتری، زحل، اورانوس و نپتون را شکل دادند.

۶ پلوتون و دیگر خرده‌سیاره‌های کوچک و بزرگ از موادی شکل گرفتند که در غول‌های گازی مصرف نشدند. تکه‌های باقی‌مانده‌ی غبار، سنگ و یخ به درون خورشید کشیده و نابود شدند یا به بیرون از منظومه‌ی شمسی پرتاب گردیدند. بسیاری از آن‌ها ابر اورت، خانه‌ی دنباله‌مدارها، را تشکیل دادند.

غول‌های گازی، مانند زحل، ابتدا هسته‌ای ضلب بودند و سپس مقدار عظیمی جو به دور آن جمع کردند.

زمین

بیگانه‌ای که به دیدار منظومه‌ی شمسی بیاید، با گوناگونی فوق‌العاده‌ای از انواع دنیاها برای کاوش روبه‌رو می‌شود؛ از حلقه‌های زحل تا آتش‌فشانی زهره. اما سومین سیاره از خورشید بیش از همه نظر مسافر فضایی را به خود جلب خواهد کرد؛ سیاره‌ای به رنگ آبی لاجوردی در زمینه‌ی مشکی فضا که درست در «کمر بند حیات» منظومه‌ی شمسی، نه خیلی نزدیک به خورشید و نه خیلی دور از آن قرار دارد. این سیاره ترکیبی از بسیاری از عارضه‌های دیگر سیاره‌ها، به اضافه‌ی عوارضی منحصر به خود را یک‌جا دارد. زمین مانند زهره و مریخ آتش‌فشان، مانند عطارد دهانه‌های برخوردی و مانند مشتری و دیگر سیاره‌های گازی توفان‌های جوی دارد. البته تنها سیاره‌ای است که آب مایع و یخ را هم‌زمان دارد؛ تنها سیاره‌ای است که جوش غنی از اکسیژن است و تا آن‌جا که می‌دانیم، تنها سیاره‌ای است در منظومه‌ی شمسی که حیات در آن وجود دارد.



سیاره‌ی دوتایی


سومین سیاره از خورشید، همان‌طور که در این تصویر فضایی گالیله می‌بینید، سیاره‌ی دوتایی به‌نظر می‌رسد. قطر قمر زمین یک‌چهارم اندازه‌ی خود سیاره است؛ یعنی ماه، پس از پلوتون و کارن، بزرگ‌ترین قمر در مقایسه با سیاره‌اش در منظومه‌ی شمسی است. اما این دو دنیا بسیار متفاوت‌اند؛ زمین سرزنده و پُر جنب و جوش است؛ در حالی که ماه یک‌نواخت و مرده است.

سیاره‌ی آبی

زمین، از فضا، مانند جواهری آبی رنگ می‌درخشد. رنگ آبی زیبای زمین به سبب مقدار عظیم آب روی سطح آن است (۷۱ درصد سطح زمین). زمین تنها سیاره‌ای است که فشار جوی مناسب و دمای سطحی در بازه‌ی صفر تا صد درجه‌ی سانتی‌گراد دارد و بنابراین، آب به صورت مایع روی سطح آن پیدا می‌شود. روی سطح عطارد و زهره، که به خورشید نزدیک‌ترند، آب به بخار تبدیل می‌شود و روی مریخ دور دست، یخ می‌زند و حتی زمانی که دما اندکی به بالای صفر درجه‌ی سانتی‌گراد می‌رسد، فشار جوی کافی وجود ندارد که آب مایع شود.

نشانه‌های حیات

وقتی از فضا نگاه کنید، زمین تنها سیاره‌ای است که نشانه‌هایی محکم از حیات روی آن دیده می‌شود. این نشانه‌ها گستره‌ی وسیعی دارند؛ از پوشش گیاهی که با تغییر فصل تغییر می‌کند و اکسیژن موجود در جو تا علائم رادیویی مصنوعی و نورهای فروزان تمدن بشر در شب. ساختارهای مصنوعی، حتی دیوار بزرگ چین، به سادگی از فضا دیده نمی‌شود.



زمین در شب

نور چراغ‌های
خیابان در شهرها

ناوگان ماهگیری در
کنار ساحل ژاپن


گازهای در حال
سوختن در
چاه‌های نفت

آتش در بیشه‌زارهای
آفریقا

بارانی که از ابرها می‌بارد، آب را به
اقیانوس‌ها بازمی‌گرداند و آنچه را که به
چرخه‌ی آب معروف است، کامل می‌کند.

ابرها از انقباض بخار
آبی پدید می‌آیند که از
اقیانوس‌ها تبخیر شده است.




اقیانوس‌ها و دریاها ۷۱ درصد
از سطح زمین را می‌پوشانند.



زمین در یک نگاه

زمین بزرگترین سیاره‌ی سنگی است. تنها سیاره‌ی است که می‌دانیم پوسته‌ی آن از منقح‌های تکتیکه و در حال حرکت تشکیل شده است و در جو آن اکسیژن و روی سطحش آب مایع و حیات وجود دارد.

انحراف محور، چرخش و گردش در مدار



قطر زمین نزدیک به چهار برابر ماه و جرم آن حدود ۸۰ برابر این قمر است.



مغناط کُره

میدان مغناطیسی زمین تا دوردست‌ها در فضا کشیده شده و «حباب مغناطیسی» عظیمی را اطراف سیاره‌ی ما پدید آورده است. این حباب بر اثر رویارویی با ذرات باردار باد خورشیدی، کشیده شده و شکل اشک چشم به خود گرفته است. در نتیجه، این مغناط کُره زمین را از آثار ذرات پُرانرژی و پُرسرعت باد خورشیدی حفظ می‌کند. برخی ذرات در دو ناحیه‌ی نزدیک زمین، به نام کمربندهای مغناطیسی وان آلن، به دام می‌افتند. بقیه به سوی قطب‌های مغناطیسی جاری می‌شوند و بر اثر برخورد با ملکول‌های گاز، جو را روشن می‌کنند. به این پدیده شفق قطبی می‌گویند.

شناسنامه



قطر	۱۲۷۵۶ کیلومتر
متوسط فاصله از خورشید	۱۴۹/۶ میلیون کیلومتر
سرعت مداری به دور خورشید	۲۷/۷۹ کیلومتر بر ثانیه
دوره‌ی انتقالی (گردش به دور خورشید)	۳۶۵/۲۵ روز
فاصله‌ی زمانی دو طلوع خورشید (شبانه‌روز)	حدود ۲۴ ساعت
دوره‌ی وضعی (چرخش به دور خود)	حدود ۲۴ ساعت
جرم (زمین = ۱)	۱
حجم (زمین = ۱)	۱
چگالی متوسط (آب = ۱)	۵/۵۲
گرانش سطحی (زمین = ۱)	۱
تمایل محوری (از حالت عمود به صفحه‌ی مداری)	۲۳/۴
انحراف مداری (از دایرة البروج یا صفحه‌ی منظومه‌ی شمسی)	۰
دمای متوسط سطحی	۱۵ درجه سانتی‌گراد
تعداد قمرها	۱

بیش‌تر بدانیم

منظومه‌ی شمسی ۹۴ ماه، ۱۱۰ عطارد (تیر)، ۱۲۲ زهره (ناهید)، ۱۲۶ مریخ (بهرام)، ۱۳۲ زمین چرخان ۲۶۲، مدار زمین ۲۶۴، شفق‌های قطبی و هاله‌ها ۲۸۴


آهن‌ربایی به نام زمین

زمین، در مقایسه با اندازه‌ی کوچک آن، قوی‌ترین میدان مغناطیسی را در جمع سیاره‌ها دارد. منشأ این مغناطیس در هسته‌ی داغ و پویای زمین است؛ جایی که جریان‌های چرخان آهن مذاب میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی تولید می‌کنند. با گذر زمان، این نیروی مغناطیسی جهت خود را تغییر می‌دهد و به همین سبب، قطب‌های مغناطیسی جابه‌جا می‌شوند. در حال حاضر، قطب‌های مغناطیسی کمتر از ۲ هزار کیلومتر از قطب‌های شمال و جنوب جغرافیایی فاصله دارند.



یخ

بیش از یک‌دهم سطح زمین، بیش‌تر در کلاهک‌های یخی قطب‌ها، پوشیده از یخ است. دیگر سیاره‌ها، مانند مریخ نیز، کلاهک‌های یخی قطبی دارند؛ اما فقط روی زمین آب مایع و یخ کنار هم وجود دارند. کلاهک‌های یخی در زمستان هر نیم‌کره رشد می‌کنند و در تابستان، که کوه‌های عظیم یخ می‌شکنند و به اقیانوس‌های اطراف می‌پیوندند، کوچک می‌شوند.





کلاهک یخی جنوبگان (قطب جنوب) از فضا.

سطح زمین

دلتای رود گنگ

سنگ‌های رسوبی

گل و لای که رود بزرگی مانند گنگ با خود می‌شوید، زیر فشار دریا به سنگ صلیبی تبدیل می‌شود که ممکن است دوباره به شکل کوهستانی بیرون بزنند. این سنگ‌های رسوبی در اثر فرسایشی به وجود می‌آیند که رودها، یخچال‌ها، باد یا امواج در پوسته‌ی زمین ایجاد می‌کنند.



سطح زمین، شکل خود را از نیروهای زمین‌شناختی‌ای گرفته که در سیاره‌ی دیگری کشف نشده است. سطح سیاره‌ی ما منحصر به فرد است. پوسته (خارجی‌ترین لایه‌ی زمین) به بخش‌های عظیمی به نام صفحه تقسیم می‌شود که همواره روی گوشته (جبهه) در حال حرکت‌اند. پس نقشه‌ی امروز زمین فقط تصویری مقطعی از دنیای در حال تغییر ماست. این صفحه‌های متحرک (صفحه‌های تکتونیک) بر لایه‌های از سنگ تقریباً مذاب شناورند و وقتی با هم برخورد می‌کنند یا از هم دور می‌شوند، پوسته‌ی سطحی در آن ناحیه نابود یا از نو ساخته می‌شود. این نیروها سنگ‌های زمین را به‌طور مداوم جای‌گزین می‌کنند. به این ترتیب، بیش‌تر بخش‌های سطح زمین جوان‌تر از ۲۰۰ میلیون سال است.


زمین‌ساخت صفحه‌ای

اگر اقیانوس‌ها را کنار بزنیم، سیاره‌ای عجیب رخ نشان می‌دهد. سطح زمین را نیرویی حاصل از حرکت پاره‌صفحه‌هایی زیر پوسته شکل می‌دهد. به این ساختار، زمین‌ساخت صفحه‌ای (صفحه‌های تکتونیک) می‌گویند. هشت صفحه‌ی اصلی و بسیاری صفحه‌های کوچک‌تر وجود دارند. برخی از آنها فقط شامل بستر اقیانوس‌ها هستند؛ در حالی که بقیه شامل قاره‌ها نیز می‌شوند. لبه‌ی صفحه‌ها و محل برخورد آنها با ترک‌های عظیم، رشته‌کوه‌های پیچ‌درپیچ، رشته‌های آتش‌فشانی و مناطق زلزله‌خیز مشخص می‌شود.



آتش‌فشانی‌های نقاط داغ


جزایر آتش‌فشانی هاوایی حاصل جریانی از گدازه‌ی داغ در اعماق زمین هستند که به صورت یک «نقطه‌ی داغ» به سطوح بالایی رسیده‌اند. صفحه‌ی اقیانوس آرام (صفحه‌ی پاسیفیک)، در حال حرکت، جزیره را به جلو رانده و بنابراین نقطه‌ی داغ، که راه نفوذش سد شده است، باید دوباره به صورت آتش‌فشانی جدید، پوسته را بشکند و از جایی جدید بیرون بزنند و مخروط آتش‌فشانی تازه‌ای ایجاد کنند.



قاره‌های شناور

قاره‌ها، که بر پشت صفحه‌های متحرک حمل می‌شوند، با سرعت رشد ناخن دست، به تدریج روی سطح زمین جابه‌جا می‌شوند. در این فرآیند، قاره‌ها از هم دور و به هم نزدیک می‌شوند. هند، آفریقا، استرالیا و قطب جنوب زمانی بخشی از یک قاره بودند. بعدها هند با آسیا برخورد کرد و در آن ناحیه، رشته کوه عظیم هیمالیا سر برآورد که با فشار بر صفحه‌ی اروپا - آسیا هنوز هم به کندی در حال مرتفع شدن است.


طاق طبیعی «در دوردل» در انگلستان
زمانی شکل گرفته است که امواج
سنگهای نرم را فرسوده‌اند.



در دوردل


جایی که صفحه‌ها از هم جدا می‌شوند

جایی که دو صفحه از هم جدا می‌شوند، گدازه‌ی تازه از زیر بالا می‌آید تا ترک عظیم را پر کند و رشته کوه بیچ‌دریچی بسازد. این ناحیه را به نام تیغه‌ی میان‌اقیانوسی می‌شناسیم زیرا مرز اتصال بین صفحه‌ها، بخشی از بستر اقیانوس را شکل می‌دهد. تیغه‌ی میان‌اقیانوسی اطلس طولی‌ترین رشته کوه روی زمین است. مرتفع‌ترین قله‌های آن هم چون جزایری، مانند ایسلند، جزیره‌ی استنیش و تریستان ده‌چونا، سر برآورده‌اند.




تیغه‌ی میان اقیانوس

کوه‌های آلپ



قاره‌های برخوردکننده

رشته کوه‌های آلپ حاصل برخورد بین دو قاره است. وقتی صفحه‌ی آفریقا به سوی شمال رفت، با صفحه‌ی اروپا - آسیا برخورد کرد و این رشته کوه شکل گرفت.



قاره‌های برخوردکننده

جهان در حال پخش شدن

- در سال ۱۹۲۴، هواشناس آلمانی، آلفرد وگنر (۱۸۸۰ - ۱۹۳۰)، اعلام کرد که قاره‌ها در حال از هم گسستن‌اند.
- در سال ۱۹۶۰، زمین‌شناس آمریکایی، هری هس (۱۹۰۶ - ۱۹۶۹)، نظریه‌ی زمین‌ساخت صفحه‌ای را مطرح کرد که در سال ۱۹۶۳ با شناخت گسترش بستر اقیانوس هند به اثبات رسید.

بیش‌تر بدانیم

تولّد منظومه‌ی شمسی ۱۰۰،۰۰۰ قمرهای مشتری ۱۴۶

بستر اقیانوس آرام زیر صفحه‌ی آمریکای جنوبی تحت فشار است.



جایی که صفحه‌ها به هم می‌رسند

رشته کوه‌های آند بخشی از زنجیره‌ای آتشفشانی یا حلقه‌ی آتش است که دور تا دور اقیانوس آرام را فراگرفته است. وقتی آمریکای جنوبی به سوی غرب حرکت کرد، به صفحه‌ای نازک برخورد و روی آن پیش رفت. این فرآیند، که به «فروانش» معروف است، به سنگ‌های بستر اقیانوس فشار می‌آورد که به زیر قاره بروند. در آن‌جا حرارت زمین، آن‌ها را ذوب می‌کند و به صورت آتش‌فشان بالا می‌روند.

حوضچه‌های آتشفشانی در کوه‌های آند



جو زمین

سیاره‌ی زمین را لایه‌ای نازک از گاز، به نام جو، فراگرفته است که سطح سیاره را از خشونت فضا در امان نگه می‌دارد. در مقایسه با اندازه‌ی زمین، جو آن به نازکی پوست سیب است. اما مکانی بسیار شلوغ و پویاست. هوای جو از یک سو حرارت نایکسانی را از خورشید دریافت می‌کند و از سویی، به سبب چرخش زمین، در حال چرخش است. بنابراین، به صورت الگوهای چرخان دائماً متغیر درمی‌آید. جو زمین پیچیده‌ترین و پیش‌بینی‌ناپذیرترین جو در میان سیاره‌ها منظومه‌ی شمسی است. این جو پوششی ضروری برای حیات روی زمین است؛ زیرا دمای سیاره را در حد مطلوب نگه می‌دارد و سطح آن را از تابش‌های خطرناک در فضا حفظ می‌کند.



ایستگاه فضایی میر

جو زمین هیچ مرز بلندی ندارد و کم‌کم رقیق و در فضا محو می‌شود. در نتیجه، ماهواره‌هایی مانند میر، در حقیقت درون جو زمین در گردش‌اند و مقاومت هوا به مرور از سرعت آن‌ها می‌کاهد. اگر این ماهواره‌ها به حال خود رها شوند، سرانجام آن‌قدر مدارشان سقوط می‌کند که در جو می‌سوزند. این اتفاقی است که در پایان مأموریت ایستگاه میر (سال ۲۰۰۱) به صورت هدایت شده رخ داد.

ساختار جو

جو زمین مخلوطی از گازها (عموماً اکسیژن و نیتروژن)، آب و غبار است. جو چند صد کیلومتر ضخامت دارد؛ اما نمی‌توان هیچ مرز تیزی برای آن تعیین کرد و در حقیقت، در ارتفاعات رقیق و در فضا محو می‌شود. حدود ۹۰ درصد از گاز جوی در همان ۱۰ کیلومتر ابتدا (تروپوسفر یا گشت‌کره) جمع شده است. لایه‌های محسوس جوی تا ارتفاع حدود ۱۰۰ کیلومتری پخش شده‌اند و پس از آن جو بسیار رقیق است و تا ارتفاع ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلومتری ردیابی می‌شود. در سطح زمین، جو چرخان، بادهای قوی تولید می‌کند. این بادهای به شکل‌هایی می‌وزند که مستقیماً به حرارت خورشید چرخش زمین بستگی دارد. در میان سامانه‌های اصلی بادهای بیضی‌های چرخان پرفشار (فرابار) و کم‌فشار (فروبار) وجود دارند.

لایه‌های جو


اگر برشی عمودی از جو زمین جدا کنیم، درمی‌یابیم که از چند لایه‌ی مجزا تشکیل شده است: گشت‌کره، پوش‌کره، میان‌کره، گرم‌کره و بیرون‌کره. با افزایش ارتفاع، هوا رقیق‌تر می‌شود؛ اما دما متغیرتر است. در گشت‌کره، دما با افزایش ارتفاع کاهش می‌یابد؛ زیرا هوایی که به سوی بالا می‌رود، منبسط و خنک می‌شود. پوش‌کره گرم‌تر از لایه‌های بالایی پوش‌کره است. چون پرتو فرابنفش خورشید را جذب می‌کند. گرم‌کره از پرتوهای ایکس خورشید، حرارت دریافت می‌کند.

پوش‌کره، از مرز بین گشت‌کره و پوش‌کره (گشت‌ایست) تا ارتفاع ۵۰ کیلومتری کشیده شده و شامل لایه‌ی ازن است.

میان‌کره، در ارتفاع ۵۰ تا ۹۰ کیلومتری، با دمای منفی صد درجه‌ی سانتی‌گراد سردترین ناحیه‌ی جو است.


گرم‌کره، در ارتفاع ۹۰ تا ۵۰۰ کیلومتری، به سبب تابش پرتوهای ایکس خورشید حتی به دمای ۱۰۰۰ درجه‌ی سانتی‌گراد هم می‌رسد؛ اما محیطی بسیار رقیق با دمایی بسیار متغیر دارد.

بیرون‌کره، فراتر از ارتفاع ۵۰۰ کیلومتری، جایی است که گازها در فضا محو می‌شوند.




اثر گلخانه‌ای

زمین، بدون جو، ۳۰ درجه سردتر بود؛ دمایی چنان کم که همه چیز و همه جا یخ می‌زد. هوا حرارت را مانند یک گلخانه نگه می‌دارد: نور خورشید از هوا می‌گذرد، به زمین می‌تابد و آن را گرم می‌کند. اما تمام نور فروسرخ حاصل از این گرم شدن (تابش حرارتی)، دوباره از میان جو نمی‌گذرد. گازهای گلخانه‌ای مؤثر در جو زمین، دی‌اکسیدکربن، بخار آب و متان هستند؛ اما افزایش بیش از حد هر یک از آن‌ها در دسرساز است.




گرمایش جهانی

دمای سیاره‌ی ما در گشت‌کره (در این تصویر، قرمز داغ‌تر است) به وسیله‌ی ماهواره‌ها مدام زیر نظر است. زمین هر سال حدود ۰/۰۲ درجه‌ی سانتی‌گراد گرم‌تر می‌شود که احتمالاً به سبب وجود دی‌اکسیدکربن اضافی است که اثر گلخانه‌ای را افزایش می‌دهد. این افزایش دی‌اکسیدکربن به سبب سوزاندن زغال‌سنگ و نفت، انبوه اتومبیل‌ها و هواپیماها از یک سو و نابود کردن جنگل‌های استوایی جذب‌کننده‌ی این گاز از سوی دیگر است. این روند بزرگ‌ترین تهدید حیات روی زمین را سبب شده است: گرمایش جهانی و به هم خوردن تعادل اقلیمی زمین. خوش‌یختانه تکاپوی بسیاری برای جلوگیری از تولید بیش‌تر گازهای گلخانه‌ای آغاز شده است اما این کار فقط با همکاری همه‌ی کشورهای جهان امکان‌پذیر است؛ همکاری برای حفظ یک سیاره و نه فقط یک کشور یا یک قوم.




سوراخ لایه‌ی ازن

لایه‌ی ازن در پوش کره است. این لایه نواری از گازها، شامل ملکول سه اتمی اکسیژن یا ازن است که زمین را از پرتوهای مضر فرابنفش خورشید محافظت می‌کند. این لایه بر فراز قطب جنوب (نواحی سیاه و آبی در این تصویر رنگ کاذب ماهواره‌ای) رقیق شده است. به نظر می‌رسد سوراخ‌های لایه‌ی ازن بر فراز هر دو قطب به سبب تولید زیاد ماده‌ای به نام کلر و فلوئوروکربن (CFC)، که در برخی افشانه‌ها و مواد بسته‌بندی یافت می‌شود، ایجاد شده است. این گاز با رسیدن به جو زمین، ملکول‌های ازن را می‌شکند و سپر پرتوهای مرگبار فرابنفش را ضعیف می‌کند.



تغییر پوشش یخ

با وجود اثر پوششی جو، گاهی زمین تا حد یخ زدن سرد می‌شود. شاید وقوع این دوران‌های عصر یخ به سبب کم‌تر خوردن و تغییر اندک تمایل محور زمین باشد که موجب افزایش و کاهش شدت فصل‌ها می‌شود. آخرین عصر یخ زمین ۱۰ هزار سال پیش تمام شد. در حال حاضر، زمین گرم‌تر است؛ اما این گرما نیز پایدار نخواهد بود.



آن بالا در هوا

• در سال ۱۶۴۳، اوانجلیستا توریچلی (۱۶۴۷-۱۶۰۸)، فیزیکدان ایتالیایی، فشارسنج را برای اندازه‌گیری فشار جوی اختراع کرد.

• در سال ۱۶۸۶، ادموند هالی نخستین نقشه‌ی بادهای زمین را منتشر کرد. جورج هادلی (۱۷۶۸-۱۶۸۵) چگونگی شکل گرفتن بادهای پسمان استوایی (بادهایی در مسیر مشخص) را شرح داد.

• در سال ۱۸۴۸، جیمز گلیشر (۱۹۰۳-۱۸۰۹) سوار بر بالن، دمای جو را بالای زمین اندازه گرفت و این نخستین گزارش هواشناسی بود.


• در سال ۱۹۹۰، کمیته‌ای از دانشمندان در سراسر جهان گزارش دادند که دی‌اکسیدکربن حاصل از فعالیت‌های انسانی اثر گلخانه‌ای را افزایش داده است.

بیش‌تر بدانیم

تابش‌هایی از فضا ۲۶
جو زهره ۱۲۸
مدار زمین ۲۶۴

چرخش زمین

بادهای نیم‌کره‌ی شمالی
با چرخش زمین به سوی راست منحرف می‌شوند.




جریان باد

بادهای در الگوهای خاص به دور زمین می‌گردند. در استوا، هوای گرم بلند می‌شود، به سوی شمال و جنوب می‌رود، پایین می‌آید و به سطح دریا بازمی‌گردد. در هر دو قطب، هوای سرد پایین می‌آید و پخش می‌شود. سپس گرم می‌شود تا دوباره در ارتفاعات بالا جریان یابد. هوای عرض‌های میانی (مناطق معتدل)، که در میان این جریان‌های گردشی به دام می‌افتد، در جهت مخالف به گردش درمی‌آید.

سیاره‌ی زنده

در سال ۱۹۹۰، کاوش گر فضایی گالیله از کنار دنیایی بسیار عجیب گذشت. ابزارهای آن پوششی سبز را بر فراز بخش اعظمی از این سرزمین، گازی به شدت فرساینده را در جو آن و برخی علائم عجیب رادیویی را آشکار کردند. گالیله، در بخشی از مسیرش به سوی مشتری، از کنار سیاره‌ی زمین می‌گذشت و تا کمک گرانشی بگیرد و این شبیه ملاقات کاوش‌گری با سیاره‌ای جدید بود. پوشش سبزرنگ، مواد زیستی بودند که نور خورشید را جذب می‌کردند. در این فرآیند، گاز فرساینده‌ی اکسیژن آزاد می‌شود که در غیر این صورت در واکنش‌های شیمیایی ناپدید می‌گردد. زمین ویژگی خاصی دارد که آن را از هر جسم دیگری در کیهان متمایز می‌کند؛ تنها سیاره‌ای است که می‌دانیم میزبان حیات است.




حیات روی زمین

زمین گهواره‌ی امنی برای پیدایش و تکامل حیات است؛ زیرا در منطقه‌ی طلایی به نام «کمر بند حیات» قرار گرفته است. زیادی گرم نیست؛ پس آب بخار نمی‌شود. زیادی سرد هم نیست؛ پس آب یخ نمی‌زند. زیادی کوچک نیست؛ پس جو خود را حفظ می‌کند و زیادی بزرگ هم نیست که مانند سیاره‌ی مشتری، «تماماً جو» شود.


فوران‌های سیاه

همه‌ی انواع حیات برای دوام، به نور خورشید نیاز ندارند. این کرم‌ها در تاریکی بستر اقیانوس‌ها هزاران متر زیر سطح زندگی می‌کنند. آن‌ها از مواد شیمیایی و انرژی حاصل از منافذ آتش‌فشانی در کف دریا، که فوران‌های سیاه نام دارند، تغذیه می‌کنند. امکان دارد موجودات مشابهی در اقیانوس پنهان زیر پوسته‌ی یخی اروپا، قمر مشتری، زندگی کنند.



نیروهای کیهانی

حیات روی زمین تحت تأثیر نیروهای مرگباری از کیهان پیرامون ما قرار دارد. برخورد یک دنباله‌دار یا سیارک، فوران‌های قدرت‌مند سطح خورشید یا انفجار ستاره‌ای در محیط میان‌ستاره‌ای نزدیک به ما ممکن است سبب «انقراض جمعی موجودات» روی زمین شود. در ۵۰۰ میلیون سال گذشته، دست کم ۵ انقراض نسل بزرگ در حیات دیده شده که دوتای اخیر آن ۶۵ میلیون سال پیش (مرگ ناگهانی دایناسورها و ۷۰ درصد از جانداران زمین) و ۲۵۰ میلیون سال پیش (نابودی ۹۰ درصد از گونه‌های حیات) بوده است.



چرخه‌ی اکسیژن

همه‌ی انواع حیات روی زمین به چرخه‌های گوناگونی متصل‌اند. گیاهان و حیوانات از طریق چرخه‌ی اکسیژن برای بقا به هم نیاز دارند. حیوانات از اکسیژن برای رهاسازی انرژی از غذاها استفاده می‌کنند و دی‌اکسیدکربن را در بازدم بیرون می‌دهند. گیاهان با دی‌اکسیدکربن زنده‌اند و آن را به اکسیژن تبدیل می‌کنند.

۲ آتیکبرهای بزرگ و کم‌عمق ۴ میلیارد سال پیش مواد شیمیایی را برای ساختن نخستین سلول‌ها متمرکز کردند. نخستین گیاهان ساده حدود ۴۰۰ میلیون سال پیش در خشکی پدیدار شدند. حیوانات، از جمله نخستین حشره‌ها، به دنبال گیاهان آمدند.

۳ در دوران‌های گرم، حدود ۲۰۰ میلیون سال پیش، درختان عظیم‌الجثه سرخس و دایناسورها در اوج شکوفایی بودند.

۴ امروزه حیات همچنان در حال تحول است. تهدیدی تازه برای حیات، فعالیت‌های انسان است که هر ساله صدها گونه را نابود می‌کند.



منشأ حیات: رعد و برق

بر اساس نظریه‌ای در علم، حیات روی زمین با آذرخش‌هایی در جو ابتدایی زمین شروع شد؛ رعد و برقی که گازهای جو را با هم ترکیب کرد و ملکول‌های لازم را برای حیات شکل داد. شیمی‌دان‌ها این فرآیند را به کمک جرقه‌ی الکتریکی، درون بالنی از گاز شبیه‌سازی کردند.




منشأ حیات: دنباله‌دارها

نظریه‌ی رقیب می‌گوید که ملکول‌های حیات، یا حتی سلول‌های زنده، سوار بر دنباله‌دارها به زمین آمده‌اند. برخورد این هسته‌های یخی با زمین در دوران اولیه‌ی منظومه‌ی شمسی، این موضوع را امکان‌پذیر می‌کند. در سال ۱۹۸۶، فضاپیمای جیوتو کشف کرد که هسته‌ی صلب دنباله‌دار هالی با پوسته‌ای تیره پوشانده شده که از ملکول‌های غنی از کربن، شبیه مواد سازنده‌ی سلول‌های زنده، ساخته شده است. پژوهش‌های بعدی نیز نشان داد که دنباله‌دارها از نخستین بلوک‌های سازنده‌ی منظومه‌ی شمسی بوده‌اند و حاوی ذرات کربنی سحابی خورشیدی‌اند. امکان دارد برخورد این هسته‌های یخی با زمین، پدیدآورنده‌ی اقیانوس‌های زمین باشد.




هسته: بگمدارنده‌ی دی-ان-ای سلول.
پروتئین‌ها شکل می‌گیرند.
ریبوسام، جایی که پروتئین‌ها شکل می‌گیرند.



مینوکوندریون: منبع انرژی سلول.

استروماتولیت



سلول‌های زنده

تمام حیات از سلول‌های بسیار ریز تشکیل شده است. برخی موجودات زنده فقط از یک سلول تشکیل شده‌اند. در حالی که بدن انسان ۱۰۰ میلیارد سلول دارد. سلول‌ها، بنا بر عملکرد خود در بدن، جزئیات متفاوتی دارند. اما بلوک‌های سازنده‌ی همه‌ی آن‌ها یکسان است.

تک‌سلولی‌ها

بسیاری از گونه‌ها فقط از یک سلول ساخته شده‌اند؛ از جمله جلبک‌های برکه‌نشین و باکتری‌هایی که عامل انتشار بیماری هستند. برخی از آن‌ها در چشمه‌های آب جوشان یا در اعماق زمین زندگی می‌کنند. گاهی وقت‌ها تک‌سلولی‌ها به صورت کلنی‌هایی کنار هم جمع می‌شوند؛ هم‌چون سنگ مانند.

شکل‌های ساده‌ی حیات

برخی از ساده‌ترین شکل‌های حیات، صدها میلیون سال است که دوام آورده‌اند. سرخس، نخستین گیاهی بود که بسیار پیش از شکل‌گیری گیاهان گل‌دار، خشکی را فراگرفت. نرم‌تنان در دریا و حشره‌ها روی خشکی هم ۳۵۰ میلیون سال است که دوام آورده‌اند.

سامانه‌های پیچیده‌ی حیات

بسیاری از گیاهان و حیوانات تحول یافته‌اند تا پیچیده‌تر شوند. گیاهان گل‌دار برای گرده‌افشانی از حشره‌ها کمک می‌گیرند. پرندوها و پستانداران خون‌گرم‌اند؛ پس می‌توانند در برابر تغییرات دمایی تاب بیاورند. دلفین‌ها و همه‌ی انواع میمون‌ها و سرنجام انسان‌ها مغزهای بزرگی دارند که به دوام آن‌ها کمک می‌کند. این‌ها گونه‌های تکامل یافته‌اند؛ اما تکامل هنوز ادامه دارد.



سرخس

سوسک (حشره)



گیاهان گل‌دار گرده‌های خود را به کمک پرندگان و دیگر حیوانات پخش می‌کنند



مرغ مگس

بیش‌تر بدانیم

جست‌وجوی حیات در مریخ ۱۳۴
قمرهای مشتری ۱۴۶
دیگر منظومه‌های شمسی ۱۹۸
حیات در دنیاهای دیگر ۲۵۶
هوش‌متدان فرازمینی ۳۵۸


ناره‌ترین شکل‌های گیاهان و حیوانات فقط در طی ۲ میلیون سال گذشته تکامل یافته‌اند.

ماه

ماه نزدیکترین جسم آسمانی به زمین است. این جفت در میان فضا به رقص گرانشی خود می‌پردازند: ماه به دور زمین می‌گردد و زمین هم به دور خورشید می‌چرخد. ماه در آسمان شب از هر جسم دیگری بزرگ‌تر و درخشان‌تر است. ماه نوری از خود ندارد و با بازتاب نور خورشید می‌درخشد. با گردش ماه به دور سیاره‌ی ما، مقدارهای متفاوتی از نیمه‌ی نورخورده‌ی آن را می‌بینیم که به آن اهله می‌گوییم؛ گاهی فقط یک هلال باریک و گاهی کل نیمه‌ی روشن (ماه بدر) را می‌بینیم. امکان دارد تا سه بار در سال، صورت درخشان ماه به سبب عبور از درون سایه‌ی زمین در فضا تیره شود یا اصطلاحاً بگیرد (خسوف).

از ماه، سوی روشن زمین در آسمان بسیار بزرگ به نظر می‌رسد (به پهنای ۴ برابر قرص ماه در آسمان زمین).


جوی در ماه وجود ندارد که مانع دید شود.



قمر زمین

ماه تنها قمر طبیعی زمین است. بیش‌تر قمرها، در مقایسه با سیاره‌ی مادرشان، بسیار کوچک‌اند. اما ماه، با قطر یک‌چهارم زمین، نسبتاً بزرگ و غیرعادی است در حقیقت، ماه به حد کافی بزرگ است که دستگاه زمین و ماه، یک منظومه‌ی سیاره‌ای دوگانه فرض می‌شوند.

تثلیث دوم: حدود سه‌چهارم بخش روشن ماه را می‌بینیم، اما این بخش مدام در حال کوچک شدن است.



ماه بدر: همگی بخش روشن ماه پیداست و ماه نسبت به خورشید، در سمت مخالف زمین قرار دارد؛ یعنی در آسمان در دورترین فاصله‌ی زاویه‌ای از خورشید است.

تثلیث اول: حدود سه‌چهارم بخش روشن ماه را می‌بینیم؛ اما این بخش مدام در حال کامل شدن است


تربیع اول: زمانی که ماه یک‌چهارم نخست مدارش را طی کند، بیمی از بخش روشن ماه دیده می‌شود.



ماه در یک نگاه

ماه کره‌ای غبارآلود و خشک از سنگ است که جو یا آب مایع ندارد. ماه در همان مدتی که به دور محور خود می‌چرخد، یک دور هم به دور زمین می‌گردد.

انحراف محور، چرخش و گردش در مدار




مقیاس



مسیر مداری


مدار ماه به دور زمین دایره‌ای کامل نیست؛ در نتیجه، فاصله‌ی بین آن‌ها تغییر می‌کند. ماه در نزدیک‌ترین حالت (حضیض) ۳۶۳۳۰۰ کیلومتر و در دورترین حالت (اوج) ۴۰۵۵۰۰ کیلومتر تا مرکز زمین فاصله دارد. مدار بیش‌تر قمرهای منظومه‌ی شمسی، که در مقایسه با سیاره‌ی خود اندازه‌ی کوچکی دارند و هم‌زمان با سیاره در کنار آن شکل گرفته‌اند، تقریباً منطبق با صفحه‌ی استوای سیاره است. اما صفحه‌ی مدار ماه نسبت به استوای زمین زاویه دارد و بیش‌تر به دایره‌البروج (صفحه‌ی منظومه‌ی شمسی) نزدیک است تا صفحه‌ی استوای زمین.


تربیع دوم: نیمی از بخش روشن ماه را می‌بینیم هنوز یک چهارم مراحل چرخشی اهله با تکمیل شدن مانده است.



چرخشی اهله‌ی ماه

هلال افزایشده، فقط باریکه‌ای از بخش روشن ماه دیده می‌شود؛ اما اندازه‌ی آن هر شب افزایش می‌یابد.





گرفتگی‌های ماه (خسوف)

وقتی ماه کامل (بدر) وارد سایه‌ی زمین می‌شود، ماه گرفتگی رخ می‌دهد. زمین مانع رسیدن نور مستقیم خورشید به ماه می‌شود و رخ ماه، تیره یا متمایل به سرخ به نظر می‌آید. در گرفتگی کلی، همه‌ی سطح ماه داخل تمام‌سایه، مرکز و تیره‌ترین بخش سایه، است. در گرفتگی جزئی، قسمتی از ماه درون تمام‌سایه و قسمتی درون نیم‌سایه، بخش روشن‌تر و خارجی‌تر سایه، است. در گرفتگی نیم‌سایه‌ای نیز ماه فقط از نیم‌سایه‌ی زمین می‌گذرد. سایه‌ی زمین کاملاً هم تاریک نیست. کمی از نور خورشید، به‌خصوص طول موج‌های بلندتر قرمز، از جو زمین به درون سایه منتشر می‌شود. همین نور، سبب رنگ سرخ زیبای ماه گرفته می‌شود.



اسطوره‌های مربوط به ماه

مردم خرافاتی در داستان‌های عامیانه‌ی قدیمی و اسطوره‌ها، نیروهای غریبی را به ماه نسبت می‌دادند. آنان می‌گفتند که ماه کامل، بعضی از مردم را دیوانه و برخی را به موجود وحشی گرگ‌مانندی تبدیل می‌کند و به جادوگران نیرویی مضاعف می‌دهد. به باور برخی، عوارض تیره و روشن سطح ماه نشان‌دهنده‌ی صورت یک انسان یا شکل یک خرگوش بود.

این‌که گرگ‌ها شب ماه بدر زوزه می‌کشند، افسانه‌ای بیش نیست.



اهله‌ی ماه

نیمی از کره‌ی ماه، مانند زمین، همواره به سوی خورشید و نیمی دیگر غرق در تاریکی است. با گردش ماه به دور زمین، آنچه از نیمه‌ی نورخورده‌ی ماه می‌بینیم، تغییر حالت می‌دهد که به آن اهله‌ی ماه می‌گویند. اهله‌ی ماه چرخه‌ی کاملی را طی می‌کند: از ماه نو، زمانی که سمت تاریک ماه به سوی ماست، تا ماه کامل، زمانی که سمت روشن ماه کاملاً به سوی ماست و دوباره تا ماه نو بعدی.

هلال کاهنده: باریکه‌ای از بخش روشن ماه همچنان دیده می‌شود؛ اما به تدریج کوچک و ناپیدا می‌شود.



ماه‌های قمری و نجومی

۲۷/۳۲ روزه‌ی که طول می‌کشد تا ماه یک بار به دور زمین بگردد، ماه نجومی نامیده می‌شود و موقعیت آن در مقایسه با ستاره‌های زمینه سنجیده می‌شود. اما در حقیقت کمی بیش‌تر، ۲۹/۵۳ روزه، طول می‌کشد تا ماه تمام اهله‌ی خود را یک بار طی کند. زیرا زمین هم در همان زمان در حال گردش به دور خورشید است و ماه را نیز در این سفر با خود می‌برد. این دوره را، که مبنای سنجش آن تکرار موقعیت ماه نسبت به خورشید است، ماه قمری می‌نامند. نخستین تقویمی که انسان شناخت، اهله‌ی تکرارشونده‌ی ماه، یعنی ماه قمری، بود که این دوره‌ی تقریباً ۳۰ روزه مبنای ماه‌های تقویم خورشیدی و میلادی نیز شد.



ماه گرفتگی‌های مهم

سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰

(زمستان ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۹)

اگر ماه در این شب‌ها بالای افق محل رصد شما باشد، ماه گرفتگی دیده می‌شود. وضعیت دیده شدن هر گرفت در آسمان ایران، در ستون چپ آمده است.

۲۱ فوریه ۲۰۰۸ (کلی)	نیمه‌ی اول گرفت
۱۶ اوت ۲۰۰۸ (جزئی)	تمام مراحل
۳۱ دسامبر ۲۰۰۹ (جزئی)	تمام مراحل
۲۶ ژوئن ۲۰۱۰ (جزئی)	دیده نمی‌شود
۲۱ دسامبر ۲۰۱۰ (کلی)	دیده نمی‌شود
۱۵ ژوئن ۲۰۱۱ (کلی)	تمام مراحل
۱۰ دسامبر ۲۰۱۱ (کلی)	نیمه‌ی دوم گرفت
۴ ژوئن ۲۰۱۲ (جزئی)	دیده نمی‌شود
۲۵ آوریل ۲۰۱۳ (جزئی)	تمام مراحل
۱۵ آوریل ۲۰۱۴ (کلی)	دیده نمی‌شود
۸ اکتبر ۲۰۱۴ (کلی)	دیده نمی‌شود
۴ آوریل ۲۰۱۵ (کلی)	فقط پایان نیم‌سایه‌ای
۲۸ سپتامبر ۲۰۱۵ (کلی)	نیمه‌ی اول گرفت
۷ اوت ۲۰۱۷ (جزئی)	تمام مراحل
۳۱ ژانویه ۲۰۱۸ (کلی)	نیمه‌ی دوم گرفت
۲۷ ژوئیه ۲۰۱۸ (کلی)	تمام مراحل
۲۱ ژانویه ۲۰۱۹ (کلی)	فقط ابتدای گرفت
۱۶ ژوئیه ۲۰۱۹ (جزئی)	تمام مراحل

شناسنامه

۳۴۷۶ کیلومتر	قطر
۳۸۴۴۰۰ کیلومتر	فاصله‌ی متوسط تا زمین
۱/۰۲ کیلومتر بر ثانیه	سرعت مداری به دور زمین
۲۷/۳۲ روز	دوره‌ی انتقالی (گردش به دور زمین)
۲۹/۵۳ روز	از ماه نو تا ماه نو (شبانمروز)
۲۷/۳۲ روز	دوره‌ی وضعی (چرخش به دور خود)
۵/۰۱	جرم (زمین = ۱)
۵/۰۲	حجم (زمین = ۱)
۳/۳۴	چگالی متوسط (آب = ۱)
۵/۱۷	گرانرش سطحی (زمین = ۱)
۶/۷	تمایل محوری (از حالت عمود بر صفحه‌ی مداری)
۵/۱	انحراف مداری (از دایره‌البروج یا صفحه‌ی منظومه‌ی شمسی)
۲۰- درجه‌ی سانتی‌گراد	دمای متوسط سطحی
بیش‌تر بدانیم	
زمین ۱۰۲، تأثیرات ماه ۱۱۲، سطح ماه ۱۱۴، گرفت‌های خورشید ۱۸۰	

تأثیرات ماه

با این که ماه بسیار کوچکتر از زمین است، بر همدم بزرگترش آثاری می‌گذارد. همان‌طور که گرانش زمین ماه را می‌کشد، گرانش ماه نیز زمین را می‌کشد و آن را کمی به شکل بیضی درآورده است. این تغییرات به سختی بر خشکی‌ها تأثیر می‌گذارند؛ اما موجب برآمدگی اقیانوس‌ها در هر دو سوی سیاره و بروز جزر و مد در سواحل می‌شوند. از سوی دیگر، جزر و مد بر سرعت چرخش زمین و فاصله‌ی بین زمین و ماه تأثیر می‌گذارد.



جزر و مد

دوبار در هر روز، با ورود A زمین به برآمدگی‌های کُشدی حاصل از گرانش ماه و خروج از آن‌ها، آب‌های اقیانوس‌ها دچار مد (بالآمدگی) و سپس جزر (پایین رفتن) می‌شود. این چرخه‌ی کُشدی ۲ ساعت و ۵۰ دقیقه طول می‌کشد؛ زیرا حرکت ماه به دور زمین به گونه‌ای است که هر شب ماه حدود ۵۰ دقیقه دیرتر در نقطه‌ای خاص روی زمین طلوع می‌کند. ارتفاع دقیق کُشدی‌ها نه تنها به موقعیت ماه در مدار، بلکه به جغرافیای محلی نیز بستگی دارد.

مد، سورن استواری، انگلستان




جزر، سورن استواری، انگلستان




دلیل کُشدی‌ها

آب‌ها در سمتی از زمین، که به ماه نزدیک‌تر است، کشش گرانشی ماه را قوی‌تر حس می‌کنند. در حالی که آب‌های سمت مخالف زمین کمترین تأثیر را می‌پذیرند. در نتیجه آن‌ها نیز در مقایسه با بقیه‌ی جاها، برآمده به نظر می‌رسند. دو برآمدگی کُشدی در آب‌ها شکل می‌گیرند و حرکت ماه را در مدار خود به دور زمین دنبال می‌کنند. چرخش زمین موجب حرکت برآمدگی‌های کُشدی نیز می‌شود؛ به طوری که امتداد این برآمدگی‌ها، به جای این که درست در امتداد ماه باشد، کمی جلوتر از آن است.




مه‌کُشدی و که‌کُشدی

در زمان ماه بدر (کامل) و ماه نو، خورشید و زمین و ماه در یک خط قرار می‌گیرند. گرانش خورشید و نیروهای کُشدی ماه با هم ترکیب می‌شوند و بلندترین مد و کوتاه‌ترین جزر را ایجاد می‌کنند که به آن‌ها مه‌کُشدی می‌گویند. وقتی ماه در حالت تربیع اول و تربیع آخر است، خورشید با آن زاویه‌ی قائم می‌سازد. گرانش خورشید از نیروهای کُشدی ماه می‌کاهد و موجب که‌کُشدی می‌شود. این‌ها همان کوتاه‌ترین مد و بلندترین جزر هستند.



خورشید گرفتگی کلی سال ۱۳۶ پیش از میلاد.

مرجان فسیل شده



کند شدن کشندی

اصطکاک میان سطح زمین و برآمدگی‌های کشندی، به تدریج چرخش زمین را کند می‌کند، پس بیش‌تر و بیش‌تر طول می‌کشد تا زمین یک بار به دور محور خود بچرخد. شواهد این امر از ثبت‌های خورشید گرفتگی‌های کامل گذشته حاصل می‌شود. مسیر خورشید گرفتگی کلی پانزدهم آوریل سال ۱۳۶ پیش از میلاد، از شهر بابل در امپراتوری ایران باستان می‌گذشت. اگر زمین در آن زمان تقریباً با سرعتی به دور محور خود می‌چرخید که امروز می‌چرخد، مسیر آن کسوف بسیار غرب‌تر بود. فسیل‌های مرجانی هم شواهدی به دست می‌دهند. خطوط رشد آن‌ها نشان می‌دهد که ۳۵۰ میلیون سال پیش، روز زمین حدود ۳ ساعت کوتاه‌تر از امروز بود. تخمین زده می‌شود که چرخش زمین در هر قرن حدود چند هزارم ثانیه کند می‌شود.

فاصله‌سنجی لیزری

اخترشناسان می‌توانند به کمک فاصله‌سنجی لیزری، فاصله‌ی بین زمین و خورشید را اندازه بگیرند. پرتو قوی لیزر به سوی ماه تابانده می‌شود و بازتابنده‌هایی که از مأموریت‌های آپولو روی سطح ماه مانده‌اند، لیزر را دوباره به سوی زمین باز می‌تابانند. اخترشناسان می‌دانند که نور با سرعت حدود ۳۰۰ هزار کیلومتر بر ثانیه حرکت می‌کند، پس با دانستن زمان رفت و برگشت پرتو لیزر، می‌توانند فاصله‌ی بین زمین و ماه را محاسبه کنند. فاصله را به این روش می‌توان با دقت باورنکردنی چند میلی‌متر محاسبه کرد.



دریای شرقی یا اوربیتال

دیدن پشت ماه


دیدن اثر رخ‌گرد، به‌خصوص با دوربین دوچشمی، ساده است. این تصویر در زمانی گرفته شده که بیش‌ترین مقدار از سطح ماه در لبه‌ی غربی آن پیدا بوده است. بخشی از دریای شرقی در بخش چپ، پایین رخ ماه، پیداست.

بیش‌تر بدانیم

زمین ۱۰۲، ۱۱۰ ماه
سمت نزدیک ماه ۱۱۸
سمت دور ماه ۱۲۰
زمین چرخان ۲۶۲


رخ ماه

زمان گردش ماه به دور زمین با زمان چرخش آن به دور خودش، برابر است. در نتیجه، هرچه ماه به دور خود می‌چرخد تا کمی از نیمه‌ی پشتی آن پیدا شود، به همان اندازه نیز به دور زمین می‌گردد و همواره یک روی ماه به طرف زمین است. کاهش سرعت چرخش زمین به دور محور خود به این معنی است که ماه به تدریج در حال دور شدن از زمین است و خودش هم کندتر خواهد چرخید. اگر این روند ادامه پیدا کند، طول شبانه‌روز زمین سرانجام با یک ماه برابر می‌شود. در آن هنگام، همواره یک روی زمین به سوی ماه خواهد بود؛ یعنی از سیمی از کره‌ی زمین دیگر هرگز ماه دیده نخواهد شد. در منظومه‌ی شمسی برای پلوتون و قمر آن، کارون، چنین اتفاقی افتاده است.




رخ‌گرد

مدار ماه کاملاً دایره نیست؛ به این سبب، سرعت حرکت ماه تغییر می‌کند. وقتی به زمین نزدیک‌تر است، تندتر و وقتی دورتر است، کندتر حرکت می‌کند؛ بنابراین، چرخش ماه دقیقاً با موقعیت آن در مدارش هماهنگ نیست. در نتیجه، گاهی اوقات می‌توانیم فراتر از لبه‌های نیمه‌ی پیدای ماه را هم ببینیم. این اثر، معروف به رخ‌گرد یا لیبراسیون، سبب می‌شود که تا ۹ درصد از پشت ماه را، که از دید ما روی زمین پنهان است، ببینیم.



سطح ماه

جسمی به اندازه‌ی مریخ
ضربه‌ای به زمین وارد کرد



مواد پرتاب شده به فضا،
حلقه‌ای دور زمین تشکیل
دادند و سپس به هم پیوستند
تا ماه را شکل دهند.

منشأ ماه

نظریه‌های گوناگونی

درباره‌ی پیدایش ماه بیان

شده است. شاید ماه همراه زمین شکل گرفته باشد یا این‌که جای دیگری شکل گرفته و سپس به دام گرانش زمین افتاده باشد. اما ماه بزرگ‌تر از آن است که از این دو راه پدید آمده باشد. علاوه بر این، ساختار آن بیش‌تر شبیه پوسته‌ی زمین است تا هسته‌ی آن. محتمل‌ترین نظریه «برخورد بزرگ» است که می‌گوید در ابتدای پیدایش منظومه‌ی شمسی، جسمی به اندازه‌ی مریخ، که با سرعت زیادی در حرکت بود، با زمین جوان برخورد کرد. مواد مذاب از هر دو جسم به فضا پرتاب شدند و در اطراف زمین به گردش درآمدند. این مواد، سرانجام ماه را شکل دادند.

رگولیت یا خاک ماه لایه‌ی سطحی از
غبار و سنگ است که در اثر بمباران
شهاب‌سنگ‌ها ایجاد شده است.

دریا نامی است که به دشت‌های تیره‌ی
ماه داده شده است. در قرن هجدهم،
افرادی مانند گالیله تصور کردند که این
نواحی دریا هستند و این نام هنوز به یاد
آن‌ها بر این دشت‌ها مانده است.

دهانه‌ها عوارصی کاسه‌شکل هستند که از
برخورد سنگ‌های آسمانی بر جای مانده‌اند.

ضخامت پوسته‌ی سنگی ۶۰
تا ۱۰۰ کیلومتر است.

ارتفاعات، بالاتر از سطح دریاها، نخستین بخش‌های
پوسته بودند که حنک و ملب و جامد شدند.

سطح ماه به طور میانگین فقط ۷ درصد از
نوری را که به آن می‌تابد، بازتاب می‌کند.

رشته کوه‌ها نواحی بیرون‌زده‌ای از
پوسته هستند که دورتادور برخی دریاها
و دهانه‌های بزرگ را پوشانده‌اند.

بزرگ‌ترین دهانه‌ها را، که قطری
برابر چند صد کیلومتر دارند،
حوضه‌ی برخوردی می‌نامند.

فضانورد مأموریت آپولو بر سطح ماه




چشم‌انداز ماه

روی سطح ماه، دو چشم‌انداز مشخص و متفاوت دیده می‌شود: دشت‌های خاکستری پُررنگ یا دریاها و ارتفاعات روشن‌تر. این ارتفاعات، که تعداد بسیاری دهانه‌ی برخوردی روی آن‌هاست، قدیمی‌ترین نواحی باقی‌مانده‌ی پوسته‌ی ماه هستند. دشت‌های هموار خاکستری، که از چند قرن پیش دریا نامیده شده‌اند، در اصل دهانه‌های عظیم که با گدازه پُر شده‌اند؛ زمانی که ماه درون فعال و مذاب داشت. آن‌ها عموماً تعدادی دهانه‌ی برخوردی کوچک‌تر و جوان‌تر دارند و معمولاً اطرافشان را کوه‌هایی پوشانده است.


تاریخچه ماه




دهانه‌ی برخوردی کوپرنیک حدود ۸۰۰ میلیون سال پیش شکل گرفت.



با سرد شدن درون ماه و سخت شدن پوسته‌ی آن، فعالیت‌های آتشفشانی کم‌کم از بین رفت.




با جاری شدن گدازه بر بستر دهانه‌ی برخوردی، دریای باران‌ها شکل گرفت.



گدازه از میان ترک‌هایی در پوسته جاری می‌شود.



این دهانه‌ی عظیم، سرانجام به دریای باران‌ها تبدیل می‌شود.



شهاب‌سنگ‌ها با شدت به پوسته‌ی ماه کوبیده می‌شوند.

۱. چهار میلیارد سال پیش


ماه، در نخستین ۷۵۰ میلیون سال زندگی خود، در تیررس بمباران نابودکننده‌ی سنگ‌های آسمانی بود. برخورد آن‌ها پوسته را سوراخ سوراخ کرد و دهانه‌هایی را بر همی سطح ماه شکل داد.

۲. سه میلیارد سال پیش

بمباران‌ها کاهش یافت. دوره‌ای از فعالیت‌های شدید آتشفشانی در پی آمد که دهانه‌های بزرگ و عمیق را با گدازه (سنگ مذاب)، که از عمق ۱۰۰ کیلومتری زیر سطح بیرون زده بود، پر کرد. این گدازه‌ها سپس سرد و جامد شدند و دریاهای را شکل دادند.

۳. ماه امروز

سطح ماه در ۱/۶ میلیارد سال گذشته کمی تغییر کرده است. تعدادی دهانه‌ی جوان و درخشان، مانند دهانه‌ی کوپرنیک، به وجود آمده‌اند. بیش‌تر پوسته‌ی اولیه‌ی ماه، به سبب فرآیند ساخت دهانه‌های برخوردی، نابود شد. اما پس از پایان بمباران و سرد شدن درون ماه، چون مانند زمین جو و فرسایشی نداشت، چهره‌ی پُرگودال و آبله‌روی آن دست‌نخورده ماند.




دمای سطح ماه

بر سطح ماه دمای روز و شب و روشنی و تاریکی بسیار متفاوت است، چنان‌که در سردترین حالت در شب به ۱۸۰- درجه‌ی سانتی‌گراد و در گرم‌ترین حالت در نیمه‌ی روز به ۱۱۰ درجه‌ی سانتی‌گراد می‌رسد. نبود جو در اطراف ماه، یعنی که چیزی برای تنظیم دمای سطحی وجود ندارد. بخش روشن سطح در معرض حرارت زیادی از سوی خورشید است؛ اما وقتی تاریکی آغاز می‌شود، حرارت هم یک‌باره از دست می‌رود. حتی در روز دمای بخش زیر نور خورشید، با چند متر آن سوتر در تاریکی سایه‌ی یک سنگ، بسیار متفاوت است.

بیش‌تر بدانیم

سمت نزدیک ماه ۱۱۸
سمت دور ماه ۱۴۰، عطارد (تیر) ۱۲۲
سیارک‌ها ۱۶۶، شهاب‌سنگ‌ها ۱۶۸

دهانه‌های ثانویه با سقوط مواد پرتاب شده شکل می‌گیرند.




مواد نرم باقی‌مانده در کف دهانه.

مسیر مواد پرتاب شده

دهانه‌های ثانویه زمانی شکل می‌گیرند که مواد پرتاب شده دوباره فراتر از لبه‌ی دهانه، سقوط و با سطح برخورد کنند. در این هنگام، تعداد بسیاری دهانه‌های کوچک‌تر شکل می‌گیرد.

دیواره‌ای از سنگ‌های ماه دور تا دور دهانه‌ی برخوردی بیرون می‌زند.




سنگ شکسته

مواد به سبب نیروی برخورد به بیرون، از دهانه پرتاب می‌شوند.

برخورد شهاب‌سنگ، گودالی کاسه‌شکل ایجاد می‌کند که دور تا دور آن را دیواره‌ای سنگی احاطه کرده، است. مواد از این گودال به بیرون پرتاب می‌شوند.

دهانه‌ای با رگه‌هایی از مواد پرتاب شده در اطراف آن را دهانه‌ی رگه‌دار می‌نامند.




پوششی از مواد پرتاب شده، نواحی فراتر از دیواره‌ی دهانه را پوشانده است.

وقتی کف دهانه، پس از برخورد به وضعیت پیشین بازگشت، حلقه‌هایی از کوه شکل می‌گیرد.


ممکن است دهانه‌ای کاملاً شکل گرفته، میلیون‌ها سال بدون تغییر باقی بماند؛ مگر این‌که برخورد دیگری آن را نابود کند یا تغییر شکل دهد. روی ماه هیچ آب یا هوایی نیست که آن را پاک کند. همی دهانه‌ها به روش یکسانی شکل می‌گیرند؛ اما ممکن است ویژگی‌های متفاوتی، از دیواره‌های پلکانی و حلقه‌های مرکزی تا رگه‌ها و پوششی از مواد پرتاب شده به اطراف داشته باشند.

کاوش ماه



آزمایش‌های علمی آپولو

فضانوردان ابزارهایی روی ماه باقی گذاشتند تا آزمایش‌هایی انجام دهند و نتیجه را به زمین ارسال کنند. آن‌ها شدت ماه‌لرزه‌ها (حرکت‌هایی در پوسته‌ی ماه)، دمای خاک، مقدار غبار در فضا و مقدار ذرات باد خورشیدی که به ماه می‌رسد را اندازه گرفتند.



برنامه‌ی آپولو

در سال ۱۹۶۱، ایالات متحده‌ی آمریکا برنامه‌ی فضایی آپولو را به راه انداخت که هدف آن، فرستادن فضانوردانی به ماه تا پایان آن دهه بود. موشکی قدرتمند به نام ساترن ۵، طراحی و ساخته شد. در نخستین مأموریت‌های آپولو در بخش‌های متفاوت سفر، از این موشک استفاده شد. در روندی که با فضاپیما آپولو ۱۱ در سال ۱۹۶۹ آغاز شده بود، شش فضاپیما بر سطح ماه نشستند. دوازده فضانورد سطح ماه را کاوش و عکس‌برداری کردند و ۳۸۸ کیلوگرم سنگ و خاک برای بررسی بیشتر به زمین آوردند. فضانوردان مأموریت‌های آپولو، تنها انسان‌هایی هستند که تاکنون به ماه رفته‌اند.

سفر به ماه

در ژوئیه‌ی سال ۱۹۶۹، نیل آرمسترانگ و باز آلدرین، سوار بر فضاپیما آپولو ۱۱، به کمک موشک ساترن ۵ از پایگاه فضایی کپ کاناورال ایالات متحده به فضا پرتاب شدند. آن‌ها ۱۰۲ ساعت و ۴۵ دقیقه بعد درون مدول ممتشین بر سطح ماه در سمت رو به زمین ماه فرود آمدند. سومین فضانورد مأموریت، مایکل کالینز، درون مدارگرد (مدول‌های فرمان‌دهی و خدمات) در مداری به دور ماه ماند. پس از پایان مأموریت، آن دو نفر نیز به مدار بازگشتند تا با هم به سوی زمین بازگردند.

خودرو معنورد، اتومبیل برقی جیب‌مانندی بود که فضانوردان آپولو ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ از آن استفاده کردند.


مدول ممتشین، اقامتگاه فضانوردان روی ماه بود. از بخش بالایی آن بزر برای سفر بازگشت به زمین استفاده می‌شد.



جیم ایروین، فضانورد آپولو ۱۵.

یخ روی ماه

فضاییمهای کلمنتاین، پوشش گر ماه (لودر پراسپکتر)، چاندراپا و J.CROSS که در دهه‌ی ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ میلادی پرتاب شدند، مدارکی یافتند که در دهانه‌های در سایه‌مانده‌ی نواحی قطبی ماه، یخ آب پنهان است. زاویه‌ی تابش خورشید بر این دهانه‌های قطبی چنان مایل است که نور به کف آن‌ها نمی‌رسد. احتمالاً این یخ از دنباله‌دارهایی آمده است که سال‌ها پیش با ماه برخورد کرده بودند. اگر این موضوع قطعی باشد، می‌توان این یخ را بعدها برای تأمین آب در پایگاهی روی ماه ذوب یا آنرا برای تنفس فضانوردان به اکسیژن و برای سوخت موشک‌ها به هیدروژن تبدیل کرد.




مدارگرد پوشش‌گر ماه با لودر پراسپکتر بیش‌تر اوقات سال ۱۹۹۸ در ارتفاع ۱۰۰ کیلومتری بالای سطح ماه در مدار گشت و سپس تا ارتفاع ۱۰ کیلومتری پایین آمد.

مأموریت	تاریخ فرود	مکان فرود	فعالیت	مدت زمان توقف بر سطح ماه
آپولو ۱۱	۲۰ ژوئیه ۱۹۶۹	دریای آرامش	نخستین فضانوردی که قدم بر ماه گذاشت	۲۴ ساعت
آپولو ۱۲	۱۹ نوامبر ۱۹۶۹	اقیانوس توفان‌ها	نخستین آزمایش‌های بزرگ علمی	۳۲ ساعت
آپولو ۱۴	۵ فوریه ۱۹۷۱	نزدیک دهانه‌ی فرا	نخستین فرود در ارتفاعات ماه	۳۴ ساعت
آپولو ۱۵	۳۰ ژوئیه ۱۹۷۱	دامنه‌های کوهستان آپنین	نخستین گشت‌وگذار با خودرو روی سطح ماه	۶۷ ساعت
آپولو ۱۶	۲۱ آوریل ۱۹۷۲	نزدیک دهانه‌ی جسکار تس	کاوش ارتفاعات	۷۱ ساعت
آپولو ۱۷	۱۱ دسامبر ۱۹۷۲	نزدیک دهانه‌ی لیترو، لمبی دریای آرامش	طولانی‌ترین و آخرین اقامت روی ماه	۷۵ ساعت

کاوش گرهای ماه

مأموریت‌های آپولو به سبب بردن فضانوردان به ماه مشهور است. اما بسیاری از فضاییم‌ها، که از راه دور هدایت می‌شدند، مانند کاوش گرهای رنجر و سورویور ایالات متحده نیز به این سفر رفتند. کاوش گرهای لونا‌ی روسی نخستین فضاییم‌هایی بودند که به ماه رسیدند، در مداری به دورش گشتند، از سوی دور آن عکس گرفتند و بر سطحش نشستند. بین سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۷۳، دو خودرو روبات روسی، به نام‌های لونا خود ۱ و ۲، به کاوش ماه پرداختند.


آنتن‌ها تصاویر تلویزیونی را به زمین مخابره می‌کنند.



پس از فرود، «گل‌برگ‌ها» باز می‌شوند تا آنتن‌ها بار شوند. لونا - ۹ نخستین کاوش‌گری بود که در سال ۱۹۶۶ بمهرمی و با موفقیت بر سطح ماه فرود آمد.

پایگاه‌های ماه

ممکن است در ۵۰ سال آینده، پایگاه‌های ثابتی، مجهز به تلسکوپ برای بررسی ستاره‌ها و ابزارها و سازه‌هایی برای کاوش منابع معدنی غنی، روی ماه ساخته شود. امکان دارد این پایگاه‌ها توقف‌گاه‌هایی برای کاوش گرانی باشد که قصد سفر به نقاط دورتری را در منظومه‌ی شمسی دارند. شاید هم مقصدی غیر عادی برای گردش گران فضایی باشد که تعطیلات خود را در آن‌ها بگذرانند.



دانشمندان روی زمین با کمک دوربین‌ها این خودرو را هدایت می‌کردند.

ابزار آزمایش خاک


چرخ‌ها در خاک نرم ماه فرو می‌رفتند.

اقامت‌گاه‌ها زیر خاک مدفون می‌شوند تا مسافران ماه را از دماهای پم‌شدت سرد و گرم و فوران‌های تشعشع‌های خورشیدی محفوظ بدارند.

مف‌هم‌های خورشیدی انرژی لازم برای اقامت‌گاه‌ها را فراهم می‌آورند.

خودروهای م‌منورد ساکنان را در منطقه جابه‌جا می‌کنند.

بشقاب‌های مخابراتی پیام‌ها را به زمین ارسال و از زمین دریافت می‌کنند.



نخستین‌های ماه

• لونا - ۲ نخستین فضاییمایی بود که با سطح ماه برخورد کرد. این کاوش‌گر فضایی در سال ۱۹۵۹ به روش فرود برخوردی به سطح ماه رسید. ماه بعد، لونا - ۳ نخستین تصاویر را از سمت دور و پنهان ماه گرفت.

• فضاییمای رنجر - ۷ در سال ۱۹۶۴ با ماه برخورد کرد و با تهیه‌ی ۴۳۰۸ عکس، نخستین تصاویر نمای نزدیک ماه را گرفت.

• در سال ۱۹۶۶، لونا - ۹ نخستین تصاویر تلویزیونی را از سطح ماه مخابره کرد.



سنگی از ماه

• در سال ۱۹۶۸، آپولو - ۸ نخستین فضانوردان را در مداری به دور ماه برد. آن‌ها ۱۰ بار دور ماه گشتند.

• در سال ۱۹۶۹، نیل آرمسترانگ نخستین انسانی بود که بر سطح ماه قدم گذاشت. او در مأموریت آپولو ۱۱، نمونه‌هایی از سنگ و خاک ماه را به زمین آورد.

• در سال ۱۹۷۰، لونا - ۱۶ نخستین بازیابی خودکار از نمونه‌های ماه را انجام داد.

بیش‌تر بدانیم



موشک‌ها چگونه کار می‌کنند؟ ۴۴
پرواز به فضا ۷۰
کاوش‌گرهایی به سوی سیاره‌ها ۹۶
سمت نزدیک ماه ۱۱۸
سمت دور ماه ۱۲۰

سمت نزدیک ماه

عوارض اصلی بر سمت نزدیک ماه، سمتی که همیشه رو به زمین است، دریاهای تیره‌اند که اخترشناسان قدیم گمان می‌کردند دریا هستند. این دشت‌های پُرگدازه زمانی شکل گرفتند که سنگ‌های مذاب از زیر سطح بالا آمدند و گودال‌های حاصل از برخورد شهاب‌سنگ‌ها را پُر کردند. حتی بزرگ‌ترین آن‌ها، اقیانوس توفان‌ها نیز، از دریای مدیترانه کوچک‌تر است. این دهانه‌ها همه جای سطح ماه، درون دریاها و حتی روی کوهستان‌هایی را که دور تا دور آن‌ها را پوشانده‌اند، نیز پُر کرده‌اند. فرود تمام فضاپیماها تاکنون بر سمت نزدیک ماه، یعنی نیمه‌ی رو به زمین بوده است.

دریای بخران‌ها


دریای بخران‌ها، که از مجموعه دریاهای به هم پیوسته‌ی ماه جداست، ۵۶۳ × ۴۵۰ کیلومتر وسعت دارد. کف هموار و پُرشده از گدازه‌ی آن شامل دو دهانه‌ی فوق‌العاده‌ی پیکارد و پیرس و چند دهانه‌ی کوچک‌تر است. کاوش گرلونا - ۲۴ در سال ۱۹۷۶ با ۱۷۰ گرم از خاک این دریا به زمین بازگشت.



این تصویر از کوهستان روپس آلتای را یکی از ۵ مدارگرد لونا ۵ آرپیتر گرفته است. این مدارگردها در سال‌های ۱۹۶۶ و ۱۹۶۷ ماه را نقشه‌برداری کردند تا مکان فرود آپولو را مشخص کنند.


روپس آلتای

روپس آلتای رشته کوهی است که به صورت قوسی دور تا دور لبه‌ی جنوب غربی دریای شهادت را فراگرفته است. ارتفاع این کوه ۱۸۰۰ متر بالاتر از سطح این دریاست. روپس آلتای هم مانند کوهستان آپنین، زمانی شکل گرفته که نیروی برخورد شهاب‌سنگی با سطح ماه نواحی دور تا دور منطقه‌ی برخورد را بلند کرده است.



دهانه‌ی هومبولت

این دهانه‌ی برخوردی به یاد دولت‌مرد آلمانی، ویلهلم هومبولت (۱۸۳۵ - ۱۷۶۷)، نام‌گذاری شده است. دور تا دور این دهانه را دیواره‌ی کوهستانی بلندی فراگرفته است. پوششی از مواد پرتابی، که در زمان برخورد شهاب‌سنگی به بیرون پرتاب شده‌اند، زمین‌های بیرون از دیواره را فراگرفته است. یک قله‌ی مرکزی درون دهانه و مجموعه‌ای از تَرَک‌ها در سراسر بستر دهانه وجود دارد.



۱۹ و ۸۹۷ رنجر ۱۶ سورویور ۱ و ۵۳ و ۱۷ و ۶۹

لونا ۱۳ و ۹۰۲ و ۱۶ و ۱۷ و ۲۰ و ۱۴ و ۱۲ و ۱۱ آپولو ۱۷ و ۱۶ و ۱۵ و ۱۴ و ۱۳ و ۱۲ و ۱۱

بیش‌تر بدانیم


سطح ماه ۱۱۴، کاوش ماه ۱۱۶ سمت دور ماه ۱۲۰، سیارک‌ها ۱۶۶ شهاب‌سنگ‌ها ۱۶۸

مکان‌های فرود

مناطق که روی نقشه علامت‌گذاری شده، محل فرود ۱۶ فضاپیما بی‌سرنشین و ۶ فضاپیما بی‌سرنشین‌دار است که بین سال‌های ۱۹۵۹ و ۱۹۷۶ به ماه رفتند.


دریای باران‌ها

این دریای عظیم، ۳۰۸۵ میلیارد سال پیش، زمانی شکل گرفت که برخورد یک شهاب سنگ (خَرده سیاره‌ای نسبتاً بزرگ) حوضه‌ای عظیم را شکل داد و مواد را به بیش تر بخش‌های سمت نزدیک ماه پرتاب کرد. در چند میلیارد سال بعد، این حوضه‌ی برخوردی با گدازه‌هایی از درون ماه پُر شد.



رصد ماه

بسیاری از عوارض ماه با چشم غیر مسلح دیده می‌شود. نواحی تخت و تیره، دریاها و نواحی روشن تر، ارتفاعات هستند. با دوربین دوچشمی می‌توان دهانه‌های منفرد و رشته کوه‌ها را تشخیص داد. رصد زمانی ساده‌تر است که نور خورشید با زاویه‌ای آریب بر سطح می‌تابد. زیرا در این هنگام، سایه‌های بلندی که ایجاد می‌شوند، منظره را مانند نقش برجسته‌ای نمایان می‌کنند. به همین سبب، بیش ترین عوارض را در مرز تاریکی و روشنایی (سایه مرز) روی ماه می‌توان دید.



نمای دوربین دوچشمی از هلال یهن ماه.


کوه‌های آپنین

کوهستان آپنین یکی از باشکوه‌ترین رشته کوه‌های ماه است. این رشته کوه همراه با کوه‌های کاریاتوس، قفقاز (کائوکاسوس)، ژورا و آلپ، دیواره‌های دریای آرامش را می‌سازند. آن‌ها حلقه‌ای شکسته از کوه‌ها را دور لبه‌ی این دریا ایجاد کرده‌اند. زمانی که شهاب سنگ سازنده‌ی دریا با سطح ماه برخورد کرد، موج برخورد، سرزمین‌های اطراف را بلند کرد و این کوه‌ها را شکل داد.




کوپرنیک

یکی از بهترین مثال‌ها از دهانه‌ی رگه‌دار روی ماه، دهانه‌ی کوپرنیک است. قطر این دهانه ۱۰۷ و عمق آن ۴ کیلومتر است و رگه‌هایی از تکه سنگ‌های درخشان از آن بیرون زده است (ریز بودن تکه‌ها و ذرات تشکیل دهنده‌ی رگه‌ها دلیل روشن بودن و بازتاب بیش تر نور از آن‌هاست). درون کوپرنیک، دهانه‌های جوان و قله‌های مرکزی وجود دارند و لبه‌ی آن کاملاً با دیواره‌های پلکانی مشخص شده است. بررسی مواد رگه‌ها، که فضانوردان آپولو ۱۲ جمع کرده بودند، نشان داد که سن آن‌ها ۵۰ میلیون سال است.



عوارض سمت نزدیک

دریا‌های پهناور تیره‌ترین عوارض سمت نزدیک ماه هستند که ۲ تا ۵ کیلومتر پایین تر از سطح تراز ماه (مانند سطح اقیانوس‌ها در زمین) قرار گرفته‌اند. جدیدترین عوارضی که روی ماه شکل گرفته‌اند، دهانه‌های رگه‌دار درخشان‌اند. نواحی جنوبی تر، ناهموارترین بخش سمت نزدیک ماه هستند که بیش تر سرزمین‌های مرتفع و پُر دهانه با تعدادی دشت‌های پهناور دیواره‌دار را شامل می‌شوند. هر دو ناحیه‌ی قطبی ماه، نواحی مرتفع‌اند.




تیکو

دهانه‌ی رگه‌دار تیکو، که ۱۰۰ میلیون سال پیش شکل گرفته است، دارای قله‌های مرکزی و دیواره‌های پلکانی است. رگه‌های این دهانه فقط زیر نور مستقیم حوالی زمان ماه بدر دیده می‌شود.

سمت دور ماه


سمت دور ماه همواره پشت به زمین است. این روی ماه تا سال ۱۹۵۹، که کاوش گر فضایی روسی لونا - ۳ موفق شد به پشت ماه برود و نخستین عکس‌ها را بفرستد، ناشناخته بود. با آن‌که سمت دور ماه بسیار شبیه سمت نزدیک آن است، این دو سمت تفاوت‌های واضحی هم دارند. سمت دور دریاهای کمتری دارد؛ زیرا پوسته از سمت نزدیک ضخیم‌تر و برای گدازه‌ها مشکل است که از پوسته بیرون بزنند و داخل حوضه‌های برخوردی را پُر کنند. به‌علاوه، سمت دور ماه بیش‌تر در معرض برخوردها بوده و پُردهانه‌تر است.



کرولف

دهانه‌ی کرولف، با قطر ۴۳۷ کیلومتر، یکی از بزرگ‌ترین عوارض حلقه‌ای سمت دور ماه است. این دهانه یکی از ۱۰ دهانه‌ی سمت دور است که قطر آن به بیش از ۲۰۰ کیلومتر می‌رسد. چند دهانه‌ی کوچک‌تر درون آن قرار گرفته‌اند که یکی از آن‌ها کریلوف نام دارد. قطر کریلوف حدود ۵۰ کیلومتر است و یک قله‌ی مرکزی دارد.

دریای مسکووینسه



نخستین تصویر از سمت دور ماه


این تصویر از سمت دور ماه را فضایی‌های لونا-۳ در اکتبر سال ۱۹۵۹ گرفت. از نظر استاندارد‌های امروزی، این تصویر کیفیت خوبی ندارد؛ اما آن‌قدر واضح است که عوارض بزرگ، از جمله دریای مسکووینسه، در آن شناسایی شوند.

عوارض سمت دور

دو دریای بارز در سمت دور ماه دریای شرقی (اورینتال) و دریای مسکووینه هستند. دهانه‌ها فراوان، اما ظاهراً کوچک‌ترند و به اندازه‌ی دهانه‌های سمت نزدیک تیره نیستند. جالب توجه‌ترین دهانه‌ها، گودال‌های دایره‌ای مانند هرتسپرونگ، آپولو و کرولف هستند. حلقه‌ی خارجی دهانه‌ی هرتسپرونگ را دهانه‌های کوچک‌تر شکسته‌اند.

دریای شرقی (اورینتال)

این دریای بزرگ، که جوان‌ترین دریای ماه است، در مرز میان سمت دور و نزدیک ماه پخش شده است؛ اما بیش‌تر آن به سمت دور ماه تعلق دارد. دور تا دور این دهانه راه که قطر آن ۳۲۷ کیلومتر است، حلقه‌های کوه‌های هم‌مرکزی تا قطر ۹۰۰ کیلومتر فراگرفته و یکی از بدیع‌ترین مناظر سطح ماه را ساخته است. بعد از این رشته کوه‌های حلقه حلقه، مواد پرتاب شده قرار دارند که دهانه‌های پیش از آن را پوشانده‌اند. فقط بخش مرکزی این حوضه‌ی برخوردی با گدازه پوشیده شده و شکلی دریامانند به خود گرفته است.



ملک ایرانیان در ماه

برخی از دهانه‌های برخوردی سطح ماه به نام مشاهیر ایرانی نام‌گذاری شده‌اند. در سمت نزدیک ماه، دهانه‌ی ۴۷ کیلومتری صوفی (AZOPHI) به نام عبدالرحمن صوفی رازی است (عرض ۲۲ درجه‌ی جنوبی و طول حدود ۱۳ درجه‌ی شرقی). در لبه‌ی شمال غربی قرص ماه، در مرز سمت دور و نزدیک، دهانه‌ی ۷۰ کیلومتری خیام وجود دارد که گاهی بر اثر پدیده‌ی رُخ‌گرد در لبه‌ی سمت نزدیک ماه کاملاً دیده می‌شود (عرض ۵۸ درجه‌ی شمالی و طول ۱۰۲ درجه‌ی غربی). دهانه‌های دیگری نیز با نام ایرانیان اغلب نزدیک به این مرز در نیمه‌ی پنهان ماه‌اند: دهانه‌ی ۵۵ کیلومتری ابوالوفا به یاد ابوالوفای بوزجانی (عرض ۱ درجه‌ی شمالی و طول ۱۱۷ درجه‌ی شرقی)، دهانه‌ی ۷۷ کیلومتری بیرونی (عرض ۱۸ درجه‌ی شمالی و طول ۹۲ درجه‌ی شرقی)، دهانه‌ی ۶۵ کیلومتری خوارزمی (عرض ۷ درجه‌ی شمالی و طول ۱۰۶ درجه‌ی شرقی) و دهانه‌ی ۷۴ کیلومتری ابن‌سینا (عرض ۴۰ درجه‌ی شمالی و طول ۹۷ درجه‌ی غربی).

دهانه‌ی کریلوف

بسیاری از دهانه‌های سمت دور ماه به نام دانشمندان و فیلسوفان جهان نام‌گذاری شده‌اند. ژول، منظور فیزیک‌دان انگلیسی جیمز ژول است. (۱۸۸۹-۱۸۱۸)

لندادو

ژول

فرسمان

ماخ

تسندر

مایکلسون


کالونا

کوهستان بگور دیرا
کوهستان رونی
دریای شرقی

مندل

هرتسپرونگ، دهانه‌ای به قطر ۵۹۱ کیلومتر، یکی از عوارض مهم سمت دور ماه است.

دهانه‌ی آپولو به یاد مأموریت‌های آپولو به ماه نام‌گذاری شده است.




قطب جنوب ماه
دهانه‌ی شرودینگر
در نواحی همیشه در سایه، احتمالاً در خاک، یخ آب وجود دارد.

نواحی قطبی

قطب‌های شمال و جنوب ماه آخرین نواحی آن بودند که نقشه‌برداری شدند. این مأموریت را کاوش گر فضایی کلمنتاین در سال ۱۹۹۴ انجام داد. نقشه‌های موزاییکی از کنار هم چیدن هزاران تصویری به دست آمده که کلمنتاین به زمین ارسال کرده است. این نقشه‌ها نشان می‌دهند که بستر برخی از دهانه‌های برخوردی قطبی، همیشه در سایه است و نور خورشید به آن‌ها نمی‌رسد.


دریای موسکووینه

دریای موسکووینه یکی از معدود دریا‌هایی است که کاملاً در سمت دور ماه قرار دارد و با قطر ۲۷۷ کیلومتر، از حوضه‌های برخوردی بزرگ سمت دور مانند آپولو کوچک‌تر است. بستر تیره‌ی آن موجب شده است که به خوبی از اطراف مشخص باشد.




تسیولکوفسکی

یکی از عوارض بارز سمت دور، عارضه‌ی تسیولکوفسکی است که به سبب داشتن بستر تیره از گدازه‌ی صُلب شده‌ی چیزی، میان دهانه‌ی برخوردی و دریا شناخته می‌شود. قطر آن ۱۸۵ کیلومتر است و در مرکز، ساختاری بزرگ و کوه‌مانند دارد. نواحی اطراف تسیولکوفسکی به شدت پُردهانه است. مواد سطحی در آن محوطه احتمالاً برخی از قدیمی‌ترین مواد سطح ماه هستند.



وَن دِگراف

این دهانه با شکلی نامنتظران و قطری حدود ۲۳۳ کیلومتر، در خود چند دهانه‌ی کوچک‌تر دارد. اما با وجود این پهنای عظیم، عمق آن فقط ۴ کیلومتر است. کف این حوضه‌ی برخوردی، در مقایسه با زمین‌های اطراف، خاصیت مغناطیس و رادیواکتیو قوی‌تری دارد. ممکن است این خاصیت به سبب آن باشد که سنگ‌های آتش فشانی، زیر بستر دهانه دفن شده‌اند.



نقشه‌برداری از ماه

• در سال ۱۶۰۹، توماس هریوت انگلیسی (۱۶۲۱ - ۱۵۶۰)، بر اساس رصدهایی که با تلسکوپ انجام می‌داد، نقشه‌ای از ماه کشید. یک سال بعد نیز، نقشه‌های گالیله توجه همه را به عوارض ماه جلب کرد.

• اخترشناسان قرن هجدهم، با استفاده از تلسکوپ‌های جدید و پیش‌رفته، نقشه‌هایی با جزئیات بیشتر از سطح ماه تهیه کردند.

• نخستین عکس‌ها در سال ۱۸۴۰ از ماه گرفته شد. اطلس‌های عکس‌دار ماه در اواخر قرن نوزدهم منتشر شد.


• تصاویر پُرجزییاتی از سطح ماه را مدارگردهای ایالات متحده در دهه‌ی ۱۹۶۰ و فضایی‌های کلمنتاین در سال ۱۹۹۴ به زمین ارسال کردند.



کاوش‌گر مدارگرد ماه، دهه‌ی ۱۹۶۰

بیش‌تر بدانیم

سطح ماه ۱۱۴، کاوش ماه ۱۱۶، سمت نزدیک ماه ۱۱۸، سیارک‌ها ۱۶۶، شهاب‌سنگ‌ها ۱۶۸



دریای جنوبی

این دریا در نمای هر دو سمت نزدیک و دور ماه دیده می‌شود. اما شکل آن به سختی قابل تشخیص است. شاید این ناحیه، به جای حوضه‌ی برخوردی واقعی، فقط ناحیه‌ای از سنگ‌های تیره‌ی آتش‌فشانی باشد.




عطارد (تیر)

عطارد، با سطحی که از تابش خورشید سوخته و خشک شده، نزدیک‌ترین سیاره به خورشید است. این دنیای سنگی خشک، جوّی چنان رقیق دارد که بهتر است بگوییم اصلاً جوّی ندارد. در میان همه‌ی سیاره‌های منظومه‌ی شمسی، عطارد از همه سریع‌تر به دور خورشید می‌گردد؛ اما گردش آن به دور محور خودش بسیار آهسته است. از روی زمین، عوارض کم‌رنگی را می‌توان روی سطح این سیاره دید. نخستین تصاویر نمای نزدیک از عطارد، مربوط به دهه‌ی ۱۹۷۰ است. در آن سال، کاوش‌گر فضایی مارینر ۱۰ از کنار آن گذشت و مشخص کرد که عطارد دنیایی پر از دهانه‌های برخوردی است. اخترشناسان در تعجب‌اند که چرا سیاره‌ای به این کوچکی، هسته‌ی آهنی بزرگی دارد.

سطح آبله‌رو

حدود ۴ میلیارد سال پیش، در اوایل تاریخ منظومه‌ی شمسی، سطح عطارد جوان در تیررس اصابت شهاب‌سنگ‌ها قرار گرفت. گدازه‌ها از درون سیاره روی سطح جاری شدند و دشت‌های پهناوری را شکل دادند. آن‌ها ظاهری به این سیاره دادند که در نگاه نخست، بسیار شبیه سطح ماه است. از آن‌جا که هیچ باد و آبی بر سطح عطارد وجود ندارد که سطح را فرسوده کند و شکل دهانه‌ها را تغییر دهد، سطح این سیاره از آن زمان تقریباً بدون تغییر باقی مانده است.



دما

عطارد را همسایه‌ی غول‌پیکرش، خورشید، بریان می‌کند. این سیاره در میان همه‌ی سیاره‌ها بیش‌ترین تغییر دما را در روز و شب دارد. دمای متوسط سطحی آن ۱۶۷ درجه‌ی سانتی‌گراد است. اما زمانی که سیاره در نزدیک‌ترین حالت به خورشید است، ممکن است دما به بالاتر از ۴۵۰ درجه‌ی سانتی‌گراد هم برسد. در شب، این سیاره به سرعت خنک می‌شود؛ زیرا جوّ آن آن‌قدر رقیق است که حرارت را نگه‌نمی‌دارد و دما به ۱۸۰- درجه‌ی سانتی‌گراد می‌رسد. این تغییر ۶۰۰ درجه‌ای دما در شب و روزهای طولانی عطارد، سنگ‌های سطحی سیاره را به شدت منقبض و منبسط می‌کند و پیوسته سب ترک خوردن و خرد شدن آن‌ها می‌شود.


قطر دهانه‌های برخوردی از چند متر تا صدها کیلومتر است.

دهانه‌های جوان‌تر با شعاع‌های روشنی از مواد پرتاب شده (رگه‌ها) احاطه شده‌اند.

دهانه‌ی برونه

عمق دهانه‌ها، در مقایسه با دهانه‌های ماه، کمتر است. اما مواد پرتاب شده از برخورد، به اندازه‌ی روی ماه دور نرفته‌اند؛ زیرا گرانش عطارد بیش‌تر است.

در این تصویر، که مارینر ۱۰ گرفته، نور فرابنفش خورشید موجب شده که سطح، رنگ و رو رفته به‌نظر برسد.




چرخش و گردش مداری

عطارد بسیار آهسته به دور محور خود می‌چرخد؛ به‌طوری که یک دور چرخش کامل آن، ۵۹ روز زمینی طول می‌کشد. اما این سیاره در گردش به دور خورشید، به سبب نزدیکی به آن، سرعت بسیار دارد و یک دور گردشش ۸۸ روز زمینی است. از دید ناظری که روی عطارد ایستاده باشد، مجموع این دو حرکت باعث بروز وقعه‌ای ۱۷۶ روزه بین یک طلوع خورشید تا طلوع بعدی می‌شود. شخصی که از موقعیت یک طلوع خورشید را می‌نگرد، باید تا دوباره رسیدن به موقعیت یک، صبر کند تا طلوع بعدی خورشید را ببیند. در این مدت، سیاره دوبار به دور خورشید گشته است، در نتیجه، شبانه‌روز از سطح عطارد برابر دو سال این سیاره طول می‌کشد. مانند ماه در مدار زمین، آهنگ چرخش این سیاره نیز به مرور کند شده است تا در آینده، برابر دوره‌ی گردش مداری آن شود و همواره یک روی سیاره رو به خورشید باشد.

شناسنامه	
قطر	۴۸۸۰ کیلومتر
فاصله‌ی متوسط تا خورشید	۵۷/۹ میلیون کیلومتر
سرعت مداری دور خورشید	۴۷/۸۷ کیلومتر بر ثانیه
دوره‌ی انتقالی (گردش به دور خورشید)	۸۷/۹۷ روز
از طلوع تا طلوع بعدی خورشید (شبانه‌روز)	۱۷۶ روز
دوره‌ی وضعی (چرخش به دور خود)	۵۸/۶۵ روز
جرم (زمین = ۱)	۰/۰۶
حجم (زمین = ۱)	۰/۰۶
چگالی متوسط (آب = ۱)	۵/۴۳
گرانش سطحی (زمین = ۱)	۰/۳۸
تمایل محوری (از حالت عمود بر صفحه‌ی مداری)	۰ (صفر)
انحراف مداری (از دایره‌البروج یا صفحه‌ی منظومه‌ی شمسی)	۷ درجه
دمای متوسط سطحی	۱۶۷ درجه‌ی سانتی‌گراد
تعداد قمرها	۰ (صفر)

مسیر پرواز کاوش‌گر
بر فراز سطح سیاره

محوطه‌ای که یک عکس
پوشش می‌دهد.




کاوش‌گر، سطح سیاره را در
نوارهای پهنی از عکس‌های
هم‌پوشاننده عکاسی می‌کند.

عکس‌برداری از سیاره‌ها

تصاویر پُر جزئیات از سطح سیاره‌ها را دوربین‌هایی تهیه می‌کنند که بر کاوش‌گرهای فضایی، مانند مریخ‌۱۰، نصب شده‌اند. این کاوش‌گرها در کنار سیاره می‌گذرند یا در مداری به دور آن می‌گردند. وقتی کاوش‌گر در ارتفاع بالا از فراز سیاره می‌گذرد، دوربین‌ها عکس‌های متوالی می‌گیرند. این تصاویر به کمک امواج رادیویی به زمین ارسال می‌شوند و با رایانه‌ها بهبود می‌یابند. سپس کنار هم قرار می‌گیرند تا نمایی کلی، به نام تصویر موزاییکی از سیاره به‌دست دهند.

هسته‌ی مغناطیسی



عطارد هم مانند زمین، میدان مغناطیسی دارد؛ اما میدان آن بسیار ضعیف و فقط حدود ۱ درصد میدان زمین است. خاصیت مغناطیسی عطارد را هسته‌ی بزرگ آهنی آن ایجاد کرده است. قطر این هسته سه‌چهارم قطر خود سیاره است. اخترشناسان بر این باورند که هسته‌ی عطارد را آهن جامد ساخته شده که لایه‌ای از آهن مایع و گوگرد هم آن را احاطه کرده است.





عطارد

عطارد در یک نگاه

عطارد، سیاره‌ای سنگی با هسته‌ی فلزی بزرگ، بسیار سریع به دور خورشید می‌گردد و گرانش ضعیف و جو بسیار رقیقی دارد. بدون در نظر گرفتن پلوتون در جمع سیاره‌ها، این سیاره کوچک‌ترین سیاره‌ی منظومه‌ی شمسی است.




ساختار



مکان‌نما

رصد عطارد

تنها وقت‌هایی که می‌توان عطارد را رصد کرد، زمانی کوتاه پس از غروب خورشید یا در سپیده‌دم، پیش از طلوع خورشید، است؛ زیرا در آن لحظات، این سیاره کمی دورتر از خورشید و بسیار نزدیک به افق پدیدار می‌شود. عطارد شبیه ستاره‌ای درخشان است و می‌توان آن را با چشم غیر مسلح یا دوربین دوچشمی مشاهده کرد. از قرص عطارد، می‌توان اهله را با تلسکوپی مناسب مشاهده کرد.



عطارد در آسمان شامگاهی دشت کویر، شمال قم

بیش‌تر بدانیم


کاوش‌گرهایی به سوی سیاره‌ها ۹۶
تولد منظومه‌ی شمسی ۱۰۰
زمین ۱۰۲، سطح ماه ۱۱۴، برخوردها ۱۷۰

سطح عطارد

در آسمان زمین، عطارد هرگز از خورشید خیلی دور نمی‌شود؛ در نتیجه، رصد آن مشکل است. حتی رصدخانه‌های فضایی، مانند تلسکوپ فضایی هابل نیز نمایی از سطح عطارد به‌دست نمی‌دهد؛ زیرا پرتوهای خورشید به ابزارهای حساس تلسکوپ آسیب می‌رساند. فضاپیمای ماریتر ۱۰، با کمک سایه‌بان‌های محافظ، تصاویری با جزییات از سطح عطارد فراهم آورد. در ملاقات این فضاپیما با عطارد، مسیر پرواز آن به‌گونه‌ای بود که فقط بخشی از سطح عطارد را بررسی کرد و بیش از نیمی از آن هنوز باقی مانده است تا در آینده کاوش شود. فضاپیمای مسنجر (پیام‌آور) در آینده‌ی نزدیک از سراسر این سیاره نقشه‌برداری خواهد کرد.

رشته‌کوه دیسکاوری


رشته‌کوه دیسکاوری، با ارتفاع ۲ کیلومتر از سطوح اطراف، سلسله جبال عظیمی است که وسعتی حدود ۵۰۰ کیلومتر را روی سطح عطارد دربر گرفته است. تا به حال، ۱۶ عارضه‌ی مشابه روی عطارد کشف شده که ۸ عدد از آن‌ها در بخش شرقی نیم‌کره‌ی جنوبی سیاره بوده است.



سنگ‌های فضایی با عطارد برخورد می‌کنند.

امواج ضربه‌ی برخورد

زمانی که خُرده‌سیاره‌ی سرگردانی، که سازنده‌ی حوضه‌ی کالوریس بود، با عطارد برخورد کرد، این سیاره هنوز جوان بود. پوسته و گوشته‌ی بالایی آن هنوز پایدار نشده بود و هم‌چنان در حال سرد و منقبض شدن بود. امواج ضربه‌ی این برخورد، امواجی در سطح سیاره پدید آورد و روی سطح آن، رشته‌تپه‌ها و رشته‌کوه‌هایی ایجاد کرد.



امواج ضربه در سطح و درون سیاره منتشر می‌شوند.

امواج ضربه به سطح مقابل نقطه‌ی برخورد روی سیاره می‌رسند و آن را تغییر شکل می‌دهند.

دنیای پُر دهانه

عطارد دنیایی پُر دهانه است و سطح آن را برخورد هزاران شهاب‌سنگ سوراخ سوراخ کرده است. برخوردی عظیم، حوضه‌ی کالوریس را شکل داده است. دورتادور این حوضه را حلقه‌ای از ارتفاعات به نام کوه‌های کالوریس فراگرفته است. پس از کوه‌ها، نواحی پوشیده از سنگ‌های پرتابی حاصل از برخورد و سپس دشت‌های مسطح پُرگدازه قرار دارند. به‌علاوه، می‌توان بر سطح عطارد چین‌وچروک‌ها، رشته‌کوه‌ها و ترک‌های بسیاری دید که در زمان سرد شدن سیاره‌ی جوان شکل گرفته‌اند.

بیش‌تر بدانیم

تلسکوپ فضایی هابل ۱۴ کاوش‌گرهایی به سوی سیاره‌ها ۹۶ سطح ماه ۱۱۴ عطارد (تیر) ۱۲۲ سیارک‌ها ۱۶۶ شهاب‌سنگ‌ها ۱۶۸


این بخش عطارد و روی دیگر این سیاره، هنوز به نقشه درنیامده است؛ زیرا ماریتر ۱۰ از آن‌ها عکس‌برداری نکرده است.




پتراک یکی از دهانه‌های جوان‌تر سطح عطارد است. در پستر هموار آن چند دهانه‌ی جدیدتر هم دیده می‌شود.

ناحیه‌ی قطب جنوب

نواحی قطبی عطارد شامل بخش‌هایی است که همواره از حرارت خورشید در امان می‌مانند. دانشمندانی که این نواحی را از روی امواج رادار بازتاب شده از آن‌ها، بررسی می‌کنند، بر این باورند که احتمالاً در قطب‌های عطارد یخ‌آب وجود دارد. اما این یافته‌ها باید تأیید شود؛ زیرا ماده‌ی دیگری مانند گوگرد بر ممکن است همین نتیجه را به‌دست دهد.





عطارد

گذر عطارد

در آسمان ما، مسیر عطارد معمولاً از بالا یا پایین خورشید می‌گذرد؛ زیرا صفحه‌ی مداری این سیاره حدود ۷ درجه با صفحه‌ی منظومه‌ی شمسی زاویه دارد. اما هرچند سال یکبار، زمانی که خورشید و زمین و عطارد در یک خط قرار می‌گیرند، پدیده‌ای به نام گذر رخ می‌دهد و عطارد از مقابل قرص خورشید عبور می‌کند. این سیاره شبیه نقطه‌ی سیاهی بر صورت خورشید دیده می‌شود و ممکن است عبورش از یک لبه تا لبه‌ی دیگر خورشید، چند ساعت طول بکشد. در هر قرن، بیش از ۱۰ گذر عطارد رخ می‌دهد و فاصله‌ی هر دو گذر سه تا سیزده سال است. آخرین گذرها در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ رخ داد و گذرهای بعدی در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۹ اتفاق خواهد افتاد.

شناخت انسان از عطارد

• عطارد، مانند دیگر سیاره‌ها، حدود ۴/۶ میلیارد سال پیش شکل گرفت. در ۷۰۰ میلیون سال ابتدایی، سطح آن از هجوم سنگ‌های فضایی آبله‌رو شد.

• ۵۰۰ میلیون سال پس از آن، سیاره سرد و منقبض شد و به اندازه‌ی فعلی خود رسید.

• مردم از زمان‌های باستان عطارد را می‌شناختند و برخی اقوام آن را، به سبب سرعت چابک‌جایی بسیار در زمینه‌ی ستاره‌ها، پیک بادپای آسمان‌ها می‌دانستند. با ورود تلسکوپ به دنیای نجوم، در قرن هفدهم مشخص شد که عطارد اهله دارد.

• در سال ۱۹۶۵، با ارسال امواج راداری به سطح عطارد و دریافت امواج بازتابی، دوره‌ی تناوب چرخش ۵۹ روزه‌ی عطارد تأیید شد.

• در سال ۱۹۷۴، فضاییمای مارینر ۱۰ نخستین تصاویر را با جزئیات از سطح این سیاره به زمین ارسال کرد.

• در سال ۱۹۹۱، دانشمندان از رادار برای بررسی نواحی نادیده‌ی سیاره‌ی عطارد استفاده کردند.

• فضاییمای مسنجر (پیام‌آور) ناسا، پس از چند گذر از کنار عطارد در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی، در سال ۲۰۱۱ در مداری حداقل یک‌ساله به دور این سیاره قرار می‌گیرد تا نقشه‌ای کامل از آن تهیه کند.

مارینر ۱۰


در سال‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵،

فضاییمای مارینر ۱۰ سه بار از کنار سیاره‌ی عطارد گذشت و تا فاصله‌ی ۳۲۷ کیلومتری سطح آن رسید. در تصاویری که این فضاپیما به زمین مخابره می‌کرد، عوارضی به کوچکی ۱۵ کیلومتر آشکار بود دانشمندان دریافته‌اند که این سیاره میدان مغناطیسی دارد.



حوضه‌ی کالوریس

حوضه‌ی کالوریس، به قطر حدود ۱۳۰۰ کیلومتر، بزرگ‌ترین دهانه در عطارد و از بزرگ‌ترین دهانه‌های برخوردی منظومه‌ی شمسی است که ۳/۶ میلیارد سال پیش، با برخورد خرده‌سیاره‌ای به قطر بیش از ۱۰۰ کیلومتر با عطارد، شکل گرفت. بستر این دهانه پُر از دهانه‌های برخوردی کوچک‌تر و جدیدتر است.



جایی که پوسته چروک خورد، رشته‌کوه‌ها شکل گرفتند.

چین و چروک‌ها و رشته‌کوه‌ها

عطارد جوان، سریع‌تر از حال به دور خود می‌چرخیده و گرم‌تر نیز بوده است. وقتی چرخش آن آهسته‌تر شد، چین و چروک‌هایی بر سطح آن شکل گرفت و وقتی این سیاره سرد شد، منقبض هم شد. وقتی پوسته در اطراف ناحیه‌ی منقبض شده چروک خورد، رشته‌کوه‌هایی پدید آمدند. با توجه به شکل و ضخامت بسیار کم پوسته‌ی عطارد در مقایسه با هسته‌ی بزرگ و غیرعادی آن، احتمال دارد که هنگام پیدایش عطارد، برخوردی سهمگین پوسته‌ی اولیه را به فضا پرتاب کرده باشد.



دشت شیکو دشتی وسیع است که پس از برخورد کالوریس با گدازه پُر شده است. یک جفت دهانه‌ی رگمدار درون این دشت قرار دارد.

کوه‌های کالوریس بر اثر برخورد کالوریس شکل گرفتند.

حسگر میدان مغناطیسی


تولستوی، دهانه‌ی بزرگ و پرگدازه‌ای در غرب نیم‌کره‌ی جنوبی سیاره‌ی عطارد است. این دهانه، از نظر اندازه، پس از دهانه‌ی نتهوون قرار دارد.

دهانه‌ها بیش از ۶۰ درصد از سطح شناخته‌شده‌ی عطارد را پوشانده‌اند. بقیه‌ی سطح بیش‌تر دشت‌هایی از گدازه است.

بنه‌وون

دهانه‌ی برخوردی بنه‌وون، دومین عارضه‌ی بزرگ سطح عطارد به قطر ۶۴۳ کیلومتر است. بستر این دهانه را مواد آتش‌فشانی پُر کرده و برخورد‌های شهاب‌سنگی بعدی آن را سوراخ سوراخ کرده است. بسیاری از دهانه‌های سطح عطارد، به یاد مردان و زنان هنرمند نام‌گذاری شده‌ست. این دهانه هم به یاد لودیگ فون بنه‌وون (۱۸۲۷ - ۱۷۷۰)، آهنگ‌ساز آلمانی، نام‌گذاری شده است.

زهره (ناهید)



نمای بالای ابرهای زهره


عوارض سطحی

سطح زهره، در طول زندگی آن تغییر بسیاری کرده است. سطح فعلی سیاره (در مقایسه با تاریخ ۴۵ میلیارد ساله منظومه شمسی)، فقط نیم میلیارد سال قدمت دارد. سرزمین‌های سنگی، که امروز بر سطح آن می‌بینیم، به سبب فعالیت‌های شدید آتش‌فشانی شکل گرفته‌اند و این فرایندی است که هنوز هم ادامه دارد. دشت‌هایی از مواد آتش‌فشانی و نواحی مرتفع، بیش‌تر سطح سیاره را پوشانده‌اند. گسترده‌ترین ناحیه‌ی مرتفع فلات آفرودیت است که چند کوه آتش‌فشانی، از جمله قله‌ی مات، دارد.



گذر زهره از مقابل خورشید

مدار زهره




زهره به خورشید، نزدیک‌تر از زمین است. به این سبب، در حین گردش به دور خورشید، گاهی در میان زمین و خورشید و گاهی در سوی دیگر مدار خود به زمین، در پشت خورشید می‌گذرد. زهره در زمان این مقارنه‌های درونی و بیرونی، در درخشش حیره‌کننده‌ی خورشید از نظرها گم می‌شود. اما در زمان بیش‌ترین کشیدگی‌هایش، یعنی وقتی در آسمان از خورشید دورتر از همیشه است، در بیش‌ترین ارتفاع و تقریباً در درخشان‌ترین حالت است. در این زمان‌ها، این سیاره یا پس از غروب یا پیش از طلوع خورشید دیده می‌شود. در هر ۱/۵ سال وضعیت مداری زهره و زمین نسبت به هم تکرار می‌شود. در نتیجه، هر ۱/۵ سال یک‌بار مقارنهی درونی رخ می‌دهد که ممکن است زهره از مقابل قرص خورشید بگذرد. اما انحراف ۳/۴ درجه‌ای مدار زهره از صفحه‌ی منظومه‌ی شمسی، سبب می‌شود این سیاره از بالا یا پایین خورشید عبور کند. در نتیجه، گذر آن به پدیده‌ای بسیار نادر تبدیل می‌شود که تقریباً در هر قرن ۲ بار رخ می‌دهد. گذرها به صورت جفتی با تفاوت ۸ سال پدید می‌آیند. آخرین گذر زهره در سال ۱۳۸۳/۲۰۰۴ از ایران نیز دیده شد و بعدی در سال ۱۳۹۱/۲۰۱۲ رخ خواهد داد. سپس جفت دیگری در سال‌های ۲۱۱۷ و ۲۱۲۵ باز خواهند گشت

نمای رایانه‌ای که با استفاده از اطلاعات و تصاویر راداری فضایی مازلان ساخته شده است.



قله‌ی مات، یکی از بزرگ‌ترین آتش‌فشان‌های زهره، ۹ کیلومتر از زمین‌های اطراف خود مرتفع‌تر است. قطر آن نیز به ۲۰۰ کیلومتر می‌رسد.

جریان‌های گدازه صدها کیلومتر در دشت‌های کوه‌پایه‌ی قله‌ی مات روان می‌شوند.



زهره در یک نگاه


زهره سیاره‌ای سنگی با ساختار و اندازه‌ی مشابه زمین است. اما جو آن باعث شده است که داغ‌ترین سیاره در منظومه شمسی باشد. این سیاره به آهستگی خلاف جهت دیگر سیاره‌ها (در جهت ساعتگرد) به دور خود می‌چرخد؛ زیرا محور چرخش آن حدود ۱۸ درجه از حالت عادی منحرف شده است. دلیل چرخش بسیار کند زهره (کندترین در منظومه شمسی) شناخته شده نیست؛ اما احتمالاً نیروی کشندی خورشید، اصطکاک سطح با جو غلیظ آن یا برخورد فضایی سهمگینی، در این کندي نقش داشته است.



کننده‌های کلوچه‌ای آتش‌فشان‌هایی با رویه‌ی تخت و کناره‌های پرشیب هستند. این‌ها، که در منطقه‌ی آلفا قرار دارند، قطر متوسطی حدود ۲۰ کیلومتر و ارتفاعی حدود ۷۵۰ متر دارند.

آتش‌فشان‌ها

فعالیت آتش‌فشانی همه جا روی زهره واضح است. بر سطح آن جریان‌های طولی از گدازه‌ها، دهانه‌های آتش‌فشانی و آتش‌فشان‌های گنبدی و سپر شکل دیده می‌شود. ۱۵۶ آتش‌فشان بزرگ با قطر بیش از ۱۰۰ کیلومتر، تقریباً ۳۰۰ آتش‌فشان با قطر بین ۲۰ تا ۱۰۰ کیلومتر و دست کم ۵۰۰ مجموعه آتش‌فشان کوچک‌تر شناسایی شده است. گنبد‌های کلوچه مانند و آتش‌فشان‌های عنکبوتی به سبب شکل غیرعادی‌شان قابل توجه‌اند.




عنکبوتی‌ها، آتش‌فشان‌هایی با ظاهر عنکبوت‌مانندند. قطر این آتش‌فشان در منطقه‌ی آبیستلا، حدود ۳۵ کیلومتر است. دامن‌های شیار شیار، دور لبه‌ی قلمی مقعر کوه حلقه زده‌اند.



دهانه‌ی برخوردی در دشت لائوینیا

دهانه‌های برخوردی

تا به حال، روی زهره حدود هزار دهانه‌ی برخوردی شناسایی شده است. قطر این دهانه‌ها از ۱/۵ تا ۲۸۰ کیلومتر متفاوت است. دهانه‌های کوچک‌تر روی زهره دیده نمی‌شوند؛ زیرا جو غلیظ این سیاره، اجازه‌ی نفوذ اجرام کوچک را نمی‌دهد. بیش از ۶۰ درصد از دهانه‌های برخوردی زهره، آسیبی ندیده و در وضعیت اصلی خود باقی مانده‌اند. حلقه‌های آن‌ها به وضوح قابل شناسایی‌اند و اطرافشان را مواد پرتابی از برخورد پوشانده است. معدودی از ۴۰ درصد دهانه‌ی باقی‌مانده، در اثر گدازه‌های تیش‌فشانی آسیب دیده‌اند. بقیه هم تحت تأثیر ترک‌ها و حرکت‌های پوسته‌ی زهره بوده‌اند.



دشت‌های زهره

بیش از سه‌چهارم سطح زهره را دشت‌هایی پوشانده‌اند که بیش‌تر آن‌ها حاصل فرآیندهای آتش‌فشانی هستند. علامت مشخصه‌ی این دشت‌ها، دهانه‌های آتش‌فشانی و برخوردی، جریان‌های گدازه و عوارضی است که باد در زهره آن‌ها را شکل می‌دهد.

در سرتاسر دشت، کمره‌هایی از رشته کوه‌های باریک به ارتفاع چند صد متر تا سدها کیلومتر گسترده شده است.

دشت لائوینیا یکی از دشت‌های اصلی زهره است.

شناسنامه

قطر	۱۲۱۰۴ کیلومتر
فاصله‌ی متوسط از خورشید	۱۰۸/۲ میلیون کیلومتر
سرعت مداری به دور خورشید	۳۵/۰۲ کیلومتر بر ثانیه
دوره‌ی انتقالی (گردش به دور خورشید)	روز ۲۲۴/۷
از یک طلوع تا طلوع بعدی (شیبانه‌روز)	روز ۱۱۷
دوره‌ی وضعی (چرخش به دور خود)	روز ۲۴۳
جرم (زمین = ۱)	۰/۸۲
حجم (زمین = ۱)	۰/۸۶
چگالی متوسط (آب = ۱)	۵/۲
گرانش سطحی (زمین = ۱)	۰/۹
تمایل محوری (از حالت عمود بر صفحه‌ی مداری)	درجه ۱۷۷/۴
انحراف مداری (از دایره‌البروج یا صفحه‌ی منظومه‌ی شمسی)	درجه ۳/۴
دمای متوسط سطحی	۴۶۴ درجه‌ی سانتی‌گراد
تعداد قمرها	صفر (۰)
بیش‌تر بدانیم	
منظومه‌ی شمسی ۹۴، کاوش‌گرهایی به سوی سیاره‌ها ۹۶، جو زهره ۱۲۸	
سطح زهره ۱۳۰، مریخ (بهرام) ۱۳۲، سیارک‌ها ۱۶۶، برخوردها ۱۷۰	

جو زهره




سیاره‌ی زهره در
آسمان صبحگاهی تفرش

از افسانه‌ی زیبایی تا سیاره‌ی بشقاب پرنده

ایرهای جو زهره بازتاب‌کننده‌ی قوی نور خورشیدند و زمین نزدیک‌ترین همسایه‌ی این سیاره، به این سبب، زهره دومین جرم درخشان آسمان پس از ماه است که در پُر نورترین حالت به قدر $4/8$ ، یعنی حدود ۱۶ برابر پُر نورترین ستاره‌ی آسمان شب می‌رسد. نور تابناک آن مسبب شده است که در افسانه‌های باستان جای بگیرد. بسیاری آن‌را الهه‌ی زیبایی می‌دانستند که سر شب یا دم صبح ظاهر می‌شد. یونانیان آن‌را نماد آفرودیت (الهه‌ی زیبایی) و رومیان آن‌را ونوس می‌دانستند. در میان‌رودان باستان و تمدن ایلامی در جنوب غرب ایران، آن‌را نماد ایشتر یا ایشتر، الهه‌ی باروری، تصور می‌کردند. در دوره‌های بعدی نیز در ایران با نام آناهیتا یا ناهید (الهه یا فرشته‌ی آب و رویش) شناخته می‌شد. در سوی دیگر جهان، در تمدن مایا در آمریکای مرکزی زهره را ستایش می‌کردند و منجمان مایایی حدود ۲ هزار سال پیش رصدخانه‌ای برای دنبال کردن حرکت آن ساخته بودند.

حتی امروز هم برای ناآشنایان با آسمان شب، سیاره‌ی زهره جرمی اسرارآمیز است. وقتی این سیاره به بیش‌ترین کشیدگی‌های خود می‌رسد و جرمی تابناک بر فراز افق می‌شود، برخی را چنان غافل گیر می‌کند که تصور می‌کنند بشقاب پرنده، ماهواره‌ی جاسوسی، هواپیمای دشمن، یا انفجاری آسمانی دیده‌اند!



حدود ۴ میلیارد سال پیش، که زمین و زهره جوان بودند، جو این دو سیاره شبیه هم بود. اما امروز همه چیز بسیار متفاوت است. جو زهره، که جرمش ۱۰۰ برابر بیش‌تر از جو زمین است، آن‌قدر ضخیم شده است که از روی سطح آن دیگر نمی‌توان ستاره‌ها را دید. جو این سیاره بیش‌تر شامل دی‌اکسید کربن و کمی غبار گوگرد و قطره‌های اسید سولفوریک حاصل از فوران‌های آتش‌فشانی بسیار است. این جو خشن، زهره را به سرزمینی گرم، بسیار خشک، تیره و تار و خفقان‌آور تبدیل کرده است. فشار جوی بر سطح زهره ۹۰ اتمسفر، ۹۰ برابر فشار جوی بر سطح زمین و برابر فشار خردکننده‌ی آب در عمق ۹۰۰ متری است.

ساختار جو

درست بر فراز سطح زهره، مرز مشخصی آغاز جو را نشان می‌دهد و این لایه‌ی جو تا ارتفاع حدود ۴۰ کیلومتری ادامه دارد. بالاتر از آن لایه‌ی ضخیم و یک‌دستی از ابر تا ۲۰ کیلومتر دیگر ادامه دارد. این ابرها، که شامل غبار و اسید سولفوریک هستند، از رسیدن مستقیم نور خورشید به سطح سیاره جلوگیری می‌کنند و زهره را همیشه تیره و تار نگه می‌دارند. سرانجام، لایه‌ی شفاف و نامتراکم دیگری از جو دست کم تا ۲۰ کیلومتر دیگر گسترده شده است.

فرود فضایی روسی ونرا

مدارگرد زهره‌نشین متصل به هم پیش از جدا شدن به دور سیاره می‌گردند.

گردبادهای قطبی

بررسی‌های مدارگرد اروپایی ونوس اکسپرس در سال ۲۰۰۶ نشان داد که دو گردباد بسیار فشرده به هم، در قطب شمال فعال و پایدارند. در زمین، تفاوت سرعت و جهت حرکت توده‌های جوی و سطح سیاره به پیدایش گردبادهای و تندبادهای عظیم کمک می‌کند. اما در زهره، برخلاف آن، سرعت چرخش سیاره چنان کند است که عامل اصلی پیدایش گردبادهای فقط تفاوت شدید دمایی در جو سیاره است.

بررسی‌های جوی

فضاپیمایی که برای شیرجه رفتن در جو زهره ارسال می‌شوند، باید از ابرهای فرساینده و فشار بسیار زیاد جان سالم به‌در ببرند. تعدادی از این کاوش‌گرها وارد جو زهره شدند و برخی موفق شدند به سطح آن برسند. آن‌ها در مدت کوتاهی که دوام آوردند، ساختار و ترکیبات جو و گستره‌ی تغییرات دما و فشار را آشکار کردند.

اهله‌ی زهره

دو سیاره‌ی درون‌مدار زمین، عطارد و زهره نیز، مانند ماه اهله دارند. به این ترتیب، ما در زمان‌های گوناگون، مقدار متفاوتی از سطح نورخورده‌ی آن‌ها را می‌بینیم. ما هیچ‌گاه قرص کامل زهره را نمی‌بینیم؛ زیرا زمانی که کل سطح نورخورده‌ی آن رو به زمین است، سیاره تقریباً پشت قرص خورشید پنهان می‌شود. با حرکت زهره به دور خورشید و نزدیک‌تر شدن به زمین، قرص این سیاره در آسمان زمین بزرگ‌تر می‌شود؛ اما ما هلال کوچک و کوچک‌تری از سطح نورخورده‌ی آن‌ها را می‌بینیم تا زهره در نزدیک‌ترین فاصله از زمین، به مقارنه‌ی درونی با خورشید برسد و از دید ما مدتی ناپدید شود. فاصله‌ی زهره در دورترین و نزدیک‌ترین حالت به زمین، به اندازه‌ی قطر مدار این سیاره تغییر می‌کند و سبب می‌شود هلال باریک زهره نزدیک به مقارنه‌ی درونی تا شش بار بزرگ‌تر از قرص آن در مقارنه‌ی بیرونی باشد. اندازه‌ی زهره تا حدود یک دقیقه‌ی قوس، یعنی حد فرضی توان تفکیک چشم انسان، بزرگ می‌شود.



الگوهای جوی

حو به سرعت دور این سیاره‌ی سنگی حرکت می‌کند. تصاویر فرابنفش از فراز ابرها نشان می‌دهد که ابرها در جهت شرق به غرب حرکت می‌کنند و حدود ۴ روز دور سیاره می‌گردند. ابرها در همان جهتی حرکت می‌کنند که سیاره می‌چرخد. اما حرکت ابرها ۶۰ بار سریع‌تر و تا ۳۵۰ کیلومتر بر ساعت است. در ارتفاع پایین‌تر، حرکت‌های جوی بسیار آهسته‌تر است و سرعت بادهای سطحی به سختی به ۱۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسد.

در این تصاویر، ابرهای بالایی از راست به چپ حرکت می‌کنند.

حرکت ابرهای بالایی الگوهای ۷- یا ۷- شکل می‌سازند.

الگوها به سرعت، با سرعت گرفتن ابرها بر فراز سطح، تغیر می‌کنند.


حرکت ابرها

حرارت خورشید ابرها را به دور زهره به حرکت درمی‌آورد. وقتی خورشید گازهای بخش استوایی جو را گرم می‌کند، هوای گرم بلند می‌شود و به سوی نواحی خنک‌تر قطبی حرکت می‌کند. این گازهای تازه از راه رسیده، وقتی خنک شوند، در لایه‌ی پایینی ابر ته‌نشین می‌شوند. سپس به استوا بازمی‌گردند و این فرآیند از نو آغاز می‌شود.

این تصاویر فرابنفش را مدارگرد پایونیر - ونوس در ماه‌های مه و ژوئن سال ۱۹۸۰، از فاصله‌ی حدود ۵۰ هزار کیلومتری گرفته است. فاصله‌ی زمانی هر عکس حدود ۵ ساعت است.

گازهای داغ از استوا با حرکتی مارپیچی به سوی نواحی قطبی می‌روند.

فضاپیمای زهره‌شناس			
نام	نوع	تاریخ سفر	دست‌آوردها
مارنیر ۲	گذرنده	دسامبر ۱۹۶۲	کشف دی‌اکسید کربن در جو
ونرا ۴	ورود به جو	اکتبر ۱۹۶۷	نخستین ارسال داده‌ها از جو
ونرا ۵ و ۶	ورود به جو	مه ۱۹۶۹	آزمایش جو، احتمالاً با سطح برخورد کرد.
ونرا ۷	زهره‌نشین	دسامبر ۱۹۷۰	نخستین زهره‌نشین‌هایی که داده‌هایی را از سطح زهره به زمین فرستادند.
ونرا ۸ و ۹	مدارگرد / زهره‌نشین	ژوئیه ۱۹۷۲	هر یک از زهره‌نشین‌ها عکسی از سطح پُر از سنگ زهره فرستادند.
پایونیر - ونوس ۱	مدارگرد	دسامبر ۱۹۷۸	نخستین نقشه‌ی راداری سیاره
پایونیر - ونوس ۲	چند کاوش‌گر	دسامبر ۱۹۷۸	پنج کاوش‌گر ترکیبات و ساختار جو را بررسی کردند.
ونرا ۱۱ و ۱۲	گذرنده / زهره‌نشین	دسامبر ۱۹۷۸	زهره‌نشین‌ها به سطح سیاره رسیدند اما دوربین‌های تلویزیونی از کار افتادند.
ونرا ۱۳ و ۱۴	زهره‌نشین	مارس ۱۹۸۲	نخستین تصاویر رنگی از سطح؛ نخستین نمونه‌های خاک تحلیل شدند.
ونرا ۱۵ و ۱۶	مدارگرد	اکتبر ۱۹۸۳	تصاویر راداری از سطح سیاره
وگاس ۱ و ۲	ورود به جو / زهره‌نشین	ژوئن ۱۹۸۵	کاوش‌گرهای بالنی جو را بررسی کردند؛ زهره‌نشین‌ها سطح را آزمایش کردند.
ماژلان	مدارگرد	۱۹۹۴ - ۱۹۹۰	تصویربرداری راداری از سطح سیاره
ونوس اکسپرس	مدارگرد	۲۰۰۶ -	بررسی جو زهره
بیش‌تر بدانیم			
کاوش‌گرهایی به سوی سیاره‌ها ۰۹۶ جو زمین ۱۰۶، ماه ۱۱۰، زهره (ناهید) ۱۲۶ سطح زهره ۱۳۰، جو مشتری ۱۴۴			



اثر گل‌خانه‌ای

کمتر از یک چهارم نوری که از خورشید به زهره می‌تابد، به سطح این سیاره می‌رسد. نوری که از میان ابرها رد می‌شود، سطح را گرم و حرارت را به شکل تابش فروسرخ آزاد می‌کند. مانند شیشه‌ی گل‌خانه که حرارت را به دام می‌اندازد، جو پُر از دی‌اکسید کربن زهره نیز تابش فروسرخ را به دام می‌اندازد. از آن‌جا که دی‌اکسید کربن یکی از گازهای گل‌خانه‌ای است، دما روی زهره افزایش می‌یابد و این سیاره همیشه بسیار داغ است، البته دما از حدود ۴۸۰ درجه‌ی سانتی‌گراد بیش‌تر نمی‌شود؛ زیرا فراتر از آن، گرما ملکول‌های گاز گل‌خانه‌ای را می‌شکند و سبب خروج تابش گرمایی و خنک شدن سیاره می‌شود.

۱۳۵

تصویر مازلان از دشت لکشمی
(تصویر رایانه‌ای از اطلاعات راداری).

فضاپیما در ارتفاع بین ۲۹۴ تا ۸۷۴۳ کیلومتری بر فراز سطح سیاره پرواز می‌کرد.

آنتن شیپوری شکل با ارسال امواج رادار و ثبت بازتاب آنها، ارتفاع عوارض سطحی زیر پای فضاپیما را می‌سنجید.

بدشقاب رادار

این پرتوها تصاویری از
نوارهایی به طول ۱۰ هزار
کیلومتر و عرض ۲۵
از سطح سیاره تهیه کردند.

قله‌ی دانو، به ارتفاع ۵ هزار متر، در افق مشخص است.

نواحی بسیاره مناطقی
است که داده‌ای از آن‌ها
بهدست نیامده است.

جریان‌های آبشار مانند از
گدازه‌ی جامد شده.

فلت ایشتار فلتی مرتع
است که کمربندهای
کوهستانی باریکی دور تا
دور آن را احاطه کرده‌اند.

ماژلان

بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴، فضایی‌های مازلان طی ۴ جلسه‌ی ۲۴۳ روزی نقشه‌برداری، از ۹۸ درصد از سطح زهره (به‌جز ناحیه‌ی قطب شمال آن) پای فضاییما را نقشه‌برداری می‌کردند. داده‌های به‌دست آمده از این نوارها با هم ترکیب شد تا تصاویری از نواحی بزرگ سطح زهره به‌دست آید.

قلہی سیف

هزاران قله‌ی آتش‌فشانی، که جابه‌جا در سرتاسر سطح زهره پراکنده‌اند، خروجی‌هایی هستند که حرارت درونی سیاره از آن‌ها و از میان پوسته بیرون می‌زند. برخی از بزرگ‌ترین قله‌های آتش‌فشانی، مانند قله‌ی سیف (SIF)، در ناحیه‌ی ایستلا یافت شده‌اند. ارتفاع قله‌ی سیف از دشت‌های اطراف، تقریباً ۲ هزار متر و قطر دهانه‌ی آن ۳۰۰ کیلومتر است.

دشت لاکشمی دشت
آتش فشانی همواری است
که دو آتش فشان بزرگ
سپیر مانند، به نام های
کولت و ساگاگوی، به آن
مشارف هستند.

ناحيه ی ألفا

حسین عارضی سطحی زهره، که با کمک رادارهای زمینی کشف شد، ناحیه‌ی آلفا بود. ناحیه‌ی آلفا، که در نیم‌کره‌ی جنوبی زهره قرار دارد، منطقه‌ای از ارتفاعات آتش‌فشانی با وسعت حدود ۱۳۰۰ کیلومتر است. این ناحیه شامل تپه‌های کم‌ارتفاع و گنبدی، تیغه‌های متقاطع و دره‌هاست.

عوارض سطحی

زهره سیاره‌ای بسیار هموار است و حدود ۹۰ درصد سطح آن ارتفاعی بیش از ۳ کیلومتر ندارد. دشت‌های کم ارتفاع آتش‌فشانی ۸۵ درصد از سطح آن را پوشانده‌اند. ۱۵ درصد باقی‌مانده شامل تعدادی نواحی مرتفع، به نام فلات یا ناحیه، است که به سبب حرکت پوسته‌ی سیاره بالا زده‌اند. ماژلان عوارض منفردی به کوچکی ۱۲۰ متر شناسایی کرد و تپه‌های شنی و رگه‌هایی در سنگ‌ها یافت که در اثر باد شکل گرفته بودند.

دشت لایبیا دشتی از گدازه است که ناحیهی آکا آن را از سایر دشت‌های گدازه‌ای سطح زهره جدا کرده است.


داده‌های ماژان حدود ۴ هزار عارضه‌ی سطحی به قسمتی که سطح زهره افزود. بسیاری از این عوارض به نام زنان مشهور تاریخ نامگذاری شده‌اند؛ مانند جوا که به نقل از کتابهای مقدس، نخستین زن تاریخ به‌شمار می‌رود. نام ناهید نیز در عوارض سطح زهره دیده می‌شود. اما جالبتر از آن داده‌ای ۳۰ کیلومتری در نیمکره‌ی جنوبی زهره در دست نیابتین به نام اندامی است که به یاد دکتر آذر اندامی، پزشک باکتری‌شناس ایرانی، نامگذاری شده است.

بیشتر بدانیم

کاوش‌گرهایی به سوی سیاره‌ها ۹۶
عطارد (تیر) ۱۲۲، زهره (ناهید) ۱۲۶
جوزهره ۱۲۸

مریخ (بهرام)

سیاره‌ی مریخ به نام ایزد جنگ در روم باستان، مارس، و در ایران باستان، بهرام؛ نام‌گذاری شده است؛ زیرا چهره‌اش عصبانی و سرخ‌رنگ است! به همین سبب، گاهی آن را سیاره‌ی سرخ می‌نامند. مریخ از مواد سنگی و چگال تشکیل شده و همراه با عطارد و زهره و زمین، یکی از چهار سیاره‌ی خاکی زمین‌مانند در بخش درونی منظومه‌ی شمسی است. فاصله‌ی مریخ از خورشید $\frac{1}{5}$ برابر فاصله‌ی زمین است. از مدت‌ها پیش تصور وجود هوش‌مندانی در مریخ، در ذهن بشر بود. اما فضاپیماها از دهه‌ی ۱۹۶۰ به بعد نشان دادند که این سیاره جو‌ی رقیق، سرمای زیاد، توفان غبار و وضعیت نامطلوبی برای حیات تکامل یافته دارد. با وجود این، احتمال می‌رود که مریخ زمانی پوشیده از آب و خوش‌اقلیم بوده است. این سیاره‌ی کوچک به قطر نصف زمین، برخی از شگفت‌انگیزترین عوارض جغرافیایی و پدیده‌ها را دارد.




مدار

مدار مریخ از مدار زمین بیضی‌تر است. به همین سبب، فاصله‌ی آن از خورشید بیش‌تر تغییر می‌کند. مریخ در نزدیک‌ترین حالت به خورشید، ۴۵ درصد به آن نزدیک‌تر است تا در دورترین حالت. در زمین، تغییر دما در اثر تغییر فصل‌ها و به سبب تمایل محور چرخش سیاره است. اما در مریخ، دور و نزدیک شدن سیاره به خورشید هم نقش دارد. امکان دارد دمای سطح مریخ بین ۱۲۵- درجه تا ۲۲ درجه‌ی سانتی‌گراد تغییر کند.

سرزمین‌های هموار و کم‌ارتفاع شمالی پس از دوری بمباران شدید شهاب‌سنگی شکل گرفته‌اند.

نواحی رنگ‌پریده‌ی دورتادور لبه‌ی دهانه‌های برخوردی رسوب‌های غبار باد آورده‌اند.

به ظاهر، نواحی تیره مناطقی از سنگ نرم‌اند که از جامد شدن گدازه‌ها شکل گرفته‌اند.



حرکت برگشتی یا رجوعی

سیاره‌ها در زمینه‌ی ستاره‌ها، به مرور جابه‌جا می‌شوند؛ زیرا آن‌ها و زمین، به دور خورشید در گردش‌اند. اما سیاره‌ها، به‌خصوص مریخ، گاهی برعکس در آسمان حرکت می‌کنند. این حرکت ظاهری، به سبب تفاوت سرعت مدارِ زمین و سیاره، حرکت برگشتی یا رجوعی نام دارد. سیاره هم‌چنان در مدار خود به سوی جلو حرکت می‌کند؛ اما به‌منظر می‌رسد که عقب می‌افتد. زیرا زمین، که سریع‌تر از مریخ به دور خورشید می‌گردد، از آن سبقت می‌گیرد. این موضوع به شکل نامحسوسی برای سیاره‌های دورتر و سیاره‌های زیرین مثل زهره نیز رخ می‌دهد. زیرا در حرکت مدارِ زمین جلو می‌زند.

عوارض سطحی

بیش‌تر سطح سیاره‌ی سرخ بیابانی، یخ‌زده و پُر از سنگ است که جابه‌جا، تپه‌های شنی و دهانه‌های برخوردی دارد. اما برخی از متنوع‌ترین و خارق‌العاده‌ترین عوارض سطحی در همه‌ی منظومه‌ی شمسی را هم دارد. در برابر آتش‌فشان‌ها و ژرف‌دره‌های عظیم مریخ، همتایان این عوارض روی زمین بسیار کوچک هستند. رنگ سرخ سیاره به سبب وجود اکسید آهن (زنگ) فراوان در خاک آن و غبار این ترکیب در جو سیاره است.

بیش‌تر بدانیم

- منظومه‌ی شمسی ۹۴
- تولد منظومه‌ی شمسی ۱۰۰
- کاوش‌گرهایی به سوی سیاره‌ها ۹۶
- زمین ۱۰۲، سطح مریخ ۱۴۰

قمرها و مدار آنها


قمرهای مریخ، فوبوس و دیوموس، نخستین بار در سال ۱۸۷۷ رصد شدند. آنها از تیره‌ترین جرم‌های منظومه شمسی هستند؛ ریز، نور بسیار کمی باز می‌تابانند. چگالی این قمرهای کوچک و ناهموار از مریخ کمتر است و هر دو پُر از دهانه‌های برخوردی‌اند. این قمرها در جهت شرق به دور مریخ می‌گردند. قطر فوبوس ۲۶ کیلومتر و قطر پهن‌ترین بخش دیوموس سیب‌زمینی‌شکل، فقط ۱۶ کیلومتر است. اخترشناسان بر این باورند که این قمرها سیارک‌هایی هستند که گرانش مریخ آنها را به دام انداخته است.

جو

مریخ ایر، آب و هوا و بادهای شدیدی دارد. جو رقیق آن بیش‌تر از دی‌اکسید کربن است. گاهی ممکن است یک‌سوم جو در قطب‌ها یخ بزند. هر روز در ت باد خورشیدی، که با سرعت مافوق صوت از سوی خورشید می‌ورد، کمی دیگر از جو مریخ را جارو می‌کند. میلیاردها سال پیش، مریخ جو غلیظی داشت که نگهدار گرما و پوشش سطحی آب سیاره بود. اما جرم کم سیاره، گرانش کافی برای نگه داشتن جو را نداشت. از سوی دیگر، با سرد شدن درون سیاره، فعالیت آتش‌فشان‌ها نیز کم شد و گاز کمتری جای‌گزین جو از دست رفته گردید. با رقیق شدن جو، آب مایع نیز یخ زد. به‌دلیل تراکم، از سطح سیاره ناپدید شد.

مریخ در آسمان

مریخ را می‌توان با چشم غیر مسلح، به‌خصوص در زمان مقابله (زمین بین خورشید و مریخ) دید. در مقابله، که هر ۲۶ ماه یک‌بار رخ می‌دهد، مریخ در نزدیک‌ترین فاصله از سیاره ماست. هر ۱۵ تا ۱۷ سال یک‌بار، مقابله‌ی مطلوب رخ می‌دهد که سیاره هم‌زمان در نزدیکی حضیض مداری و در نتیجه، نزدیک‌تر به زمین است. در این هنگام، مریخ شاید از سیاره‌ی درخشان مشتری نیز پررنگ‌تر شود. اما در ماه‌های دور از مقابله، جرمی عادی است. مقابله بهترین زمان برای رصد مریخ با تلسکوپ است؛ اما باز هم قرص سیاره فقط ۱۵ تا ۲۵ ثانیه‌ی قوس است؛ یعنی به اندازه‌ی ظاهری یکی از دهانه‌های ماه.



مریخ در هنگام مقابله (بالا) و در نمای تلسکوپی در مقارنتی، سیاره نزدیک با ماه (پایین)

مدار قمرها

فوبوس

دیوموس

دیوموس در ارتفاع ۲۰۰۴۰ کیلومتری از سطح مریخ در هر ۳۰/۶۳ ساعت به دور آن می‌گردد.

همیشه یک روی فوبوس به سمت مریخ است.

قمرهای مریخ، مانند سیارک‌ها، از سنگ‌های پُرگرم ساخته شده‌اند.


استیکنی، بزرگ‌ترین دهانه‌ی برخوردی بر سطح فوبوس، قطری حدود ۱۰ کیلومتر دارد.

فوبوس در ارتفاع ۵۹۸۰ کیلومتری از سطح مریخ، در هر ۷/۶۶ ساعت به دور آن می‌گردد. دوره‌ی مداری فوبوس سریع‌تر از چرخش خود مریخ است، در نتیجه، فوبوس برخلاف همه‌ی اجرام آسمان مریخ، از غرب به شرق حرکت می‌کند.


مریخ در یک نگاه

مریخ سیاره‌ای سنگی با هسته‌ای آهنی است. اندازه‌ی آن نصف اندازه‌ی زمین و مدت چرخش آن به دور خودش، برابر زمین است. جو آن رقیق و فشار جو در سطح ۱ درصد روی زمین است (برابر فشار جوی در ارتفاع ۳۰ هزار متری سطح زمین).

تمایل محوری، چرخش و گردش در مدار




جو



ساختار

مقیاس



مکان‌نم



شناسنامه

قطر	۶۷۹۴ کیلومتر
فاصله‌ی متوسط از خورشید	۲۲۷/۹ میلیون کیلومتر
سرعت مداری به دور خورشید	۲۴/۱۳ کیلومتر بر ثانیه
دوره‌ی انتقالی (گردش به دور خورشید)	۶۸۶/۹۸ روز
از یک طلوع تا طلوع بعدی خورشید (شبانه‌روز)	۲۴/۶۳ ساعت
دوره‌ی وضعی (چرخش به دور خود)	۲۴/۶۲ ساعت
جرم (زمین = ۱)	۰/۱۱
حجم (زمین = ۱)	۰/۱۵
چگالی متوسط (آب = ۱)	۳/۹۳
گرانش سطحی (زمین = ۱)	۰/۳۸
تمایل محوری (از حالت عمود بر صفحه‌ی مداری)	۲۵/۲ درجه
انحراف مداری (از دایره‌البروج یا صفحه‌ی منظومه‌ی شمسی)	۱/۹ درجه
دمای میانگین سطحی	۶۳- درجه‌ی سانتی‌گراد
تعداد قمرها	۲

جست‌وجوی حیات در مریخ

شاید چند میلیارد سال پیش حیات ابتدایی درون آب‌راه‌ها وجود داشته است.

آب‌راه‌هایی شبیه این مرز میان سرزمین‌های پست شمالی و سرزمین‌های مرتفع جنوبی مریخ را قطع می‌کند.

با آغاز عصر تلسکوپ، شباهت‌های بسیاری بین زمین و مریخ پیدا شد. در قرن هفدهم، جیووانی هویگنس مدت‌دوران مریخ را برابر زمین محاسبه کرد. در اواخر قرن هجدهم میلادی، ویلیام هرشل اخترشناس انگلیسی - آلمانی، نواحی تیره‌ای بر سطح مریخ رصد کرد. نظریه‌ی او، که این‌ها دریاهایی بر سطح مریخ هستند، این گمان را تقویت کرد که بر سطح مریخ حیات وجود دارد. هرشل کلاهک‌های سفید قطبی در مریخ را، مانند زمین، قطب‌هایی پوشیده از یخ دانست و تمایل محوری مریخ را بسیار شبیه زمین به‌دست آورد. یک قرن بعد، جیووانی شیپارلی اخترشناس ایتالیایی، در گزارش رصدهای تلسکوپی خود اعلام کرد آب‌راه‌هایی دیده است و آن‌ها را کانال نامید. این گزارش بسیاری را به اشتباه انداخت و تصور کردند او کانال‌هایی را رصد کرده که به‌دست موجودات هوشمند بر سطح مریخ کنده شده است. پرسپوال لاول آمریکایی، یکی از آن‌ها بود که در اواخر قرن نوزدهم، رصدخانه‌ی بزرگی در آریزونا ساخت تا تمدن مریخی را پیدا کند. امیدها برای یافتن حیات بر سطح سیاره‌ی سرخ در سال ۱۹۶۵، که کاوش گر مارینر ۴ تصاویری از سطح برهوت مریخ به زمین فرستاد، به یأس تبدیل شد. اما حیات احتمالاً زمانی وجود داشته است یا حتی شاید هنوز هم در بخش‌هایی، که کاوش نشده‌اند، به صورت باکتری یا تک‌سلولی‌های جان‌سخت وجود دارد.

شواهدی از گذشته‌ی پرآب

حیات، به گونه‌ای که روی زمین می‌شناسیم، به آب نیاز دارد. احتمالاً آب مایع در وضعیت یخ‌زده‌ی امروز مریخ وجود ندارد اما عوارض سطحی نشان می‌دهد که روزی آب بر سطح این سیاره جاری بوده است. کاوش‌گرها آب‌راه‌هایی یافته‌اند که فقط آب جاری آن‌ها را حفر می‌کند. نیم‌کره‌ی شمالی سیاره بسیار پست‌تر و هموارتر از نیم‌کره‌ی جنوبی است و برخی دانشمندان، آن‌را بستر اقیانوس دیرین مریخ می‌دانند. شواهدی غیر قطعی نیز از ظهور فورانی و کوتاه‌مدت آب مایع در مریخ امروز در دست است. در تصاویر مدارگرد MGS از دیواره‌ی چند گودال مریخی، رسوب‌های سفیدی دیده می‌شود که در عکس‌های چند سال قبل همان منطقه، اثری از آن‌ها نیست.


سرچشمه‌های آب

در نخستین روزهای تولد مریخ، آب مایع همه جا پراکنده بود. بمباران‌های شدید شهاب‌سنگی و فعالیت‌های آتش‌فشانی سیاره را، حتی در دورترین فاصله از خورشید، گرم نگه می‌داشت. شاید در آن هنگام، حیات در مریخ آغاز شده باشد. با پایان گرفتن بمباران شهاب‌سنگ‌ها و از دست رفتن تدریجی جو مریخ به سبب گرانش و فعالیت‌های آتش‌فشانی کم آن، فشار جوئی چنان کم شد که آب‌های سطحی یا یخ زدند یا به صورت بخار آب تصعید و در فضا پخش شدند. امروز، بیش‌تر آب‌ها به شکل یخ‌زده در خاک‌لایه‌ای همیشه یخ‌بسته محبوس شده‌اند. ورقه‌های یخ خالص در قطب‌های مریخ یافت می‌شوند و بقیه ریز خاک و سنگ مریخ پنهان است. احتمال می‌رود که هر وقت فعالیت آتش‌فشانی در مریخ آغاز شود، با بالا آمدن گدازه‌ها، بخشی از یخ پنهان ذوب شود و سیلاب زیرزمینی پدید آید. ممکن است این تونل آب مایع از دیواره‌ی گودال یا دره‌ای، مانند چشمه بجوشد و پیش از آن‌که کاملاً یخ بزند و تبخیر شود، مدتی کوتاه بر سطح مریخ جاری باشد.


در نقشه‌ی لاول، کانال‌هایی دیده می‌شود که با آب‌راه‌های واقعاً رصد شده بر سطح مریخ همخوانی ندارد.


کانال‌هایی بر سطح مریخ؟

آب‌راه‌هایی را، که جیووانی شیپارلی نخستین بار دید، پرسپوال لاول در دهه‌ی ۱۸۹۰ میلادی از رصدخانه‌ی خود در فلگ استف آریزونا (ایالات متحده) روی نقشه آورد. لاول بر این باور بود که آن‌ها کانال‌هایی دست‌ساخته‌ی موجوداتی هوشمندند که آب را از قطب‌ها به نواحی استوایی و بایر مریخ منتقل می‌کنند و در آبادی‌ها متمرکز می‌شوند! بعدها مشخص شد که هم آب‌راه‌های شیپارلی و هم کانال‌های لاول خطای دید بودند.




احتمالاً ۳ میلیارد سال پیش آب بر سطح مریخ جاری بوده است.





در شهاب سنگ مریخی ALH84001 (که تصویر آن زیر میکروسکوپ الکترونی ۱۰۰ هزار بار بزرگ شده)، ساختارهای لوله‌مانندی دیده می‌شود که شاید ریز سنگ‌واره‌های موجودات باکتری‌مانند باشند.


بستر خشک رودخانه‌ی مانگالوایس که مدارگرد وایکینگ از آن عکس‌برداری کرد.



بررسی شهاب سنگ‌ها

جالب‌ترین مدرک حیات روی مریخ، که مخالفان بسیاری هم دارد، درون شهاب سنگی باستانی از مریخ به نام ALH84001 است که حدود ۱۳ هزار سال پیش در قطب جنوب سقوط کرد. این سنگ میلیون‌ها سال پیش بر اثر برخوردی فضایی از مریخ کنده شد و در فضا سرگردان شد. درون این سنگ مواد شیمیایی آلی، که شاهده‌ی حیات است، و ساختارهایی کشف شد که ممکن است موجودات زنده‌ی تک‌سلولی (باکتری‌ها) آن‌ها را ساخته باشند.

یکی از آزمایش‌های وایکینگ در خاک مریخ به دنبال گازهایی می‌گشت که موجودات زنده تولید می‌کنند. نمونه‌ای از خاک را با مواد مغذی تغذیه کردند؛ اما گازهای رها شده در پی واکنش با خاک مریخ، وجود حیات در نمونه‌ی خاک را ثابت نکرد.




این آب‌راهه زمانی شکل گرفت که حجم عظیمی از آب‌های زیرزمینی بر سطح مریخ رها شد.

وایکینگ‌ها به کمک آزمایش دیگری، به دنبال سلول‌های گیاه‌مانند در خاک بودند. لامپ درخشانی سلول‌های احتمالی را به رشد ترغیب کرد. خاک حرارت دید و گازهای حاصل، که امکان داشت از سلول‌های گرم شده آزاد شده باشند، آزمایش شدند. اما هیچ نشانه‌ی قطعی از حیات در این آزمایش یافت نشد.

آزمایش‌های مریخ‌نشین وایکینگ

در سال ۱۹۷۶، دو فضایی‌های وایکینگ به مریخ رسیدند. هر یک از این مدارگردها، مریخ‌نشین‌ها را کردند که با چتر نجات بر سطح مریخ فرود آمد. آن‌ها حامل آزمایش‌های پیچیده‌ای برای ردیابی نشانه‌هایی از موجودات زنده در خاک مریخ بودند. در ابتدا، به نظر می‌رسید که نشانی از وجود مواد آلی یافت شده است. اما آزمایش‌های بعدی آن را رد کرد. هنوز هم در نتایج منفی این آزمایش‌ها تردید وجود دارد و برخی نیز بر این باورند که حیات تک‌سلولی احتمالی مریخ باید در زیر سطح باشد؛ در جایی که از تیررس پرتوهای مرگبار کیهانی در امان بماند و بتواند از منابع آب و یخ استفاده کند. متأسفانه کاوش گر انگلیسی بیگل - ۲، که قرار بود این آزمایش‌ها را با دقت بیش‌تری انجام دهد، در سال ۲۰۰۳ به هنگام فرود از دست رفت. مریخ‌نشین قنوس در سال ۲۰۰۸ اندکی در این راه پیش رفت و شاید مأموریت‌های آینده در سال‌های آتی پرده از این راز بردارند.



لحظات مهم در تاریخ مریخ

• در مقابله‌ی سال ۱۸۷۷ مریخ، آتشفشان‌ها را کشف کرد. کوچک این سیاره را کشف کرد.

• در دورانی که وجود کانال‌های مریخ مطرح بود، کتاب جنگ دنیاها، نوشته‌ی هربرت جورج ولز، در سال ۱۸۹۸ منتشر شد. این داستان سبب گمانه‌زنی‌های شدیدی درباره‌ی احتمال وجود هوش‌مندانی در مریخ گردید.

• در سال ۱۹۶۵، کاوشگر مارینر ۴ تعداد ۲۲ عکس از مناظر خالی از سکنه‌ی مریخ به زمین ارسال کرد. دانشمندان به این باور رسیدند که سطح مریخ، مانند ماه، مرده است.

• مأموریت مارینر ۹ در سال‌های ۱۹۷۱ و ۱۹۷۲ نمایانی از دره‌ی عظیم مارینر و ساختارهای عظیم آتشفشانی این سیاره را آشکار کرد.


• در سال ۱۹۷۶، دو مریخ‌نشین وایکینگ نخستین کاوشگرهایی بودند که با موفقیت بر سطح این سیاره فرود آمدند.

• با آغاز نسل جدید مأموریت‌های مریخ‌شناسی در سال ۱۹۹۷، مدارگردها و مریخ‌نشین‌ها یکی پس از دیگری نشان دادند که این سیاره آن قدرها هم مرده و کم‌جاذبه نیست. فعالیت‌های آتشفشانی در گذشته‌ی نزدیک، توفان‌های غبار، منابع عظیم یخ پنهان در زیر سطح، چشمه‌ها و آب‌راه‌های خشک شده اما نسبتاً جدید، نشان‌دهنده‌ی سیاره‌ای پویا و بسیار شگفت است.

بیش‌تر بدانیم

تولد منظومه شمسی ۱۰۰ شهاب‌سنگ‌ها ۱۶۸

کاوش در مریخ



نقشه‌بردار سراسری


فضایماری نقشه‌بردار سراسر مریخ (MGS) در سپتامبر سال ۱۹۹۷ به مریخ رسید. سپس ۱۸ ماه طول کشید تا به آهستگی مدار خود را به ارتفاع ۳۵۰ کیلومتری بر فراز سطح سیاره برساند. این فضایما حامل دوربین‌ها و طیف‌سنج‌هایی بود که برای نقشه‌برداری از جزئیات سطح مریخ و بررسی الگوهای آب و هوایی و ترکیبات شیمیایی آن طراحی شده بود. اما اواخر سال ۲۰۰۶، ارتباط این فضایما با زمین قطع شد.



تصویر MGS از آب‌رهم‌های خشک در دیواره دهانه‌ای در مریخ

کاوش سطح


فضایماری سبک‌وزن ره‌یاب (پت فایندر) ناسا در ژوئیه سال ۱۹۹۷ (تیر ۱۳۷۶)، پس از سفری ۷ ماهه از زمین، بر سطح مریخ فرود آمد و سه ماه به فعالیت پرداخت. مکان فرود آن، دره‌ی آرس والیس، دشتی سیلابی در نیم‌کره‌ی شمالی مریخ بود. دانشمندان این دره‌ی پهن را به این سبب انتخاب کردند که بر این باور بودند می‌توان در آن‌جا انواع گوناگونی از سنگ و خاک و نشانه‌های وجود آب یافت. ره‌یاب به ابزارهایی، از جمله یک دوربین طیف‌سنج پیش‌رفته، مجهز بود. این وسیله، حامل خودرو ۶ چرخه‌ی سوچر نیز بود که اطراف را کاوش می‌کرد. این نخستین مریخ‌نورد تاریخ کاوش‌های فضایی بود که فقط تا چند متری محل فرود گشت زد.



عمق رد پای خودرو سوچر نشان داد که خاک، نرم و پودرماتند است.

مریخ‌نورد در حال نمونه‌برداری از سنگی مشهور به «یوگی» است.

ره‌یاب دریافت که غبار معلق در هوای مریخ خاصیت مغناطیسی دارد.





کار در بیوسفر ۲

مهاجرنشینانی روی مریخ

در دهه‌های آینده، نخستین مهاجرنشینان مریخ احتمالاً روبات‌هایی خواهند بود که برای تولید جو به آن می‌روند. آن‌ها از خاک مریخ، به تولید گازهای سنگین و پایدار دودمانندی می‌پردازند که به مرور، جو آن را غلیظ کند و اثر گرم‌کننده‌ی گل‌خانه‌ای را افزایش دهد. برای زندگی در وضعیت زیست‌ناپذیر ماه یا مریخ، آزمایش‌هایی روی زمین انجام شده است. زندگی درون محوطه‌های محصور خودکفا و ضد هوا و ضد آب در طرح بیوسفر ۲ در توسان آریزونا آزمایش شده است.




مسافران مریخ			
نام	سال رسیدن	کشور	نوع کاوشگر
مارینر ۴	۱۹۶۵	ایالات متحده	گذرنده
مارس ۳	۱۹۷۱	روسیه	مدارگرد و مریخنشین
وایکینگ ۱	۱۹۷۶	ایالات متحده	مدارگرد و مریخنشین
وایکینگ ۲	۱۹۷۶	ایالات متحده	مدارگرد و مریخنشین
نقش‌بردار سراسر مریخ	۱۹۹۷	ایالات متحده	مدارگرد
رهباب مریخ	۱۹۹۷	ایالات متحده	مریخنشین و مریخ‌نورد
آدیسفای مریخ	۲۰۰۱	ایالات متحده	مدارگرد
مارس اکسپرس	۲۰۰۳	اروپا	مدارگرد
مریخ‌نوردهای دوقلو	۲۰۰۳	ایالات متحده	مریخ‌نورد
مدارگرد شتایی مریخ	۲۰۰۶	ایالات متحده	مدارگرد
فونیکس (قفتوس)	۲۰۰۸	ایالات متحده	مریخنشین

نمای رهباب از مریخ

دشمن حیات

روی مریخ، آب مایع یافت نمی‌شود؛ زیرا بیش‌تر اوقات آن‌جا بسیار سرد است. در این سیاره، اکسیژن قابل تنفس هم نیست و گاه بادهای شدیدی، که حامل درات ریز غبارند، سطح این سیاره را جارو می‌کنند. در لایه‌ی بالایی جو، ن‌زود وجود ندارد تا حیات را از تاش سبزی فرابنش حفظ کند

جو مریخ رقیق‌تر از آن است که حافظ حیات باشد. گاهی ابرهای مه‌آلود بخ آب دیده می‌شود. این تصویر را مریخ‌نورد آپورونیتی از سطح این سیاره گرفته است.



این تصویر پانوراما از کنار هم چیدن چند تصویر تکی ارسالی رهباب ساخته شده است. به چنین تصاویری اصطلاحاً موزاییک می‌گویند.

آینه‌های عظیمی که به دور مریخ بگردند، نور خورشید را باز می‌تابانند تا دی‌اکسیدکربن یخ‌زده را در کلاهک یخی قطب جنوب تبخیر کنند.

مسکونی‌سازی مریخ

به باور دانشمندان، می‌توان محیط

مریخ را تغییر داد تا سیاره‌ای

سکونت‌پذیر شود. گم‌اندازی و مهم در

مسکونی‌سازی مریخ، گرم کردن آن با

ایجاد اثر گل‌خانه‌ای است. برای این کار

باید گاز گل‌خانه‌ای دی‌اکسیدکربن را،

که در سنگ‌ها و کلاهک‌های یخی قطبی

سیاره محبوس است، از حالت انجماد

خارج کرد. قرن‌ها خواهد گذشت تا

دما و فشار به نقطه‌ای برسد که گیاهان

بتوانند بر سطح این سیاره دوام آورند و با


رشد آن‌ها، به مرور، اکسیژن بیش‌تری از

فتوسنتز دی‌اکسیدکربن به‌وجود آید.

پراکندگی سنگ‌ها بر سطح مریخ نشان می‌دهد که زمانی حجم عظیمی از آب بر سطح این سیاره جریان داشته است.

بیش‌تر بدانیم

سفر میان‌سیاره‌ای ۸۸ کاوش‌گرهایی به سوی سیاره‌ها ۹۶ سیاره‌ی زنده ۱۰۸، کاوش ماه ۱۱۶ جست‌وجوی حیات در مریخ ۱۳۴ حیات در دنیاهای دیگر ۲۵۶



روبات‌ها، مقدمه‌ی سفر انسان به مریخ



مریخ‌نوردهای دوقلو


در زمستان سال ۲۰۰۴، جفت مریخ‌نوردهای دوقلوی ناسا در دو منطقه‌ی استوایی در دو سوی مخالف مریخ فرود آمدند. آن‌ها مانند کاوشگر ره‌یاب، در مرحله‌ی پایانی فرود، با کیسه‌های هوا محافظت شدند. مریخ‌نورد اسپریت (روح) که سه هفته زودتر رسید، در بستر سنگلاخ دهانه‌ی برخوردی عظیم گوسف قطر ۱۶۰ کیلومتر فرود آمد که احتمال می‌رود در گذشته‌ی بسیار دور دریاچه‌ای پُرآب بوده است. مریخ‌نورد آپورتونیتی (فرصت) در بیابان هموار و شن‌زاری به نام فلات نصف‌النهار (مریدیانی) پایین آمد. اما کاوشگر، که درون کیسه‌های هوا مثل توبی بر سطح مریخ بالا و پایین می‌رفت، درست درون یک گودال برخوردی کوچک ثابت شد. آپورتونیتی پس از خروج از گودال، کیلومترها در دشت طی کرد و از چند دهانه‌ی دیگر، از جمله دهانه‌ی ۷۵۰ متری ویکتوریا، بازدید کرد تا نشانه‌هایی از گذشته‌ی مریخ را در لایه‌های ژرف این دهانه‌ها بیابد.

اسپریت نیز چند کیلومتر طی کرد و در افق آشیانه‌ی فرود، به تپه‌های کلمبیا رسید و از بالای آن‌ها منظره‌ی بستر دهانه‌ی گوسف، لایه‌های گوناگون ارتفاعات دیواره‌ی دهانه را زیر نظر گرفت. هر دو مریخ‌نورد در مسیر خود نشانه‌های قطعی وجود آب را در گذشته‌ی منطقه‌ی کاوش خود یافتند. آن‌ها از مریخ‌نورد سوچرنو، ۴ بار بزرگ‌ترند و به طول و ارتفاع حدود ۲ متر (با در نظر گرفتن دکل عکس‌برداری)، به وزن ۱۸۵ کیلوگرم می‌رسند. کار اصلی این مریخ‌نوردها، زمین‌شناسی مریخ است. آن‌ها به ۹ دوربین عکس‌برداری و ابزارهای طیف‌سنج، بازوی رباتی و مته و میکروسکوپی بر سر آن برای برش و بررسی سطح سنگ‌ها مجهزند. چند دوربین وظیفه‌ی شناسایی موانع برای دستگاه هدایت خودکار مریخ‌نورد را به عهده دارند. در مقایسه با سوچرنو، که فقط چند متر از محل فرود فاصله گرفت، این مریخ‌نوردها کیلومترها دور شدند و رکورد بیش از صد متر جابه‌جایی در یک روز را به دست آوردند.


روبات‌های جان‌سخت

با توجه به تغییر دمای شدید شب و روز در مریخ (تا حدود صد درجه) و نشست عبار مریخی بر صفحه‌های خورشیدی انرژی مریخ‌نوردها، پیش‌بینی شده بود که حداکثر سه ماه فعال بمانند. اما طراحی دقیق و برنامه‌ریزی بی‌نقص مهندسان این مأموریت در رویارویی با مشکلات، سبب شد تا زمان انتشار این کتاب (بیش از ۶ سال) در وضعیت مرگبار مریخ دوام بیاورند؛ ما برخی از ابرارهای آن‌ها دیگر به خوبی عمل نمی‌کنند. در طوفان غبار عظیمی که در تابستان ۲۰۰۷ تقریباً سراسر سیاره را دربرگرفت، آن‌ها هفته‌ها بی‌حرکت نگه‌داشته شدند تا در وضعیتی که غبار ۹۹ درصد از نور خورشید را سد کرده بود، با حداقل انرژی دریافتی زنده بمانند. به افتخار دست‌آوردهای بسیار این مأموریت، دو سیارک به نام این دو مریخ‌نورد نام‌گذاری شدند.

بیش از نیمی از مأموریت‌های مریخ، از جمله چند کاوشگر ناسا، اروپا و ژاپن در دهه‌ی ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، شکست خورده‌اند؛ اما در سال‌های اخیر، موفقیت‌های بسیاری به دست آمده است. مدارگرد ادیسه‌ی مریخ، که در سال ۲۰۰۱ به مریخ رسید، به طیف‌سنج‌های گوناگون و دوربین تصویربرداری گرمایی مجهز است. این فضاپیما برخی داده‌های کاوشگرهای سطح مریخ را به زمین مخابره می‌کند. در اواخر سال ۲۰۰۳، مدارگرد اروپایی مارس اکسپرس (سریع‌السیر مریخ) در مدار قرار گرفت. این فضاپیما به دوربین تصویربرداری سه بعدی و راداری مجهز است که منابع یخ‌آب را زیر سطح مریخ آشکار می‌کند. در سال ۲۰۰۶، مدارگرد شناسایی مریخ (MRO) با هدف بررسی اقلیم و شناسایی زمین‌شناختی مریخ، جست‌وجوی منابع آب و تهیه‌ی تصاویر دقیق از سطح سیاره در مدار مریخ قرار گرفت. دوربین اصلی این فضاپیما جزئیاتی کمتر از نیم متر را بر سطح مریخ تفکیک می‌کند که به دانشمندان در شناسایی مکان‌های فرود کاوشگرهای آینده یاری می‌رساند.



مریخ‌نورد اسپریت از پرتله‌ی سایه‌ی خود بر فراز دهانه‌ای برخوردی عکس گرفته است. دهانه‌ی برخوردی ویکتوریا، که در تصویر مدارگرد MRO از بالا دیده می‌شود، از دید دوربین مریخ‌نورد آپورتونیتی در لایه‌ی آن عکس‌برداری شده است.




تصویر مدارگرد تیزبین MRO از دهانه‌ی ۷۰۰ متری ویکتوریا در مریخ در حالی که مریخ‌نورد آپورتونیتی در لایه‌ی آن (داخل دایره‌ی سفید) ایستاده است

مریخ‌نوردها به طول و ارتفاع حدود ۲ متر، ۹ دوربین متفاوت، از جمله دوربین‌های تیزبین استریو در سر تیرک بالا آمده از کاوشگر دارند. آن‌ها با دو آنتن کوتاه‌برد (میل‌های) و بلندبرد (دایره‌مانند) داده‌ها را به ماهواره‌ای در مدار مریخ یا به‌طور مستقیم به زمین می‌فرستند.

فیروز نادری

دکتر فیروز نادری مدیر برنامه‌ریزی علمی و راهدی پروژه‌های فضایی در آزمایشگاه جت یروپالش (پس‌راحت) ناسا، مرکز پیش‌رو در مأموریت‌های روبوتی کوش منظومه شمسی و شاحت کیهان است او در سال ۱۳۲۵ در شیرز به دنیا آمده و دوره‌ی دانشجویی و کاری خود را در ایالات متحده گذرانده است. تحصص و الکترونیک و مهندسی سیستم و یکی از موفق‌ترین مدیران ناسا در پیش‌برد مأموریت‌های فضایی و یکی از شناخته‌شده‌ترین شخصیت‌های ایرانی در جامعه‌ی جهانی علم است. او دانشمند حترشاسی یا علوم سپره‌ای یا پژوهش‌گر فوری فضایی نیست؛ بلکه مدیری علمی است



که با شناخت بخش‌های متفاوت یک پروژه‌ی علمی، ارتباط درستی میان آن‌ها برقرار می‌کند. دکتر نادری در سال‌های قبل، مدیر طرح «منشأ» ناسا برای شناخت منشأ حیات و منظومه‌ی شمسی و مدیر طرح بزرگ کاوش مریخ در موفق‌ترین دوره‌ی خود، از جمله زمان طراحی، پرتاب، فرود و آغاز کار مریخ‌نوردهای ناسا بود. متخصصان فن‌آوری فضایی مأموریت این جفت روبوت مریخ‌نورد را معجزه‌ای در تاریخ کاوش‌های فضایی می‌دانند؛ زیرا طراحی و اجرای دقیق و خلاقیت و دانش گروه سازندگان و هدایت‌کنندگان این روبوت‌ها سبب شده چندین سال بر سطح مریخ با سخت‌ترین و صعب‌القلیمی و عوامل تخریب‌کننده‌ی دستگاه‌های الکترونیک، دوم بیابان فیروز نادری به پاس خدمات مهمی که در مقام یک مدیر به جامعه‌ی علمی کرده، شن‌ها و حوایر بین‌المللی متعددی دریافت کرده است. در جمع همکاران تأثیرگذار در کاوش‌های مریخ، به‌خصوص مأموریت مریخ‌نوردها، ایرانیان دیگری نیز در بخش‌های مهندسی نقش داشته‌اند. زنده‌یاد دکتر همایون سراجی (۱۹۴۷-۲۰۰۷) متخصص سرشناس روباتیک در جهان، که حدود ۱۰ سال نیز استاد دانشگاه صنعتی شریف تهران بود، در طراحی دستگاه هدایت هوشمند مریخ‌نوردها و توانایی آن‌ها در مسیریابی خودکار نقشی اساسی داشت.

سفر انسان

هنوز موانع بسیاری مانع سفر انسان به مریخ است. با آن‌که فن‌آوری فضایی چنین سفری فراهم آمده است، مشکلات حل‌نشده‌ای وجود دارد. هزینه‌ی سرسام‌آور ده‌ها میلیارد دلاری این سفر را می‌توان برای ارسال ده‌ها کاوش‌گر روبوتی صرف کرد، بی‌آن‌که نگران اکسیژن برای تنفس، آذوقه و حفظ سلامت فضانوردان بود. تمام سفرهای بدون سرنشین انجام شده به مریخ یک‌طرفه بوده است. با فن‌آوری کنونی، سفر رفت و برگشت انسان به مریخ حدود ۳ سال طول می‌کشد؛ چند ماه برای رفت، حدود دو سال انتظار در مریخ یا مدار آن برای دوباره رسیدن زمین و مریخ به موقعیت مداری مطلوب تا کوتاه‌ترین مسیر پیموده شود و چند ماه نیز برای برگشت. تاکنون طولانی‌ترین اقامت انسان در فضا حدود یک سال بوده است و هنوز نمی‌دانیم چگونه در مدت طولانی سفر به مریخ، فضانوردان از آسیب پرتوهای فضایی و گرانش کم در امان خواهند ماند. آن‌ها باید بخشی از اکسیژن و آب مورد نیاز در سفر رفت و برگشت خود را از منابع یخ‌آب و خاک و یخ تهیه کنند و این‌ها همه باید پیش از سفر به خوبی شناخته و آزمایش شود. به همین سبب، کاروانی از کاوش‌گرها تا آن زمان مریخ را به دنبال رمزگشایی ناشناخته‌های آن در می‌نورند. پیش‌بینی می‌شود تا بیش از سفر به مریخ، که کاوش‌گرهای سفر رفت و برگشت به مریخ را آزمایش کنند، انسان بار دیگر به ماه برود و احتمالاً پس از دهه‌ی ۲۰۳۰ میلادی مریخ را فتح کند.




خورشید در مریخ

در مریخ غروب و طلوع خورشید، آن‌طور که در این تصویر واقعی ترکیب شده و با طرحی ضد نور از مریخ‌نورد دیده می‌شود، آبی رنگ است. آسمان مریخ قهوه‌ای تیره است؛ اما در نزدیکی خورشید سفیدرنگ، هاله‌ای آبی دیده می‌شود که هرچه خورشید به افق نزدیک‌تر باشد، پررنگ‌تر است. رنگ آسمان هر سیاره به نوع و اندازه‌ی ملکول‌های جو‌ی آن بستگی دارد.

بیش‌تر بدانیم

منظومه‌ی شمسی ۹۴ کاوش‌گرهایی به سوی سیاره‌ها ۹۶ مریخ (بهرام) ۱۳۲

مریخ‌نورد اسپریت در دشت سنگلخ محل فرود خود به سوی تیمه‌هایی در افق پیش می‌رود.




گردبادهای کوچک غبار معروف به تنوره‌ی دیو در افق دید مریخ‌نورد اسپریت. یکی از آن‌ها نیز درست از روی مریخ‌نورد گذشت و گرد و غبار نشسته بر صفحه‌های خورشیدی آن را روید و برد.



سطح مریخ

سطح مریخ جایگاه افراط در پدیده‌های زمین‌شناختی است که به سبب فعالیت آتش‌فشانی، بمباران‌های شهاب‌سنگی، سیل و باد به وجود آمده‌اند. روی این سطح، هیچ‌گونه پوشش گیاهی و آبی پیدا نمی‌شود. برخلاف پوسته‌ی زمین، که از صفحه‌های متحرک شکل گرفته، ظاهراً سطح مریخ یک تکه است. نبود حرکت در پوسته، دلیل شکل بسیاری از عوارض سطحی سیاره از جمله قله‌های بلند آتش‌فشانی و دشت‌های پهناور سیلاب‌های آتش‌فشانی است. این‌ها در ابعاد وسیعی ساخته می‌شوند؛ زیرا سنگ مذاب میلیون‌ها سال فقط از یک روزنه بیرون می‌زند و روی سطح تلنبار می‌شود. در حالی که در سیاره‌ای با پوسته‌ی تکه‌تکه، با حرکت صفحه‌ای، محل خروج گدازه در جایی بسته و در جای دیگر باز می‌شود.




توفان مریخی، که امکان دارد در آن سرعت باد به ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت برسد، غباری برپا می‌کند که گاه تمام سطح سیاره را می‌پوشاند؛ مانند این دو تصویر تلسکوپ فضایی هابل از مریخ که به فاصله‌ی چند ماه پیش و پس از توفان عظیم غبار در سال ۲۰۰۱ گرفته شده است.

مریخ‌نشین واپکینگ ۱ در دشت بزرگ چریس، شمال دره‌ی مارینر، فرود آمد.

ساختارهای سطحی

نیم‌کره‌ی جنوبی سیاره پوشیده از سرزمین‌های مرتفع و نیم‌کره‌ی شمالی پر از دشت‌های پست وسیع است. بین این دو ناحیه، صخره‌های طولیل قرار دارند. دهانه‌های حاصل از برخورد شهاب‌سنگ‌ها، نواحی جنوبی سیاره را زخمی کرده و در شمال هم پراکنده‌اند. قله‌های آتش‌فشانی مرتفعی مانند قله‌ی آلمپ یا آلمپوس، دره‌ی عمیق و عظیم مارینر و رشته‌کوه‌ها و تَرَک‌های بسیاری در فلات تارسیس، درست شمال استوای سیاره و اطراف آن به چشم می‌خورد. برخی دانشمندان نیمه‌ی هموار شمالی را، به هر دلیلی که به‌وجود آمده باشد، بستر خشک‌شده‌ی اقیانوس قدیمی مریخ می‌دانند. در نقشه‌ی توپوگرافی سیاره (تصویر زیر)، ژرفا و ارتفاع پستی و بلندی‌های آن نواحی نیز مشخص شده است. نواحی پست (آبی) شمالی و نواحی مرتفع (قرمز)، جنوبی است.



مارینر، بزرگ‌ترین دره‌ی شناخته‌شده در منظومه‌ی شمسی به طول بیش از دوسوم قطر مریخ و عمق حداکثر ۱۵ کیلومتر (تقریباً ۲ برابر ارتفاع قله‌ی اورست).

شکاف اوفیر


شکاف اوفیر، بخشی از دره‌ی عظیم مارینر، به سبب از هم‌گسیختن پوسته‌ی مریخ، رانش زمین و فرسایش در اثر باد و آب ایجاد شده است. دیواره‌ی دره ۴ هزار متر ارتفاع دارد و خَرده‌سنگ‌های حاصل از رانش زمین، در پای صخره‌ها دیده می‌شود. دلیل بروز رانش یا زمین‌لغزه‌ها در بسیاری از دره‌ها، ترکیب اثر زمین‌لغزه‌ها با مواد خیس آب در پشت دیواره‌ی دره‌هاست که سطحی سُست و آماده‌ی فروریزش ایجاد می‌کند.




گاه ابرهایی از یخ آب شکل می‌گیرند؛ اما عوامل اصلی تأثیرگذار در آب و هوای مریخ، غبار و ابرهای دی‌اکسیدکربن است.

دهانه‌های برخوردی

بیش‌تر دهانه‌های مریخ را بمباران شدید شهاب‌سنگی در ۳۸ میلیارد سال پیش به‌وجود آورده است. بر اساس یکی از نظریه‌ها، برخوردی فوق‌العاده بزرگ، موجب تفاوت میان سرزمین‌های مرتفع جنوبی و سرزمین‌های کم‌ارتفاع شمالی شده است.



دهانه‌های شهاب‌سنگی روی مریخ



آلبا پاترا

آلبا پاترا، که در لبه‌ی شمالی فلات تارسیس قرار دارد، قله‌ای به ارتفاع ۱۶۰۰ متر و قطر ۴۶۴ کیلومتر است. امکان دارد این قله آتش‌فشان یا ساختاری باشد که با بالا زدن حباب‌های گدازه‌ی داغ از پوسته‌ی سیاره و سپس سرد و جامد شدن آن، شکل گرفته است.


رصد عوارض سطحی

مریخ تنها سیاره‌ای است که هنگام نزدیک شدن به زمین، می‌توان جزئیات عوارض سطحی آنرا با تلسکوپ نسبتاً ارزان‌قیمت تشخیص داد. تلسکوپ ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متری مناسب، دشت‌های تیره و روشن و کلاهک‌های یخی قطبی را، اگر در جهت مناسبی رو به ما باشد، نشان می‌دهد و با ابزاری بهتر، حتی ابرهای سیاره نیز تشخیص داده می‌شود. برخی بخش‌های سطح، نور کمتری بازتاب می‌کنند؛ زیرا سنگ و پوشش غبار آن‌ها متفاوت است. این نواحی مانند دشت‌های تیره‌ای بر سطح‌اند که بزرگ‌ترین آن‌ها، دشت سه‌گوش سیرئیس بزرگ است. در نیمه‌ی قرن هفدهم، هویگنس با تلسکوپ ۶ سانتی‌متری از رصد جابه‌جایی آن، شبانه‌روز مریخ را محاسبه کرد.

ابرهای رقیق در نزدیکی لبه‌ی سیاره

لکه‌های تیره با بازتاب کم

کلاهک یخی قطبی



در این نمای مریخ، کلاهک‌های یخی قطب شمال و آتش‌فشان‌ها و دره‌های شگفت‌انگیز نزدیک استوا دیده می‌شود.

قله‌ی آلمپ

بزرگ‌ترین آتش‌فشان روی مریخ و حتی منظومه‌ی شمسی، قله‌ی آلمپ است که به یاد کوه افسانه‌ای خدایان در یونان، نام‌گذاری شده است. ارتفاع این قله از سطح دشت‌های اطراف، فلات تارسیس، ۲۴ هزار متر (سه برابر قله‌ی اورست روی زمین) و ابتدای دامنه‌ی این کوه صخره‌ای پُرشیب به ارتفاع ۶ تا ۸ هزار متر است. قطر این کوه ۶۰۰ کیلومتر و قطر دهانه‌ی آتش‌فشانی نوک آن ۹۰ کیلومتر است. آلمپ چنان بزرگ است که اگر در ایران و در اصفهان قرار می‌گرفت، دامنه‌های آن از جنوب تهران تا شمال شیراز می‌رسید. شواهد تازه نشان می‌دهد که آتش‌فشان‌های مریخ خاموش شده‌اند؛ اما دیر به دیر فوران می‌کنند. احتمالاً تازه‌ترین فوران این آتش‌فشان‌ها، چند میلیون سال پیش بوده است. با آن‌که چند میلیون سال پیش خیلی دور به نظر می‌رسد، در مقایسه با ۴/۵ میلیارد سال عمر این سیاره، روی داد جدیدی است!

وسعت فلات تارسیس ۸ هزار کیلومتر، کمی بیش از فاصله‌ی تهران تا توکیو در شرق‌ترین مرزهای آسیاست.

کلاهک یخی قطبی

کلاهک‌های قطب‌های شمال و جنوب مریخ، شامل یخ دی‌اکسیدکربن (یخ خشک)، غبار و یخ آب است. در تابستان، با تبخیر دی‌اکسیدکربن یخ‌زده، کلاهک‌ها کوچک و بخش زیادی از آن‌ها یخ‌آب می‌شود. این تصویر، که مدارگرد وایکینگ آن را گرفته، کلاهک یخی جنوبی را در تابستان آن نیم‌کره نشان می‌دهد که به قطر حدود ۴۰۰ کیلومتر رسیده است.

بیش‌تر بدانیم

تولّد منظومه‌ی شمسی ۱۰۰
سطح زمین ۱۰۴، مریخ (بهرام) ۱۳۲
شهاب‌سنگ‌ها ۱۶۸

دره‌ی مارینر عمیق‌ترین دره در منظومه‌ی شمسی است، طول این شکاف ۴۵۰۰ کیلومتر و عمق متوسط آن ۸ هزار متر است. ریز آبه‌های آن به بزرگی دره‌ی گراندکانیون، بزرگ‌ترین دره‌ی زمین در ایالات متحده، است.

سیلاب‌های گذاره در سرزمین‌های مرتفع و پردانه‌ی جنوبی، دشت‌های همواری ساخته است.

نیم‌کره‌ی غربی مریخ

مشتري



منظومه‌ی حلقه‌ها

حلقه‌های کم‌فروغ مشتری نخستین بار در سال ۱۹۷۹ در تصاویری دیده شد که کاوشگر فضایی ویجر ۱ به زمین ارسال کرد. تصاویر بعدی، که ویجر ۲ و فضایی‌های گالیله ارسال کردند و نیز در گذر فضایی‌های کاسینی و افق‌های نو گرفته شد، جریانی از ساختار آن‌ها آشکار شد. این حلقه‌ها شامل حلقه‌ی «ابرآلود» داخلی است که تا بالای جو سیاره امتداد دارد. حلقه‌ی تخت مرکزی و حلقه‌ی خارجی، که فضایی‌های گالیله نشان داد، حلقه‌ای لانه گرفته درون حلقه‌ای دیگر است. این حلقه‌ها از غبار و خردسنگ‌هایی شکل گرفته‌اند که با برخورد‌های شهاب‌سنگی از چهار قمر داخلی مشتری به فضا پرتاب شده‌اند.

چرخش

مشتری آنقدر سریع می‌چرخد که یکبار چرخش آن به دور محور، فقط ۹ ساعت و ۵۵ دقیقه طول می‌کشد؛ این مقدار را با چرخش ۲۴ ساعته‌ی زمین مقایسه کنید. نیروهای حاصل از چرخش سریع سیاره و تأثیرپذیری ساختار گازی، آن را کمی بیخ کرده و موجب شکم دادن استوای آن شده است، قطر قطب تا قطب مشتری در مقایسه با قطر استوایی آن ۷ درصد کوچک‌تر است.



می‌توان چرخش سریع مشتری را با یک تلسکوپ زمینی دید. در مدت ۲ ساعت، لکه‌ی بزرگ سرخ (چشم مشتری) حدود یک‌چهارم مسیر دور سیاره را طی می‌کند. در این تصویر تلسکوپی سیاره وارونه است.

ترکیب مواد، از جمله کوگرد، موجب ظاهر چند رنگ مشتری است.

مشتری را کمربندهایی از ابرهای رنگی با رنگ‌های متفاوت فراگرفته است. به همین سبب، گاه آن را سیاره‌ی راه‌راه می‌نامند.

نقطه‌ها، لکه‌ها و نوارها در لایه‌ی بالایی ابرها، آشفتنگی‌ها و توفان‌های جوی هستند.


پنجمین سیاره از سوی خورشید، با سیاره‌های زمین‌مانند تفاوت بسیار دارد. مشتری بزرگ‌ترین سیاره در منظومه‌ی شمسی است. بیش از ۱۳۰۰ کره به اندازه‌ی زمین در حجم آن جا می‌گیرد و جرمش ۲/۵ برابر مجموع جرم سیاره‌های دیگر است. این سیاره جاذبه‌ی گرانشی بسیار قدرتمندی دارد که بر مسیر بسیاری از دنباله‌دارها تأثیر می‌گذارد؛ دنباله‌دارهایی که شاید در غیر این صورت، با زمین برخورد می‌کردند. به علاوه، حضور مشتری سبب پیدایش کمربند سیارک‌ها شده است و تعدادی از آن‌ها نیز به صورت قمرهای این سیاره یا همراهانی در مدار آن درآمده‌اند. مشتری یک غول گازی است؛ یعنی برخلاف سیاره‌های کوچک و سنگی داخلی، هیچ سطح جامدی ندارد، از گاز و مایع است و فقط یک هسته‌ی سنگی کوچک دارد. همه‌ی آنچه از این سیاره پیداست، گازهای بیرونی آن است. این سیاره ۶۳ قمر و منظومه‌ای از حلقه‌های خردسنگ و غباری دارد.

ساختار

مشتری توپ عظیمی از هیدروژن و هلیوم است که در لایه‌های پایین‌تر، به سبب فشار به مایع تبدیل شده‌اند و احتمالاً هسته‌ای جامد دارد. دانش ما درباره‌ی هسته‌ی این سیاره محدود است؛ اما احتمالاً ۱۰ تا ۱۵ بار پُرچرم‌تر از هسته‌ی زمین است. فشار و دما در عمق ۲۰ هزار کیلومتری زیر ابرها آنقدر شدید است که هیدروژن به مایعی تبدیل می‌شود که شبیه فلز عمل می‌کند. هیدروژن مایع معمولی بالاتر از لایه‌ی فلزی قرار دارد. گازهای هیدروژن و هلیوم و ترکیبات متفاوت، ابرها و جو‌ی را شکل داده‌اند که سیاره را فراگرفته است.

شناسایی فضایی قمرهای مشتری			
نام	تاریخ	هدف‌های مهم مأموریت	
ویجر ۱	مارس ۱۹۷۹	تصویربرداری از قمرهای گالیله‌ای. فعالیت‌های آتش‌فشانی قمر یو مشاهده شد.	
گالیله	دسامبر ۱۹۹۶	آشکار سازی مغناطی‌گری گانیمد. تصاویر نشان دادند که یخ‌فشان‌ها سطح قمر اروپا را شکل داده‌اند.	
گالیله	ژوئن ۱۹۹۷	شواهدی از اقیانوسی در زیر سطح یخی قمر کالیستو	

اگر مشتری ۸۰ بار پُرچرم‌تر از حالا بود، هسته‌ی آن به حد کافی داغ می‌شد تا موجب هم‌جوشی هسته‌های هیدروژن شود و به ستاره‌ای کم‌چرم تبدیل گردد.



دما

مشتری حرارتی بیش از آنچه از خورشید دریافت می‌کند، بیرون می‌دهد. این تابش حرارتی با متقبض شدن سیاره تولید می‌شود. قطر مشتری زمانی ۷۰۰ هزار کیلومتر، ۵ برابر قطر فعلی آن، بوده است. انقباض سیاره حدود ۲ سانتی‌متر در هر سال ادامه دارد. در حال حاضر، دما بر فراز ابرهای مشتری ۱۱۰- درجه‌ی سانتی‌گراد است و به ازای هر یک کیلومتر عمق بیش‌تر، ۰/۳ درجه افزایش می‌یابد. این دما در هسته‌ی سیاره تقریباً به ۳۰ هزار درجه‌ی سانتی‌گراد می‌رسد.

تاریخچه‌ی شناخت مشتری

• در سال ۱۶۱۰، اخترشناس آلمانی زیمن ماریوس و هم‌زمان به طور مستقل گالیله گالیله چهار قمر بزرگ‌تر مشتری را با تلسکوپ‌های دست‌ساز کوچک خود کشف کردند که بعدها به قمرهای گالیله‌ای مشهور شدند.

• لکه‌ی سرخ بزرگ مشتری نخستین بار در قرن هفدهم رصد شد.

• اخترشناسان در سال ۱۹۵۵ تابش‌های رادیویی قوی سیاره را رصد کردند.

• پایوتیر ۱۰ نخستین فضاییابی بود که در سال ۱۹۷۳ به مشتری رسید. این فضاپیما میدان مغناطیسی قوی و عجیب مشتری را کشف کرد.


• در سال ۱۹۹۵، فضاپیما گالیله به مشتری رسید. کاوش‌گری به درون ابرهای مشتری فرستاد و خود تا سال ۲۰۰۳، که در مدار سیاره فعال بود، دانش ما را درباره‌ی مشتری متحول کرد.

• در سال ۲۰۰۰، فضاپیما کاسینی در راه زحل از کنار مشتری گذشت و اطلاعات و تصاویر بسیاری به زمین فرستاد. مقایسه‌ی تصاویر هم‌زمان گالیله و کاسینی از دو منظر متفاوت، بسیار ارزشمند بود.

• در سال ۲۰۰۷، فضاپیما افق‌های نو در راه رسیدن به پلوتون از کنار مشتری گذشت و تصاویر ارزشمندی از مشتری و قمرهای گالیله‌ای و اطلاعاتی از گستردگی مغناطکره‌ی مشتری به دست داد.

بیش‌تر بدانیم

منظومه‌ی شمسی ۹۴
کاوش‌گرهایی به سوی سیاره‌ها ۹۶
تولّد منظومه‌ی شمسی ۱۰۰
زمین ۱۰۲، درون خورشید ۱۷۴



رصد مشتری


مشتری اغلب شب‌ها سومین جرم پرنور آسمان، پس از ماه و زهره، است. می‌توان آن را با چشم غیر مسلح دید و جزئیاتی مانند کمربندهایش را با تلسکوپ آماتوری رصد کرد.

شناختنامه

قطر (استوایی)	۱۴۲۹۸۴ کیلومتر
قطر (قطبی)	۱۳۳۷۰۸ کیلومتر
فاصله‌ی متوسط از خورشید	۷۷۸/۴ میلیون کیلومتر
سرعت مداری به دور خورشید	۱۳/۰۷ کیلومتر بر ثانیه
دوره‌ی انتقالی (گردش به دور خورشید)	۱۱/۸۶ سال
از طلوع تا طلوع بعدی خورشید (هبانروز بر فراز ابرها)	۹/۸۴ ساعت
دوره‌ی وضعی (چرخش به دور خود)	۹/۹۲ ساعت
جرم (زمین = ۱)	۳۱۸
حجم (زمین = ۱)	۱۳۲۱
چگالی متوسط (آب = ۱)	۱/۳۳
گرانش بر فراز ابرها (زمین = ۱)	۲/۳۶
تمایل محوری (از حالت عمود بر صفحه‌ی مداری)	۳/۱۳ درجه
انحراف مداری (از دایرة البروج یا صفحه‌ی منظومه‌ی شمسی)	۱/۳ درجه
دما بر فراز ابرها	۱۱۰- درجه‌ی سانتی‌گراد
تعداد لایه‌ها	۶۳ عدد (شناخته شده تا سال ۲۰۰۹)

مشتری در یک نگاه


مشتری سیاره‌ای غول‌پیکر است. این سیاره هیچ پوسته‌ای ندارد و جو آن لایه‌ای به ضخامت حدود هزار کیلومتر است که لایه‌های داخلی هیدروژن مایع، هیدروژن فلزی مایع و هسته‌ای جامد را احاطه کرده است.




هلیوم (۱۰/۲) درصد، با ردپایی از متان و آمونیاک

هیدروژن (۸۹/۸ درصد)


ساختار



مقاسم



مکان‌نما



اثر مغناطیسی

میدان مغناطیسی مشتری ۲۰ هزار بار قوی‌تر از میدان زمین است. دانشمندان بر این باورند که جریان‌های الکتریکی در هیدروژن فلزی چرخان درون سیاره، عامل تولید این میدان است. این میدان در فضا گسترده شده و سیاره را حباب مغناطیسی عظیمی، به نام مغناطکره، احاطه کرده که در سمت خورشید، در تقابل با باد خورشیدی، فشرده و در سمت مخالف کشیده شده است. دُم این میدان اشک‌چشم مانند ۶۵۰ میلیون کیلومتر در فضا، تا ورای مدار زحل، کشیده می‌شود.

جو مشتری

در منظومه‌ی شمسی، نواحی آشفته‌تر از جو مشتری بسیار کم‌اند. چرخش سریع سیاره به دور محور خود بادهایی برپا می‌کند که فضاپیماهای گالیله سرعت آن‌ها را ۶۵۰ کیلومتر بر ساعت اندازه گرفت. از روی زمین می‌توان سامانه‌های پُریپچ و تاب توفانی را در جو این سیاره دید. فضاپیماهایی هم که به سوی این سیاره رفته‌اند، آذرخش عظیمی را ثبت کرده‌اند. سیاره‌های گازی، مانند مشتری، از همان ابر گازی قدیمی ساخته شده‌اند که خورشید را پدید آورده است. به این سبب، بررسی اعماق جو آن‌ها به دانشمندان درک بهتری از اوایل تاریخ شکل‌گیری منظومه‌ی شمسی می‌دهد.

بر فراز ابرها

مشتری توپ گازی عظیمی است که با افزایش عمق به مایع و سپس جامد تبدیل می‌شود. این سیاره سطح جامدی ندارد؛ به این سبب، وقتی اخترشناسان به ویژگی‌هایی مانند دما اشاره می‌کنند، ارتفاعی از جو سیاره را در نظر می‌گیرند که فشار جو برابر با فشار زمین در سطح دریا باشد. این ناحیه تقریباً سطح ابرهای سفید است.

لکه‌های بزرگ سرخ

تندباد شدیدی با ابعاد سه برابر قطر زمین بیش از ۳۰۰ سال است که در جو مشتری دیده می‌شود. این توفان، که به لکه‌ی بزرگ سرخ (GRS) یا چشم مشتری مشهور است، در هر ۶ روز زمینی، در خلاف جهت عقربه‌های ساعت به دور خود می‌چرخد. این لکه، که حدود ۸ کیلومتر مرتفع‌تر از ابرهای اطراف است، بیش‌تر از گاز آمونیاک و ابرهای یخی ساخته شده است. در سه قرنی که لکه‌ی سرخ رصد شده، تغییراتی نیز در رنگ و شکل آن ثبت شده است که دلیل آن هنوز ناشناخته است.

مرز بین منطقه و کمربند

مانند هوای مرطوب در جو زمین، گارهای لکه‌ی بزرگ سرخ صعود می‌کنند و در مارپیچی چرخنده پیچ‌وتاب می‌خورند و پس از سرد شدن پایین می‌روند.

سامانه‌ی پُرفشار
سامانه‌ی کم فشار

جریان‌های جوی


بیش‌تر انرژی‌ای که موجب شکل‌گیری آب و هوای مشتری است، بیش از خورشید، از حرارت درونی خود سیاره تأمین می‌شود. حرارت برآمده از درون، به اضافه‌ی چرخش سریع سیاره، سامانه‌های پُرفشار و کم‌فشار را در تمام سیاره پخش می‌کند. در مرزهای بین سامانه‌های فشار، توفان‌ها شکل می‌گیرند.



مناطق و کمربندها

نوارهای روشن (که منطقه نامیده می‌شوند)، نواحی بالا آمدن گاز گرم‌تر در جو هستند و نوارهای تیره (کمربندها)، نواحی فرورفتن گاز سرد شده‌اند. بالاترین نقاط کمربندها حدود ۲۰ کیلومتر پایین‌تر از بالاترین نقاط مناطق است. احتمالاً رنگ کمربندها به سبب ردپای گوگرد و ملکول‌های آلی است. ملکول‌های اصلی ردیابی شده در جو مشتری، علاوه بر هیدروژن و هلیوم، که بیش‌تر سیاره و جو آن را تشکیل می‌دهد، متان، آمونیاک، آب، اتان، اتیلن، فسفین، مونوکسید کربن و سولفید آمونیوم است.


درست پایین قطب‌های مشتری، نه‌ری از ذرات باردار از قمر آن، یو، با سطح سیاره برخورد می‌کند. این ذرات باردار از آتش‌فشان‌های فعال یو به فضا پرتاب می‌شوند و در میدان مغناطیسی مشتری گیر می‌افتند. احتمالاً برخورد آن‌ها با جو مشتری موجب تابش‌های شدید رادیویی است که از مشتری آشکار شده است.



ناحیه‌ی قطبی جنوبی

نمای ابرها

در لایه‌ی جو هزار کیلومتری مشتری، سه لایه ابر وجود دارد که تا عمق حدود ۸۰ کیلومتری امتداد می‌یابند. فضای پیمای گالیله تأیید کرد که لایه‌ی بالایی، شامل یخ نازک آمونیاک است. لایه‌ی مرکزی شامل سولفید آمونیوم و لایه‌ی پایینی از یخ و آب است.



بادام‌های سفید

بادام‌های سفید، مانند لکه‌ی بزرگ سرخ (GRS)، توفان‌های بیضی شکل چرخنده‌اند. بادها در مرکز آن‌ها بالا می‌آیند و در لبه‌ها فرو می‌روند. در سال ۱۹۹۸، دانشمندان دو بیضی سفید رصد کردند که با هم تلفیق شدند و بزرگ‌ترین توفان جوی منظومه‌ی شمسی بعد از GRS را شکل دادند.

کمربند استوایی شمالی، ظاهری

درهم‌پیچیده شبیه طناب دارد که به سبب نادهای شدید ایجاد شده است.

کاوشگر رها شده از فضاپیمای گالیله درست شمال استوا وارد جو مشتری شد.

برخورد دنباله‌دار


در ژوئیه‌ی سال ۱۹۹۴، ۲۱ قطعه‌ی دنباله‌دار شومیکر-لوی ۹ به مشتری برخورد کرد. برخی از این برخوردها، با سرعت حدود ۲۱۰ هزار کیلومتر بر ساعت، گوی‌هایی از آتش به قطر ۴ هزار کیلومتر را تا ارتفاع بیش از ۲ هزار کیلومتر بالاتر از فراز ابرها فرستادند. توده‌های تیره، مکان برخوردها را در این تصویر تلسکوپ فضایی هابل نشان می‌دهند.

بیش‌تر بدانیم

منظومه‌ی شمسی ۹۴
جو زمین ۱۰۶، زحل ۱۴۸
اورانوس ۱۵۴، شهاب‌سنگ‌ها ۱۶۸

نمای قطبی شمال


لایه‌ی جنوبی کمربند معتدل شمالی، پر از لکه‌های بیضی‌شکل قرمز است.



چتر نجات سرعت سقوط کاوشگر به درون جو را کاهش داد.

کاوشگر ۵۸ دقیقه فرود آمد تا سرانجام در جو مشتری خرد شد و از بین رفت.

ابزارها ترکیبات، دما و فشار جو را اندازه گرفت.



سپر گرمایی کاوشگر را در حین سقوط در جو محافظت می‌کرد.

فضاپیمای گالیله

فضاپیمای گالیله‌ی ناسا در دسامبر سال ۱۹۹۵ به مشتری رسید. چندی بعد، کاوشگری از آن رها شد و درون جو سیاره فرود آمد. این کاوشگر فقط رشته‌رشته‌هایی از ابر و اکسیژن و آب بسیار کمتری، در مقایسه با پیش‌بینی دانشمندان، رصد کرد. کاوشگر حدود ۵۸ دقیقه در ابرها نفوذ کرد تا این‌که مطابق پیش‌بینی، بر اثر فشار خردکننده‌ی جوی از بین رفت.


قمرهای مشتری

معمولاً به مشتری و بیش از ۶۰ قمر شناخته شده‌ی آن، منظومه‌ی شمسی مینیاتوری لقب می‌دهند. آن‌ها بسیار متنوع، برخی سنگی و بعضی یخی هستند و برخی زیر پوسته‌ی یخی خود وضعیتی دارند که برای پرورش حیات ابتدایی لازم است. همه‌ی قمرهای قدیمی‌تر، به‌جز آمالِتا - به نام معشوقگان زئوس - الهه‌ی خدایان یونان باستان و معادل الهه‌ی رومی ژوپیتر (نام لاتینی مشتری) - نام‌گذاری شده‌اند. قمرهای جدید نام‌های دیگری مانند شخصیت‌های نمایش‌نامه‌های شکسپیر دارند. چهار قمر بزرگ‌تر را نخستین بار گاليله در سال ۱۶۱۰ بررسی کرد. فضایی‌مایی که به شایستگی نامش گاليله بود، طی حدود ۸ سال کار خود، نحوه‌ی عمل اجزای منظومه‌ی پیچیده‌ی مشتری و قمرهایش را در کنار هم و اثر آن‌ها را بر هم آشکار کرد.



اروپا

سطح قمر اروپا یخ صاف و هموار است. تعداد کم دهانه‌های برخوردی و ترک‌های بسیار بر سطح سپید آن، از پوسته‌ی تازه‌ی نشان دارد که مدام با لایه‌های تازه‌ی یخ تجدید می‌شود. از شکاف‌های سطحی اروپا، فوران‌هایی به نام یخ‌فشان، یخ گرم و تازه‌ی زیرین را به سطح می‌رساند. داده‌های فضایی‌مایی گاليله حاکی از آن است که اقیانوسی مایع زیر این یخ وجود دارد که از گرمای مرکزی اروپا شکل گرفته است. برخی دانشمندان بر این باورند که شاید حیات آب‌زی در بخش‌های گرم‌تر این اقیانوس پا گرفته باشد. تلسکوپ فضایی هابل نیز جو بسیار رقیقی از اکسیژن به دور اروپا آشکار کرد.




قمرهای گاليله‌ای

چهار قمری که گاليله آن‌ها را بررسی کرد، به ترتیب فاصله از مشتری عبارت‌اند از: یو، اروپا، گانیمد و کالیستو. اندازه‌ی آن‌ها از ۰/۹ تا ۱/۵ برابر اندازه‌ی قمر زمین، ماه، است و هریک ویژگی‌هایی دارند. قمرهای گاليله‌ای در مسیرهای تقریباً دایره‌ای و دور استوای مشتری می‌گردند.

۱۶ قمر اصلی مشتری (به ترتیب فاصله از سیاره)


نام	قطر به کیلومتر	فاصله تا مشتری (کیلومتر)	گردش در مدار به روز	سال کشف
متیس	۴۰	۱۲۷۹۶۰	۰/۲۹	۱۹۷۹
آدراسْتِنا	۲۰	۱۲۸۹۸۰	۰/۳۰	۱۹۷۹
آمالِتا	۲۰۰	۱۸۱۳۰۰	۰/۵۰	۱۸۹۲
تیه	۱۰۰	۲۲۱۹۰۰	۰/۶۷	۱۹۷۹
یو	۳۶۴۳	۴۲۱۶۰۰	۱/۷۷	۱۶۱۰
اروپا	۳۱۳۰	۶۷۰۹۰۰	۳/۵۵	۱۶۱۰
گانیمد	۵۲۶۸	۱۰۷۰۰۰۰	۷/۱۵	۱۶۱۰
کالیستو	۴۸۰۶	۱۸۸۳۰۰۰	۱۶/۶۹	۱۶۱۰
لدا	۱۰	۱۱۰۹۴۰۰۰	۲۳۹	۱۹۷۴
هیمالیا	۱۷۰	۱۱۴۸۰۰۰۰	۲۵۱	۱۹۰۴
لیسیتنا	۲۴	۱۱۷۲۰۰۰۰	۲۵۹	۱۹۳۸
الرا	۸۰	۱۱۷۳۷۰۰۰	۲۶۰	۱۹۰۵
آتانکه	۲۰	۲۱۲۰۰۰۰۰	۶۳۱	۱۹۵۱
کارمه	۳۰	۲۲۶۰۰۰۰۰	۶۹۲	۱۹۳۸
پاسیفاده	۳۶	۲۳۵۰۰۰۰۰	۷۳۵	۱۹۰۸
سینوپه	۲۸	۲۳۷۰۰۰۰۰	۷۵۸	۱۹۱۴



برش مقطعی پوسته‌ی قمر اروپا

قمرهای داخلی

از میان حدود ۶۰ قمر کوچک‌تر مشتری، چند تایی درون مدار یو به دور مشتری می‌گردند. آن‌ها هم‌چنان مورد هجوم شهاب‌سنگ‌ها هستند و از غبار حاصل از این برخوردها، حلقه‌های سیاره پیوسته بازسازی می‌شود. دو عدد از درونی‌ترین قمرها، متیس و آدراسْتِنا، سرانجام با حرکتی مارپیچی به درون سیاره می‌روند. بزرگ‌ترین قمر غیر گاليله‌ای، آمالِتا، سبب زمینی شکل است. به احتمال زیاد، رنگ قرمز آمالِتا به سبب گوگرد حاصل از فوران‌های آتش‌فشانی یو است.



قمرها و مدارهای آن‌ها

در طرح روبه‌رو، ۱۶ قمر از قدیم شناخته شده و اصلی مشتری نشان داده شده است. قمرهای لدا، هیمالیا، لیسیتنا و الارا احتمالاً تکه‌های سیارکی خرد شده‌اند. شاید چهار قمر دورتر، سیارک‌های به دام افتاده باشند. آن‌ها در خلاف جهت گردش قمرهای داخلی به دور مشتری می‌گردند.

شناسایی فضایی قمرهای مشتری			
نام	تاریخ	هدفهای مهم مأموریت	
ویجر ۱	مارس ۱۹۷۹	تصویربرداری از قمرهای گالیله‌ای، فعالیت‌های آتش‌فشانی یو و اولین شواهد از اقیانوس احتمالی زیر سطح یخی اروپا مشاهده شد.	
گالیله	دسامبر ۱۹۹۶	آشکارسازی مناطکره‌ی گانیمد، تصاویر نشان دادند که یخ‌فشان‌ها سطح اروپا را شکل داده‌اند.	
گالیله	ژوئن ۱۹۹۷	شواهدی از اقیانوسی در زیر سطح یخی کالیستو	

گانیمد

بزرگ‌ترین قمر مشتری، ر سیاره‌ی عطارد بزرگ‌تر است به‌علاوه، گانیمد بزرگ‌ترین قمر در همه‌ی منظومه‌ی شمسی است کاوش گر گالیله کشف کرد که گانیمد برای خود معاط‌کره دارد پیش از آن، دانشمندان تصور می‌کردند که این قمر هسته‌ای سنگی دارد که با آب و سپس پوسته‌ی یخ احاطه شده است. کون دانشمندان بر این باورند که دست کم، بخشی از هسته‌ی گانیمد آهن مدب است که گوشته‌ای سنگی و پوسته‌ای یخی دارد. نشانه‌هایی در دست است که بین گوشته و پوسته، اقیانوس کم‌صحامتی ر آب‌مک وجود دارد.

کالیستو

سطح کالیستو کاملاً با دهانه‌های برخوردی، که به زمان شکل‌گیری منظومه‌ی مشتری تعقیق دارند، پوشیده شده است کالیستو شامل ۰ درصد سنگ و آهن و ۴۰ درصد یخ و آب است کاوش گر گالیله تغییراتی را در میدان مغناطیسی اطراف این قمر کشف کرد دانشمندان بر این باورند که بین تغییرات به سبب جریان‌های الکتریکی است که در اقیانوس نمکی زیر پوسته‌ی یخی کالیستو جریان دارد

سطح گانیمد، گسل‌هایی شبیه گسل سنت‌آندریاس در کالیفرنیا از پهلوی لغزیده‌اند.

رصد مشتری با تلسکوپ کوچک

یو، پوشیده از آتش‌فشان‌ها، دریاچه‌های گوگرد مذاب، جریان‌های گدازه و کوه‌هایی تا ارتفاع ۸ هزار متر است.

ممکن است آتش‌فشان‌ها ستون‌هایی از گاز را تا ارتفاع حدود ۳۰۰ کیلومتری به هوا پرتاب کنند. در هر لحظه آتش‌فشان‌های عظیم بسیاری در حال فوران بر سطح این قمرند.

رصد قمرها

با یک دوربین دوچشمی خوب یا تلسکوپ کوچک، می‌توان در شب‌های یبایی یا گاه فقط در چند ساعت، حرکت قمرهای گالیله‌ای به دور مشتری را دنبال کرد. آن‌ها گاهی در پشت مشتری یا در سایه‌ی آن در فضا پنهان می‌شوند، از مقابل قرص مشتری می‌گذرند یا سایه‌ای کوچک بر آن می‌افکنند. این قمرها در تاریخ اخترشناسی نقشی حیاتی داشته‌اند؛ این حقیقت که آن‌ها به دور سیاره‌ی دیگر می‌گردند، نشان داد که همه چیز به دور زمین نمی‌گردد.




رصد مشتری و عوارض سطحی آن با تلسکوپ متوسط آماتوری

بیش‌تر بدانیم

سیاره‌ی زنده ۱۰۸، ماه ۱۱۰
قمرهای زحل ۱۵۲، اورانوس ۱۵۴
سیارک‌ها ۱۶۶

مقیاس به شعاع مشتری
۱ شعاع = ۷۱۴۹۲ کیلومتر




یو

بیرونی‌ترین مشتری، اروپا و گانیمد، مدام یو را می‌کشند و پس می‌زنند و پوسته‌ی آن ر عقب و جلو می‌کند. بین بیرونی‌ترین مشتری (یو) درون قمر را گرم می‌کند در نتیجه، یو فعال‌ترین جسم منظومه‌ی شمسی از نظر آتش‌فشانی است. چهره‌ی رنگارنگ و پیتزا، مانند آن به سبب فعالیت صدها آتش‌فشانی است که گوگرد و ترکیبات گوگردی بر سطح قمر پخش کرده‌اند. این آتش‌فشان‌ها سبب پیدایش جو رقیقی از دی‌اکسید گوگرد در اطراف یو شده‌اند.

زحل

زحل دومین سیاره‌ی بزرگ منظومه‌ی شمسی است. تشخیص این سیاره، به سبب وجود حلقه‌های درخشانی به دور استوای آن، بسیار ساده است. این سیاره هم، مانند مشتری، توپ عظیمی از گاز و مایع است که پوششی از ابر، آن را دربر گرفته است. زحل، که در مقایسه با زمین، ۱۰ بار از خورشید دورتر است، دورترین سیاره‌ی شناخته شده پیش از اختراع تلسکوپ بود. این سیاره با چشم غیر مسلح، شبیه ستاره‌ای زرد رنگ و تقریباً درخشان دیده می‌شود؛ ولی برای دیدن حلقه‌های آن به تلسکوپ نیاز است. سه فضاپیما، پایونیر ۱۱ و ویجرهای ۱ و ۲، از کنار زحل عبور کرده‌اند و فضاپیما کاسینی، که در سال ۲۰۰۴ به زحل رسید، هم‌چنان در حال گردش به دور این سیاره و ارسال داده‌های ارزشمندی به زمین است.



گذر ویجرها

در سال ۱۹۸۰، فضاپیما ویجر ۱ از کنار زحل و بزرگ‌ترین قمر آن، تیتان، گذشت. در سال ۱۹۸۱ نیز ویجر ۲، پیش از رفتن به سوی «ورانوس و نپتون، از کنار زحل گذشت.

سیاره‌ی گندمی

زحل نیز، مانند مشتری، سطحی از ابرهای گوناگون دارد که به سبب چرخش سیاره به صورت نوار درآمده است. در مقایسه با مشتری، ابرهای زحل ظاهر آرام‌تری دارند و کمتر رنگین هستند. آن‌ها در ارتفاع پایین‌تری در جو قرار دارند و سردترند (دمای ابرهای سفید در بالای جو ۱۴۰- درجه‌ی سانتی‌گراد است). بر فراز ابرها، لایه‌ای غبار است که سبب رنگ زرد گندمی زحل و باعث شده است که سطح این سیاره هموارتر از مشتری به نظر برسد.




ابرهای سفید
ابرهای نارنجی تیره
ابرهای آبی

قطر زحل ۹ برابر زمین است

توفان‌های زحل

تقریباً هر ۳۰ سال یک‌بار (مدت گردش زحل به دور خورشید)، در تابستان نیم‌کره‌ی شمالی زحل، توفان‌هایی درمی‌گیرد که نقاط سفید رنگ عظیمی را در نزدیکی استوای سیاره شکل می‌دهد. این تصاویر، که تلسکوپ فضایی هابل آن‌ها را گرفته است، توفانی را نشان می‌دهند که در سال ۱۹۹۰ شکل گرفت و دور تا دور سیاره را احاطه کرد. تندبادهای جو زحل، تندترین بادهای شناخته شده در منظومه‌ی شمسی هستند که سرعتشان به بیش از هزار کیلومتر در ساعت هم می‌رسد.



مرحله‌ی ۱ توفان


ابرها، کمربندهای روشن و مناطق تیره را ایجاد می‌کنند؛ درست مانند مشتری.

حلقه‌ها از ذرات و تکه‌های ریز و درشت یخ تشکیل شده‌اند.

الگوی ابرهای زحل در زیر لایه‌ای از غبار بلورهای آمونیاک پنهان است.


زحل در یک نگاه

زحل، به قطر ۹ برابر زمین، هسته‌ای سنگی و لایه‌های خارجی از گاز و مایع دارد. حلقه‌های درخشانی از ذرات یخی به دور استوای سیاره می‌گردند که زیباترین حلقه‌های سیاره‌ای منظومه شمسی به‌شمار می‌روند.




سیاره‌ی یخ شده

استوای زحل در هر ۱۰ ساعت و ۱۴ دقیقه به دور خود می‌چرخد که در مقایسه با قطب‌ها تقریباً نیم ساعت بیش‌تر است. ساختار گازی و چگالی کم آن، به اضافه‌ی چرخش سریع، به این معنی است که زحل بیش از هر سیاره‌ی دیگری یخ شده و استوای آن شکم داده است. استوای زحل ۱۱ درصد از قطب‌هایش پهن‌تر است و شکل بیضوی سیاره در تصاویر آن پیداست.




هسته‌ی زحل در هر ۱۰ ساعت و ۱۴ دقیقه به دور خود می‌چرخد.



چگالی سیاره

زحل کمترین چگالی را در میان سیاره‌ها دارد. چگالی متوسط آن فقط ۷۰ درصد چگالی آب است (البته چگالی مرکز سیاره بسیار بیش‌تر و در نزدیکی سطح بسیار کمتر است). جسمی با چگالی کم زحل، روی آب شناور می‌ماند.



مأموریت کاسینی

فضاپیمای کاسینی، که در سال ۱۹۹۷ پرتاب شد و در سال ۲۰۰۴ به زحل رسید، مأموریتی فضایی برای بررسی زحل، حلقه‌ها و قمرهای آن است. چند ماه پس از رسیدن کاسینی به زحل، کاوش‌گر کوچکی به نام هویگنس را روی بزرگ‌ترین قمر زحل، تیتان، رها کرد. این کاوش‌گر پس از گذر از جو غلیظ تیتان، بر سطح آن فرود آمد و در هنگام پایین آمدن و تا ساعتی پس از فرود، داده‌ها و تصاویر بسیار ارزش‌مندی از تیتان به کاسینی مخابره کرد.

مرحله‌ی ۴ توفان



مرحله‌ی ۳ توفان



مرحله‌ی ۲ توفان




شناسنامه

قطر (استوایی)	۱۲۰۵۳۶ کیلومتر
قطر (قطبی)	۱۰۸۷۲۸ کیلومتر
فاصله‌ی متوسط تا خورشید	۱/۴۲۷ میلیارد کیلومتر
سرعت مداری به دور خورشید	۹/۶۶ کیلومتر بر ثانیه
دوره‌ی انتقالی (گردش به دور خورشید)	۲۹/۴۵ سال
از طلوع تا طلوع بعدی خورشید (شبه‌دوره بر فراز ابرها)	۱۰/۲۳ ساعت
دوره‌ی وضعی (چرخش به دور خود)	۱۰/۶۶ ساعت
جرم (زمین = ۱)	۹۵
حجم (زمین = ۱)	۷۶۳/۵۹
چگالی متوسط (آب = ۱)	۰/۶۹
گرانش بر فراز ابرها (زمین = ۱)	۰/۹۲
تمایل محوری (از حالت عمود بر صفحه‌ی مداری)	۲۶/۷۳ درجه
انحراف محوری (از دایرة البروج یا صفحه‌ی منظومه‌ی شمسی)	۲/۵ درجه
دما بر فراز ابرها	-۱۴۰ درجه‌ی سانتی‌گراد
تعداد قمرهای شناخته شده	۶۱ عدد (شناخته شده تا سال ۲۰۰۹)
بیش‌تر بدانیم	
منظومه‌ی شمسی ۹۴، مشتری ۱۴۲، اورانوس ۱۵۴	

حلقه‌های زحل

چهار سیاره حلقه دارند: مشتری، زحل، اورانوس و نپتون؛ اما حلقه‌های زحل درخشان‌ترین است که حتی از درون تلسکوپی کوچک هم نمای شگفت‌انگیزی دارد. شاید حلقه‌ها، صفحه‌هایی یک تکه به نظر برسند؛ اما در حقیقت، از تکه‌های یخ و سنگ، با ابعادی از ذرات غبار تا کوه‌های یخی بزرگ‌تر از یک خانه، تشکیل شده‌اند که مانند گله‌ای از قمرها به دور استوای سیاره می‌گردند. حلقه‌های زحل احتمالاً بقایای قمر یا خُرده‌سیاره‌ای هستند که در چند صد میلیون سال گذشته، به مرور بسیار به زحل نزدیک شده و بر اثر نیروهای کشندی گرانشی از هم پاشیده شده‌اند.



حلقه‌های باشکوه

ما نمی‌توانیم در زمین چنین زاویه‌ای از زحل و حلقه‌های آن ببینیم. این تصویر را فضایی‌ویجر ۲ در سال ۱۹۸۱، زمانی که در حال دور شدن از زحل و در راه رفتن به اورانوس و نپتون بود، گرفت. حلقه‌ها نور خورشید را روشن شده‌اند. بخشی از سیاره‌ی زحل، حتی از پشت بخش درونی حلقه‌ها، دیده می‌شود.

تکه‌های یخ، حلقه‌ها را شکل داده‌اند. ابعاد آن‌ها از ذرات ریز تا قطعاتی به اندازه‌ی چند متر است. اما فراوان‌ترین تکه‌ها، گلوله‌های یخی به قطر حدود ۱۰ سانتی‌متر هستند.

سایه‌ی حلقه‌ها بر سطح سیاره

پره‌های تاریک در حلقه‌های زحل احتمالاً به سبب برخورد ذرات پاره‌شده در جو زحل و اثر برخورد ذرات باردار متحرک در میدان مغناطیسی سیاره شکل می‌گیرند.

حلقه‌ی C شفاف است.

ساختار حلقه‌ها

با تلسکوپ‌های روی زمین، اغلب فقط سه حلقه‌ی اصلی قابل تشخیص است: حلقه‌ی خارجی A، حلقه‌ی درخشان مرکزی B و حلقه‌ی درونی و شفاف C (که حلقه‌ی کرب نیز خوانده می‌شود). فضاپیماها نشان دادند که ذرات درون این حلقه‌های اصلی، خود به صورت هزاران حلقه‌ی کوچک و فشرده کنار هم قرار گرفته‌اند. در هر دو سوی این سه حلقه، حلقه‌های کم‌فروغ‌تری وجود دارند که فضاپیماها آن‌ها را کشف کردند. حلقه‌ی D از همه به زحل نزدیک‌تر و حلقه‌های E، F و G دورتر است.


قمرهای چوپان

دو قمر کوچک، پاندورا و پرومتئ، در دو سوی حلقه‌ی باریک F در حرکت‌اند. آن‌ها را قمرهای چوپان می‌نامند؛ زیرا از پراکنده شدن ذرات این حلقه جلوگیری می‌کنند و آن‌ها را مدام در یک مسیر نگه می‌دارند. البته پرومتئ پیوسته ذراتی را نیز از حلقه جذب می‌کند. حلقه‌ی F را فضاپیما‌ی پایونیر ۱۱ در سال ۱۹۷۹ و یک سال بعد، ویجر ۱ قمرهای چوپان را کشف کرد.




حلقه‌های درونی

حلقه‌ی B درخشان‌ترین و پهن‌ترین حلقه در میان آن‌هایی است که از زمین دیده می‌شوند. شکاف کاسینی، به پهنای ۴۷۰۰ کیلومتر، بین این حلقه و حلقه‌ی A قرار دارد. این شکاف کاملاً از ماده خالی نیست؛ اما تراکم ذرات، به‌خصوص ذرات کوچک‌تر، در آن کم است. شکاف باریکی به پهنای حدود ۳۰۰ کیلومتر، شکاف انکه، حلقه‌ی A را به دو بخش تقسیم کرده است. دو حلقه‌ی کم‌فروغ دیگر، E و G که دورتر قرار دارند، در این جا نمایش داده شده‌اند.



سطح سیاره از میان شکاف کاسینی پدید است.

حلقه‌ی D آن قدر به سیاره نزدیک است که تقریباً با آن تماس دارد.



نمای نزدیک از دید ویجر

در نمای نزدیکی که فضاییمای ویجر از حلقه‌های زحل گرفت، این حلقه‌ها به بی‌شمار حلقه‌های باریک‌تر تبدیل شده‌اند که یادآور شیارهای صفحه‌های گرامافون‌های قدیمی هستند. حلقه‌های کوچک‌تر، حتی درون شکاف‌ها، از جمله شکاف کاسینی یافت می‌شوند. در این تصویر حلقه‌ی C و بخشی از حلقه‌ی B را می‌بینید. رنگ‌ها حقیقی نیستند و با رایانه اضافه شده‌اند تا تفاوت‌های حلقه‌ها بارزتر نشان داده شود. در سال ۲۰۰۴، هم‌زمان با ورود فضاییمای کاسینی به مدار زحل، تصاویری بسیار نزدیک‌تر از حلقه‌ها گرفته و حتی بزرگ‌ترین صخره‌های یخی در فضای حلقه‌ها تفکیک شد. این عبور سبب کشف آثار گرانشی موج‌مانند قمرها بر حلقه‌ها شد.

تاریخچه‌ی شناخت ارباب حلقه‌ها

• در سال ۱۶۱۰، گالیلئو گالیله از درون تلسکوپ ابتدایی خود نگاهی به حلقه‌های زحل انداخت. اما آن‌ها را با دو قمر اشتباه گرفت. او این «قمرها» را گوش نامید.



نقاشی‌های گالیله از گوش‌ها

• در سال ۱۶۵۵، کریستین هویگنس ماهیت حلقه‌های زحل را تشخیص داد.

• در سال ۱۶۷۵، جیووانی کاسینی شکاف بین حلقه‌های A و B را (که امروز به نام شکاف کاسینی می‌شناسیم)، کشف کرد.


• در سال ۱۸۳۷، یوهان انکه (۱۸۶۵-۱۷۹۱) شکاف انکه را کشف کرد.

• در سال ۱۸۹۵، جیمز کیلر (۱۹۰۸-۱۸۵۷) اخترفیزیکدان آمریکایی، به کمک طیف‌سنجی ثابت کرد که حلقه‌ها انبوهی از ذرات در حال گردش به دور سیاره‌اند.

• در سال ۱۹۷۹، فضاییمای پایونیر ۱۱ حلقه‌ی F را کشف کرد.

• در سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۸۱، فضاییماهای ویجر ۱ و ۲ کشف کردند که این حلقه‌ها از هزاران حلقه‌ی کوچک‌تر تشکیل شده‌اند.

• از سال ۲۰۰۴، فضاییمای کاسینی در مدار زحل در جست‌وجوی پاسخ معماهای بسیاری درباره‌ی این سیاره و حلقه‌های آن است.



پرواز مأموریت کاسینی بر فراز حلقه‌ها

بیش‌تر بدانیم

تولّد منظومه‌ی شمسی ۱۰۰ اورانوس ۱۵۴، دنباله‌دارها ۱۶۲

ممکن است ذرات یخ و غبار برخاسته از قمر فعال انسلادوس، در حلقه‌ی E، که دورترین حلقه از زحل است، یافت شوند.



ذرات کوچک‌تر به ابعاد چند سانتی‌متر هم می‌رسند.



هر ذره شبیه قمری برای زحل است.




اندازه‌ی حلقه‌ها

در مقایسه با حلقه‌های دیگر سیاره‌ها، حلقه‌های زحل تا فواصل دورتری کشیده شده‌اند. حلقه‌ی کم‌فروغ E تا فاصله‌ی ۴۸۰ هزار کیلومتری، بیش از فاصله‌ی ماه تا زمین، گسترده شده است. ضخامت حلقه‌های زحل، با وجود گستردگی بسیار، در برخی مناطق فقط ۱۰ متر است؛ در نتیجه، در مقایسه با قطر خود، بسیار نازک‌تر از یک برگ دستمال کاغذی هستند.

قمر زمین


زمین

حلقه‌ی E



کار عملی

محور زحل ۲۶/۷ درجه تمایل دارد. به این سبب، در حین حرکت سیاره به دور خورشید، حلقه‌ها را از زوایای گوناگونی می‌بینیم. در طی مدار ۲۹/۵ ساله‌ی زحل، حلقه‌ها دو بار از لبه دیده می‌شوند. از آن‌جا که لبه‌ی حلقه‌ها خیلی نازک است، حتی از درون تلسکوپ‌های کوچک هم محو می‌شوند. در سال ۲۰۰۹ نیز حلقه‌ها از دید ما از لبه دیده شدند.



زحل از روی زمین با چشم غیر مسلح، ستاره‌ای زردرنگ دیده می‌شود. به کمک یک تلسکوپ می‌توان حلقه‌های آن را هم دید.

حلقه‌ها در بیش‌ترین تمایل قرار دارند.

۱۴ تا ۱۵ سال طول می‌کشد تا از دید ما، حلقه‌ها بزرگ‌تر و سپس به‌ظاهر محو شوند.

حلقه‌ها از روی زمین لبه دیده می‌شوند.

قمرهای زحل

خانواده‌ی قمرهای زحل مانند مشتری بسیار بزرگ است. تا امروز، ۶۱ قمر زحل به‌طور قطعی شناخته شده است. ابعاد این قمرها از تیتان، دومین قمر بزرگ منظومه‌ی شمسی، تا پان کوجولو که به قطر فقط ۲۰ کیلومتر در شکاف آنکه در حلقه‌ی A به دور زحل می‌گردد، در تغییر است. برخی قمرهای زحل در یک مدار در حرکت‌اند. همه‌ی قمرها چگالی اندکی دارند و دانشمندان بر این باورند که از مخلوطی از سنگ و آب یخ‌زده تشکیل شده‌اند. شاید قمرهای بیش‌تری در اطراف زحل وجود داشته باشد که در آینده کشف شود.

کاوش گر هویگنس

این کاوش‌گر را سازمان فضایی اروپا (اسا) ساخت و به نام اخترشناسی که تیتان را کشف کرده بود، نام‌گذاری کرد. کاوش گر هویگنس بخشی از مأموریت کاسینی در کاوش زحل بود. این کاوش‌گر در ژانویه‌ی سال ۲۰۰۵ (دی‌ماه ۱۳۸۳) به سوی تیتان، بزرگ‌ترین قمر زحل، رها شد. حدود ۳ هفته‌ی بعد، با چتر نجات از جو تیتان عبور کرد و طی فرودی ۲/۵ ساعته بر سطح آن نشست. کاوش گر هویگنس به‌گونه‌ای طراحی شده بود که هم بر خشکی و هم در دریاچه‌های روغن‌مانند تیتان فرود بیاید.

بیش از ۲ ساعت طول کشید تا هویگنس با چتر نجات به سطح تیتان رسید. برخلاف پیش‌بینی برخی دانشمندان، کاوش‌گر در زمینی تقریباً خشک فرود آمد.


اما بر بستری نیمه خشک فرود آمد که شاید تا چندی پیش از فرود آن، پُر از متان مایع بود. بیش از یک ساعت پس از فرود نیز کاسینی داده‌های هویگنس را دریافت می‌کرد. حاصل این مأموریت، نخستین نگاه انسان به سطح تیتان و داده‌های بسیار از جو این قمر بود که تا سال‌ها بعد در مراکز پژوهشی تحلیل خواهد شد.

در تصاویر هویگنس و داده‌های راداری کاسینی، وجود گوه‌ها و تپه‌هایی کم‌ارتفاع (بیش‌تر از جنس یخ‌آب) بر سطح تیتان شناسایی شد. خشکی‌های تیتان با این ناهمواری‌های کوتاه بسیار پُرچین و چروک هستند.

ابزارهای سوار بر هویگنس از سطح تیتان عکس‌برداری و از جو آن نمونه‌برداری کردند.

شواهد بسیاری در دست است که دریاچه‌های متان و هیدروکربن‌های دیگر در سطح تیتان وجود دارد. به احتمال زیاد، حتی چشمه‌ها و رودهای متان، ابر و نهم باران متان نیز در این قمر وجود دارد.

زحل، آن‌طور که از تیتان دیده می‌شود.



دو نما از سطح تیتان وقتی هویگنس به زیر فشار پنهان‌کننده‌ی جو قمر رسید و وقتی بر سطح تیتان فرود آمد.

تیتان

تیتان، که از سیاره‌ی عطارد هم بزرگ‌تر است، تنها قمر در منظومه‌ی شمسی است که جو غلیظی دارد. در حقیقت، فشار جوی آن ۶۰ درصد بیش‌تر از فشار جو زمین در سطح دریاست. درست مانند زمین، گاز اصلی در جو تیتان هم نیتروژن است. مانند آب در زمین، متان در جو و سطح تیتان به صورت گاز، مایع و یخ وجود دارد و چرخه‌ای اقلیمی شبیه زمین به وجود می‌آورد. اما تیتان در سرمای منجمدکننده، در دمای حدود ۱۸۰- درجه‌ی سانتی‌گراد، قرار دارد. در نور مرئی، ابرهای مه‌آلود نارنجی‌رنگ مانع دید ما از سطح تیتان می‌شوند.

انسلادوس

انسلادوس با بازتاب بیش از ۹۰ درصد از نور خورشید، سیدترین جرم منظومه‌ی شمسی است. بخش‌هایی از سطح درخشان و یخ‌زده‌ی این قمر، پُر از دهانه‌های برخوردی است. اما بقیه‌ی قسمت‌ها آن‌قدر صاف و صیقلی است که به‌نظر می‌رسد یخ‌ها بسیار تازه‌اند و مثل گدازه‌هایی که از دل زمین بیرون می‌آیند، از اقیانوس آب احتمالی زیر پوسته‌ی انسلادوس بالا آمده و دهانه‌ها را از بین برده‌اند. شیارهای روی سطح انسلادوس گسل‌هایی روی پوسته‌اند که احتمالاً بر اثر نیروهای کشندی (جزر و مدی) زحل به وجود می‌آیند. تصاویر فضایی‌های کاسپینی نشان داد که مانند آتش‌فشان‌های زمینی، در سطح انسلادوس نیز یخ‌فشان‌هایی وجود دارد که ذرات یخ را در سطح قمر و در فضای اطراف پخش می‌کنند.


دیون

دیون، چهارمین قمر بزرگ زحل، سطح متنوعی دارد. این‌ها بخش‌هایی پوشیده از دهانه‌هایی به قطر ۱۰۰ کیلومتر یا بیش‌ترند و برخی بخش‌ها، دهانه‌های کمتری دارند یا زیر لایه‌ای از یخ سفید مانده‌اند که از ترک‌های پوسته‌ی قمر، تراش کرده است. رنا، قمری کمی بزرگ‌تر، شبیه دیون است.

ایپیمتئوس و ژانوس

ژانوس و ایپیمتئوس دو قمر کوچک‌اند که مدارهایشان با ۵۰ کیلومتر فاصله از هم، نزدیک لبه‌ی حلقه‌های زحل قرار دارد. تقریباً هر ۴ سال یک‌بار، قمر درونی‌تر از قمر بیرونی‌تر سبقت می‌گیرد و مدار آن‌دو و دوری و نزدیکی آن‌ها به زحل جابه‌جا می‌شود. شاید ایپیمتئوس و ژانوس دو نیمه از یک قمر واحد باشند که دو تکه شده است. این دو قمر همراه با قمر کوچک پاندورا، در مجاورت بیرونی حلقه‌ی باریک F زحل قرار دارند و دو قمر کوچک اطلس و پرومته درون این حلقه هستند. به این قمرها، که گرانش آن‌ها مانند سگ‌های چوپان سب روی خط ماندن و پخش نشدن «گله‌ی» ذرات حلقه‌ی F می‌شود، قمرهای چوپان می‌گویند.

مقیاس به شعاع زحل (۱ شعاع = ۶۰۲۶۸ کیلومتر)



جست‌وجوی قمرهای زحل

• در سال ۱۶۵۵، کریستین هویگنس، تیتان یا بزرگ‌ترین قمر زحل را یافت.

• در سال ۱۶۷۱، جیووانی کاسینی، یاپتوس و در سال ۱۶۷۲ رنا را کشف کرد.

• کاسینی در سال ۱۶۸۴ تیتس و دیون را یافت.

• در سال ۱۹۴۴، جرارد کوییپر (۱۹۷۳-۱۹۵۵) اخترشناس متولد دانمارک، جو تیتان را کشف کرد.

• در سال ۱۹۶۶، که حلقه‌های زحل از لبه دیده می‌شدند، اخترشناسان ژانوس و ایپیمتئوس را یافتند.

• در سال ۱۹۸۰، ویجر ۱ از کنار زحل گذشت و قمرهای اطلس، پرومته و پاندورا را کشف کرد.



• در سال ۱۹۹۴، تلسکوپ فضایی هابل با استفاده از طول موج‌های فرسرخ، از سطح تیتان نقشه‌برداری کرد.

• از دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی، بیش از ۴۰ قمر جدید در اطراف زحل کشف شده است.

• کاوش‌گر هویگنس در ابتدای سال ۲۰۰۵ بر سطح تیتان فرود آمد.

بیش‌تر بدانیم

- جو زمین ۱۰۶
- سطح ماه ۱۱۴
- قمرهای مشتری ۱۴۶



دیون

ایپیمتئوس

ژانوس

مدار قمرها

برخی قمرهای زحل با مشکل ازدحام جمعیت در مدارها روبه‌رو شده‌اند. هلن کوچولو با دیون یک مدار دارد و همواره حدود ۶۰ درجه جلوتر از حرکت می‌کند. در حالی که تیتس در مدار خود با دو قمر کوچک‌تر، یکی جلوتر (تلسو) و دیگری عقب‌تر (کالیپو)، شریک است. اطلس درست در لبه‌ی خارجی حلقه‌ی A قرار دارد. یاپتوس، مانند ماه زمین و برخی قمرهای دیگر، در قفل مداری گیر افتاده و مدت گردش آن به دور زحل تقریباً برابر است. در نتیجه، همواره یک نیم‌کره‌ی آن پیش‌روست و تمام درات تیره‌ی غبار در مدار را جارو می‌کند. به همین سبب، نیمه‌ی پیش‌رو قمر مثل قیر سیاه و نیمه‌ی پشتی آن مثل برف سفید است. خارجی‌ترین قمر اصلی زحل، فوبه، خَرده‌سیاره‌ای یخی است که به دام گرانش زحل افتاده است و در خلاف جهت حرکت دیگر قمرها حرکت می‌کند.

اورانوس

اورانوس نخستین سیاره‌ای است که به کمک تلسکوپ کشف شد. این سیاره را ویلیام هرشل در شب سیزدهم مارس سال ۱۷۸۱ میلادی کشف کرد. با این که می‌توان آن را با دوربین دوچشمی یافت، آن قدر کم فروغ است که به آسانی با چشم غیر مسلح دیده نمی‌شود. اورانوس سومین سیاره‌ی بزرگ منظومه‌ی شمسی است؛ اما چشمگیرترین ویژگی آن، این است که به پهلوی خوابیده است. بنابراین، در حین حرکت در مدار خود، ابتدا یک قطب و سپس قطب دیگرش رو به خورشید قرار می‌گیرد. شاید در زمان شکل‌گیری اورانوس، جسمی با آن برخورد کرده باشد. اورانوس ۲۷ قمر شناخته شده و تعدادی حلقه‌ی کم‌فروغ دارد.

ساختار و ترکیبات


در میان سیاره‌ها، اورانوس کم‌جاذبه‌ترین ظاهر را دارد. این سیاره، مانند مشتری و زحل، پوشیده در ابر است؛ اما ابرهایش در بیش‌تر مدت گردش مداری سیاره، کم‌رنگ‌ورو هستند و فقط چند رگه‌ی درخشان‌تر، مانند آنچه در تصویر فضایی‌م‌ی وِیجر ۲ ثبت شده است، دیده می‌شود. اما وقتی اورانوس به نقاط اعتدال بهاری یا پاییزی مدار خود نزدیک می‌شود، استوای سیاره از خورشید نور بیش‌تری می‌گیرد و ابرهای توفان‌زای بسیاری به وجود می‌آید. ابرهای اورانوس از بلور یخ متان تشکیل شده‌اند و به رنگ سبز - آبی دیده می‌شوند؛ زیرا گاز متان در جو بالایی، مانند صافی (فیلتری) است که دیگر رنگ‌ها را حذف می‌کند.

حلقه‌ها

اورانوس ۱۳ حلقه‌ی شناخته شده دارد که دور استوای سیاره قرار دارند (۱۱ حلقه را فضایی‌م‌ی وِیجر ۲ تأیید کرد و ۲ حلقه نیز در سال ۲۰۰۵ با تلسکوپ فضایی هابل کشف شد). حلقه‌ها و استوا، ایستاده به‌نظر می‌رسند؛ زیرا اورانوس به پهلوی کج است. دیدن این حلقه‌ها، که بسیار تیره‌اند، از روی زمین مشکل است. دو قمر کوچک، کوردلیا و اوفلیا، در دو سوی خارجی‌ترین حلقه از مجموعه حلقه‌های درونی (حلقه‌ی اپسیلون) حرکت و قطعات حلقه را در جای خود هدایت می‌کنند. به این قمرها، قمرهای چوپان می‌گویند.

شناسنامه

قطر	۵۱۱۸ کیلومتر
فاصله‌ی متوسط از خورشید	۲/۸۷۱ میلیارد کیلومتر
سرعت مداری به دور خورشید	۶/۸۲ کیلومتر بر ثانیه
دوره‌ی انتقالی (گردش به دور خورشید)	۸۴/۰۲ سال
از یک طلوع خورشید تا طلوع بعدی	۱۷/۲۴ ساعت
دوره‌ی وضعی (چرخش به دور خود)	۱۷/۲۴ ساعت
جرم (زمین = ۱)	۱۴/۵
حجم (زمین = ۱)	۶۳/۱
چگالی متوسط (آب = ۱)	۱/۳۲
گرانش در سطح ابرها (زمین = ۱)	۰/۸۹
تمایل محوری (از حالت عمود بر صفحه‌ی مداری)	۹۷/۸ درجه
انحراف مداری (از دایرة البروج یا صفحه‌ی منظومه‌ی شمسی)	۰/۸ درجه
دما در سطح ابرها	۱۹۷- درجه‌ی سانتی‌گراد
تعداد قمرهای شناخته شده	۲۷



اوپرون دومین قمر بزرگ اورانوس است. قطر آن ۱۵۲۳ کیلومتر و دورترین قمر اصلی، در فاصله‌ی ۵۸۲۶۰۰ کیلومتری از سیاره است.




تیتانیا، با قطر ۱۵۷۸ کیلومتر، بزرگ‌ترین قمر اورانوس است و در فاصله‌ی ۴۳۵۸۰۰ کیلومتری آن می‌گردد.



اورانوس به پهلوی خوابیده است و حلقه‌های باریکش از ذراتی به اندازه‌ی حدود یک متر تشکیل شده‌اند.

شکم‌دادگی مختصر در استوا به سبب چرخش سریع به‌وجود آمده است.






تصویر وِیجر از حلقه‌ها



پاک بزرگ‌ترین قمری است که وِیجر ۲ کشف کرد. اما قطر این قمر کوچک فقط ۱۵۰ کیلومتر است.


اورانوس در یک نگاه

فصل‌های اورانوس، به سبب انحراف شدید محور آن، به‌طور شگفتی طولانی هستند. وقتی سیاره مدار ۸۴ ساله‌ی خود را به دور خورشید طی می‌کند، هر قطب آن ۴۲ سال متمادی در معرض نور خورشید و سپس ۴۲ سال پیاپی در تاریکی شب قرار می‌گیرد.





آریل و امبریل

این دو قمر هم‌اندازه (به قطر حدود ۱۱۶۰ کیلومتر)، ظاهری بسیار متفاوت دارند. در میان قمرهای اصلی، آریل درخشان‌ترین و امبریل تیره‌ترین است. آنچه روی سطح آریل به چشم می‌آید، دره‌هایی است که به سبب ترک خوردن پوسته‌ی آن به وجود آمده‌اند.




میدان مغناطیسی

میدان مغناطیسی اورانوس ۵۰ بار قوی‌تر از میدان زمین است. البته میدان مغناطیسی آن، نسبت به محور چرخش سیاره (محور جغرافیایی)، ۶۰ درجه انحراف دارد و مثل این است که قطب شمال مغناطیسی زمین در کشور مراکش باشد! از این هم عجیب‌تر این که مغناطیس، به جای هسته، در لایه‌ی گوشته‌ی سیاره تولید می‌شود.




میراندا

میراندا، به قطر ۴۷۰ کیلومتر، کوچک‌ترین قمر در میان ۵ قمر اصلی اورانوس است و سطحی آشفته و پُرچین و چروک با یک علامت تیک درخشان و چند شیار دارد. جزئیات سطح آن در تصویر نشان داده شده است. یک نظریه این است که میراندا از هم پاشیده شده و دوباره به هم جوش خورده است.



قمرهای اورانوس

از میان ۲۷ قمر شناخته‌شده‌ی اورانوس، ۱۰ قمر را فضایی‌های ویجر ۲ در سال ۱۹۸۶ میلادی کشف کرد. نام قمرها به افتخار شخصیت‌های نوشته‌های ویلیام شکسپیر و الکساندر پوپ انتخاب شده‌اند. بزرگ‌ترین قمر، تیتانیا، از نصف اندازه‌ی قمر زمین، ماه، کوچک‌تر است. قمرهای دورتر از اقماری که در تصویر نشان داده شده‌اند، از سال ۱۹۹۷ تا به حال به کمک تلسکوپ‌های زمینی و فضایی، مانند تلسکوپ فضایی هابل، کشف شده‌اند. آن‌ها ده‌ها بار دورتر از اوبرون قرار دارند و در جهت مخالف سایر قمرها به دوره سیاره‌ی خود می‌گردند. به نظر می‌رسد که این قمرهای کوچک و دور دست خُرده‌سیاره‌های سرگردانی در فضا بودند که به دام گرانش اورانوس افتادند.



کشف اورانوس

• در سال ۱۸۷۱، ویلیام هرشل، در حالی که از شهر بات در انگلستان با تلسکوپ دست‌ساز خود آسمان را رصد می‌کرد، اورانوس را کشف کرد.

• حلقه‌های آن، در سال ۱۹۷۷ که سیاره از مقابل ستاره‌ای عبور می‌کرد، کشف شد.

• در سال ۱۹۸۶، فضایی‌های ویجر ۲ از کنار اورانوس گذشت و ۱۰ قمر جدید در اطراف آن کشف کرد.

بیش‌تر بدانیم

منظومه‌ی شمسی ۹۴
اورانوس ۱۵۴
نپتون ۱۵۶

نپتون

دورترین سیاره‌ی اصلی منظومه‌ی شمسی و یکی از چهار سیاره‌ی غول‌پیکر گازی است. نپتون در مقایسه با زمین، ۳۰ بار دورتر از خورشید است. این سیاره را اخترشناس آلمانی، یوهان گاله، در سال ۱۸۴۶ یافت. اما وجود آن پیش‌تر، بر اساس این حقیقت که نیروی گرانش جسمی دورتر، اورانوس را در مدارش جابه‌جا می‌کرد، پیش‌بینی شده بود. جان کوچ آدافر، ریاضی‌دان انگلیسی و اوربن لووریه، ریاضی‌دان فرانسوی، مستقل از هم مکان این جسم را محاسبه کردند. دور این سیاره ۱۳ قمر و تعدادی حلقه‌ی کم‌فروغ شناخته شده است. نپتون با تلسکوپ‌های کوچک و دوربین دوچشمی، نقطه‌ای کم‌فروغ دیده می‌شود و از بسیاری جهات شبیه اورانوس است.

جو نپتون ابرهای سفید درخشان دارد.

دست کم پنج حلقه دور این سیاره وجود دارند.

لکه‌ی تیره‌ی بزرگ را ابرهای درخشان بچ متان احاطه کرده‌اند.

جو

در ارتفاعات جو نپتون، از اورانوس گاز متان بیش‌تری وجود دارد و همین موجب می‌شود ابرهای نپتون آبی‌تر دیده شوند. بیش‌تر گاز جو نپتون هیدروژن و هلیوم است. ابرهای آن بیش‌تر وقت‌ها از ابرهای اورانوس توفان‌رآتر هستند؛ زیرا درون این سیاره گرم‌تر است و گازها را بلند می‌کند تا ابرهای سفید و تیره‌ای را شکل دهد که پیدا و پنهان می‌شوند.



اسکوئر




ویجر ۲ از عارضه‌ی درخشانی در نیم‌کره‌ی جنوبی نپتون عکس گرفت. به‌نظر می‌رسید که این عارضه بسیار سریع‌تر از لکه‌ی تیره‌ی بزرگ، دور سیاره در حال حرکت است. به این سبب، نام این توفان بادپا را اسکوئر گذاشتند. این عارضه، که از رشته‌رشته‌های درخشان ابر تشکیل شده بود، هر روز تغییر شکل می‌داد.

لکه‌ی تیره‌ی بزرگ

در سال ۱۹۸۹، ویجر ۲ ابر بیضی‌شکل عظیمی، حدود اندازه‌ی زمین، کشف کرد. اما این ابر در سال ۱۹۹۴، که تلسکوپ فضایی هابل به نپتون خیره شد، از بین رفته بود. دور این ابر را، که هر ۱۶ روز در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت به دور خود می‌چرخد، ابرهای مرتفع‌تر و درخشان‌تر متان فراگرفته‌اند.


نپتون در یک نگاه

نپتون از نظر اندازه، دوره‌ی تناوب چرخش و ساختار درونی، شبیه اورانوس است. البته ابرهای نپتون فعالیت بیش‌تری دارند و محور آن نیز به اندازه‌ی اورانوس تمایل ندارد.



ابرها


در تصاویر ویجر ۲، رشته‌رشته‌های درخشان ابر، شبیه ابرهای سیروس جو زمین، اما از متان، ثبت شدند. این نوارهای ابر به طول هزاران کیلومتر، بر لایه‌ی اصلی ابرها، که ۵۰ تا ۱۰۰ کیلومتر پایین‌تر است، سایه می‌اندازد.



قمرها

در سال ۱۹۸۹، فضاییمای ویجر ۲ شش قمر نپتون را کشف کرد. تریتون (که در مقایسه با دیگر قمرها در خلاف جهت به دور سیاره می‌گردد) و نرئید نخستین بار از روی زمین دیده و کشف شدند. چهار قمری که به سیاره نزدیک‌ترین، در میان حلقه‌های آن می‌گردند. حلقه‌ها هم احتمالاً از غبار سطحی قمرها تشکیل شده‌اند.


رنگ آبی به سبب وجود متان در جو سیاره است.



بادهای توفندی

با وجود بادهایی که از شرق به غرب با سرعت حدود ۲ هزار کیلومتر بر ساعت می‌وزد (این سرعت در نزدیکی لکه‌ی تیره‌ی بزرگ اندازه‌گیری شده)، نپتون بادخیزترین سیاره‌ی منظومه‌ی شمسی است.

آتش‌فشان روی تریتون



تریتون


تریتون، بزرگ‌ترین قمر نپتون، از سیاره‌ی کوتوله بزرگ‌تر است. احتمالاً تریتون زمانی در کمربند خُرده‌سیاره‌های کویپر، جسی مجزا بوده که به دام گرانش نپتون افتاده است. به همین سبب، در مسیری برعکس، دور این سیاره می‌گردد. تریتون با دمای ۲۳۵- درجه‌ی سانتی‌گراد، سردترین سطح در منظومه‌ی شمسی است که با نیتروژن و متان یخ‌زده پوشیده شده است. تریتون در فاصله‌ی تقریباً برابر زمین از ماه به دور نپتون می‌گردد؛ اما فاصله‌ی آن به مرور در حال کاهش است و پیش‌بینی می‌شود صدها میلیون سال بعد، آن‌قدر نزدیک شود که نیروی گرانش نپتون آن را کاملاً از هم بپاشد و حلقه‌ای عظیم از ذرات در اطراف نپتون شکل بگیرد.

«آتش‌فشان»هایی از یخ

رگه‌های تیره‌ی روی تریتون، که در تصاویر ویجر ۲ ثبت شده‌اند، به سبب فوران آب‌فشان - مانند گاز نیتروژن از زیر سطح آن است. گاز و غبار ریز و تیره تا ۸ کیلومتر بر فراز سطح تریتون فوران می‌کند و سپس در مسیر بادها تا ۱۵۰ کیلومتر در جو رقیق تریتون پراکنده می‌شود.

شناستامه

قطر	۴۹۵۳۲ کیلومتر
فاصله‌ی متوسط از خورشید	۴/۴۹۸ میلیارد کیلومتر
سرعت مداری به دور خورشید	۵/۴۸ کیلومتر بر ثانیه
دوره‌ی انتقالی (گردش به دور خورشید)	۱۶۴/۷۹ سال
از یک طلوع خورشید تا طلوع بعدی	۱۶/۱۱ ساعت
دوره‌ی وضعی (چرخش به دور خود)	۱۶/۱۱ ساعت
جرم (زمین = ۱)	۱۷/۲
حجم (زمین = ۱)	۵۷/۷۴
چگالی متوسط (آب = ۱)	۱/۶۴
گرانش بر فراز ابرها (زمین = ۱)	۱/۱۳
تمایل محوری (از حالت عمود بر صفحه‌ی مداری)	۲۸/۳ درجه
انحراف مداری (از دایرة البروج یا صفحه‌ی منظومه‌ی شمسی)	۱/۸ درجه
دما بر فراز ابرها	۲۰۰- درجه‌ی سانتی‌گراد
تعداد قمرهای شناخته شده	۱۳



مقیاس به شعاع نپتون (۱ شعاع = ۲۴۷۶۶ کیلومتر)

نماهایی از نپتون

• یوهان گاله، اخترشناس آلمانی، نپتون را در سال ۱۸۴۶ بر اساس محاسباتی لووریه فرانسوی پیدا کرد. در همان سال، ویلیام لایسل (۱۸۸۰-۱۷۹۹) در انگلستان تریتون را کشف کرد.

• جرارد کویپر (۱۹۷۳-۱۹۰۵)، اخترشناس آمریکایی متولد دانمارک، نرئید، خارجی‌ترین قمر نپتون را در سال ۱۹۹۴ کشف کرد.

• در سال ۱۹۸۴، در ستاره‌ای که پشت نپتون پنهان شده بود، نشانه‌هایی از حلقه‌ی این سیاره از زمین رصد شد.

• در سال ۱۹۸۹، ویجر ۲ از کنار نپتون گذشت و نخستین نمای خوب از ابرها، حلقه‌ها و قمرهای آن به زمین ارسال کرد.



بیش‌تر بدانیم

منظومه‌ی شمسی ۹۴، جو مشتری ۱۴۴ زحل ۱۴۸، اورانوس ۱۵۴

پلوتون

بر سطح پلوتون دهانه‌های برخوردی هم وجود دارد.

پلوتون، تا پیش از آخرین نشست انجمن بین‌المللی نجوم در سال ۲۰۰۶، آخرین و کوچک‌ترین سیاره‌ی منظومه‌ی شمسی بود. اما بر اساس رأی‌گیری انجام شده در آن نشست، پلوتون از رده‌ی سیاره‌های اصلی خارج و وارد رده‌ی «سیاره‌های کوتوله» شد. به‌جز پلوتون، سیاره‌های سرس (بزرگ‌ترین جرم در کمربند سیارک‌ها) و اریس (بزرگ‌ترین جرم در کمربند کوبی‌پر) هم در این دسته جای گرفتند. پلوتون را کلاید تومبا، اخترشناس آمریکایی، در سال ۱۹۳۰ کشف کرد. مدار پلوتون بیضی بسیار کشیده‌ای است؛ در حقیقت، یکی از تفاوت‌های مهم آن با سیاره‌های اصلی منظومه‌ی شمسی، کشیدگی بسیار زیاد مدارش است. سال‌هاست که این بحث بین اخترشناسان جریان دارد که آیا می‌توان پلوتون کوچک و غیرعادی را جزو سیاره‌ها محسوب کرد یا باید آن را جزیی از گروه خُرده‌سیاره‌های کمربند کوبی‌پر، و رای مدار نپتون، دانست. سرانجام تصمیم بر این شد که رده‌ی جدیدی از اجرام به نام سیاره‌های کوتوله ایجاد شود.

ساختار پلوتون

قطر پلوتون ۲۲۷۴ کیلومتر و حتی از ماه زمین و بسیاری از قمرهای سیاره‌های دیگر هم کوچک‌تر است. در تصاویر تلسکوپ فضایی هابل، بر سطح تیره‌ی آن فقط نقاط درخشانی دیده می‌شود که به‌ظاهر تکه‌های یخ هستند. شاید هم دهانه‌هایی، حاصل از برخورد جرم‌های کوچک‌تر بر سطح پلوتون باشند.

کارن

کارن، که در سال ۱۹۷۸ کشف شد، قطری حدود ۱۱۵۰ کیلومتر دارد. چگالی آن کمتر از پلوتون است؛ پس احتمالاً بیش‌تر یخ و کمتر سنگ دارد. بنا بر یکی از نظریه‌ها، این قمر بر اثر تصادم جرمی دیگر با پلوتون، از یخ‌های جدا شده از پلوتون شکل گرفته است.

سطح کارن پوشیده از یخ آب و پر از دهانه‌های برخوردی است.

مدار بیضوی و کج پلوتون


مدار اورانوس
مدار نپتون

در مقایسه با سیاره‌های اصلی، مدار پلوتون زاویه‌ی بیش‌تری دارد.

مدار غیرعادی

مدار پلوتون آن‌قدر بیضی است که فاصله‌ی آن از خورشید بین ۴/۴۵ تا ۷/۳۸ میلیارد کیلومتر تغییر می‌کند. در هر مدار ۲۴۸ ساله، پلوتون حدود ۲۰ سال از نپتون به خورشید نزدیک‌تر می‌شود (بین سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۹ چنین بود)؛ البته احتمال برخورد بین آن‌دو وجود ندارد. صفحه‌ی مداری پلوتون، به صفحه‌ی مداری زمین (دایرة البروج) ۱۷ درجه تمایل دارد که از همه‌ی سیاره‌های اصلی منظومه‌ی شمسی بیش‌تر است.

در سال ۱۹۷۹، که پلوتون در مدار خود از نپتون جلو افتاد، مدتی عنوان «دورترین سیاره» را از دست داد.



تصویر گرفته شده در ۲۳ ژانویه ۱۹۳۰

جست‌وجو به دنبال یک سیاره

در این دو تصویر، که به فاصله‌ی ۶ روز از هم گرفته شده است، پلوتون مانند نقطه‌ی کوچکی دیده می‌شود. کلاید تومبا در فوریه‌ی سال ۱۹۳۰، از رصدخانه‌ی لاول در آریزونا، ایالات متحده، پلوتون را کشف کرد. او آسمان را به دنبال سیاره‌های بیش‌تری جست‌وجو کرد؛ اما چیزی نیافت.



تصویر گرفته شده در ۲۹ ژانویه ۱۹۳۰

دوردست و یخ‌زده




از فاصله‌ی بسیار دوردست پلوتون، خورشید هزار بار کم‌فروغ‌تر از زمین دیده می‌شود؛ اما هم‌چنان بسیار درخشان‌تر از ستاره‌هاست. دمای پلوتون حدود ۲۲۰- درجه‌ی سانتی‌گراد است؛ اما وقتی به خورشید نزدیک می‌شود، سطحش به اندازه‌ی کافی گرم می‌شود که بخشی از یخ آن به بخار تبدیل شود و جو رقیقی دور سیاره ایجاد کند. وقتی پلوتون دوباره از خورشید دور می‌شود، گارهای یخ می‌زنند و لایه‌ی جدیدی از یخ، بر سطح آن شکل می‌گیرد. این یخ‌ها بیش‌تر از جنس نیتروژن هستند؛ اما یخ متان و دی‌اکسید کربن نیز وجود دارد.

طرح خیالی از نمای خورشید از سطح پلوتون

خورشید

پلوتون در یک نگاه

پلوتون گوی کوچکی از یخ و سنگ و بسیار کوچکتر از زمین است. تمایل محور آن بیش‌تر از اورانوس است. معتبرترین نظریه درباره‌ی آن این است که برخوردی با آن، بخش عظیمی از پوسته‌ی یخی را به فضا پرتاب کرده که سازنده‌ی کارن شده است.



دنیای دوتایی

پلوتون و قمر آن، کارن، در این تصویر تلسکوپ فضایی هابل دیده می‌شوند. کارن بیش از نصف قطر پلوتون است. در مقایسه‌ی بین نسبت سیاره‌ها و قمرهای آن‌ها، نسبت کارن و پلوتون از همه بزرگ‌تر است. این دو جرم آن‌قدر از نظر اندازه به هم شبیه هستند که گاهی آن‌ها را «سیاره‌ی دوتایی» می‌خوانند. در سال ۲۰۰۵، تلسکوپ فضایی هابل دو قمر کوچک نیز در اطراف پلوتون شناسایی کرد. این سیاره‌ی کوتوله‌ی اعجاب‌انگیز، منظومه‌ای از دست کم سه قمر دارد.

سریع‌السير پلوتون

تا به حال هیچ فضاییمایی به پلوتون نرفته است. فضاییمای افق‌های نو (نیو هورایزنز)، که در سال ۲۰۰۶ با بیش‌ترین سرعت اولیه پرتاب شد، نخستین پیک انسان به سوی این سیاره‌ی کوتوله است. این فضاپیما در ابتدای سال ۲۰۰۷ با عبور از کنار مشتری، سرعت بیش‌تری گرفت تا در سال ۲۰۱۵ به پلوتون و قمر آن، کارن، برسد. این فضاپیما پس از عبور از کنار آن دو احتمالاً به بررسی جرم‌های دیگری در کمربند کویی‌پر خواهد پرداخت.



مدارهای هماهنگ

پلوتون و کارن در قفل مداری کامل‌اند؛ یعنی حین گردش در مدارهای خود، همواره یک رویشان به سوی هم است؛ بنابراین، اگر بر یک سوی پلوتون بایستید، همواره کارن را می‌توانید بر نقطه‌ای از آسمان می‌بینید. در حالی که شخص دیگری در سوی دیگر پلوتون، کارن را نمی‌بیند. زیرا در همان مدتی که کارن دور پلوتون می‌گردد، هریک از آن دو نیز یکبار دور خود می‌چرخند. کارن در فاصله‌ی ۱۹۴۰۰ کیلومتری از پلوتون در هر ۶ روز و ۹ ساعت دور آن می‌گردد.

شناستنامه

قطر	۲۳۰۲ کیلومتر
فاصله‌ی متوسط از خورشید	۵/۹ میلیارد کیلومتر
سرعت مدار به دور خورشید	۴/۷۵ کیلومتر بر ثانیه
دوره‌ی انتقالی (گردش به دور خورشید)	۲۴۷/۹ سال
از یک طلوع خورشید تا طلوع بعدی	۶/۳۹ روز
دوره‌ی وضعی (چرخش به دور خود)	۶/۳۹ روز
جرم (زمین = ۱)	۰/۰۰۲
حجم (زمین = ۱)	۰/۰۰۶
چگالی متوسط (آب = ۱)	۲/۰۵
گرانش سطحی (زمین = ۱)	۰/۰۶۷
تمایل محوری (از حالت عمود بر صفحه‌ی مداری)	۱۲۲/۶ درجه
انحراف مداری (از دایرة البروج یا صفحه‌ی منظومه‌ی شمسی)	۱۷/۱ درجه
دمای سطحی	۲۲۳- درجه‌ی سانتی‌گراد
تعداد قمرهای شناخته شده	۳
بیش‌تر بدانیم	
منظومه‌ی شمسی ۹۴، تولد منظومه‌ی شمسی ۱۰۰، سیارک‌ها ۱۶۶	
کاوش‌گرهایی به سوی سیاره‌ها ۹۶، اعضای خرد ۱۶۰، برخورد‌ها ۱۷۰	

اعضای خُرد

تقریباً همه‌ی جرم منظومه‌ی شمسی در خورشید، سیاره‌ها و قمرهای آن‌ها متمرکز است. بقیه یا کسر کوچکی از مواد، در میان تعداد بسیاری از جرم‌های کوچک پراکنده‌اند. این‌ها اعضای خُرد منظومه‌ی شمسی هستند و تکه‌های سنگ یا ترکیبی از سنگ، یخ، غبار و برف‌اند. خُرده‌سیاره‌های سنگی یا سیارک‌ها، در قلمرو سیاره‌های منظومه قرار دارند. جرم‌های ساخته شده از یخ و غبار، دنباله‌دارها و ابر اورت را در لبه‌ی خارجی منظومه می‌سازند. در این میان، خُرده‌سیاره‌های کمربند کویبی قرار دارند که در اواخر قرن بیستم کشف شدند و اغلب آن‌ها درست در ورای مدار نپتون‌اند.

نواحی خارجی منظومه‌ی شمسی

ابر اورت، که به نام یان اورت اخترشناس دانمارکی نام‌گذاری شده است، در فاصله‌ی بیش از هزار بار دورتر از پلوتون، لبه‌ی خارجی منظومه‌ی شمسی را مشخص می‌کند. این ابر کروی، به شعاع $0/8$ سال نوری، از هسته‌های دنباله‌دار تشکیل شده و ناحیه‌ی سیاره‌ای منظومه را فرا گرفته است. میان این ابر و سیاره‌ها، کمربندی از اجرام دنباله‌دارمانند، دور خورشید در گردش است. آن را به این سبب کمربند کویبی پر می‌نامند که به نام جرارد کویبی پر (۱۹۷۳ - ۱۹۰۵) نام‌گذاری شده است.

ابر اورت شامل میلیون‌ها میلیون هسته‌ی دنباله‌دار است. آن‌ها از زمان پیدایش منظومه‌ی شمسی، یعنی $4/6$ میلیارد سال پیش، آن‌جا بوده‌اند. قطر این ابر $1/6$ سال نوری (۱۵ میلیون میلیون کیلومتر) است.

برای دنباله‌داری در لبه‌های خارجی ابر اورت، 10 میلیون سال طول می‌کشد تا دور خورشید بگردد. توده‌ی دنباله‌دارها پس از ابر اورت وجود ندارد. زیرا نیروی گرانش خورشید در آن‌جا دیگر آن‌قدر قوی نیست و ممکن است ستاره‌ی گذرنده، هسته‌ی دنباله‌دار را به سوی خود بکشد و آن را از حیطه‌ی تسلط خورشید خارج کند.

مجموع جرم تمام دنباله‌دارهای درون ابر اورت، برابر با حدود سه سیاره‌ی زمین است.

ابر اورت تا یک‌پنجم مسیر به سوی نزدیک‌ترین ستاره گسترده شده است.

کمربند کویبی پر


دانشمندان بر این باورند که دست کم 70 هزار خُرده‌سیاره‌ی یخی با قطرهای بیش از 100 کیلومتر در کمربند کویبی پر وجود دارد. این منطقه، از مدار نپتون تا نواحی خارجی‌تر منظومه‌ی شمسی گسترده شده است و پلوتون در ناحیه‌ی اصلی آن قرار می‌گیرد. با ابزارهای فعلی از روی زمین، فقط می‌توان جرم‌هایی را دید که نزدیک به لبه‌ی داخلی‌تر کمربند قرار گرفته باشند. بیش از هزار جرم کمربند کویبی پر تا به حال شناخته شده است که بزرگ‌ترین آن‌ها اریس به قطر 2400 کیلومتر است؛ اما هیچ‌یک را از نزدیک ندیده‌ایم. دانشمندان بر این باورند که آن‌ها اجسامی دنباله‌دارمانندند.



تصویرسازی هنرمندی از خُرده‌سیاره‌ای در کمربند کویبی پر

نواحی داخلی منظومه‌ی شمسی

بیش‌تر اعضای خُرد بخش سیاره‌ای منظومه‌ی شمسی، سیارک‌ها هستند. بیش‌تر این سیارک‌ها در کمربندی میان مریخ و مشتری، دور خورشید می‌گردند. بقیه، مانند گروه قنطورها، دنباله‌دارمانند و دورتر از این منطقه دور خورشید می‌گردند. اعضای خُرد نواحی خارجی‌تر منظومه‌ی شمسی نیز از میان نواحی سیاره‌ای می‌گذرند. این اعضا در مدارهایی بسیار کشیده قرار دارند که آن‌ها را از ابر اورت و کمربند کویبی پر تا نزدیکی خورشید می‌رساند و بازمی‌گرداند.





جستوجوی اعضای خُرد

اخترشناسان حرفه‌ای از قدرت‌مندترین تلسکوپ‌های جهان برای جستوجوی اعضای خُرد دوردست استفاده می‌کنند. آن‌ها با استفاده از آشکارسازهای حسّاس الکترونیک، یعنی CCDها که قادرند نور کم‌فروغ اجسام کمربند کویپر را آشکار کنند، تصاویری با عمق بسیار از آسمان تهیه می‌کنند. سپس تصاویری را که در زمان‌های متفاوت گرفته‌اند، به این امید با هم مقایسه می‌کنند که با تشخیص حرکت جزئی اعضای خُرد در زمینه‌ی پُرستاره‌ی تصویر، آن‌ها را بیابند.


روبوت‌های دنباله‌دار یاب

در طرح‌هایی مانند لی‌نیر و نیت، از تلسکوپ‌های روبوتی برای کاوش آسمان به دنبال خرده‌سیاره‌های جدید استفاده می‌کنند. این طرح رقیبان جدی منجمان آماتور در کشف دنباله‌دارهای جدید است. تلسکوپ‌های این طرح، که از فاصله‌ی دور هدایت می‌شوند، در هر شب صاف و تاریک بخش‌هایی از آسمان را به دنبال جرم‌های کم‌نور متحرک در زمینه‌ی ستاره‌ها پیمایش می‌کنند.



دنباله‌دارهای دوره‌ای

دنباله‌دارها را زمانی می‌توان دید که خاستگاه دوردست خود را ترک و به نزدیکی خورشید سفر کنند. برخی از این‌ها، که دنباله‌دار دوره‌ای نامیده می‌شوند، مدارهایی دارند که گاه به طور منظم آن‌ها را نزدیک خورشید می‌آورد. حدود ۵۰۰ دنباله‌دار دوره‌ای شناخته شده، دنباله‌دار کوتاه‌دوره‌اند که در مدتی کمتر از ۲۰۰ سال دور خورشید می‌گردند و بیش‌تر آن‌ها از کمربند کویپر می‌آیند. اما خاستگاه دنباله‌دارهای بلنددوره، که بازگشت آن‌ها قطعی نیست، ابر اورت است. ممکن است هزاران سال طول بکشد تا دنباله‌دارهای بلنددوره به نزدیکی خورشید بازگردند.



قنطورها

گروهی از اعضای خُرد، به نام قنطورها، در مداری بین مشتری و نپتون دور خورشید می‌گردند. اخترشناسان بر این باورند که فقط چند میلیون سال است که این جرم‌ها در این مدارند. شاید آن‌ها جرم‌های کمربند کویپر بودند که در راه خود به سوی نواحی داخلی‌تر منظومه، به دنباله‌دارهای کوتاه‌دوره تبدیل شدند. نخستین نمونه‌ی شناخته‌شده‌ی این جرم‌ها، کایرون است که در سال ۱۹۷۷ کشف شد.

کمربند کویپر

نپتون

پلوتون

اکتشاف خرده‌سیاره‌ها


- نخستین سیارک در سال ۱۸۰۱ کشف شد. یک قرن بعد، حدود ۵۰۰ سیارک دیگر کشف شد. اما هنوز کسی نمی‌دانست که آن‌ها از چه ساخته شده‌اند.
- تا سال ۱۹۱۰، یعنی حدود صد سال پیش، مردم از بازگشت دنباله‌دار هالی می‌ترسیدند. آن‌ها قرص‌های ضددنباله‌دار می‌خوردند و برخی آرزو می‌کردند به مکان امن‌تری، مثلاً ماه، بروند!
- در سال ۱۹۸۶، فضاییمای جیوتو نخستین تصویر نمای نزدیک از مرکز یک دنباله‌دار و هسته‌ی برفی آن به زمین ارسال کرد.
- اخترشناسان همچنان در جستوجوی اعضای خُرد جدیدند. به‌خصوص به دنبال جرم‌های جدیدی در کمربند کویپر و سیارک‌های نزدیک زمین می‌گردند.
- سه مأموریت فضایی در آینده‌ی نزدیک به کاوش جرم‌های کمربند سیارک‌ها، سطح یک دنباله‌دار و جرم‌های کمربند کویپر می‌پردازند.

بیش‌تر بدانیم

- منظومه‌ی شمسی ۹۴، شهاب‌ها ۱۶۴
- تولد منظومه‌ی شمسی ۱۰۰
- سیارک‌ها ۱۶۶، دنباله‌دارها ۱۶۲

دنباله‌دارها

دم گازی یا یونی، معمولاً آبی و بسیار باریک است.



دنباله‌دار هیل - باپ

تقریباً هر ده سال یکبار، دنباله‌دار خارق‌العاده‌ای مانند هیل - باپ، در آسمان شب ظاهر می‌شود. در سال ۱۹۹۷ (بهار ۱۳۷۶)، این دنباله‌دار به وضوح با چشم غیر مسلح دیده شد؛ مانند این تصویر که در آسمان منطقه‌ی کوهستانی کن در شمال غربی تهران گرفته شده است.

ممکن است گیسو به قطر ۱۰۰ هزار کیلومتر هم برسد.

در منظومه‌ی شمسی، میلیاردها دنباله‌دار وجود دارد که برخی در کمربند کویپر و تعداد بسیار زیادی نیز در لبه‌های منظومه، ابر کروی عظیم اورت را شکل می‌دهند. هریک از آن‌ها به تنهایی تکه‌هایی کوچک و نامنظم از غبار سنگی و یخ‌اند که در مدار خود دور خورشید می‌گردند. گاهی یکی از آن‌ها زادگاه خود را ترک می‌کند و به نواحی درونی منظومه‌ی شمسی می‌آید. این هسته وقتی به خورشید نزدیک‌تر می‌شود، سری بزرگ‌تر و دو دم پیدا می‌کند. در این زمان، دنباله‌دار به حد کافی بزرگ و درخشان است که از آسمان زمین دیده شود. تا به حال حدود ۲ هزار دنباله‌دار کشف شده است. تعدادی را منجمان آماتور کشف می‌کنند و تعدادی را هم تلسکوپ‌های رباتی مخصوص می‌یابند که هر شب به دنبال خرده‌سیاره‌های جدید در منظومه‌ی شمسی، آسمان را می‌کاوند. اما بیش از نیمی از این دنباله‌دارها در تصاویر رصدخانه‌ی فضایی خورشیدشناس سوهو پیدا شده‌اند.

ساختار یک دنباله‌دار

دنباله‌دار، در تمام مدت عمر، یک هسته دارد که اجتماعی نامستحکم از یخ و برف و غبار سنگی است. البته، دنباله‌داری که به نواحی درونی‌تر منظومه‌ی شمسی سفر می‌کند، به سبب حرارت خورشید تغییر می‌یابد و مدت کوتاهی یخ سطحی آن به گاز تبدیل می‌شود و توده‌ی برخاسته‌ی گاز، سری درخشان، به نام گیسو را شکل می‌دهد. به علاوه، باد خورشیدی و فشار تابش خورشید، گاز و غبار را از هسته به بیرون پراکنده می‌کند و دو دم، یکی غباری و دیگری گازی، شکل می‌گیرد.

هسته‌ای از جنس یخ و غبار. معمولاً به قطر فقط چندکیلومتر، درون گیسو از دیدها پنهان می‌شود.

این دوربین یکی از ۱۰ ابزار یود که از هسته‌ی هالی عکس گرفت و آن را تحلیل کرد.

فضاپیمای جیوتر

برش مقطعی، ساختار یخ و غباری درون هسته‌ی دنباله‌دار را نشان می‌دهد. به همین سبب به آن گلوله‌ی برفی کثیف نیز می‌گویند.

بخش روشن به سوی خورشید است.

وقتی حرارت خورشید سطح دنباله‌دار را گرم می‌کند، گاز و غبار از هسته‌ی آن رها می‌شود.

دهانه‌ی برخوردی

سلسله‌تپه‌های روی سطح

پوسته‌ای از غبار تیره

هسته‌ی یک دنباله‌دار

نخستین بار در مارس سال ۱۹۸۶، هسته‌ی یک دنباله‌دار، تنها بخش جامد آن، دیده شد. فضاپیمای اروپایی جیوتر در حالی به سوی دنباله‌دار هالی پرواز کرد که دنباله‌دار در مسیر خود، به سوی نواحی درونی‌تر منظومه‌ی شمسی می‌آمد. جیوتر حدود ۱۰ ساعت داده جمع‌آوری کرد و از فاصله‌ی ۶۰۰ کیلومتری از هسته‌ی هالی عکس گرفت. قطر هسته‌ی این دنباله‌دار ۱۶ کیلومتر تخمین زده شد.

فضایماهایی به سوی دنباله‌دارها

اخترشناسان مشتاق بررسی دنباله‌دارها هستند؛ زیرا مواد دنباله‌دارها مربوط به زمان شکل‌گیری منظومه‌ی شمسی است. فضاپیمای استانداردست در سال ۲۰۰۴ از هسته‌ی دنباله‌دار ویلت ۲- عکس گرفت و نمونه‌ای از گاز و غبار گیسوی آن را درون کپسول محافظی در سال ۲۰۰۶ به زمین رساند.

گاز و غبار رهاشده از هسته، از خورشید دور رانده می‌شوند و دُم‌هایی تشکیل می‌دهند.

دُم گازی صاف و باریک و دُم‌غباری منحنی است.

با نزدیکتر شدن دنباله‌دار به خورشید دُم‌ها بزرگتر می‌شوند.

دُم‌های دنباله‌دارها

غبار و گازی که از هسته رها می‌شود، دُم‌هایی را شکل می‌دهد. ذرات باردار باد خورشیدی گاز را به عقب می‌رانند و دُم گازی یا یونی را ایجاد می‌کند. فشار تابش خورشید نیز ذرات ریز غبار را به عقب می‌رانند تا دُم یونی پدید آید. آن‌ها بیش‌تر تحت تأثیر گرانش خورشیدند و در مسیری شبیه مدار حرکت دنباله‌دار قرار می‌گیرند. سپس دُم منحنی می‌شوند.

دُم‌ها در نزدیکی خورشید از هر زمان بلندترند


با دور شدن دنباله‌دار دُم‌ها از خورشید، دُم‌ها کوچک می‌شوند.

دُم یک دنباله‌دار همواره در جهت مخالف حضور خورشید در فضا کشیده می‌شود؛ چه دنباله‌دار در حال نزدیک شدن به خورشید یا دور شدن از آن باشد

دُم دنباله‌دار چند ده تا چند صد میلیون کیلومتر در فضا کشیده می‌شود.


دُم غباری، به رنگ سفید مایل به زرد، پهن‌ترین دُم است.

دنباله‌دار هالی، ۲۶ آوریل تا ۱۱ ژوئن ۱۹۱۰




دُم دنباله‌دار هالی

هر بار که یک دنباله‌دار دوره‌ای به سوی خورشید بازمی‌گردد، دُم آن با دفعات قبل و بعد متفاوت است. دُم‌ها مدت کوتاهی، حدود ۲ ماه، دوام می‌آورند. این تصاویر مراحل شکل‌گیری و نابودی دُم دنباله‌دار هالی را طی حدود سه هفته، از اوج ظهور در سال ۱۹۱۰ نشان می‌دهند.



از هم پاشیدن دنباله‌دار

معمولاً تا زمانی که همهی ذخیره‌ی گاز و غبار دنباله‌دارها به پایان برسد، به طور متوسط ۱۰۰ بار به نواحی درونی منظومه‌ی شمسی می‌آیند. اما ممکن است زندگی دنباله‌داری که از مسیر اصلی خارج شده است، به شیوه‌ی خارق‌العاده‌تری به پایان برسد. مکان دارد پایان عمر بسیاری از دنباله‌دارها، سفر به درون خورشید و نابود شدن در حو آن باشد (دنباله‌دارهای خورشیدخراش)؛ اما برخی نیز به سیاره‌ها و قمرها برخورد می‌کنند. در دوران ماه، دنباله‌دار شومیکر - لوی ۹، تحت تأثیر گرانش مشتری تکه‌تکه شد. در ژوئیه سال ۱۹۹۴، بیست و یک قطعه‌ی این دنباله‌دار با سطح مشتری برخورد کرد




دنباله‌دار شومیکر - لوی ۹

رصد دنباله‌دارها


برخی دنباله‌دارها به حدّ کافی درخشان هستند که با چشم غیرمسلح دیده شوند؛ مانند این تصویر از دنباله‌دار مکنتاک که در ابتدای سال ۲۰۰۷ با درخششی خیره‌کننده در آسمان نیم‌کره‌ی جنوبی به پُر نورترین دنباله‌دار چهار دهه ندید شد. ما بسیاری از دنباله‌دارها را فقط با دوربین و تلسکوپ می‌توان دید. روش رصد هر چه باشد، دنباله‌دارها همواره در آسمان شب چون لکه‌های مه‌الود نور دیده می‌شوند. آن‌ها با سرعت به سوی بوحی دحلّی منظومه‌ی شمسی می‌آیند. حرکت این دنباله‌دارها در زمینه‌ی ستاره‌ها به آرامی است و می‌توان تغییر مکان آن‌ها را هر شب دنبال کرد

برخورد عمیق

در سال ۲۰۰۵، فضایی‌ای دیپ ایمپکت (برخورد عمیق) پس از پیمودن راهی طولانی در فضا به نزدیکی هسته‌ی دنباله‌دار تمپل - ۱ رسید. فضایی‌ما گلوله‌ای به وزن حدود ۴۰۰ کیلوگرم را با سرعت زیاد به سوی هسته‌ی دنباله‌دار فرستاد تا سبب نفوذی عظیم بر این سطح یخی شود. فضایی‌ما در فاصله‌ی ایمن به مشاهده و تجربه و تحلیل ابر تازه و دست‌نخورده‌ی ذرات یخ و غبار پرتاب شده به گیسوی دنباله‌دار پرداخت؛ هم‌زمان، تلسکوپ‌های گوناگونی هم در زمین به بررسی این روی‌داد پرداختند.




شهاب‌ها



باران شهاب


انسان از دوره‌ی ما قبل تاریخ، شهاب‌ها را در آسمان می‌دید. اما در نوامبر سال ۱۷۹۹، که این بارش شهاب حیرت‌انگیز اسدی رخ داد، دانشمندان فقط می‌دانستند منشأ این پدیده، جایی خارج از زمین است. زیرا تا قرن نوزدهم، کسی از ارتباط بین ظهور دنباله‌دارها و بارش‌های شهاب مطلبی نفهمید.

جریان شهاب‌واره توده‌ای از ذرات غبار است که به صورت حلقه‌ای در حال گردش در طول مدار یک دنباله‌دار کوتاه‌مدوره، که در دوره‌های منظم بازمی‌گردد، پراکنده شده‌اند.



عبور زمین از میان جریان شهاب‌واره‌ها به مرور بارش شهاب متجر می‌شود.

به‌منظر می‌رسد که بارش شهاب‌های اسدی از نقطه‌ای در بال شبر آغاز می‌شود. در بارش‌های معمول اسدی، معمولاً ۱۰ تا ۲۰ شهاب در ساعت دیده می‌شوند؛ اما هر سه دهه، که دنباله‌دار سازنده‌ی این بارش بازمی‌گردد، توده‌ی پُرترکمی از شهاب‌واره‌ها با زمین برخورد می‌کنند و امکان دارد بارش‌هایی با چند هزار شهاب در ساعت ظهور کنند.



هر شب می‌توان در آسمان تیرهای درخشان نور را دید که لحظه‌ای به سرعت می‌گذرند. این‌ها شهاب یا در حقیقت، قطعاتی از سنگ و غبار بر جای مانده از دنباله‌دارها یا رها شده بر اثر برخورد سیارک‌ها هستند که با ورود به جو زمین می‌سوزند. این ذرات، که به شهاب‌واره مشهورند، در سراسر منظومه‌ی شمسی پراکنده و سرگردان‌اند. هر سال زمین ۲۰۰ هزار تن شهاب‌واره را به سوی خود جذب می‌کند. ذراتی که در جو می‌سوزند، به شکل شهاب‌های اتفاقی یا بخشی از بارش‌های شهاب دیده می‌شوند.

زندگی یک شهاب

شهاب‌ها حاصل دنباله‌دارهای کوتاه‌مدوره یا سیارک‌ها هستند. دنباله‌دارها وقتی به نزدیکی خورشید می‌آیند، بخشی از مواد خود را از دست می‌دهند. سیارک‌ها هم در صورت برخورد با هم، قطعات ریز و درشتی در فضا پراکنده می‌کنند. وقتی شهاب‌واره‌ای وارد جو زمین می‌شود، اصطکاک جو آن را گرم و بخار گرم می‌کند و ردی از نور همان شهاب را در امتداد مسیر آن شکل می‌دهد. دنباله‌دارهای کوتاه‌مدوره، جویباری از شهاب‌واره را پشت سر خود در مدار بر جای می‌گذارند. اگر زمین در مسیر مدار خود به دور خورشید، مدار یکی از این دنباله‌دارها را قطع کند، هر سال وقتی به آن محدوده از مدار می‌رسد، بارش شهاب دیده می‌شود.

مدار دنباله‌دار

بارش اسدی

در این تصویر با نوردهی بلند، ستاره‌ها بر فراز کاروان‌سرای قدیمی دهنمک سمنان، مانند ردهای کوتاه و مواری نور دیده می‌شوند. ردهای پرنور، که رد ستاره‌ها را قطع کرده‌اند، شهاب‌های بارش اسدی بسیار دیدنی سال ۱۳۷۷/۱۹۹۸ هستند. اما شهاب بارانی دیدنی‌تری در دوره‌ی قبلی باز آمدن دنباله‌دار سازنده‌ی بارش اسدی، در نوامبر سال ۱۳۴۵/۱۹۶۶ رخ داد که ده‌ها شهاب در هر ثانیه در ساعت اوج بارش آسمان را می‌خراشید. اگر امتداد خطوط شهاب‌ها را در بارش شهاب، مثلاً بارش اسدی، به عقب بازگردانید، به‌نظر می‌رسد که همه از یک نقطه در آسمان آمده‌اند. این نقطه را کانون بارش می‌نامند.

منشأ بارش‌های شهاب

بارش‌های شهاب را به نام صورت فلکی‌ای نام‌گذاری می‌کنند که کانون در آن باشد. مثلاً اگر مسیر عبور همه‌ی شهاب‌های بارش اسدی در آسمان را برعکس ادامه دهیم، به‌نظر می‌رسد از نقطه‌ای در صورت فلکی اسد (شیر) آغاز می‌شوند. بارش اسدی هر سال در ماه آبان، که زمین از میان توده‌ی شهاب‌واره‌های بر جای مانده از دنباله‌دار تیمبل - تابل می‌گذرد، رخ می‌دهد. این بارش یکی از چند بارش سالانه شهاب‌هاست. یکی از بهترین شهاب‌باران‌های سال، بارش پرساوشی است که در بیست‌ویکم و بیست‌ودوم مرداد به اوج می‌رسد.

آذرگویی‌ها و آتش‌گویی‌ها

هر چه شهاب‌واره بزرگ‌تر باشد، شهاب هم پرنورتر خواهد بود. درخشان‌ترین شهاب‌ها را آذرگویی می‌نامند که قدرشان دست کم ۴- و هم‌نور یا درخشان‌تر از سیاره‌ی زهره هستند. شهاب‌واره‌ای که این آذرگویی را در مارس ۱۹۳۳، پدید آورد، به‌طور کامل در جو نسوخت. هر سال ده‌ها هزار آذرگویی در جو زمین رخ می‌دهد. تعدادی از آن‌ها تکه‌تکه و منفجر می‌شوند که به آن‌ها آتش‌گویی یا بولید می‌گویند.

از شهاب‌واره تا شهاب

سرنوشت شهاب‌واره‌ای که وارد جو زمین می‌شود، به اندازه، سرعت، و قابلیت تکه‌تکه شدن آن بستگی دارد. کوچک‌ترها در بخش‌های بالایی جو، یعنی ارتفاع ۸۰ تا ۱۲۰ کیلومتری، می‌سوزند. بزرگ‌ترها یا آن‌هایی که سرعت بیش‌تری دارند، به زمین نزدیک‌تر می‌شوند و می‌سوزند. بسیار به‌ندرت اتفاق می‌افتد که شهاب‌واره‌ی بزرگی پس از عبور از جو سالم بماند و با سطح زمین برخورد کند. پس از برخورد، به این سنگ، شهاب‌سنگ می‌گویند. شهاب‌سنگ‌های زیادی به زمین نمی‌رسند؛ زیرا بیش‌تر ذرات توده‌ی شهاب‌واره‌های دنباله‌داری، یخ و غبار ریزند.



ممکن است ده‌ها تا صدها سال طول بکشد تا توده‌ای از شهاب‌واره‌ها شکل بگیرند.

زل استفاده شده بر روی هواپیما

جمع‌آوری غبار شهاب

شهاب‌واره‌ها از ذرات ریز غبار به جرم امیلونیوم گرم تا سنگ‌های چند تنی را شامل می‌شوند. در دو سه دهه‌ی گذشته، دانشمندان ذرات کوچک‌تر را جمع‌آوری و بررسی کرده‌اند. هواپیمایی با صفحه‌های پوشیده از نوعی زل خاص در ارتفاع حدود ۲۰ کیلومتری به پرواز درمی‌آید. زمینی که ذرات پُرسرعت با زل برخورد می‌کنند، به آن می‌چسبند و می‌توان آن‌ها را برای بررسی به آزمایشگاه منتقل کرد.

سنگ‌های تکی که از سرعتشان کاسته می‌شود، به زمین سقوط می‌کنند.



شهاب تکی

تک‌شهاب‌ها، شهاب‌هایی که بخشی از بارش شهاب نیستند و تصادفی می‌آیند نیز، در طول سال دیده می‌شوند. زیر آسمان صاف و تاریک شاید بتوان ۵ تا ۷ تک‌شهاب در ساعت هم دید. رد هر شهاب معمولی در جو زمین حدود ۱ متر پهنا و ۷ تا ۲۰ کیلومتر طول دارد و کمتر از یک ثانیه دوام می‌آورد.

رصد شهاب

بهترین زمان برای رصد شهاب‌ها، زمانی است که زمین از میان توده‌ی شهاب‌واره‌ای رد می‌شود و وقوع بارش شهاب محتمل است. برای رصد شهاب، هیچ ابزار خاصی لازم نیست؛ کافی است جایی با افق باز و دور از نور شهر باشید. کمی صبر کنید تا چشمانتان به تاریکی عادت کند. شهاب‌ها هر جایی از آسمان ظاهر می‌شوند؛ اما معمولاً در فاصله‌ی ۳۰ تا ۵۰ درجه‌ای کانون بارش فراوان‌ترند. بسیاری اوقات، بیش‌ترین تعداد شهاب‌ها پیش از سپیده‌دم دیده می‌شوند.



یک شهاب‌واره با سرعت بین ۱۱ تا ۴۷ کیلومتر بر ثانیه وارد جو می‌شود.

شهاب‌ها در ارتفاع ۱۲۰ تا ۸۰ کیلومتری بر فراز زمین شکل می‌گیرند.

بیش‌تر شهاب‌های مرنی قدری بین حدود ۴ تا ۴۰ دارند.

آذرگویی‌ها در ارتفاع کمتری از جو رخ می‌دهند و درخشان‌تر از شهاب‌های عادی هستند.

تکه‌تکه شدن شهاب‌واره‌ها معمولاً بین ارتفاع ۳۰ تا ۱۰ کیلومتری بر فراز زمین رخ می‌دهد.

سنگ‌های بزرگ که از سرعتشان کاسته نمی‌شود، دهانه‌های برخوردی را شکل می‌دهند.

مهم‌ترین بارش‌های شهاب

نام	تاریخ فعالیت	مورث فلکی کانون بارش
شلیایی	۳۰ فروردین تا ۴ اردیبهشت (اوج ۱ و ۲ اردیبهشت)	شلیایی
اتا - دلوی	۱۱ تا ۱۸ اردیبهشت (اوج ۱۵ تا ۱۶ اردیبهشت)	دلو
دلتا - دلوی	۲۴ تیر تا ۲۴ مرداد (اوج ۶ و ۷ مرداد)	دلو
برساوشی	۳ تا ۲۷ مرداد (اوج ۲۱ و ۲۲ مرداد)	برساوش
جباری	۲۴ مهر تا ۵ آبان (اوج ۲۹ تا ۳۰ مهر)	جبار
ثوری	۲۸ مهر تا ۹ آذر (اوج ۱۴ و ۱۵ آبان)	ثور
اسدی	۲۴ تا ۲۹ آبان (اوج ۲۸-۲۶ آبان)	اسد
جوزایی	۱۶ تا ۲۵ آذر (اوج ۲۲ و ۲۳ آذر)	جوزا
ربعی	۱۰ تا ۱۶ دی (اوج ۱۴ و ۱۵ دی)	عوا

بیش‌تر بدانییم

اعضای خرد ۱۶۰، دنباله‌دارها ۱۶۲، سیارک‌ها ۱۶۶
شهاب‌سنگ‌ها ۱۶۸، برخورد‌ها ۱۷۰، عکاسی از آسمان شب ۲۸۶

سیارک‌ها

سرس، بزرگترین عضو کمربند سیارک‌ها، یک سوم کل جرم همگی سیارک‌ها را در خود جای داده است. سرس حالا عضوی از گروه سیاره‌های کوتوله است.

وستا سومین سیارک بزرگ و درخشان‌ترین سیارک در آسمان زمین است.

سایکس شکل نامنظمی دارد.

اندازه ۱۸۵ کیلومتر

اندازه‌ی سیارک‌ها

سرس، نخستین سیارکی که کشف شد، با قطر حدود ۹۴۰

کیلومتر بزرگ‌ترین عضو کمربند اصلی سیارک‌ها نیز هست.

البته سرس از سال ۲۰۰۶ با توجه به کروی بودن و بزرگی

قطرش وارد رده‌ی سیاره‌های کوتوله شد. فقط سیارک‌هایی که

قطرشان بیش از ۳۰۰ کیلومتر است، کروی‌اند. بیش‌تر سیارک‌ها

بسیار کوچک‌ترند و شکلی نامنظم دارند. حدود ۱۰ سیارک با

قطر بیش از ۲۵۰ کیلومتر وجود دارد.

۱۴ سال طول می‌کشد تا سیارک هیدالگو دور خورشید بگردد.

کایرون (CHIRON)، سیارکی که در سال ۱۹۷۷ کشف شد، مداری بیضوی و غیرعادی دارد. در حال حاضر، تصور بر این است که کایرون، دنباله‌داری متعلق به گروه فنتور هاست.

دو گروه سیارک، معروف به گروه ترورا، در مدار مشتری قرار دارند؛ یک گروه از آن‌ها پیش از مشتری و گروه دیگر پس از سیاره در حرکت‌اند. آن‌ها در نقاط تعادل گرانشی یا نقاط لاگرانژی مدار مشتری گرفتار شده‌اند.

اگر همگی سیارک‌ها را کنار هم می‌گذاشتند، جرم آن‌ها فقط ۱۵ درصد جرم ماه می‌شد.

سیاره ناموفق: برخی دانشمندان بر این باورند که کمربند سیارک‌ها بقایای سیاره‌ای است که هرگز متولد نشده است. مواد این ناحیه حدود ۴/۶ میلیارد سال پیش، که سیاره‌ها منظومه شمسی شکل می‌گرفتند، بیش از ۶۰۰ کروی سبکی بزرگ (پیش‌سیاره) را شکل داد. اما سیاره‌ی واحدی را تشکیل نداد. گرانش سیاره‌ی مشتری جوان بین این پیش‌سیاره‌ها آشوب برپا می‌کرد و آن‌ها هم در برخورد با هم، تعداد بسیاری جرم‌های کوچک کمربندی به‌وجود آوردند.

تصویرسازی هنرمندانه از سیارک نزدیک زمین



سیارک‌های نزدیک زمین

مدار برخی سیارک‌ها به گونه‌ای است که آن‌ها را به نزدیکی زمین می‌آورد. این اعضای گروه‌های سیارکی آپولو، آمور و آتن هستند. نام هر گروه از عضو اصلی گروه گرفته شده است. اعضای یک گروه خاص، مدار مشخصی را طی می‌کنند. آتنی‌ها عموماً درون مدار زمین هستند. آپولویی‌ها از مدار زمین می‌گذرند و مدار آموری‌ها آن‌ها را تا میان مدار زمین و مریخ می‌آورد.

میلیاردها سنگ فضایی، به نام سیارک، در نواحی داخلی منظومه‌ی شمسی دور خورشید می‌گردند. سیارک‌ها را خورده‌سیاره نیز می‌نامند؛ زیرا مانند سیاره‌ها، مدار خاص خود را گرد خورشید طی می‌کنند و در حین سفر، دور خود نیز می‌چرخند. بیش از ۹۰ درصد از آن‌ها در ناحیه‌ای به نام کمربند اصلی سیارک‌ها، میان مدار مریخ و مشتری، قرار دارند. بین ۳ تا ۶ سال طول می‌کشد تا دور خورشید بگردند. اندازه، شکل و رنگ سیارک‌ها گوناگون است. اغلب فقط یکی از آن‌ها، سیارک وستا، به حد کافی بزرگ و درخشان است که بتوان آن را با چشم غیر مسلح دید. حتی آن‌هایی که با تلسکوپ‌های قوی رصد می‌شوند، از درون تلسکوپ هم فقط نقاطی نورانی‌اند. راه دیگر کاوش زمینی آن‌ها، استفاده از رادار است. با ارسال امواج رادیویی و بررسی بازتاب ضعیف آن‌ها از سطح سیارک، شکل و پستی و بلندی‌های سیارک نقشه‌برداری می‌شود. اما بهترین راه شناخت آن‌ها کاوش فضایی است. تاکنون فضاپیماها، ۶ سیارک را با وضوح زیاد از نزدیک بررسی کرده‌اند. با وجود این، به کمک رصد اختفای ستاره‌ها در پشت این سیارک‌ها، می‌توان اطلاعاتی از شکل و اندازه‌ی آن‌ها به‌دست آورد.

کمربند اصلی سیارک‌ها

خورشید مدار مریخ سیارک آپولو

مدار مشتری

شمارک‌های گروه ترورا

مشتری

سیارک آمور

سیارک آتن

زحل

کمربند سیارک‌ها

کمربند اصلی سیارک‌ها از فاصله‌ی ۲۵۴ میلیون تا ۵۹۸ میلیون کیلومتری خورشید گسترده شده است. این کمربند شامل میلیاردها سیارک است که مستقل از هم دور خورشید می‌گردند. آن‌ها در همان جهت سیاره‌ها حرکت می‌کنند و دور خودشان هم می‌چرخند. بیش‌تر سیارک‌ها کوچک هستند و قطرشان فقط چندمتر است. اما قطر حدود ۱ میلیارد عدد از آن‌ها بیش از یک کیلومتر است. برخلاف تصور عمومی، که کمربند سیارک‌ها توده‌ای پر ازدحام از سنگ‌های فضایی است، اغلب آن‌ها هزاران کیلومتر از هم فاصله دارند.

نقشه‌برداری از کمربند اصلی

تاکنون هزاران سیارک شناسایی شده‌اند. بسیاری از آن‌ها مدتی طولانی رصد و بررسی شده‌اند تا مدار و دوره‌ی تناوب چرخشان محاسبه شود. نخستین سیارک‌ها در اوایل قرن نوزدهم کشف شدند. پیش از همه، سرس در سال ۱۸۰۱، با مشاهده‌ی تلسکوپی پیدا شد. امروزه، سیارک‌هایی که اخترشناسان کشف می‌کنند، آنقدر کم‌فروغ‌اند که از درون تلسکوپ‌ها دیده نمی‌شوند؛ بلکه از درون عکس‌ها یا به کمک آشکارسازهای الکترونیک کشف می‌شوند. کمربند سیارک‌ها چند شکاف دارد که به شکاف‌های کرک‌وود مشهورند و به سبب اثر گرانش مشتری، سیارک ندارند.

سیارک‌های بزرگ در کمربند اصلی، موقعیت خود را در برابر هم نشان می‌دهند. این اندازه‌ها بسیار بزرگ‌تر از واقعیت نشان داده شده است.

پالاس (زمان چرخش ۷/۸ ساعت)

سرس (زمان چرخش ۹/۱ ساعت)



خانواده‌ی سیارک‌های فلورا (زمان چرخش ۱۲/۸ ساعت)

وستا (زمان چرخش ۵/۳ ساعت)

شکاف کرک‌وود. یکی از چند شکاف کمربند سیارک‌ها.

اروس

گاسپرا




در مدار سیارک

بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱، فضاپیمای نیر (NEAR) در مداری به دور سیارک ۳۳ کیلومتری اروس در گردش بود تا از این سیارک نزدیک زمین، نقشه‌برداری کند. در پایان نیز در حین فرود بر سطح سیارک، نزدیک‌ترین نماهای دیده شده از سطح سیارک‌ها را ارسال کرد. در سال ۱۹۹۷ نیز پیش از رسیدن به اروس، از کنار سیارک ۶۶ کیلومتری و پُرجودال متیلدا گذشت. فضاپیمای ژاپنی هایابوسا بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ از سیارک کوچک ۵۰۰ متری ایتوکاوا نقشه‌برداری کرد. در کمال شگفتی، سطح این سیارک بدون گودال‌های برخوردی بود؛ گویی بر اثر برخورد تازه‌ای، تکه‌سنگ‌ها و انبوه غبار بلند شده از سطح آن به مرور بر سطح نشسته‌اند و دهانه‌های قبلی را پنهان کرده‌اند. هایابوسا کاوش گر بسیار کوچکی به سوی سیارک فرستاد که هرگز به آن نرسید. اما خود بر سطح سیارک فرود آمد تا نمونه‌ی غبار سطحی آن را برای بازگرداندن به زمین جمع‌آوری کند. در سال‌های آینده، مهم‌ترین مأموریت کاوش سیارک‌ها، به‌عهده‌ی فضاپیمای سپیده‌دم یا دان (Dawn) است که در سال ۲۰۱۱ در مداری یک‌ساله به دور سیارک بزرگ وستا قرار خواهد گرفت و در سال ۲۰۱۵، پنج ماه به دور سرس خواهد گشت.

انواع سیارک

از نظر ساختاری، سه نوع اصلی سیارک وجود دارد: سنگی‌ها، فلزی‌ها، و سنگی - فلزی‌ها. گاسپرا سیارکی سنگی و نخستین سیارکی است که از نزدیک دیده شده است. این سیارک به قطر حدود ۱۹ کیلومتر در هر ۳/۳ سال دور خورشید می‌گردد. فضاپیمای گالیله در اکتبر سال ۱۹۹۱، از آن تصویربرداری کرد.


وقتی جرم سیارک برخوردکننده کوچکتر از یک‌پنجاه هزارم جرم بزرگتر باشد، یک دهانه برخوردی شکل می‌گیرد.



برخورد میان سیارک‌ها

کمربند اصلی همیشه به شکل امروزی نبوده است. بر اساس یکی از نظریه‌ها، زمانی که منظومه‌ی شمسی شکل می‌گرفت، این کمربند شامل بیش از ۶۰۰ قطعه سنگ بود که از سرس بزرگ‌تر بودند. آن‌ها به مرور بر اثر برخورد و به‌هم چسبیدن ذرات و قلوه‌سنگ‌های اولیه به‌وجود آمده بودند. این پیش‌سیاره‌ها با هم برخورد کردند و مقدار بسیاری ماده هم بر اثر نیروی گرانشی مشتری از این محدوده جارو شد. بقیه‌ی تکه‌ها هم مدام با هم برخورد کردند و کمربند سیارکی امروزی را شکل دادند. برخوردها و ملاقات‌های پیاپی سیارک‌ها، گاه سبب پیدایش سیارک دو یا چندتایی یا قمر یا قمرهایی در اطراف سیارک‌ها می‌شود.

وقتی جرم سیارک برخوردکننده حدود یک‌پنجاه هزارم جرم دیگر باشد، سیارک بزرگ‌تر خرد و تبدیل به کرای ای قلوه‌سنگ‌ها می‌شود.



اگر جرم سیارک برخوردکننده بیش از یک‌پنجاه هزارم جرم سیارک دیگر باشد، سیارک تکه‌تکه می‌شود و خانواده‌ای از سیارک‌ها را شکل می‌دهد.

نواری از غبار شکل می‌گیرد.

بیش‌تر بدانیم

منظومه‌ی شمسی ۹۴
تولّد منظومه‌ی شمسی اعضای خرد ۱۶۰
شهاب‌ها ۱۶۴، شهاب‌سنگ‌ها ۱۶۸


شهاب سنگ ها




پوسته‌ی گداخته‌ی تیره به سبب سوختن شهاب سنگ در جو زمین شکل می‌گیرد.

شهاب سنگ سنگی
بیش تر شهاب سنگ هایی که روی زمین کشف شده اند، سنگی هستند. تاکنون هزاران شهاب سنگ سنگی جمع آوری شده است. آن ها را می توان بر حسب بافت، به زیر مجموعه های کُندریتی ها و آکندریتی ها تقسیم کرد. کُندریتی ها شامل «قطره های» سنگ سخت شده هستند و آکندریتی ها این دانه های کُندریل را در ساختار خود ندارند.

شهاب سنگی شامل اکایاز آهن - نیکل



یکی از چند تن تکه شهاب سنگ دره‌ی دیابلو در آریزونا که ۵۰ هزار سال پیش با زمین برخورد کرد.



این شهاب سنگ ۶ سانی متری سنگی - آهنی، که در قطب جنوب کشف شد، از یک سیارک آمده است.

بلور زبرجد به رنگ سبز کم رنگ در میان آهن - نیکل دیده می‌شود.

شهاب سنگ سنگی - آهنی

نادرترین نوع شهاب سنگ نوعی است که از ترکیب آهن و سنگ ساخته شده است. برخی شهاب سنگ ها از آهن - نیکل مذاب و ماده‌ی معدنی سنگی زبرجد تشکیل شده اند و برخی هم به سبب برخورد ها و ترکیب قطعات سنگی و آهنی شکل گرفته اند.


هر سال حدود ۳ هزار سنگ فضایی، به جرم بیش از یک کیلوگرم و بزرگ تر از آن که در جو زمین بسوزد، بر سطح زمین سقوط می‌کند. به این سنگ ها، شهاب سنگ می‌گویند. بیش تر آن ها در دریاها سقوط می‌کنند و هرگز پیدا نمی‌شوند. برخی شهاب سنگ ها، که سقوط آن ها بر خشکی ها دیده می‌شود، به سرعت جمع آوری می‌شوند. برخی هم زمانی و جایی سقوط می‌کنند که کسی متوجه نمی‌شود و ممکن است سال ها یا حتی قرن ها بعد کشف شوند.

انواع شهاب سنگ

شهاب سنگ ها معمولاً از همان موادی ساخته شده اند که روی زمین یافت می‌شوند؛ اما نسبت های متفاوتی دارند. دانشمندان بر این باورند که مواد آن ها مانند مواد سال های ابتدایی منظومه‌ی شمسی است. بیش تر آن ها بسیار چگال تر و سنگین تر از سنگ های هم جثه‌ی زمینی هستند و به سبب داشتن آهن و فلز، اثر مغناطیسی دارند. شهاب سنگ ها به سه نوع تقسیم می‌شوند.

شهاب سنگ آهنی

دومین نوع فراوان شهاب سنگ ها بیش تر از فلز آهن - نیکل و کمی مواد معدنی دیگر تشکیل شده اند. بیش تر شهاب سنگ های آهنی در ابتدا مذاب بودند و درون هسته‌ی سیارک ها شکل گرفتند.




شهاب سنگ سنگی بارول

این نمونه‌ای از یک شهاب سنگ درون شهاب سنگ دیگر است که از سنگی از یک سیارک و قطعات مذابی از سیارک دیگر تشکیل شده است. این سنگ در تکه تکه شدن شهاب واره‌ای بزرگ و سقوط بارانی از سنگ ها بر فراز بارول انگلستان، در بیست و چهارم دسامبر سال ۱۹۶۵ به زمین رسیده است.

منشأ شهاب سنگ ها

بیش تر شهاب سنگ هایی که روی زمین جمع آوری شده اند، از کمربند سیارک ها آمده اند. اما حدود ۳۰ شهاب سنگ شناخته شده از ماه و همین حدود نیز از مریخ به زمین آمده اند. تعداد کمی نیز ممکن است منشأ دنباله‌داری داشته باشند. شهاب سنگ ها بر سطح ماه و مریخ هم یافت شده اند که منشأ بیش تر آن ها از سیارک ها است.



فضانوردی به نام جک اشویت ناحیه‌ی برخورد شهاب سنگی با ماه را بررسی می‌کند.

یافته‌های شهاب‌سنگی

بزرگ‌ترین شهاب‌سنگ شناخته شده، در سال ۱۹۲۰ مدفون در خاک کشف شد. نام آن هواوست شد که نام جایی در جنوب غربی آفریقا بود که شهاب‌سنگ در آن فرود آمده بود. این شهاب‌سنگ آهنی در زمین سنگ آهکی محل فرود، دست‌نخورده و سالم باقی مانده بود. حالا این سنگ در نامیبیا اثر ملی محسوب می‌شود.




ساختار یک شهاب‌سنگ

اصطکاک با جو زمین، سطح خارجی سنگ فضایی سقوط‌کننده را حرارت می‌دهد و ذوب می‌کند. برخی شهاب‌سنگ‌ها سطح خارجی یک‌نواختی دارند و برخی دارای یک سطح جلویی و یک سطح پشتی هستند.

درک شهاب‌سنگ‌ها

• سقوط تکه‌شهاب‌سنگ‌ها یا بارش قطعاتی از یک شهاب‌سنگ خرد شده، از زمان مصر باستان ثبت شده است.



سقوط شهاب‌سنگ در انسیسهایم

• شهاب‌سنگ دونرشتاین، که در سال ۱۴۹۲ نزدیکی انسیسهایم فرانسه سقوط کرد، یکی از نخستین نمونه‌های شهاب‌سنگی است که سالم به زمین رسیده است.

• بارش شهاب‌سنگ‌ها در هشتم مارس ۱۹۷۶، در جیلین چین گسترده‌تر از هر حادثه‌ی سقوط شهاب‌سنگ در تاریخ رصد شده است.

بیشتر بدانیم

- شهاب‌ها ۱۶۴
- سیارک‌ها ۱۶۶
- برخوردها ۱۷۰



شهاب‌سنگ‌های سقوط‌کننده

هر سال سقوط تعدادی شهاب‌سنگ به زمین دیده یا شنیده می‌شود. برخورد شهاب‌سنگ‌ها با انسان در زمین پنهان و نادر است. تنها نمونه‌ی گزارش شده مربوط به خانمی در آلابامای ایالات متحده است که در سال ۱۹۵۴، شهاب‌سنگی از سقف خانه‌ی او به زمین برخورد و به سوی او کمانه کرد. سقوط شهاب‌سنگ‌ها تاکنون در جاهای عجیبی مانند صندوق عقب اتومبیل، داخل دست‌شویی، نزدیک کشاورزان در رمین رراعی آن‌ها و حتی نزدیک توپ گلف‌باران گزارش شده است. فریبرز فتاحی، کوه‌نوردی که شب نهم بهمن سال ۱۳۸۲ در پناهگاهی در ارتفاعات گپیگان اقامت می‌کرد، وقتی برای آوردن آب از چشمه بیرون رفت، صدای بلند سقوطی را شنید و سنگ فضایی داغ و درخشانی نزدیک چشمه یافت.



بررسی شهاب‌سنگ‌ها

بیشتر شهاب‌سنگ‌ها را در موزه‌ها یا دانشگاه‌ها نگه می‌دارند تا دانشمندان آن‌ها را بررسی کنند. ابزارهای مخصوصی از مدت واپاشی عناصر رادیواکتیو، یعنی تبدیل عناصر به عناصر دیگر در طول زمان، استفاده می‌کنند تا عمر این سنگ‌ها را تخمین بزنند و نحوه‌ی شکل‌گیری آن‌ها را بررسی کنند.

جست‌وجوی شهاب‌سنگ‌ها

دانشمندان با جست‌وجو در نواحی دست‌نخورده و بکر زمین، مانند قطب جنوب، صحرای بزرگ آفریقا و بیابان‌های استرالیا، صدها شهاب‌سنگ در سال می‌یابند. پیدا کردن شهاب‌سنگ‌های تیره در زمینه‌ی روشن برف و یخ قطب یا خاک کویر ساده است.

شهاب‌سنگ‌های بزرگ		
نام و مکان سقوط	وزن به تن	سال سقوط یا کشف
شهاب‌سنگ‌های آهنی		
هواوست، نامیبیا	۶۰	۱۹۲۰
آهنیگیتو، گرین‌لند	۳۰/۴	۱۸۹۵
باکوبیتو، مکزیک	۲۷	۱۸۷۱
امیوسی، تانزانیا	۲۶	۱۹۳۰
شهاب‌سنگ‌های سنگی		
جیلین، چین	۱/۷۷	۱۹۷۶
نورتن کانتی، کانزاس، ایالات متحده	۱	۱۹۴۸
لانگ آیلند، کانزاس، ایالات متحده	۰/۵۶	۱۸۹۱
باراگلد، آرکانزاس، ایالات متحده	۰/۴	۱۹۳۰
بیوریل، فنلاند	۰/۳	۱۸۹۹

برخوردها

برخورد روی میماس

همه‌ی سیاره‌ها سنگی و بسیاری از قمرهای سیاره‌ای، دهانه‌های برخوردی دارند. سطح یخی میماس، یکی از قمرهای زحل، پوشیده از دهانه‌های برخوردی است. یکی از دهانه‌های برخوردی آن، به نام هرشل، قطری معادل ۱۳۰ کیلومتر، یک‌سوم قطر خود میماس دارد. شاید آن برخورد، بزرگ‌ترین برخوردی بوده که امکان داشته قمری به اندازه‌ی میماس تحمل کند و خرد نشود.



وقتی شهاب‌سنگی با زمین برخورد کند، ممکن است دهانه‌ای برخوردی یا گودالی کاسه‌شکل در سطح زمین با لبه‌های برآمده ایجاد کند. سنگ‌های فضایی در طول تاریخ، به‌خصوص حدود ۴ میلیارد سال پیش که زمین سیاره‌ی جوانی بود، از این گودال‌ها زیاد ساخته‌اند. دهانه‌هایی با قطر بین ۱ متر تا بیش از هزار کیلومتر به تعداد بسیار روی سیاره‌ها و قمرها در سراسر منظومه‌ی شمسی دیده می‌شوند. فرسایش شدید و پوئای سیاره‌ی ما، سبب از بین رفتن عوارض سطحی قدیمی می‌شود. با وجود این، حدود ۱۵۰ دهانه‌ی برخوردی روی زمین پیدا شده است.

دهانه‌های برخوردی چگونه شکل می‌گیرند؟

همه‌ی دهانه‌های برخوردی، چه روی زمین یا روی سیاره‌ها و قمرهای دیگر، یکسان شکل می‌گیرند. یک شهاب‌سنگ برخوردی مواد سطحی را در نقطه‌ی برخورد پراکنده می‌کند و دهانه‌ای می‌سازد. اندازه‌ی دهانه، به اندازه‌ی سنگ اصلی، جنس آن، سرعت و زاویه‌ی برخورد بستگی دارد. اگر سنگی فضایی به قطر ۵۰ متر با زمین برخورد کند، ممکن است دهانه‌ای به قطر یک کیلومتر بسازد. در چنین برخوردی، گرمای انفجار، بیش‌تر سنگ فضایی را تبخیر یا تکه‌های ریز آن‌را در اطراف پراکنده می‌کند. در نتیجه، در اغلب گودال‌های برخوردی، تکه‌سنگ بزرگی از شهاب‌سنگ اولیه باقی نمی‌ماند.



۱ شهاب‌سنگ هنگام برخورد با اتمسفر جو می‌شکند و می‌سوزد.

۲ وقتی شهاب‌سنگ با زمین برخورد می‌کند، لایمی خارجی سنگ به اطراف پراکنده می‌شود.

۳ با فرو رفتن شهاب‌سنگ در زمین، امواج ضربه در سطح آن پراکنده می‌شود.

۴ انفجاری، حاصل از حرارت و فشار برخورد، دهانه‌ای در سطح زمین ایجاد می‌کند.



دهانه‌های هن‌بری

دهانه‌های هن‌بری گروهی از ۱۱ دهانه در شمال استرالیا هستند که برخی از کوچک‌ترین دهانه‌های روی زمین را شامل می‌شوند. میدان دهانه‌های هن‌بری از یک سر تا سر دیگر، یک کیلومتر پهنا دارد. به‌نظر می‌رسد این دهانه‌ها بر اثر برخورد شهاب‌سنگی به‌وجود آمده‌اند که کمتر از ۵ هزار سال پیش، در جو زمین شکسته است. قطر کوچک‌ترین دهانه ۶ متر است. شهاب‌سنگ‌های هن‌بری، که نمونه‌ی معروفی در دنیا هستند، در سراسر منطقه‌ی برخورد و بیابان اطراف به تعداد بسیار زیادی پیدا شده‌اند.



جست‌وجوی سنگ‌های فضایی

تلسکوپ‌های قدرت‌مند به دنبال سیارک‌هایی می‌گردند که احتمالاً در مسیر خود به نزدیکی زمین می‌آیند. تلسکوپ‌هایی مانند رصدخانهی کیت‌پیک در آریزونا یا ایالات متحده اجسامی به قطر یک کیلومتر را ردیابی می‌کنند.



برخورد تونگوسکا

لزومی ندارد که سنگ‌های فضایی حتماً با زمین برخورد کنند تا اثر نابود کننده‌ای بر جای بگذارند. در سی‌ام ژوئن سال ۱۹۰۸، در فاصله‌ی ۶ کیلومتری از سطح زمین در جو، انفجاری بر فراز ناحیه‌ی بی‌سکنه‌ی رودخانه‌ی تونگوسکا در سبیری رخ داد. این انفجار حاصل از هم‌پاشیدگی قطعه‌ی کوچکی از یک دنباله‌دار یا یک سیارک بود که در ناحیه‌ی ۳۰ کیلومتری، درختان را از ریشه درآورد. صدای آن هم تا فاصله‌ی هزار کیلومتری شنیده شد. در چند کیلومتری کانون انفجار، دریاچه‌ای گودال‌مانند وجود دارد که برخی بر این باورند تکه‌ای از جسم تونگوسکا آن را ساخته است.



اندازه‌ی مکان برخورد تونگوسکا در مقایسه با شهر نیویورک

برخوردهایی با زمین

• زمین و دیگر سیاره‌ها و قمرهای جوان از ۴/۶ میلیارد تا ۳/۸ میلیارد سال پیش با سنگ‌های فضایی بر جای مانده از شکل‌گیری منظومه‌ی شمسی، به‌باران می‌شدند.

• ۶۵۰ میلیون سال پیش، سنگی به اندازه‌ی یک کوه ۱۰ کیلومتری با زمین برخورد کرد و دهانه‌ی ۲۰۰ کیلومتری چیکخولوب را ساخت که حالا زیر خط ساحلی مکزیک قرار دارد. خیلی‌ها فکر می‌کنند پی‌آمدهای این برخورد به انقراض نسل دایناسورها منجر شده است.

• دهانه‌های برخوردی، هنوز هم گاهی روی زمین شکل می‌گیرند. در فوریه‌ی سال ۱۹۴۷، بیست‌وسه تن قطعه سنگ در کوهستان سیخوته‌آلین سبیری سقوط کرد و دهانه‌هایی تا قطر ۲۶ متر ساخت.

پیش‌تر بدانیم

تولد منظومه‌ی شمسی ۱۰۰، قمرها زحل ۱۵۲ سیارک‌ها ۱۶۶، شهاب‌سنگ‌ها ۱۶۸

دهانه‌ی بارینجر


این دهانه‌ی عظیم و دست‌نخورده در کویر آریزونا در ایالات متحده، از سال ۱۸۷۱ شناخته شده است. این دهانه حدود ۵۰ هزار سال پیش، با برخورد شهاب‌سنگی آهنی به قطر حدود ۵۰ متر با زمین، شکل گرفته است. قطر این دهانه ۱/۲ کیلومتر است و لبه‌ی برآمده‌ی آن ۲۵ متر بلندتر از کویر اطراف آن است.



دهانه‌های مانیوآکان


فضانوردانی که دور زمین در گردش‌اند، می‌توانند دهانه‌ی مانیوآکان، یکی از بزرگ‌ترین دهانه‌های برخوردی را در کانادا تشخیص دهند. دو دریاچه‌ی نیم‌دایره‌ای شکل، محدوده‌ی خارجی دهانه را به قطر ۱۰۰ کیلومتر می‌سازد.

دهانه‌ی برخوردی، آریزونا، ایالات متحده



دهانه‌های روی زمین

دهانه‌های برخوردی در هر قاره‌ای روی زمین پیدا می‌شوند؛ اما در بخش‌هایی از استرالیا، اروپا، و آمریکای شمالی بیش‌ترند. این اتفاق به دلیل سقوط شهاب‌سنگ‌های بیش‌تر در این نواحی نیست؛ بلکه به این سبب است که سطح این نواحی کمتر تغییر یافته و دهانه‌ها سالم‌تر باقی مانده‌اند. کوچک‌ترین دهانه‌ها، قطری حدود چند متر دارند و قطر بزرگ‌ترین دهانه‌ی روی خشکی، ۱۴۰ کیلومتر است. بیش‌تر دهانه‌های بسیار بزرگ بیش از ۵۰ میلیون سال پیش شکل گرفته‌اند.





ستارگان

خورشید ۱۸۱ - ۱۷۴

زندگی و ویژگی ستارگان ۱۹۹ - ۱۸۲

مرگ ستارگان ۲۱۱ - ۲۰۰

برای اخترشناسان حرفه‌ای، ستاره‌ها بخشی از یک آزمایشگاه عظیم طبیعی به‌شمار می‌روند. زمانی که فیزیک‌دانان اتمی در شتاب‌دهنده‌ی ذرات، به آزمایش رفتار ماده می‌پردازند، اخترفیزیک‌دانان به وضعیتی بسیار پُرانرژی‌تر در دل ستاره‌ای دوردست یا در نزدیکی یک سیاه‌چاله دست‌رسی دارند. ستاره‌ها، که سال‌های نوری دورتر از ما، در کیهان پراکنده‌اند، بهترین بستر برای آزمایش نظریه‌های علمی درباره‌ی رفتار موادی هستند که روی زمین حتی نمی‌توانیم به آن‌ها نزدیک شویم. ما و همه‌ی آن‌چه روی زمین است، از همین مواد ساخته شده‌ایم.

ستاره‌ها زنده‌اند؛ آن‌ها به دنیا می‌آیند، زندگی می‌کنند و می‌میرند. ستاره‌ی ما، خورشید، نیز همین‌طور است. خورشید اکنون در نیمه راه عمر ۱۰ میلیارد ساله‌ی خود قرار دارد و سرانجام روزی خواهد مرد و زمین هم به همراه آن از بین خواهد رفت. اما ستاره‌ها مانند ققنوس، آن پرنده‌ی افسانه‌ای هستند که از خاکسترشان نسل بعدی ستاره‌ها و سیاره‌ها و حتی سنگ بناهای حیاتی دوباره زاده می‌شود.


درون خورشید

نزدیک‌ترین ستاره به ما، خورشید، کره‌ی عظیمی از گاز داغ است. قطر آن ۱۰۹ برابر زمین و جرمش بیش از ۳۰۰ هزار برابر زمین و ۷۴۵ برابر جرم همه‌ی سیاره‌های منظومه‌ی شمسی است. بدون پرتوهای حرارت‌بخش و دائم خورشید، حیات روی زمین به وجود نمی‌آمد. منشأ حرارت خورشید کوره‌ای هسته‌ای در اعماق زیر سطح این ستاره است. ۴/۶ میلیارد سال است که در این کوره، سوخت هسته‌ای به انرژی تبدیل می‌شود و تقریباً همین مقدار زمان هم از عمرش باقی است.

ساختار خورشید

انرژی خورشید در مرکز بسیار داغ آن، با دمای ۱۵ میلیون درجه‌ی سانتی‌گراد تولید می‌شود. مرکز خورشید آن‌قدر داغ است که اتم‌های گاز متلاشی می‌شوند و فقط هسته‌ی لخت آن‌ها باقی می‌ماند. انرژی تولیدشده در لایه‌های بالاتر، از مناطق تابشی و همرفتی عبور می‌کند و به سطح یا نورسپهر می‌رسد و از آن‌جا به صورت نور مرئی و تابش فروسرخ خورشید را رها می‌کند. این پرتوها در راه خود از میان جو داغ و رقیق خورشید، که میلیون‌ها کیلومتر در فضا گسترده شده است، عبور می‌کنند و برخی از طول موج‌های نور در این لایه‌ها جذب می‌شوند.

هم‌جوشی هسته‌ای هیدروژن



واکنش‌های هسته‌ای

در مرکز خورشید، با تبدیل هیدروژن به هلیوم، در حین واکنش هم‌جوشی هسته‌ای، انرژی رها می‌شود. در واکنشی چند مرحله‌ای، چهار هسته‌ی هیدروژن (پروتون) به هم جوش می‌خورند تا یک هسته‌ی هلیوم بسازند. از این فرآیند، ذراتی به نام پوزیترون و نوترینو همراه با بسته‌های انرژی تابشی، به نام فوتون‌های پرتو گاما، رها می‌شوند. آن‌ها پراثرترین تابش نوری هستند و در مسیر رسیدن به سطح خورشید، بارها جذب و دوباره نشر می‌شوند و سرانجام در طول موج‌های گوناگون و کم‌انرژی‌تری از سطح تابش می‌شوند.

ناحیه‌ی تابشی منطقه‌ای است که انرژی مرکز را به صورت نوری از فوتون‌ها ترک می‌کند.

مرکز خورشید ناحیه‌ی مرکزی رخ‌دادن واکنش‌های هسته‌ای است. این بخش ۲ درصد از حجم خورشید را اشغال می‌کند؛ اما شامل ۶۰ درصد جرم آن است.

ناحیه‌ی همرفتی منطقه‌ای است که سلول‌های همرفتی یا جریان‌های بالا و پایین رونده‌ی گاز داغ، انرژی را با خود به بالا حمل می‌کنند.

نور سپهر سطح مرئی خورشید است.

خورشید در هر ثانیه مقدار انرژی رها می‌کند که برای پاسخ‌گویی به نیازهای همگی دنیا بیش از هزار سال کافی است.

فراتر از نورسپهر، جو خورشید آغاز می‌شود که شامل فاه‌سپهر و تاج است.


سفر یک فوتون

صدها هزار سال طول می‌کشد تا یک فوتون نور از مرکز خورشید به سطح آن برسد. برخورد این ذره با ذرات گاز به تغییرهای تصادفی در مسیر آن منجر می‌شود. در هر برخورد، فوتون انرژی از دست می‌دهد و ممکن است به چند فوتون دیگر تبدیل شود. این فوتون، که سفر خود را از مرکز به صورت پرتو گاما آغاز کرده بود، از سطح خورشید به صورت پرتو نور مرئی خارج می‌شود.

مسیر انرژی (نور) پس از ترک خورشید خط مستقیم است.

مسیر انرژی درون خورشید تصادفی است.


انرژی تابشی از سطح خورشید با سرعت نور در ۸/۳ دقیقه به سطح زمین می‌رسد.



ترکیبات خورشید
لایه‌های خارجی خورشید ۷۳ درصد هیدروژن، ۲۵ درصد هلیوم و ۲ درصد عناصر دیگر است. در مرکز، که در هر ثانیه بیش از ۶۰۰ میلیون تن هیدروژن به هلیوم تبدیل می‌شود، مقدار هیدروژن فقط حدود ۳۴ درصد و مقدار هلیوم حدود ۶۴ درصد است.

وقتی نوترینوها از میان مخزن آب می‌گذرند، آشکارسازها، درخشش‌های ضعیفی از نور را ثبت می‌کنند.

رصدخانه‌ی نوترینو ساودبری در اونتاریو، کانادا



نوترینوهای خورشیدی


نوترینوها در واکنش هسته‌ای در مرکز خورشید تولید می‌شوند و سپس در فضا سفر می‌کنند. بیش‌تر این ذرات روح‌مانند، از میان زمین و از بدن تک‌تک ما نیز عبور می‌کنند؛ اما تعداد کمی از آن‌ها را می‌توان با تلسکوپ نوترینو آشکار کرد. رصدخانه‌ی نوترینوی ساودبری در کانادا، ۲ کیلومتر زیر سطح زمین ساخته شده است تا از ورود پرتوهای کیهانی و هر پرتو و ذره‌ی دیگری به آن جلوگیری شود. اگر اثر پرتویی در آن‌جا ثبت شود، فقط ممکن است از نوترینوها باشد. اما اخترشناسان شگفت‌زده‌اند؛ زیرا نصف تعدادی که انتظار داشتند، نوترینوی خورشیدی یافته‌اند.

نوسان‌های خورشیدی

نورسپهر، سطح خورشید، بر اساس الگوهای پیچیده‌ای بالا و پایین می‌رود. بیش‌تر این ارتعاش‌ها یا نوسان‌های خورشیدی، در اثر امواج صوتی شکل می‌گیرند. این اصوات زیر سطح، در منطقه‌ی هم‌رفتی، تولید و همان‌جا زندانی می‌شوند. دانشمندان می‌توانند با نقشه‌برداری دقیق از الگوهای ارتعاشی نورسپهر، به ساختار درونی خورشید پی ببرند.

خطوط، نشان‌دهنده‌ی امواج ضربه در اطراف سلول‌های هم‌رفتی است.

امواج ضربه به سوی خارج پراکنده می‌شوند.




خورشیدلرزه

ممکن است برخی نوسان‌های خورشیدی به سبب خورشیدلرزه باشند. این‌ها موج‌ضربه‌هایی هستند که از لایه‌ی سلول‌های هم‌رفتی، جریان‌های آشفته‌ی گاز داغ، در همه‌جا جای خورشید پراکنده می‌شوند. انرژی‌ای که این امواج ضربه حمل می‌کنند، با انرژی‌ای که از انفجار ۱/۲ میلیارد تن مواد منفجره‌ی قوی رها می‌شود، برابر است.

تحولات نظریه‌های خورشید

• در اوایل قرن نوزدهم، برخی دانشمندان بر این باور بودند که خورشید توده‌ی عظیمی از زغال در حال سوختن است. برخی تصور می‌کردند سطح خورشید پوشیده از کوه‌های آتش‌فشانی است یا در اثر برخورد شهاب‌سنگ‌ها با سطح آن گرم مانده است.



خورشید به شکل توده‌ای زغال مشتعل

• در سال ۱۸۵۴، فیزیکدان آلمانی هرمان فون هلمهولتز (۱۸۱۹ - ۱۸۹۴)، در نظریه‌ای اعلام کرد که دلیل گرم بودن خورشید منقبض شدن آن در اثر وزن خودش است.


• دانشمندان در دهه‌ی ۱۹۲۰ دریافتند که واکنش‌های هسته‌ای عامل تولید حرارت در خورشید است.

• در سال ۱۹۳۸، دو فیزیکدان آلمانی، هانس بته (۱۹۰۶ - ۱۹۶۷) و کارل فون وایتس زکر (۱۹۱۲ - ۲۰۰۷)، به‌طور جداگانه به این موضوع پی بردند که چگونه درون خورشید هیدروژن به هلیوم تبدیل می‌شود.

بیش‌تر بدانیم

اخترشناسی پرتو گاما ۳۶ تلسکوپ‌های عجیب ۴۰ سطح خورشید ۱۷۶، جو خورشید ۱۷۸ ویژگی‌های ستاره‌ها ۱۸۸ چرخه‌ی زندگی ستاره‌ها ۱۹۰

نواحی‌ای که سطح خورشید بالا می‌آید. نواحی‌ای که سطح خورشید پایین می‌رود.



تصویر رایانه‌ای از الگوهای نوسانی خورشید

شناسنامه	
فاصله از زمین	۱۴۷/۱ میلیون کیلومتر
قطر	۱/۴ میلیون کیلومتر
جرم (زمین = ۱)	۳۳۰۰۰۰
چگالی متوسط (آب = ۱)	۱/۴۱
درخشندگی	۳۹۰ کوین تیلیون (۱۰ ^{۱۸}) مگاوات
دمای متوسط سطحی	۵۵۰۰ درجه‌ی سانتی‌گراد
دمای مرکز	۱۵ میلیون درجه‌ی سانتی‌گراد
دوره‌ی تناوب چرخش	۲۵/۴ روز (در استوا)
سن	۴/۶ میلیارد سال

سطح خورشید

دانه‌دانه شدن سطح به سبب وجود سلول‌های همرفتی، همان جریان‌های چرخان گاز داغ است؛ درست مثل سوپی که می‌جوشد. قطر دانه‌ها حدود هزار کیلومتر است.

فرش مغناطیسی شامل حلقه‌های مغناطیسی است که از سراسر سطح خورشید بیرون زده‌اند.

ریانه

امواج ضربه‌ای حاصل از یک شراره، در سطح پراکنده می‌شوند.

شراره‌ها، انفجارهایی در لایه‌های پایینی جو هستند.

نور سپهر

قرص مرئی خورشید یا آنچه سطح خورشید فرض می‌کنیم، نورسپهر نام دارد. انرژی‌ای که از واکنش هسته‌ای درون خورشید رها می‌شود، پس از هزاران سال طی کردن مسیری از مرکز خورشید به بالا، سرانجام به صورت پرتو نوری از نورسپهر، به فضا پراکنده می‌شود. ۴۰۰ سال پیش، که گالیله نخستین بار خورشید را از درون تلسکوپ رصد کرد، با دیدن علائم تیره‌ای بر سطح درخشان آن شگفت‌زده شد. این لکه‌های خورشیدی، در اثر میدان‌های مغناطیسی درون خورشید ایجاد می‌شوند.

نورسپهر مانند سطح زمین جامد و سخت نیست؛ بلکه دریای خروشان از گاز تابان به عمق ۵۰۰ کیلومتر و نشان دهنده‌ی جریان‌های گاز داغ و کدری است که از درون خورشید بالا می‌آیند. این گازها در نورسپهر شفاف می‌شوند و به این ترتیب، نور به فضا پراکنده می‌شود. دما در پایین نورسپهر، به ۸۵۰۰ درجه و در بالای آن به ۴۲۰۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسند. دمای متوسط سطح خورشید ۵۵۰۰ درجه‌ی سانتی‌گراد است. اخترشناسان، با تحلیل نور نورسپهر به کمک یک طیف‌نگار، می‌گویند که خورشید بیش‌تر از هیدروژن و هلیوم تشکیل شده است.

لکه‌ی خورشیدی سطح دانه دانه

لکه‌های خورشیدی

لکه‌های تیره یا لکه‌های خورشیدی، پیوسته بر سطح نورسپهر ظاهر می‌شوند. ابعاد آن‌ها متنوع است؛ از لکه‌های کوچک، به نام روزنه گرفته که قطرشان کمتر از هزار کیلومتر است تا مجموعه‌هایی به نام گروه لکه‌ها که گاه تا ۱۰۰ هزار کیلومتر، ۸ برابر قطر زمین، هم گسترده می‌شوند. ممکن است عمر لکه‌های خورشیدی، از چند ساعت تا چند هفته باشد.

ساختار لکه‌های خورشیدی

لکه‌های خورشیدی حفره‌هایی با عمق کم در نورسپهرند که در آن‌جا تجمع میدان‌های مغناطیسی قوی، جریان‌های همرفتی گاز داغ را زیر سطح متوقف می‌کند تا به سطح نرسند. لکه‌های خورشیدی حدود ۱۵۰۰ درجه‌ی سانتی‌گراد از سایر بخش‌های نورسپهر خنک‌ترند و فقط به این سبب که اطرافشان بسیار درخشان است، تیره به نظر می‌رسند. اگر آن‌ها را به تنهایی می‌دیدیم، سرخ درخشان بودند.

ناحیه‌ی خنک‌تر زیر نورسپهر گسترده شده است.

نیم‌سایه ناحیه‌ی روشن‌تر و داغ‌تر اطراف سایه است. سایه مرکز تیره و خنک‌تر لکه‌ی خورشیدی است.

زبان، توده‌ای از گاز در حال چرخش در جو خورشید است.

رشته‌ها زبانه‌هایی هستند که در لبه‌ی خورشید قرار نگرفته‌اند و در برابر سطح درخشان، تیره دیده می‌شوند.

مشعل‌ها نواحی داغ و سفیدی هستند که پیش و پس از لکه‌های خورشیدی ظاهر می‌شوند.


سیخک‌های بزرگ در نزدیکی قطب‌های خورشید ظاهر می‌شوند و چهار بار بیشتر از اندازه‌ی سیخک‌ها در فضا کشیده می‌شوند.

گروه لکه‌های خورشیدی

سیخک‌ها فوران‌های گازی‌اند.


چرخه‌ی لکه‌های خورشیدی

تعداد لکه‌های خورشیدی در چرخه‌ای ۱۱ ساله، افزایش و کاهش می‌یابد. نخستین لکه‌های هر چرخه، در عرض‌های دورتر از استوا دیده می‌شوند. تعداد آن‌ها به تدریج بیش‌تر می‌شود و بیش‌تر و بیش‌تر به استوا نزدیک می‌شوند تا چرخه به اوج خود برسد. شاید این چرخه به این سبب ایجاد می‌شود که بخش‌های گوناگون سطح خورشید، با سرعت‌های متفاوتی می‌چرخد و موجب می‌شود نوارهای فعالیت مغناطیسی به سوی استوا کشیده شوند. آخرین کمین‌های خورشیدی در سال ۲۰۰۶ رخ داد و پیش‌بینی می‌شود پیشینه‌ی بعدی فعالیت خورشیدی، سال ۲۰۱۱ یا ۲۰۱۲ باشد.




لکه‌های خورشیدی مغناطیسی

لکه‌های خورشیدی در نواحی‌ای پدیدار می‌شوند که فعالیت مغناطیسی بسیار شدید است و به نواحی فعال مشهورند. میدان‌های مغناطیسی درون خورشید به سبب سرعت‌های متفاوت چرخش سطح خورشید، بسیار آشفته و درهم هستند. جریان‌های آشفته‌ی گاز در نورسپهر، موجب شکل‌گیری حلقه‌های مغناطیسی می‌شود که از سطح بیرون می‌زنند و لکه‌ها را شکل می‌دهند. یک انتهای این حلقه‌ی مغناطیسی قطب شمال و انتهای دیگرش قطب جنوب است.



تلسکوپ‌های خورشیدی

تلسکوپ‌های خورشیدی رصدخانه‌ی تلسکوپی نور مرئی است که خورشید را با آینه‌ای متحرک (به نام هلیوستات) بر فراز یک برج دنبال می‌کند. هلیوستات نور خورشید را از درون لوله‌ای عمودی و ثابت به سوی ابزارهای اندازه‌گیری در سطح زمین بازتاب می‌کند. در برخی برج‌های خورشیدی، خلأ حاکم است و هوا بیرون رانده شده است تا حرارت خورشید، هوا را گرم و آشفته نکند و تصویر خراب نشود.



مردم روی رودخانه‌ی یخ‌زده شهر بازی راه انداخته‌اند.




رودخانه‌ی تیمر، لندن، دوران عصر یخ کوچک

فعالیت‌های خورشید بر آب و هوا

برخی دانشمندان تصور می‌کنند که فعالیت‌های خورشید بر آب و هوای زمین تأثیر می‌گذارد، به این ترتیب که دوران‌های آب و هوای خنک‌تر، به کم شدن فعالیت‌های خورشیدی بستگی دارد. یکی از چنین دوره‌هایی بین سال‌های ۱۶۴۵ تا ۱۷۱۵ اتفاق افتاد که خورشید تقریباً هیچ لکه‌ای نداشت و به نظر می‌رسید چرخه‌ی لکه‌های خورشیدی متوقف شده است. در نتیجه، شمال اروپا وارد دوره‌ای از آب و هوای سرد و غیر عادی شد که به عصر یخ کوچک مشهور شده است.

سرعت چرخش

خورشید کروی گازی است؛ به این سبب، تمامی بخش‌های آن مانند یک جسم جامد، با سرعت یکسانی نمی‌چرخد. یک دور چرخش استوای خورشید تقریباً ۲۵ روز و نواحی قطبی ۳۵ روز طول می‌کشد. نحوه‌ی نوسان یا لرزش سطح خورشید نشان می‌دهد که بخش درونی خورشید، مانند تویی جامد، با دوره‌ی تناوب چرخش ۲۷ روزه دور خود می‌چرخد.



رصدخانه‌های خورشیدی

نام	مکان	نوع	رصدها
رصدخانه‌ی خورشیدی بیگمیر	ایالات متحده	نور مرئی	نواحی فعال
گنگ (گروه شبکه‌ی جهانی نوسان‌ها) GONG	شش مکان در تمام دنیا	نور مرئی	نوسان‌های خورشیدی
رصدخانه‌ی خورشیدی کامیوکاتده	ژاپن	نوترینو	نوترینوی خورشیدی
تلسکوپ خورشیدی کیت‌پیک	ایالات متحده	نور مرئی	لکه‌های خورشیدی، طیف
خورشیدنگار رادیویی نویباما	ژاپن	رادیویی	نواحی فعال
رصدخانه‌ی قلمی ساکرامنتو	ایالات متحده	نور مرئی	تاج خورشید
رصدخانه‌ی نوترینو ساودبری	کانادا	نوترینو	نوترینوهای خورشید
برج خورشیدی مونت ویلسون	ایالات متحده	نور مرئی	لکه‌ها و نواحی فعال
رصدخانه‌ی تیده (مجموعه‌ی رصدخانه‌ی خورشیدی)	جزایر قناری	نور مرئی	مغناطیس‌نگاری، لکه‌ها، و نواحی فعال
تلسکوپ خورشیدی سوندی (دقیق‌ترین در جهان)	جزایر قناری	نور مرئی	لکه‌ها و نواحی فعال (مجهز به آپتیک سازگار)
تلسکوپ خورشیدی فن‌آوری پیش‌رفته (ATST)	هاوایی	نور مرئی	به قطر ۴ متر، بزرگ‌ترین تلسکوپ خورشیدی که در سال ۲۰۱۳ آماده می‌شود

پیش‌تر بدانیم


تحلیل نور ۲۴، درون خورشید ۱۷۴، جو خورشید ۱۷۸، ویژگی‌های ستاره‌ها ۱۸۸
چرخه‌ی زندگی ستاره‌ها ۱۹۰، اخترشناسی در روز ۲۶۶

جو خورشید

نورسپهر یا سطح درخشان و خیره‌کننده‌ی خورشید، مانع دیدن جو کم‌فروغ آن می‌شود. فقط در حین کسوف کلی، که ماه نور خورشید را سد می‌کند، جو آن به وضوح از زمین دیده می‌شود. جو خورشید از دو منطقه‌ی اصلی تشکیل شده است: فام‌سپهر و تاج. این نواحی اغلب با فوران‌ها و انفجارهای عظیمی به نام زبانه‌ها و شراره‌ها، به لرزه درمی‌آیند. به دلایلی که هنوز اخترشناسان به درستی درک نکرده‌اند، تاج بسیار داغ‌تر از نورسپهر است. به همین سبب، جو خورشید با آهنگ یک میلیون تن در هر ثانیه در فضا بخار می‌شود.


فام‌سپهر

درست بالای نورسپهر، فام‌سپهر قرار دارد که لایه‌ای کم‌چگال‌تر از گاز هیدروژن و هلیوم به قطر ۵ هزار کیلومتر است. دمای فام‌سپهر در نزدیکی نورسپهر حدود ۴ هزار درجه است؛ اما جایی که به مرز تاج می‌رسد، دما هم تا چند صد هزار درجه‌ی سانتی‌گراد افزایش می‌یابد. فوران‌های درون‌سوز گاز یا سیخک‌ها، از فام‌سپهر به تاج پرتاب می‌شوند. آن‌ها از لایه‌ی سلول‌های عظیم هم‌رفتی بلند می‌شوند؛ جایی که گاز داغ از درون خورشید بلند می‌شود و سپس به زیر سطح بازمی‌گردد.



این تصویر فرابنفش از فام‌سپهر را فضاپیمای سوهو گرفته است.

زبانه‌های خورشیدی



زبانه‌ها

ایرها و ورقه‌های عظیمی از گاز یا زبانه‌ها، از فام‌سپهر تا ارتفاع صدها هزار کیلومتری به داخل تاج کشیده می‌شوند. میدان‌های مغناطیسی بر فراز گروه لکه‌های خورشیدی به این زبانه‌ها شکل حلقه‌ای یا قوسی می‌دهند. ممکن است این گزها به صورت باران بر فام‌سپهر بارند یا به فضا فوران کنند.

چگالی تاج خورشید کمتر از یک نریلیونیوم (یک میلیون میلیونیوم) جو زمین است



در حین کسوف کلی، تاج مانند هاله‌ای سفیدرنگ دیده می‌شود که گاه می‌توان در آن ریشمها، حلقه‌ها و جریان‌هایی تاملنا کرد.



فضاپیمای خورشیدی

• اولیس فضاپیمای مشترک سازمان فضایی اروپا (اسا) و ناساست که در سال ۱۹۹۰ برای بررسی یاد خورشیدی پرتاب شد. مدار آن به‌گونه‌ای است که از نواحی قطبی خورشید عبور می‌کند؛ جایی که جریان‌های خرات پر سرعت را، که معمولاً از نزدیک زمین نمی‌گذرند، شکار می‌کند.

• سوهو (رصدخانه‌ی خورشیدی و خورشیدگره‌ای)؛ که در سال ۱۹۹۵ پرتاب شد، فضاپیمای مشترک اسا و ناساست که برای رصد تاج و نوسان‌های خورشید طراحی شده است. این رصدخانه حدود ۱/۵ میلیون کیلومتر از زمین فاصله دارد.


• تریس (کاوشگر تاج و منطقه‌ی گذار)، متعلق به ناساست که در سال ۱۹۹۸، برای بررسی تاج و مرز گذار و تغییر شدید دما میان فام‌سپهر و تاج پرتاب شد.

• استریو، جفت فضاپیمای ناساست که در سال ۲۰۰۶ پرتاب شد. یکی از آن دو یک میلیون کیلومتر جلوتر و دیگری یک میلیون کیلومتر عقبتر از زمین، سیاره‌ی ما را در مدار خود دنبال می‌کنند. آن‌ها به بررسی خورشید با دید استریو و سه بعدی و شناخت تاثیر فعالیت‌های خورشیدی بر زمین می‌پردازند.

• اینودی (طلوع) رصدخانه‌ی خورشیدی ژاپن در سال ۲۰۰۶ پرتاب شد و حاوی بزرگ‌ترین تلسکوپ خورشیدی ایکس و مرئی است که تاکنون به فضا رفته است. این رصدخانه طیف‌سنجی در پرتو فرابنفش دارد.




اولیس



باد خورشیدی

باد خورشیدی جریانی از ذرات پرتاب شده از خورشید است؛ از جمله الکترون‌ها و پروتون‌ها و میدان‌های مغناطیسی و جریان‌های الکتریکی منشأ آن‌ها که از تاج خورشید به سوی فضا جریان دارد. قدرت باد خورشیدی متغیر است و به شدت فعالیت‌های خورشیدی بستگی دارد. این باد تا ناحیه‌ای به نام خورشیدسپهر یا خورشیدکره، که تا ۱۵ میلیارد کیلومتری از خورشید گسترده شده، مؤثر است. باد خورشیدی با سرعت ۳۰۰ تا ۸۰۰ کیلومتر بر ثانیه از زمین عبور می‌کند. میدان مغناطیسی زمین بیش‌تر باد خورشیدی را منحرف می‌کند؛ اما بر اثر باد خورشیدی، سمت رو به خورشید میدانی فشرده دارد و آن‌سوی میدان مغناطیسی زمین، مانند دُمی در فضا کشیده می‌شود.



باد خورشیدی و میدان مغناطیسی زمین

شفق‌های قطبی

شفق‌های قطبی، بازی‌های خیره‌کننده‌ی نورهای رنگارنگ‌اند که گاه در آسمان نواحی قطبی زمین و عرض‌های بسیار شمالی یا جنوبی دیده می‌شوند. آن‌ها بر فراز قطب‌های مغناطیسی زمین و زمانی رخ می‌دهند که ذرات باد خورشیدی، در میدان مغناطیسی زمین به دام می‌افتند و با ملکول‌های هوا در جو بالایی زمین برخورد می‌کنند. هر رنگی در شفق‌های قطبی، نشان‌دهنده‌ی یونیده شدن گاز عنصر خاصی در جو زمین است.

در این تصویر پرتو ایکس، فام‌سپهر مانند قمری تیره ظاهر می‌شود؛ زیرا به اندازه‌ی کافی داغ نیست که پرتوهای ایکس تابش کند؛ اما در این طول موج، تاج روشن است.

نواحی تمرکز تاجی، نقاط روشن در این تصویر پرتو ایکس، مکان‌هایی هستند که گاز داغ در آن‌ها متمرکز شده است.

فام‌سپهر و زبانه‌ها را می‌توان در چین کسوف کلی به صورت حلقه‌ای باریک و صورتی رنگ دور قمر ماه دید.

گاز هیدروژن داغ سبب می‌شود که فام‌سپهر در نور مرئی صورتی به نظر برسد.

حفره‌های تاجی یا نقاط تیره، نواحی کم‌چگال تاج هستند که از آن‌ها جریان‌های پرسرعت ذرات وارد باد خورشیدی می‌شود.


در کسوف کلی، قمر تیره‌ی ماه، قمر خورشید را کاملاً می‌پوشاند و نواحی خارجی‌تر جو خورشید نمایان می‌شود.

تاج

تاج بلافاصله پس از فام‌سپهر آغاز می‌شود و میلیون‌ها کیلومتر در فضا کشیده شده است. تاج خارجی‌ترین لایه‌ی جو خورشید است و چون دورترین منطقه از کوره‌ی گرمابخش مرکز خورشید است، تصور می‌شود که باید سردترین بخش باشد. اما ممکن است دمای آن به ۳ میلیون درجه‌ی سانتی‌گراد هم برسد. یا وجود این، بسیار کم‌فروغ است؛ زیرا گاز تاج بسیار رقیق است. حباب‌هایی، که شامل میلیاردها تَن گازند، گاه از تاج به فضا فوران می‌کنند و موج‌ضربه‌هایی به درون باد خورشیدی می‌فرستند.

شراره‌ها

شراره‌های خورشیدی، انفجارهای شدید در فام‌سپهر و بر فراز گروه لکه‌های خورشیدی هستند که به سبب رها شدن انرژی مغناطیسی، ایجاد می‌شوند. این پدیده، فورانی از ذرات پُرانرژی و تابش‌هایی را به فضا می‌فرستد که ممکن است در برخورد با یون‌کره‌ی زمین (لایه‌ی باردار جو زمین)، ارتباطات رادیویی روی زمین را مختل کند. به علاوه، امکان دارد این سیل ذرات، در فضا به فضاانوردان آسیب برساند.



ممکن است شراره‌ی خورشیدی زبانه‌ای عظیم را با سرعت زیاد به فضا پرتاب کند. معمولاً شراره‌ها چند دقیقه پیش‌تر دوام ندارند؛ اما گاهی پیش می‌آید که تا چند ساعت هم باقی بمانند.

بیش‌تر بدانیم


- اخترشناسی قرائن‌ش ۳۲
- اخترشناسی پرتو ایکس ۳۴
- گرفت‌های خورشید ۱۸۵

گرفت‌های خورشید

ماه، در مدار ۲۷ روزه‌ی خود به دور زمین، گاه درست از جلو خورشید می‌گذرد و ما روی زمین، اگر در مسیر سایه‌ی آن قرار بگیریم، خورشیدگرفتگی می‌بینیم. در یکی از باشکوه‌ترین مناظر زیبای طبیعت، قرص تیره‌ی ماه به تدریج روی قرص خورشید می‌خزد. هر سال از نقاط گوناگون زمین، بین ۲ تا ۵ خورشیدگرفتگی (کسوف) متفاوت دیده می‌شود که اغلب به صورت جزئی‌اند. زمانی که ماه فقط بخشی از خورشید را می‌پوشاند، کسوف جزئی رخ می‌دهد که نسبت به کسوف کلی از مناطق بسیار بیش‌تری دیده می‌شود. زمانی که قرص خورشید کاملاً پنهان می‌شود، کسوف‌های کلی فقط از ناحیه‌ی باریکی از سطح زمین، درست در مسیر سایه‌ی ماه، دیده می‌شوند.

سایه‌ی ماه

سایه‌ای که ماه روی زمین می‌اندازد، مرکز تیره‌ای به نام سایه و ناحیه‌ی روشن‌تری اطراف آن به نام نیم‌سایه دارد. در زمان وقوع کسوف کلی، سایه مسیری منحنی به طول هزاران کیلومتر را روی سطح کره‌ی چرخان زمین طی می‌کند که پهنای آن در نواحی غیر قطبی کمتر از ۳۰۰ کیلومتر است.



کسوف کلی

تصادفاً اندازه‌ی ظاهری قرص ماه در آسمان زمین، با اندازه‌ی ظاهری قرص خورشید برابر است؛ زیرا خورشید، که تقریباً ۴۰۰ بار بزرگ‌تر از ماه است، ۴۰۰ بار نیز دورتر است. بنابراین، زمانی که این دو در یک خط قرار می‌گیرند، ماه کاملاً روی خورشید را می‌پوشاند. خورشید پنهان، آسمان تاریک و ستاره‌ها نمایان می‌شوند. فام‌سپهر صورتی و تاج سفید خورشید در اطراف قرص تیره‌ی ماه می‌درخشند. مدت کسوف کلی، یعنی زمانی که خورشید پوشیده است، بیش از هر متغیر دیگری به فاصله‌ی ماه از زمین بستگی دارد. هرچه ماه نزدیک‌تر باشد، کسوف طولانی‌تر است. کسوف‌های کلی هر یکی دو سال یک‌بار رخ می‌دهند؛

اما هر بار سایه‌ی ماه فقط کسری از ادرصد زمین را زیر تاریکی خود می‌برد که ممکن است بیش‌تر آن نیز در اقیانوس رخ دهد. به طور میانگین، هر نقطه‌ی خاص روی زمین در حدود هر ۳۶۰ سال یک‌بار شاهد یک کسوف کلی است. به همین سبب، کسوف‌جویان و خورشیدشناسان، چاره‌ای جز سفر کردن به مسیر باریک کسوف برای دیدن خورشیدگرفتگی‌های پیاپی ندارند.

در چند دقیقه‌ی کسوف کلی، قرص خورشید کاملاً پشت قرص ماه پنهان می‌شود.

با طی شدن مراحل کسوف، بخش‌های بیش‌تر و بیش‌تری از خورشید پنهان می‌شود.

تلسکوپ کک در رصدخانه‌ی موناکی هاوائی، یک کسوف کلی طولانی در ژوئیه سال ۱۹۹۱ در آن‌جا رخ داد.

این کسوف صبح زود، با طلوع خورشید، آغاز شد



تصویری با چند بار نوردهی از مراحل کسوف کلی بر فراز رصدخانه‌ی موناکی هاوائی.

در مرحله‌ی جزئی کسوف، به‌منظر می‌رسد که بخشی از قرص خورشید گاز زده و کنده شده است.

اخطار: چه در حالت عادی و چه در حین کسوف، هرگز مستقیم به خورشید نگاه نکنید. زیرا نور شدید آن به چشم آسیب می‌زند. کسوف را باید با صافی‌های مخصوص خورشیدی یا به روش غیر مستقیم تماشا کرد. فقط در هنگام کسوف کلی، نور آن به اندازه‌ای کم می‌شود که بتوان با چشم، زیبایی تاج و آسمان تاریک شده را دید.

زمانی که زمین و ماه در نزدیک‌ترین فاصله از یکدیگرند و خورشید در دورترین فاصله از زمین است امکان دارد کسوف کلی تا ۷/۵ دقیقه طول بکشد، اما گرفت کلی معمولاً خیلی کوتاه‌تر است.



کسوف در آسمان ایران

پس از گرفت ۱۷ ثانیه‌ای دوم آبان ۱۳۷۴ و گرفت به‌یاد ماندنی بیستم مرداد ۱۳۷۸، که کمتر از ۲ دقیقه بود، ایران تا آخرین ساعات اسفند سال ۱۴۱۲ (بیستم مارس ۲۰۳۴) میزبان خورشیدگرفتگی کلی نخواهد بود. در این مدت، از جمله در چهاردهم دی ۱۳۸۹ و دوازدهم آبان ۱۳۹۲، بارها کسوف‌های جزئی در آسمان ایران رخ خواهد داد.

مجموعان تمدن باستانی مایا در آمریکای مرکزی، با محاسبات دقیق این جدول‌ها را تهیه کردند تا وقوع کسوف‌ها را پیش‌بینی کنند. پیش‌بینی گرفت‌ها را منجمان بابل در امپراتوری هخامنشی نیز در حدود ۲۵۰۰ سال پیش انجام می‌دادند.

جدول‌های کسوف قوم مایا




حلقه‌ای درخشان در اطراف قرص ماه دیده می‌شود. ماه کمی کوچکتر از خورشید دیده می‌شود.

کسوف حلقوی

وقتی ماه در دورترین فاصله نسبت به زمین قرار دارد، اندازه‌ی آن در آسمان به اندازه‌ی کافی بزرگ نیست که حین کسوف، قرص خورشید را به‌طور کامل بپوشاند. به این ترتیب، به جای کسوف کلی، کسوف حلقوی رخ می‌دهد. وقتی ماه دقیقاً جلو خورشید است، حلقه‌ی درخشان‌ی از نورسپهر خورشید، مانند حلقه‌ی آتش، همچنان دور لبه‌ی ماه دیده می‌شود. امکان دارد کسوف‌های حلقوی تا ۱۲ دقیقه طول بکشند؛ اما در اغلب آن‌ها، تاج و فام‌سپهر پدیدار نمی‌شوند و آسمان نیز چندان تاریک نمی‌شود.



سایه‌ی ماه هنگام کسوف حلقوی



آخرین باریک‌ی درخشان از قرص خورشید، مانند الماسی در حلقه‌ای که فام‌سپهر و تاج درونی ایجاد کرده است، دیده می‌شود.

جلوه‌های کسوف

درست چند ثانیه پیش یا پس از مرحله‌ی کلی کسوف، باریک‌ی نور خورشید در حال پنهان شدن یا در حال نمایان شدن، از میان پستی و بلندی‌ها و کوهستان‌های لبه‌ی ماه می‌درخشد. گاه در این لحظه، نقطه‌ی نور بسیار درخشان و زیبایی به نام حلقه‌ی الماس، شکل می‌گیرد. گاهی هم قوسی از نقاط درخشان کنار هم، مانند رشته‌ای مروارید، دیده می‌شود که آن‌ها را تسبیح‌دانه‌های بیلی می‌نامند.

حلقه‌ی الماس

اکتشاف‌های علمی در کسوف‌ها

• اخترشناس انگلیسی، نورمن لاکپر (۱۹۲۰ - ۱۸۳۶)، حین کسوفی کلی در سال ۱۸۶۸، گاز ناشناخته‌ای را در فام‌سپهر خورشید شناسایی کرد. او نام این گاز را هلیوم گذاشت که از واژه‌ی یونانی هلیوس، به معنی خورشید آمده بود. هلیوم تا سال ۱۸۹۵ روی زمین کشف نشد.


• سر آرتور ادینگتون با استفاده از کسوف کلی سال ۱۹۱۹، نظریه‌ی آلبرت اینشتین را، که پیش‌بینی می‌کرد نور ستاره‌های دور دست به سبب گرانش خورشید منحرف می‌شوند، اثبات کرد. حین کسوف، او موقعیت ستاره‌های نزدیک در آسمان را سنجید و نشان داد که خورشید نور آن‌ها را اندکی منحرف کرده است. اینشتین در نظریه‌ی نسبیت عام خود این موضوع را پیش‌بینی کرده بود.

پیش‌تر بدانیم

منظومه‌ی شمسی ۹۴، زمین ۱۰۲، ماه ۱۱۰، درون خورشید ۱۷۴، سطح خورشید ۱۷۶، جو خورشید ۱۷۸ مدار زمین ۲۶۴، اخترشناسی در روز ۲۶۶

کسوف‌های کلی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳

تاریخ	مدت	مکان دیده شدن
۱۱ مرداد ۱۳۸۷	۲ دقیقه و ۲۷ ثانیه	گرن‌لند، قطب شمال، روسیه، مغولستان، چین
۱ مرداد ۱۳۸۸	۶ دقیقه و ۳۹ ثانیه	هند، چین و اقیانوس آرام
۲۰ تیر ۱۳۸۹	۵ دقیقه و ۲۰ ثانیه	جنوب اقیانوس آرام، شیلی و آرژانتین
۲۳ آبان ۱۳۹۱	۴ دقیقه و ۲ ثانیه	استرالیا و جنوب اقیانوس آرام
۱۲ آبان ۱۳۹۲	حلقوی - کلی (۱ دقیقه و ۴۰ ثانیه)	اقیانوس اطلس و آفریقا
۲۹ اسفند ۱۳۹۳	۲ دقیقه و ۴۷ ثانیه	شمال اقیانوس اطلس و قطب شمال




مسیرها نشان می‌دهد که کسوف‌های کلی تا سال ۱۴۰۳ کجاها دیده می‌شوند.

اندازه‌های ستاره‌ها

از آن‌جا که هنوز نمی‌توانیم به خارج از منظومه‌ی شمسی سفر کنیم، باید تا جایی که می‌توانیم، از راه دور درباره‌ی ستاره‌ها اطلاعاتی به‌دست بیاوریم. اخترشناسان فقط باریکه‌ی نور ستاره‌ها را در اختیار دارند و با تحلیل همین نور ضعیف، می‌توانند درخشندگی، رنگ و دمای ستاره‌ها را دریابند. آنان با شکستن نور ستاره‌ها به رنگ‌های تشکیل‌دهنده‌ی آن‌ها، یعنی با طیف‌سنجی، می‌توانند دریابند که ستاره‌ها از چه موادی تشکیل شده‌اند و سرعت چرخش آن‌ها چه‌قدر است. اخترشناسان با تعیین دقیق موقعیت آن‌ها، می‌توانند پیش‌بینی کنند که ستاره‌ها هزاران سال پس از امروز به کجای آسمان می‌رسند و در فضا چگونه حرکت می‌کنند.

آسمان پرستاره

در یک شب تاریک و پرستاره، می‌توانیم تا ۲۵۰۰ ستاره را با چشم غیر مسلح ببینیم. آن‌ها به چشم ما کمی بیش از نقاط چشمک‌زن می‌آیند؛ برخی درخشان‌تر از دیگران هستند، برخی در خوشه‌هایی دور هم جمع شده‌اند و این‌جا و آن‌جا، ستاره‌ای قرمز یا آبی خودنمایی می‌کند. همه‌ی آن‌چه درباره‌ی ستاره‌ها می‌دانیم، از بررسی نور آن‌ها آموخته‌ایم. می‌دانیم که خورشیدهایی بسیار دوردست‌اند و مانند خورشید ما، انرژی خود را از انرژی هسته‌ای تأمین می‌کنند. می‌دانیم که چه‌طور متولد می‌شوند، چگونه زندگی می‌کنند و به چه ترتیبی می‌میرند. اخترشناسان ستاره‌ها را بر اساس درخشندگی (قدر) و رنگ آن‌ها (رده‌ی طیفی)، طبقه‌بندی می‌کنند.



قدر


اخترشناسان میزان روشنایی جرم‌های آسمانی را با واحد قدر بیان می‌کنند. هرچه عدد قدر کوچک‌تر باشد، ستاره پرنورتر است.

درخشان‌ترین ستاره‌ها، قدرهای منفی دارند. در شیی تاریک، کم‌نورترین ستاره‌ای که با چشم غیر مسلح دیده می‌شود، حدود قدر ۶ است. هر پله در مقیاس قدر، نشان‌دهنده‌ی ۲/۵ بار کاهش یا افزایش درخشندگی است.

رده‌های طیفی

رنگ هر ستاره به دمای آن بستگی دارد: داغ‌ترین ستاره‌ها آبی - سفید و خنک‌ترین‌ها نارنجی - قرمزند. این قانون طبیعت است. هرچه جسم تابان داغ‌تر باشد، آبی‌تر و هرچه سردتر باشد، سرخ‌تر می‌درخشد؛ درست مانند سوزنی که روی اجاق گرم می‌کنیم. اخترشناسان ستاره‌ها را به هفت رده‌ی طیفی طبقه‌بندی کرده‌اند: O, B, A, F, G, K, M. در این میان، رده‌ی O داغ‌ترین و رده‌ی M خنک‌ترین (قرمزترین) است. هر رده‌ی طیفی به ۱۰ زیررده تقسیم می‌شود که از صفر تا ۹ (داغ‌ترین تا خنک‌ترین) شماره‌گذاری شده است. خورشید از رده‌ی G۲ است.

مقیاس قدر



رده‌ی O (۳۰,۰۰۰ تا ۲۹,۰۰۰ درجه‌ی سانتی‌گراد)	۴۰,۰۰۰
رده‌ی B (۲۸,۰۰۰ تا ۹,۷۰۰ درجه‌ی سانتی‌گراد)	۲۸,۰۰۰
رده‌ی A (۹,۶۰۰ تا ۷,۲۰۰ درجه‌ی سانتی‌گراد)	۹,۶۰۰
رده‌ی F (۷,۱۰۰ تا ۵,۸۰۰ درجه‌ی سانتی‌گراد)	۷,۱۰۰
رده‌ی G (۵,۷۰۰ تا ۴,۷۰۰ درجه‌ی سانتی‌گراد)	۵,۷۰۰
رده‌ی K (۴,۶۰۰ تا ۳,۳۰۰ درجه‌ی سانتی‌گراد)	۴,۶۰۰
رده‌ی M (۳,۲۰۰ تا ۲,۱۰۰ درجه‌ی سانتی‌گراد)	۳,۲۰۰

درخشان‌ترین ستاره‌ها

نام	قدر	رده‌ی طیفی	فاصله به سال نوری
شهابنگ	۱/۴ - (ستاره‌ی دوتایی)	A۱، کوتوله‌ی سفید	۸/۶
سهیل	۰/۶ -	F۰	۳۱۳
آلفا - قنطورس	۰/۳ - (ستاره‌ی سه تایی)	M۵، K۱، G۲	۴/۴
سماک راجع	۰/۰ -	K۲	۳۶/۷
نسر واقع	۰/۰ -	A۰	۲۵/۳
عیوق	۰/۱ - (ستاره‌ی دوتایی)	G۶، G۲	۴۲/۲
رجل الجبار	۰/۲ -	B۸	۷۷۳
شعرای شامی	۰/۴ - (ستاره‌ی دوتایی)	F۵، کوتوله‌ی سفید	۱۱/۴
آخر النهر	۰/۵ -	B۳	۱۴۴
یدالجوزا	۰/۵ - (ستاره‌ی متغیر)	M۲	۴۲۷

بیش‌تر بدانیم

تحلیل نور ۲۴ تابش‌هایی از فضا ۲۶، درون خورشید ۱۷۴ ستاره‌ها چه‌قدر دورند؟ ۱۸۶، ویژگی‌های ستاره‌ها ۱۸۸، چرخش زندگی ستاره‌ها ۱۹۰


تحلیل طیفی

نور از امواج الکترومغناطیس با طول موج‌های گوناگون تشکیل شده است. طیف‌نگار، نور ستاره را به طول موج‌های گوناگون می‌شکند و نواری از رنگ‌ها می‌سازد که نام آن طیف است. عناصر جو ستاره‌ها، نور را در برخی طول موج‌ها جذب می‌کند و خطوط تیره‌ی جذبی روی طیف به جا می‌گذارد. هر عنصر الگوی متفاوتی از خطوط ارائه می‌دهد. اخترشناسان با بررسی این خطوط روی طیف، درمی‌یابند که ستاره از چه عناصری تشکیل شده است.




اثر دوپلر

طول موج‌های خطوط تیره در طیف یک ستاره، تحت تأثیر حرکت ستاره قرار می‌گیرند. این اثر را اثر دوپلر می‌نامند. حرکت ستاره به سوی زمین، طول موج‌ها را کوتاه و خطوط را کمی به سوی انتهای آبی طیف منتقل می‌کند (انتقال به آبی). حرکت ستاره در جهت دور شدن از زمین، طول موج‌ها را بلند و خطوط را کمی به سوی انتهای قرمز طیف منتقل می‌کند (انتقال به سرخ). اخترشناسان با اندازه‌گیری این تغییرات جزئی در طول موج‌ها، می‌توانند سرعت ستاره را در امتداد خط دید ما محاسبه کنند.



حرکت ویژه

ستاره‌ها آن‌قدر دورند که معمولاً متوجه حرکت آن‌ها در فضا نمی‌شویم. بخشی از این حرکت فضایی، که روی کره‌ی آسمان تصویر می‌شود، حرکت ویژه نام دارد و به تدریج، شکل صورت‌های فلکی را تغییر می‌دهد. اخترشناسان با تعیین دقیق موقعیت ستاره‌های یک صورت فلکی در طی چند سال، می‌توانند شکل گذشته و آینده‌ی آن صورت فلکی را حدس بزنند.



ملاقات، امروز




ملاقات صد هزار سال بعد



عوارض سطحی

بیش‌تر ستاره‌ها آن‌قدر دورند که حتی با تلسکوپ‌های بزرگ هم نمی‌توان عوارضی روی سطح آن‌ها را تشخیص داد. اما در مورد برخی ستاره‌ها، آشکارسازی عوارض سطحی امکان‌پذیر است. در این تصویر از قرص ستاره‌ی ابرغول یدالجوزاء لکه‌ای نورانی می‌بینید که ممکن است بالا آمدن گاز داغ به سطح ستاره باشد.




فهم ستاره‌ها

- مقیاس قدر برای تعیین روشنایی ستاره‌ها را ابرخس یونانی حدود ۱۳۰ سال پیش از میلاد ابداع کرد.
- در سال ۱۷۱۸، ادmond هالی وقتی متوجه حرکت ستاره‌هایی شد که ابرخس حدود ۱۳۰ سال پیش از میلاد ثبت کرده بود، حرکت ویژه را کشف کرد.
- در سال ۱۸۱۴، یوزف فون فرانهور با استفاده از دستگاه طیف‌سنج، نور خورشید را تحلیل کرد. او دریافت که طیف خورشید پر از خطوط تیره‌ی جذبی است.
- در سال ۱۸۶۸، ویلیام هاگینس با استفاده از اثر دوپلر دریافت که ستاره‌ی شباهنگ با سرعت ۴۷ کیلومتر بر ثانیه از خورشید (و ما) دور می‌شود.

ستاره‌های متغیر

ستاره‌ها، آن‌طور که به نظر می‌رسند، مدام و یک‌نواخت نمی‌درخشند. ستاره‌هایی را که روشنائی آن‌ها تغییر می‌کند، ستاره‌های متغیر می‌نامند. در برخی متغیرها، مانند تپنده‌ها، گرفتگی‌ها و چرخنده‌ها در تغییرهای خود، الگو یا دوره‌ی تناوب منظمی دارند. پیش‌بینی عمل دیگر متغیرها، مانند متغیرهای فورانی و فاجعه‌بار، مشکل‌تر است. تغییر روشنائی ستاره ممکن است به سبب تغییر در میزان نور ارسال شده از آن، یعنی تغییر در درخشندگی واقعی یا به سبب پوشیده شدن سطح ستاره با ابرهای غبار متحرک یا یک ستاره‌ی هم‌دم باشد. اخترشناسان با رسم نمودار یا منحنی نور روشنائی ستاره، درمی‌یابند که دلیل تغییر روشنائی در هر ستاره چیست.




همان بخش از دجابه پس از نواخت

موقعیت نواخت
پیشین

نواختی در صورت فلکی دجابه، ۱۹۷۵

متغیرهای فاجعه‌بار

ستاره‌هایی که ناگهان دچار تغییرهای شدید و گاه به شدت درخشان می‌شوند، متغیرهای فاجعه‌بار نام دارند. آن‌ها شامل نوخترها، ابر نوخترها، و فوران‌های خاص هستند. نواخت زمانی رخ می‌دهد که یک ستاره‌ی کوتوله‌ی سفید در منظومه‌ی دوتایی، از هم‌دم خود گاز هیدروژن می‌رباید. گاز روی هم انباشته می‌شود تا یک انفجار هسته‌ای رخ دهد. در سال ۱۹۷۵، نوختری در صورت فلکی دجابه رخ داد که موجب شد ستاره‌ی دوتایی مدت کوتاهی ۴۰ میلیون بار درخشان‌تر شود.



اتا - شاه‌تخته و
سحابی سوراخ کلید

سحابی بزرگ شاه‌تخته، به قطر حدود ۳۰۰ سال نوری، شامل سحابی سوراخ کلید است.

سحابی سوراخ کلید ابر تیره‌ای از گاز و غبار است که در پیش‌زمینه درخشان سحابی شاه‌تخته، تیره به نظر می‌رسد.


سحابی سوراخ کلید در فاصله‌ی حدود ۹ هزار سال نوری قرار دارد.

در روزگار ما، بیش‌تر انرژی اتا - شاه‌تخته، به صورت تابش فروسرخ به ما می‌رسد؛ زیرا نور مرئی آن در پیلای گاز و غبار اطراف جذب می‌شود.

سحابی اتا - شاه‌تخته ستاره را در پوششی از غبار پوشانده است.

اتا - شاه‌تخته ابرغولی درخشان با جرم حدود ۱۰۰ برابر خورشید است؛ بنابراین، یکی از پرچم‌ترین ستاره‌های کهکشان به‌شمار می‌رود.

درخشندگی سحابی متغیر هبند نیز با بازتاب نور متغیر ستاره‌ی T ثور تغییر می‌کند.



متغیرهای فورانی

ستاره‌هایی که بدون هیچ الگوی منظمی ناگهان درخشان و سپس ناپدید می‌شوند، متغیرهای فورانی نام دارند. این درخشندگی، در پی تغییرات شدیدی که در جو خارجی آن‌ها رخ می‌دهد، تغییر می‌کند. برخی ستاره‌ها ابری از گاز و غبار به بیرون پرتاب می‌کنند که پس از فورانی در روشنائی آن‌ها، به مرور محو می‌شود. بقیه، مانند ستاره‌های T ثوری، ستاره‌های نوزادند که هنوز در حال انقباض هستند تا به اندازه‌ی مناسب برسند. اما در همین حال، نادهای ستاره که از آن می‌وزند، گاز و غبار پیلای پیش‌ستاره را پراکنده می‌کنند.

اتا - شاه‌تخته

روشنائی ستاره‌ی اتا - شاه‌تخته از سال ۱۶۷۷، که ادموند هالی آن را کشف کرد، تا به حال به نحو شگفت‌انگیزی تغییر کرده است. در اواسط قرن نوزدهم، این ستاره، که به قدر ۰/۸- رسیده بود، دومین ستاره‌ی پرنور آسمان بود. اما ناگهان تا قدر ۶+ مرز دید چشم غیر مسلح افت روشنائی پیدا کرد. اتا - شاه‌تخته ستاره‌ای بسیار پُرچرم و ناآرام است که در نیمه‌ی قرن نوزدهم با فورانی عظیم، ابر ضخیمی از گاز و غبار پوشاننده به بیرون پرتاب کرد که امروز به نام سحابی اتا - شاه‌تخته مشهور است. این غبار متحرک و لایه‌های خارجی ناپایدار ستاره موجب تغییرات در درخشندگی آن می‌شوند. اتا - شاه‌تخته یک ستاره‌ی متغیر فورانی است.

فهرست
تاریخچه
تاریخچه
تاریخچه

متغیرهای تپنده




معمولاً وقتی ستاره‌ها به پایان زندگی خود نزدیک می‌شوند، می‌تپند و درخشندگی، دما و اندازه‌ی آن‌ها تغییر می‌کند. ستاره‌های می‌راگونه (که به نام ستاره‌ی می‌را یا اومیکرون - قیطس نام‌گذاری شده‌اند) غول‌های سرخ‌اند که در دوره‌ای ۸۰ تا ۱۰۰۰ روزه می‌تپند و بورشان چندین قدر تغییر می‌کند. متغیرهای قیفاووسی (که به نام ستاره‌ی دلتا - قیفاووس نام‌گذاری شده‌اند) ابرغول‌های رددند که در دوره‌ای یک تا ۶۰ روزه می‌تپند.

متغیرهای گرفتی

برخی جفت ستاره‌ها، آن‌قدر به هم نزدیک‌اند که مانند تک‌ستاره به نظر می‌رسند. اما اگر مدار آن‌ها در مقایسه با زمین رله دیده شود، هر ستاره مدام از جلو هم‌دم خود می‌گذرد و سطح آن را می‌پوشاند. این کسوف، تمام نور رسیده به زمین را کاهش می‌دهد و ستاره کم‌بورت‌تر به نظر می‌رسد.

متغیرهای ذورانی

درخشندگی برخی ستاره‌ها تغییر می‌کند. ربر سطح آن‌ها با لکه‌های تیره‌ای مانند لکه‌های خورشیدی، اما عظیم‌تر، پوشیده شده است. با چرخش ستاره، لکه‌های ظاهر شده گاه روبه‌ما می‌آید و درخشندگی ستاره تعبیر می‌کند. یکی از این ستاره‌ها، ستاره‌ی AB ماهی طلایی، ستاره‌ی کوتوله‌ی سردی در فاصله‌ی حدود ۶۵ سال نوری از خورشید است درخشندگی آن در مدت ۱۲.۴ ساعت، مدسی که یک دور چرخش آن طول می‌کشد، ۰.۱۵ قدر تغییر می‌کند.



نخستین‌های متغیرها

• اخترشناسان چینی ۱۳۰۰ سال پیش از میلاد، نواختاری را نزدیک ستاره‌ی قلب‌العقرب رصد کردند.

• ۱۳۴۰ سال پیش از میلاد، ابرخس یونانی نواختاری را در صورت فلکی عقرب دید و به این فکر افتاد که نخستین فهرست ستاره‌ای را تدوین کند.

• در سال ۱۵۹۶ داویت فابریسیوس (۱۶۱۷-۱۵۶۴)، اخترشناس آلمانی، متوجه ستاره‌های متغیر شد که بعدها یوهانس هولیوس (۱۶۸۷-۱۶۱۱)، اخترشناس لهستانی، آن را میرا به معنی معجزه‌آسا نامید.



تصویر گراور صورت فلکی برساوش و ستاره‌ی رأس‌الغول، مربوط به قرن هفدهم.

رأس‌الغول چشم‌چپ سر بریده‌ی دیوی به نام مدوزا است.

• اخترشناس و ریاضیدان ایتالیایی، جیمینیانو موتاتناری (۱۶۸۷-۱۶۳۳)، در سال ۱۶۶۹ متوجه شد که درخشندگی ستاره‌ی رأس‌الغول تغییر می‌کند. در سال ۱۷۸۲، جان گودریک انگلیسی (۱۷۸۶-۱۷۶۴) اعلام کرد که ستاره‌ی رأس‌الغول ستاره‌ای دوتایی گرفتی است.

• گودریک در سال ۱۷۸۴ ستاره‌ی دلتا - قیفاووس (نخستین متغیر قیفاووسی) را کشف کرد. در سال ۱۹۱۲، خانم هنریتا لویت کشف کرد که دوره‌ی تناوب تپ‌های متغیرهای قیفاووسی با درخشندگی حقیقی آن‌ها متناسب است؛ یعنی با تعیین دوره‌ی تناوب می‌توان درخشندگی حقیقی و فاصله‌ی آن‌ها را به‌دست آورد.


بیش‌تر بدانیم

سطح خورشید ۱۷۶، اندازه‌ی ستاره‌ها ۱۸۲ اخترشناسی با دوربین دوچشمی ۲۸۸ ویژگی‌های ستاره‌ها ۱۸۸ حوشه‌ها و دوتایی‌ها ۱۹۴ ابرنواخترها ۲۰۴

رأس‌الغول (سر غول)


رصد سرغول

ستاره‌ی رأس‌الغول (سرغول) متغیری گرفتی در صورت فلکی برساوش است. گرفت‌های رأس‌الغول حدود ۱۰ ساعت طول می‌کشد و روشایی آن تا کمی بیش از یک قدر تغییر می‌کند؛ آن‌قدر که با چشم غیر مسلح نیز قابل تشخیص است. این گرفت‌ها هر ۲۹ روزه یک بار رخ می‌دهد. صورت فلکی برساوش در شب‌های پاییزی و زمستانی در نیم‌کره‌ی شمالی دیده می‌شود.



ستاره‌های متغیر مهم			
نام ستاره	قدر	دوره‌ی تناوب (روز)	نوع
رأس‌الغول	۰.۱-۳.۴	۲/۹	گرفتگی
یدالجوزا	۰.۵-۱.۳	۲۱۰۰	تپنده (نیمه‌منظم)
کبدالاسد (آلفا - تازی‌ها)	۲.۸۴-۲.۹۶	۵/۵	ذورانی
دلتا - قیفاووس	۳.۵-۴.۴	۵/۴	تپنده (قیفاووسی)
اپسیلون - ابراهان	۲.۹-۳.۸	۹۸۹۲	گرفتگی
اتا - شاه تخته	۰.۸-۷/۹	—	ذورانی
میرا	۲.۰-۱۰/۱ (متغیر)	۳۳۲	تپنده (بلنددوره)
R-گیسو	۵.۷-۱۴/۸	—	ذورانی (محوشدگی‌های شدید)
T-گیسو	۲.۰-۱۰/۸	—	فاجعه‌بار (نواختار تکرارشونده)

ستاره‌ها چه قدر دورند؟



نزدیک‌ترین ستاره

نزدیک‌ترین همسایه‌ی خورشید پروکسیما -
قنطورس، یکی از سه ستاره‌ی منظومه‌ی آلفا -
قنطورس است. این ستاره‌ی کوتوله ۴/۲ سال نوری
از ما فاصله دارد. اگر خورشید به اندازه‌ی توپ
فوتبال بود، فاصله‌ی آن تا پروکسیما - قنطورس
به اندازه‌ی فاصله‌ی پاریس تا نیویورک یا تهران تا
شول می‌شد.

آنتن، اطلاعات را به زمین
مخابره می‌کند.

برخی از نزدیک‌ترین ستاره‌ها و منظومه‌های ستاره‌ای				
نام ستاره یا منظومه‌ی ستاره‌ای	قدر	رده‌ی طیفی	فاصله به سال نوری	
آلفا - قنطورس A, B, C	۱۱/۰, ۱۱/۴, ۰/۱	M۵, K۱, G۲	۴/۴	
ستاره‌ی بارنارد	۹/۵	M۵	۵/۹	
ستاره‌ی لالاند ۲۱۱۸۵	۷/۵	M۲	۸/۳	
شباهنگ A, B	۸/۵, ۱/۴	A۰, کوتوله‌ی سفید	۸/۶	
راس ۱۵۴	۱۰/۴	M۴	۹/۷	
اپسیلون - نهر	۳/۷	K۲	۱۰/۵	
HD ۱۷۹۸۷	۷/۴	M۲	۱۰/۷	
راس ۱۲۸	۱۱/۱	M۴	۱۰/۹	
B۱ - دجاجة A, B	۶/۱, ۵/۲	K۷, K۵	۱۱/۴	
شعرای شامی	۱۰/۷, ۰/۴	F۵, کوتوله‌ی سفید	۱۱/۴	

روش‌های دیگر فاصله‌سنجی

برای ستاره‌های دورتر، که زاویه‌ی اختلاف منظر آنها قابل اندازه‌گیری نیست، روش‌های گوناگونی برای تخمین فاصله وجود دارد. اما برای این کار، باید درخشندگی حقیقی ستاره را بدانیم تا با مقایسه‌ی روشنایی ظاهری، به فاصله‌ی آن پی ببریم. رده‌ی طیفی ستاره و نوع آن تخمینی از درخشندگی حقیقی ستاره به دست می‌دهد. از این رو، یک روش فاصله‌یابی طیف‌سنجی است. جرم ستاره با دانستن نوع آن نیز کمک فراوانی به تخمین درخشندگی حقیقی می‌کند. انواع خاصی از ستاره‌های متغیر مانند قیفاووسی‌ها، RR شلیاتی‌ها و میراگوبه‌ها، میان دوره‌ی تناوب و درخشندگی حقیقی، رابطه‌ی مشخصی دارند. هرچه تناوب آنها طولانی‌تر باشد، پُر جرم‌تر و درخشان‌ترند. با دانستن این نسبت، می‌توان فاصله‌ی آنها را به دقت از دوره‌ی تناوب به دست آورد. این ستاره‌ها فراوان نیستند؛ اما هر کجا که پیدا شوند، در یک خوشه، سحابی یا کهکشانی دیگر، مانند یک کیلومتر شمار، فاصله‌ی کیهانی را به ما می‌گویند.




ماهواره‌ی اَبَرخُس

سازمان فضایی اروپا (اسا) ماهواره‌ی اَبَرخُس را در سال ۱۹۸۹ به فضا پرتاب کرد. اَبَرخُس، که بر فراز جو آشفته‌ی زمین قرار دارد، برای تعیین موقعیت ستاره‌ها سه سال و نیم وقت صرف کرد. دقت آن به اندازه‌ای بود که به‌طور نظری می‌توانست فضاوردی را روی ماه تشخیص دهد. دانشمندان، به کمک داده‌های ارسالی اَبَرخُس، تفاوت منظر ۱۱۸ هزار ستاره را تا قدر ۱۲/۵ محاسبه کردند. در حال حاضر، اخترشناسان فواصل دقیق ستاره‌هایی را که تا ۵۰۰ سال نوری از خورشید قرار دارند، به دست آورده‌اند و تخمینی از فواصل ستاره‌های دورتر نیز در دست است.

سال نوری و پارسک

اخترشناسان فواصل را به سال نوری و پارسک اندازه‌گیری می‌کنند. یک سال نوری (LY) برابر است با ۹/۵ تریلیون (میلیون میلیون) کیلومتر یا فاصله‌ای که نور در مدت یک سال طی می‌کند. یک پارسک برابر است با ۳/۲۶ سال نوری؛ فاصله‌ای که زاویه‌ی اختلاف منظر ستاره در آن، یک ثانیه‌ی قوس (۱/۳۶۰۰) یک درجه است.



آزمایش اختلاف منظر

دو انگشت اشاره‌ی خود را روبه‌روی صورتان نگاه‌دارید؛ یکی را در فاصله‌ی بازو و دیگری را در فاصله‌ی نصف آن قرار دهید. یک چشم را ببندید و سرتان را از یک سو به سوی دیگر حرکت دهید. به‌نظر می‌رسد که انگشت نزدیک‌تر، سریع‌تر از دیگری حرکت و مسافت بیشتری طی می‌کند. این مقدار اندازه‌ی اختلاف منظر است. هر چه انگشتان دورتر باشند، اختلاف منظر کمتر است.


همه‌ی ستاره‌هایی که در آسمان نزدیک به نظر می‌رسند، در فضا همسایه نیستند. ستاره‌ی غول سرخ دبران عضوی از خوشه‌ی (۷) - مانند قلائص در صورت فلکی ثور به نظر می‌رسد. اما دبران در مقایسه با این خوشه، بسیار به ما نزدیک‌تر است. فاصله‌ی دبران از خورشید ۶۵/۱ سال نوری و فاصله‌ی قلائص ۱۵۰ سال نوری است. آن‌ها فقط به طور تصادفی در امتداد هم قرار دارند.

ستاره‌ی دبران و خوشمی
«V» مانند قناص در ثور،
در آسمان سعادت شهر
فارس



روش اختلاف منظر

با گردش زمین به دور خورشید، به نظر می‌رسد که ستاره‌های نزدیک‌تر، در برابر زمینه‌ی ستاره‌های دور دست اندکی جابه‌جا می‌شوند. اما طی یک سال، به جای اول خود بازمی‌گردند. زاویه‌ای را که ستاره طی شش ماه در آسمان می‌پیماید، اختلاف منظر آن ستاره می‌نامند (و در محاسبات اغلب نصف آن را در نظر می‌گیرند). اخترشناسان با دانستن این زاویه، می‌توانند به روش‌های ساده‌ی هندسی، فاصله‌ی ستاره را محاسبه کنند. هرچه زاویه‌ی اختلاف منظر کوچک‌تر باشد، ستاره دورتر است. برای ستاره‌هایی که از چند صدسال نوری دورترند، زاویه‌ی اختلاف منظر آن‌قدر کوچک است که نمی‌توان آن را با تلسکوپ‌های امروزی اندازه گرفت.



قانون عكس مربع

ستاره‌ای که دورتر باشد، در مقایسه با ستاره‌ی نزدیک‌تر، با درخشندگی حقیقی یکسان، کم‌نورتر به‌نظر می‌رسد. زیرا تا نور آن به زمین برسد، در محوطه‌ی بزرگ‌تری پراکنده می‌شود و ستاره کم‌سوتر به‌نظر می‌رسد. قانون عکس مربع می‌گوید که روشنایی ظاهری یک ستاره متناسب با مربع فاصله‌ی آن (یعنی فاصله‌ی آن به توان ۲) کاهش می‌یابد. مثلاً دو ستاره با درخشندگی حقیقی برابر را در نظر بگیرید؛ اگر یکی دو برابر دیگری از ما فاصله داشته باشد، ستاره‌ی نزدیک‌تر ۴ بار پرنورتر به‌نظر می‌رسد.

فواصل ستاره‌ها



یظلمیوس

• از دوران
باستان، از جمله
در مصر آن زمان، معماران
هنگام ساخت بناهای
بزرگ مثل پل‌ها و معابد،
برای سنجش فاصله‌ها و
اندازه‌ها، از روش اختلاف
منظر استفاده می‌کردند.

• در سال ۱۴۰۰ میلادی،
بظلمیوس نشان داد که چگونه می‌توان
از اختلاف منظر رصدگرانی در نقاط
متفاوت زمین برای محاسبه‌ی فاصله‌ی
ماه استفاده کرد.

• فیزیک‌دان انگلیسی، رابرت هوک (۱۷۰۳-۱۶۳۵)، در سال ۱۶۶۹ سعی کرد اختلاف منظر ستاره‌ای را اندازه‌گیری کند؛ اما موفق نشد.


• در سال ۱۸۳۸، فردریک بیسل با استفاده از روش اختلاف منظر به اندازه‌گیری فاصلهی ستاره‌ی ۶۰ داجه پرداخت. کمی پس از آن، اختر شناس اسکاتلندی، توماس هندرسون (۱۸۴۴-۱۷۹۸)، فاصلهی آلفا قنطورس را اعلام کرد.

• در سال ۱۹۹۷، سازمان فضایی اروپا (اسپا) فهرست ستاره‌های ابرخس را، که شامل فاصله‌ی اختلاف منظری ۱۱۸ هزار ستاره بود، منتشر کرد.

بیشتر بدانیم

تلسکوپ چگونه کار می‌کند؟ ۱۸
اندازه‌های ستاره‌ها ۱۸۲
ویژگی‌های ستاره‌ها ۱۸۸
خوشه‌ها و دوتایی‌ها ۱۹۴

ستاره‌های مهم تا فاصله‌ی ۱۰۰ سال نوری از خورشید



ویژگی‌های ستاره‌ها

روشنایی ظاهری این ستاره‌ها هم به درخشندگی حقیقی و هم به فاصله‌ی آن‌ها بستگی دارد.




درخشندگی و قدر مطلق


در مقایسه با خورشید، روشنایی حقیقی یک ستاره را درخشندگی بصری یا مرنی می‌نامند. ممکن است درخشندگی ستاره‌ها از ۱۰۰ هزار برابر تا یک‌صد هزارم درخشندگی خورشید باشد. اخترشناسان با اصطلاح قدر مطلق نیز درخشندگی حقیقی ستاره را بیان می‌کنند. اگر ستاره‌ای درست در فاصله‌ی ۱۰ پارسی (۳۲/۶ سال نوری) زمین قرار بگیرد، قدر مطلق آن، همان قدر آن است. تابنده‌ترین ستاره‌های کهکشان، مانند یدالجوزا در شانه‌ی صورت فلکی شکارچی، از قدر مطلق ۷- یا کمی پرنورترند و کم‌نورترین ستاره‌های کهکشان، مانند کوتوله‌های سرخ، از قدر مطلق ۱۰+ تا ۵+ هستند. اگر ستاره‌های درخشان کهکشان در همسایگی ما بودند، در آسمان شب مانند نورافکن‌های خیره‌کننده‌ای دیده می‌شدند.

اندازه‌ی متفاوت ستاره‌ها

اندازه‌ی ستاره‌ها بسیار متفاوت است؛ برای مثال، چته‌ی آبرغول‌ها ۳۰۰ بار از خورشید بزرگ‌تر است. اما ستاره‌های نوترونی و سیاه‌چاله‌ها حتی از زمین کوچک‌ترند.



چگونه می‌توانیم بفهمیم که ستاره‌ها واقعاً چه شکلی هستند؟ تقریباً همه‌ی آن‌ها را در تلسکوپ‌ها به صورت نقطه می‌بینیم؛ اما با طیف‌سنجی نور آن‌ها اطلاعات بسیاری به دست می‌آید. به علاوه، وقتی فاصله‌ی ستاره‌ی خاصی را بدانیم، درمی‌یابیم که ستاره چه قدر تابنده است و می‌توانیم به ویژگی‌های دیگر آن نظیر اندازه، جرم و سن نیز پی ببریم. می‌دانیم که ابعاد کوتوله‌های سفید مانند زمین است و آبرغول‌ها چنان بزرگ هستند که می‌توانند بیش‌تر منظومه‌ی شمسی ما را ببلعند. سن برخی ستاره‌ها فقط چند میلیون سال است؛ در حالی که برخی به قدمت خود کیهان‌اند. اخترشناسان برای طبقه‌بندی گونه‌های متفاوت ستاره‌ها، نمودار ویژه‌ای به نام نمودار هرتسپرونگ - راسل (HR)، رسم می‌کنند.



مقایسه‌ی جرم‌ها

جرم ستاره‌ها را معمولاً با واحدهایی مانند کیلوگرم یا تُن بیان نمی‌کنند؛ بلکه ملاک، جرم خورشید است. سبک‌ترین ستاره‌ها کمتر از یک‌دهم خورشید جرم دارند. در حالی که امکان دارد پُر جرم‌ترین ستاره‌ها، تا حدود ۱۰۰ برابر خورشید جرم داشته باشند. ستاره‌های کوچک و کم جرم، مانند سنگ‌ریزه‌های کنار ساحل، بی‌شمارند؛ اما ستاره‌های بزرگ و پُر جرم کم هستند. فراوان‌ترین نوع ستاره‌ها در کهکشان، کوتوله‌های سرخ کم جرمی مانند پروکسیما - قنطورس یا ستاره‌ی بارنارد هستند. آن‌ها چند برابر خورشید عمر می‌کنند و بیش‌تر از ستاره‌های پُر جرم‌تر به وجود می‌آیند.



نمودار ستاره‌ها

• در سال ۱۹۰۶، آبنار هرتسپرونگ نموداری رسم کرد که نشان می‌داد چگونه می‌توان ستاره‌ها را به دو گروه، که امروز به نام رشته‌ی اصلی و غول‌ها معروف‌اند، طبقه‌بندی کرد.

• پس از سال ۱۹۱۳، که هنری راسل هم نمودار مشابهی تهیه کرد، اخترشناسان به اهمیت نمودار هرتسپرونگ - راسل در فهم ستاره‌ها پی بردند.



نمودار سال ۱۹۱۳ راسل

بیش‌تر بدانیم


اندازه‌ی ستاره‌ها ۱۸۲، چرخه‌ی زندگی ستاره‌ها ۱۹۰، جایی که ستاره‌ها متولد می‌شوند ۱۹۲، غول‌های سرخ ۲۰۰، سیاهی‌های سیاره‌ها ۲۰۲

نمودار هرتسپرونگ - راسل

اخترشناسان ستاره‌ها را بر نموداری رسم می‌کنند که محور افقی آن رده‌ی طیفی و محور عمودی آن درخشندگی (در نور مرئی نسبت به خورشید) است. همچنین ممکن است در این نمودار به جای درخشندگی قدر مطلق و به جای رده‌ی طیفی، دما ذکر شود. هر ستاره بر نمودار هرتسپرونگ - راسل جایگاهی دارد که علاوه بر جرم، به آن بستگی دارد که در چه مرحله‌ای از زندگی خود باشد. بیش‌تر ستاره‌ها در نواری مرکزی، به نام رشته‌ی اصلی، قرار دارند و بقیه در گروه غول‌ها، ابرغول‌ها، و کوتوله‌های سفید قرار می‌گیرند.

ستاره‌های رشته‌ی اصلی

رشته‌ی اصلی در نمودار هرسپرونگ - راسل، نوار آبیی است که از گوشه‌ی چپ بالایی نمودار تا گوشه‌ی راست پایین، امتداد می‌یابد. ستاره‌های رشته‌ی اصلی، که فراوان‌تر از انواع دیگر ستاره‌ها هستند، در واکنش‌های هسته‌ای خود هیدروژن را می‌سوزانند و به هلیوم تبدیل می‌کنند. ستاره‌ها حدود ۹۰ درصد از عمرشان را در رشته‌ی اصلی می‌گذرانند و در این مدت، از نظر تابندگی و دمای آن‌ها، تغییرات کمی رخ می‌دهد. خورشید نمونه‌ای از ستاره‌های رشته‌ی اصلی است.



جرم ستاره‌های رشته‌ی اصلی

ستاره‌ها به ترتیب جرم در نوار رشته‌ی اصلی جای گرفته‌اند؛ به این ترتیب که پُرجرم‌ترین‌ها در بالا سمت چپ و کم‌جرم‌ترین‌ها در پایین، سمت راست نمودار قرار دارند. کوتوله‌های قهوه‌ای جرم‌های کوچک‌تری هستند که در رشته‌ی اصلی جای نمی‌نهند؛ زیرا هرگز به اندازه‌ی کافی داغ نمی‌شوند که در مرکز آن‌ها واکنش‌های هسته‌ای رخ دهد. آن‌ها را ستاره‌های نارس نیز می‌نامند.

درخشندگی در رشته‌ی اصلی

درخشنده‌گی یک ستاره‌ی رشته‌ی اصلی، به جرم آن بستگی دارد و هرچه ستاره بزرگ‌تر باشد، تابان‌تر است. درخشان‌ترین ستاره‌ها در قسمت بالایی نمودار و کم‌نورترها در بخش پایینی آن جای دارند.

طول عمر ستاره‌های رشته‌ی اصلی

ستاره‌های داغ و درخشان انتهای بالایی رشته‌ی اصلی، تمام سوخت هسته‌ای خود را در مدت یک میلیون سال می‌سوزانند. در مقایسه با سن ۱۴ میلیارد ساله‌ی کیهان، زندگی آن‌ها مانند چشم بهرم‌زدنی است. اما ستاره‌های انتهای پایینی چنان کم‌فروغ می‌تابند که هیدروژن آن‌ها تا ۱۰۰ میلیارد سال، ۷ برابر سن فعلی عالم، دوام می‌آورد.

چرخه‌ی زندگی ستاره‌ها




ستاره‌ها هم مانند انسان‌ها، به دنیا می‌آیند، زندگی می‌کنند، پیر می‌شوند و می‌میرند. اما برخلاف ما، زندگی آن‌ها میلیون‌ها یا حتی میلیارد‌ها سال طول می‌کشد و آن قدر طولانی است که پیر شدنشان را نمی‌بینیم. اگر بیننده‌ای از سیاره‌ای دیگر به زمین نگاه می‌کرد، مردمان گوناگونی با جثه و شکل‌های متفاوتی می‌دید. ممکن بود این بیننده‌ی فضایی حدس بزند که کوچک‌ترین انسان‌ها تازه به دنیا آمده‌اند و بزرگ‌ترها بالغ یا پیرند و بعد سعی کند جایگاه انواع انسان‌ها را در چرخه‌ی عمر بیابد. اخترشناسان نیز به روشی مشابه، با بررسی گونه‌های متفاوت ستاره‌ها، می‌توانند داستان چرخه‌ی زندگی ستاره‌ها را کنار هم بگذارند و آن‌را درک کنند.

تحول ستاره‌ها

زندگی یک ستاره به صورت توده‌ی متفقیض شونده‌ای از گاز و غبار، که پیش‌ستاره نام دارد، آغاز می‌شود. وقتی به سبب انقباض، ستاره آن قدر گرم شود که واکنش‌های هم‌جوشی هسته‌ای در مرکز آن شروع شود، انقباض متوقف می‌گردد. نخستین واکنش‌ها، هسته‌های هیدروژن را به هم جوش می‌دهند تا هلیوم شکل بگیرد. بعدها و در دوره‌ی پیری ستاره، هلیوم به کربن، اکسیژن و در پُرجرم‌ترین ستاره‌ها، به آهن تبدیل می‌شود. سرانجام، چیزی برای سوختن باقی نمی‌ماند و ستاره بر سر خود فرومی‌ریزد (می‌رُمبد). در معدودی ستاره‌های پُرجرم نتیجه‌ی این رُمبش انفجار اُبرنواختری است.

زندگی در رشته‌ی اصلی

ستاره‌ها بیش‌تر عمر خود را در رشته‌ی اصلی نمودار هرتسپرونگ - راسل می‌گذرانند و از طریق واکنش‌های هسته‌ای و تبدیل مدام هیدروژن به هلیوم، انرژی خود را تأمین می‌کنند. دو نیرو در ستاره مدام در نبردند؛ یکی فشار گاز داغ درون آن است که با انفجارهای هسته‌ای همه چیز را به بیرون می‌راند. اما نیروی دیگر، که گرانش عظیم جرم کل ستاره است، همه چیز را به درون می‌کشد. تا زمانی که این دو نیرو برابری کنند، ستاره مانند ستاره‌های رشته‌ی اصلی در تعادل است. اما در دوره‌ی جنینی و در پایان عمر ستاره، این تعادل وجود ندارد.




V وقتی سوخت هیدروژن ستاره به پایان برسد، منبسط و تبدیل به ابرغول سرخ می‌شود.

مرگ ستاره

ستاره‌هایی که با جرم حدود ۸ برابر خورشید متولد می‌شوند، باد می‌کنند و زندگی آن‌ها با انفجار مهیبی خاتمه می‌یابد. از انفجار اُبرنواختری فقط هسته‌ای کوچک و چگال، یک ستاره‌ی نوترونی یا یک سیاه‌چاله، و ابرپاره‌های ستاره‌ی متلاشی شده باقی می‌ماند.

این ستاره‌ی آبی - سفید «بالغ» تا میلیون‌ها سال تقریباً بدون تغییر در رشته‌ی اصلی باقی می‌ماند.



روند زندگی ستاره‌ها


ستاره‌ها با جرم‌های متفاوت، به روش‌های متفاوتی متحول می‌شوند. این نمودار هرتسپرونگ - راسل چرخه‌ی زندگی دو ستاره را، یکی ستاره‌ای کم‌جرم مانند خورشید و دیگری ۱۵ بار پُرجرم‌تر، نشان می‌دهد. هر چه ستاره پُرجرم‌تر باشد، زندگی آن کوتاه‌تر است.

داستان خورشید

۱ سوزنده‌ی دائم؛ بیش‌تر ستاره‌ها به اندازه‌ی کافی پُر جرم نیستند که ابرنواختر شوند. ستاره‌هایی مانند خورشید، میلیاردها سال در رشته‌ی اصلی به سوزاندن هیدروژن می‌گذرانند و پایان زندگی آن‌ها نیز آرام‌تر و با جلوه‌های کمتر است.

۲ ستاره‌های ورم کرده؛ وقتی خورشید همه‌ی هیدروژن خود را مصرف کرد، باد می‌کند و تبدیل به غول سرخ می‌شود و به جای هیدروژن، هلیوم می‌سوزاند. وقتی هلیوم هم تمام شود، خورشید لایه‌های بیرونی خود را به فضا پرتاب می‌کند تا یک سحابی سیاره‌نما شکل بگیرد.

۳ کوتوله‌ی سفید؛ سحابی سیاره‌نما در فضا پراکنده می‌شود و هسته‌ی عریان خورشید باقی می‌ماند. این هسته، کوتوله‌ی سفید است؛ گوی کوچکی و چگالی از خاکستر کربنی هسته‌ی ستاره و بدون سوخت هسته‌ای باقی مانده. طی میلیاردها سال، این ستاره‌ی زمبیده داغ به مرور سرد و ناپدید می‌شود و به آن کوتوله‌ی سیاه می‌گویند.



۳ هر پیش‌ستاره در گاز و غبار پوشیده شده است که با چرخش، به صفحه‌ی تختی تبدیل می‌شود.


۴ سرانجام، پیش‌ستاره‌ی منقبض‌شونده حیات خود را آغاز می‌کند و فوران‌های عظیمی از گاز از هر دو سوی قرص بیرون می‌زند.

۵ دانه‌های غبار متراکم می‌شوند و در قرص گاز و غبار دور پیش‌ستاره به هم می‌چسبند و تکه‌های بزرگ‌تری می‌شوند و سرانجام شاید سیاره‌ها را بسازند.


۶ ستاره‌ی جوان و کاملاً شکل گرفته، در رشته‌ی اصلی، با هم‌جوشی هیدروژن، هلیوم تولید می‌کند.

تولد ستاره

ممکن است یک ابر ملکولی در اثر کشش گرانش خود منقبض و به دو توده‌ی کوچک‌تر تبدیل شود. این توده‌ها هم به سبب انقباض بیش‌تر، گرم و چگال‌تر می‌شوند. اخترشناسان از این توده‌ها، پیش از آن‌که آن‌قدر گرم شوند که نور مرئی ارسال کنند، امواج رادیویی و تابش فروسرخ دریافت می‌کنند. سرانجام، این توده‌ها شروع به تابش می‌کنند. در دمای ۱۰ میلیون درجه‌ی سانتی‌گراد، واکنش‌های هسته‌ای آغاز و ستاره‌های جدیدی متولد می‌شوند.



۱۰ سرانجام، هسته‌ی آهنی می‌زمبد و ستاره به صورت ابرنواختر درخشانی منفجر می‌شود.



۸ در این حالت، هسته‌ی ستاره داغ‌تر است. ستاره از هلیوم موجود برای تولید کربن و اکسیژن استفاده می‌کند.

۹ واکنش‌های هسته‌ای عناصر سنگین‌تر و سنگین‌تری تولید می‌کنند تا هسته‌ای از آهن شکل بگیرد.


۱۱ بیش‌تر ماده‌ی ستاره در انفجار ابرنواختری بیرون پرتاب می‌شود. ممکن است هسته‌ی زمبیده‌ی ستاره به صورت ستاره‌ی نوترونی یا سیاهچاله باقی بماند.

ستاره‌ی نوترونی گوی چگالی از جنس نوترون به قطر ۲۰ تا ۳۰ کیلومتر است.

سیاهچاله جسمی زمبیده با گرانش بسیار زیاد در قلمرو خود است که حتی نور نمی‌تواند از آن بگریزد.

بیش‌تر بدانیم


- درون خورشید ۱۷۴ ویژگی‌های ستاره‌ها ۱۸۸
- سحابی‌های سیاره‌نما ۲۰۲
- ابرنواخترها ۲۰۴
- فضای میان‌ستاره‌ای ۲۱۶



در حالی که هسته روی خود می‌زمبد و داغ‌تر می‌شود تا نتواند هم‌جوشی هسته‌ای عناصر سنگین‌تری را آغاز کند، لایه‌های خارجی منبسط و خف می‌شوند و به رنگ قرمز می‌درخشند.

ستاره‌ی منقبض‌شونده به اندازه‌ی بیش از ۱ میلیارد ستاره می‌درخشد

جایی که ستاره‌ها متولد می‌شوند



تحول ستاره‌های جوان

ستاره‌های تازه متولد شده، مانند اجسام قرمز درخشان در سمت راست نمودار هرتسپرونگ-راسل دیده می‌شوند. این ستاره‌ها وقتی منقبض و به اندازه‌ی کافی داغ شوند که در رشته‌ی اصلی هیدروژن پسوزانند، به سمت چپ نمودار حرکت می‌کنند.

تابش ستاره‌های نزدیک، بخش‌های رقیق‌تر ابر را پراکنده می‌کند.


قلب یک سحابی

سحابی جبار نزدیک‌ترین ناحیه‌ی تولد ستاره‌ها به زمین است که در جهت صورت فلکی جبار حدود ۱۵۰۰ سال نوری از ما فاصله دارد. این سحابی به سبب تابش فرابنفش از خوشه‌ی کورچکی از ستاره‌های جوان، حوشه‌ی دوزنقه، گرم می‌شود. ستاره‌ها و بیش‌ستاره‌های بسیار بیش‌تری در ابر ضخیم غباری، که قلب سحابی را پوشانده است، پنهان شده‌اند. خود سحابی جبار در دل ابری بسیار بزرگ‌تر (یک ابر ملکولی عظیم)، که شاید شامل گاز و غبار به حرم ۵۰۰ هزار برابر جرم خورشید باشد، جای گرفته است.

وقتی بخش‌هایی از ابر پراکنده می‌شود، گوی‌های چکالی، که شامل پیش‌ستاره‌هاست، از ابر جدا می‌شود.


در نمای فروسرخ، ناحیه‌ی میله شکلی از ستاره‌های تازه متولد شده نمایان می‌شود که در نور مرئی به چشم نمی‌آید.

ناحیه‌ی ستاره‌سازی سرانجام درون این ابر تیره پراکنده می‌شود.



سحابی قو


یکی دیگر از زایشگاه‌های معروف ستاره‌ای، سحابی قو در فاصله‌ی حدود ۵ هزار سال نوری از زمین است. ابرهای ضخیم تیره مانع رسیدن نور مرئی از درون سحابی‌اند؛ اما نور فروسرخ از میان غبار نفوذ و توده‌ای از ستارگان برود را آشکار می‌کند. تابش ارسال شده از ستاره‌های جدید، ابرهای غبار را فشرده می‌کند و دور توده‌ای از شکل‌گیری ستاره‌ها را به‌راه می‌اندازد.



سحابی جبار درست پایین کمر بند جبار قرار دارد.

رصد سحابی جبار

چند ناحیه‌ی ستاره‌ساز در آسمان آن‌قدر پر نورند که با دوربین دوچشمی، به شکل لکه‌های مه‌آلود در زمینه‌ی تیره‌ی آسمان، دیده می‌شوند. از همه پر نورتر، سحابی جبار است. این سحابی را می‌توان از پاییز تا اوایل بهار، با چشم غیر مسلح در آسمانی نسبتاً تاریک دید. از آن‌جا که این سحابی بخشی از شمشیر جبار است، یافتن آن در زیر سه ستاره‌ی هم‌نور و صف کشیده‌ی کمر بند جبار ساده است؛ مانند این دو تصویر که در آسمان ایران گرفته شده‌اند.



قرص پیش‌سیاره‌ای

درون این قرص کوچک و تیره‌ی گاز و غبار، ستاره‌ی جدیدی متولد می‌شود. این پیش‌ستاره، که فقط چندصد هزار ساله است، جرمی معادل یک‌پنجم جرم خورشید دارد. قطر قرص اطراف آن ۷/۵ برابر قطر مدار پلوتون و جرم آن ۷ برابر جرم زمین است.

در حالی که واکنش‌های هسته‌ای در پیش‌ستاره آغاز می‌شود، ممکن است قرص اطراف آن منقبض شود و سیاره‌ها را تشکیل دهد.


سحابی جبار چگونه شناخته شد؟

• در سال ۱۶۵۶، کریستین هویگنس نخستین طرح‌ها را از سحابی جبار کشید. در طرح او گروهی از ستاره‌ها به شکل دوزنقه در مرکز سحابی دیده می‌شدند.

• در قرن هجدهم، ویلیام هرشل سحابی جبار را چنین توصیف کرد: «مه آتشین شکل نگر گرفته، مواد پراشوب خورشیدهای آینده.»

• در سال ۱۸۶۵، ویلیام هاگیتز به بررسی طیف نور سحابی جبار پرداخت و دریافت که این سحابی از گاز داغ تشکیل شده است.

• در دهه‌ی ۱۹۶۰، اخترشناسان ستاره‌های درخشان در نور فروسرخ را در سحابی جبار یافتند و حدس زدند که آن‌ها پیش‌ستاره‌هایی هستند که در ابرهایی از غبار پنهان شده‌اند.




طرحی از سحابی جبار اثر لرد راس، رصدگر ایرلندی (۱۸۶۷-۱۸۰۰) که با بزرگترین تلسکوپ جهان در عصر خود رصد می‌کرد.

گروه پیش‌ستاره‌های جبار

اخترشناسان در سحابی جبار، چند صد پیش‌ستاره کشف کرده‌اند. پنج عدد از پیش‌ستاره‌های این گروه را قرص‌های گاز و غبار احاطه کرده‌اند. به این قرص‌ها، قرص پیش‌سیاره‌ای می‌گویند؛ زیرا سیاره‌ها از درون آن‌ها شکل خواهند گرفت.


در این تصویر با رنگ‌های کاذب که تلسکوپ فضایی هابل گرفته، هیدروژن به رنگ سبز، اکسیژن به رنگ آبی، و نیتروژن به رنگ قرمز نشان داده شده است.



نمای نزدیک از پیش‌ستاره‌های سحابی جبار

ستاره‌های خوشی دوزنقه سحابی را روشن می‌کنند.

سحابی‌های جذاب				
نام	مورث فلکی	فاصله به سال نوری	قطر به سال نوری	
آمریکای شمالی	دجاجة	۱۵۰۰	۵۰	
جبار (شکارچی)	جبار (شکارچی)	۱۶۰۰	۳۰	
قو	قوس	۵۰۰۰	۶۰	
مرداب	قوس	۵۲۰۰	۱۵۰	
سمتکه	قوس	۵۲۰۰	۴۰	
زرت	تک‌شاخ	۵۵۰۰	۵۰	
عقاب	مار	۷۰۰۰	۶۰	
شاه‌تخته (کاریتا)	شاه‌تخته	۹۰۰۰	۳۰۰	
رتیل	ماهی‌طلایی	۱۶۰۰۰۰	۸۰۰	
بیش‌تر بدانیم				
اخترشناسی فروسرخ ۲۸، ویژگی‌های ستاره‌ها ۱۸۸، چرخه‌ی زندگی ستاره‌ها ۱۹۰				
فضای میان‌ستاره‌ای ۲۱۶				



خوشه‌ها و دوتایی‌ها

ستاره‌ها تک‌تک متولد نمی‌شوند؛ بلکه به صورت گروهی به دنیا می‌آیند. هر جا را که نگاه کنید، ستاره‌های بسیاری را کنار هم در گروه‌های چندتایی یا جفت‌جفت می‌یابید. خوشه‌های باز، گروه‌های نه چندان فشرده‌ای از چند ده تا چند هزار ستاره‌اند که در امتداد بازوهای مارپیچی راه شیری دیده می‌شوند. بیش‌تر آن‌ها پر از ستاره‌های جوان هستند. زیرا به مرور زمان، حرکت این مجموعه ستاره در کهکشان، آن‌ها را از هم می‌پاشد. به این سبب، بیش‌تر خوشه‌های بازی که پا به سن می‌گذارند، دیگر وجود ندارند. خورشید نیز احتمالاً در هنگام تولد خود درون خوشه یا گروهی از ستاره‌ها بوده است. خوشه‌ها مهم‌اند؛ زیرا همه‌ی ستاره‌های آن‌ها از موادی یکسان و در زمانی یکسان شکل گرفته‌اند. اخترشناسان آن‌ها را بررسی می‌کنند تا به تحولات ستاره‌ها پی ببرند. حتی ستاره‌هایی که تک به نظر می‌رسند، در نهان اسراری دارند. وقتی ستاره‌ها را با تلسکوپ بررسی می‌کنیم، حدود نیمی از آن‌ها دوتایی یا چندتایی هستند. اندازه‌گیری حرکت‌های چنین ستاره‌هایی راه مطمئنی برای یافتن جرم ستاره‌هاست.



خوشه‌ی باز پروین

پروین، ثریا یا هفت خواهران، که در اسطوره‌های کهن بسیاری از فرهنگ‌ها وجود دارد، شناخته‌شده‌ترین خوشه‌ی باز آسمان شب است. این خوشه شامل حدود صد ستاره‌ی اصلی است که فقط ۶ یا ۷ تایی آن‌ها معمولاً با چشم غیر مسلح دیده می‌شوند. حضور چند ستاره‌ی جوان آبی و نبود غول‌های سرخ نشان می‌دهد که سن این خوشه حدود ۷۸ میلیون سال است. این خوشه نیز مانند همه‌ی خوشه‌های باز، سرانجام با دور شدن ستاره‌هایش از هم، ناپدید می‌شود.

سن خوشه‌ها

خوشه‌های جوان، مانند NGC ۲۲۶۴، پر از ستاره‌های کم‌سن و داغ آبی رنگ است. آن‌ها معمولاً درون یا در نزدیکی سحابی‌ای پیدا می‌شوند که از آن شکل گرفته‌اند. در خوشه‌های پیرتر، مانند M۶۷ در صورت فلکی خرچنگ، گاز سحابی پراکنده و محو شده است. چنین خوشه‌های باز پیری بسیار نادرند. خوشه‌های پیر، غول‌های سرخ بسیاری را شامل می‌شوند. غول‌های سرخ ستاره‌هایی هستند که سوخت هیدروژن خود را به پایان رسانده‌اند و پایان عمرشان نزدیک است.

M۶۷، خوشه‌ای ۳/۲ میلیارد ساله




NGC ۲۲۶۴، خوشه‌ای ۲۰ میلیون ساله

خوشه‌های باز جذاب

نام	صورت فلکی	سن به میلیون سال	فاصله به سال نوری	حداقل تعداد ستاره‌ها
خوشه‌ی دوتایی (خی و اچ)	برساوش	۳/۲+۵/۶	۷۴۰۰	۱۵۰+۲۰۰
جعبه‌ی جواهر	صليب جنوبی	۷/۱	۷۶۰۰	۱۰۰
NGC ۲۲۶۴	تکشاخ	۲۰	۲۴۰۰	۴۰
خوشه‌ی پروانه (M۶)	عقرب	۵۱	۲۰۰۰	۸۰
M۴۷	کشتیخ	۷۸	۱۶۰۰	۳۰
پروین	ثور	۷۸	۳۷۵	۱۰۰
M۴۱	کلب اکبر	۱۹۰	۲۳۰۰	۱۰۰
کندوی عسل (خوشه‌ی صوفی)	خرچنگ (سرطان)	۶۶۰	۵۲۰	۵۰
قللخص	ثور	۶۶۰	۱۵۰	۲۰۰
M۶۷	خرچنگ (سرطان)	۳۲۰۰	۲۶۰۰	۲۰۰



در منظومه دوتایی با ستاره‌هایی هم‌جرم، نقطه تعادل یا مرکز جرم در وسط است.



اگر در منظومه دوتایی ستاره‌ای بزرگ‌تر از ستاره‌ای دیگر باشد، مرکز جرم به ستاره‌ی بزرگ‌تر نزدیک‌تر است.

ستاره‌های دوتایی

دو ستاره‌ای که در فضا بسیار از هم دورند، اگر در یک جهت از دید ما قرار گرفته باشند، ممکن است در آسمان جفت به نظر برسند. این‌ها ستاره‌های دوتایی ظاهری‌اند. دو ستاره‌ای که به سبب کشش گرانش واقعاً در فضا کنار هم قرار گرفته‌اند، یک منظومه دوتایی حقیقی هستند. این ستاره‌ها به دور نقطه تعادل مشترکی به نام مرکز جرم می‌گردند که به ستاره‌ی بزرگ‌تر نزدیک‌تر است. در دوتایی‌های بصری می‌توان دو ستاره‌ی مجزا را (اغلب با تلسکوپ) تشخیص داد. در دوتایی‌های طیف نمودی، ستاره‌ها آن‌قدر به هم نزدیک‌اند که یکی به نظر می‌رسند و نشانه‌ی وجود دو ستاره در طیف آن‌ها شناسایی می‌شود. در برخی از دوتایی‌های طیف نمودی، ستاره‌ها از مقابل هم می‌گذرند و درخشندگی کل تغییر می‌کند. به آن‌ها دوتایی‌های گرفتی یا متغیرهای گرفتی می‌گویند.

تبادل جرم میان همسایه‌ها

برخی منظومه‌های دوتایی برهم‌کنش‌کننده‌اند؛ یعنی ستاره‌ها آن‌قدر به هم نزدیک‌اند که گاز بین آن‌ها رد و بدل می‌شود. در مثال منظومه دوتایی زیر، یکی از ستاره‌ها باد کرده و گازش را بر سر و روی دیگری می‌ریزد. در دوتایی‌های تماسی، ستاره‌ها با هم تماس دارند و جو خارجی آن‌ها یکی است. بیش‌تر دوتایی‌های برهم‌کنش‌کننده ستارگانی متغیرند و ممکن است منابع قوی پرتو ایکس باشند.


نهری از گاز که از ستاره‌ی هم‌دم ریخته شده است.

ستاره‌ی زرد بادکرده، حرم از دست می‌دهد.

گاز مدام از ستاره‌ی بزرگ‌تر و سردتر به ستاره‌ی کوچک‌تر و داغ‌تر کشیده می‌شود.

منظومه دوتایی برهم‌کنش‌کننده


ستاره‌های چندتایی مهم			
نام	صورت فلکی	تعداد ستاره‌ها	قدرها
بتا - دجاجة	دجاجة	۲	۵/۱ و ۳/۱
گاما - آندرومدا	آندرومدا	۳	۶/۳ و ۵/۵ و ۲/۳
آلفا - قنطورس	قنطورس	۳	۱۱/۰ و ۱/۴ و ۰/۰
کاستور	جوزا	۳	۸/۸ و ۲/۹ و ۱/۹
دوزنقه (سحابی جبار)	جبار	۴	۷/۹ و ۶/۷ و ۵/۱ و ۵/۱
اپسیلون - شلیاق	شلیاق	۴	۶/۱ و ۵/۵ و ۵/۲ و ۵/۰
سیگما - جبار	جبار	۵	۱۰/۳ و ۷/۵ و ۶/۵ و ۶/۰ و ۴/۰
۱۵ - تک‌شاخ	تک‌شاخ	۷+	۹/۶ و ۹/۶ و ۸/۲ و ۸/۱ و ۷/۷ و ۷/۵ و ۴/۷
بیش‌تر بدانیم			
اخترشناسی پرتو ایکس ۳۴، اندازه‌های ستاره‌ها ۱۸۲، ستاره‌های متغیر ۱۸۴ و ویژگی‌های ستاره‌ها ۱۸۸، چرخه‌ی زندگی ستاره‌ها ۱۹۰ جایی که ستاره‌ها متولد می‌شوند ۱۹۲، فضای میان‌ستاره‌ای ۲۱۶			



ستاره‌های چندتایی

گاهی سه ستاره یا بیش‌تر در منظومه‌ای چندتایی گرد هم می‌آیند. این گونه ستاره‌ها معمولاً جفت‌جفت یا شامل تک‌ستاره‌ای هستند که دور جفتی نزدیک به هم می‌گردد. یکی از مشهورترین منظومه‌های چندتایی، اپسیلون - شلیاق، شامل دو جفت ستاره‌های دوتایی است. هر دو جفت به دور نقطه‌ی مرکز جرم می‌گردند.

در منظومه دوتایی دوجفتی، هر ستاره به دور هم‌دم خود می‌گردد و هر دوجفت به دور نقطه تعادل مشترک کل منظومه (مرکز جرم) می‌گردند.



کندوی عسل

خوشه‌ی کندوی عسل یا خوشه‌ی صوفی (M44) در قلب صورت فلکی خرچنگ (سرطان) قرار دارد. این خوشه‌ی باز با حدود ۵۰ ستاره را می‌توان در شبی تاریک با چشم غیر مسلح تشخیص داد. منجم ایرانی، عبدالرحمان صوفی، از نخستین رصدگران تاریخ بود که یک‌هزار سال پیش این خوشه را مانند یک پاره ابر آسمانی ثبت کرد. نمای خوشه‌ی صوفی از درون دوربین دوچشمی بسیار زیباتر است و تشابه انبوه ستاره‌های آن به زنبورهای پراکنده در کندوی عسل پدیدار می‌شود. خوشه‌ی بسیار پیر M71 را نیز می‌توان در چند درجه‌ای جنوب کندوی عسل دید.



کندوی عسل

خوشه‌های کروی

مناظری به جذابیت و شکوه خوشه‌های کروی کمتر در آسمان پیدا می‌شود. این گروه‌های هم‌بسته، که چند صد هزار تا چند میلیون ستاره را شامل می‌شوند، در هاله‌ی مرکزی کهکشان و نواحی خارجی دور افتاده‌ی راه شیری ساکن‌اند. احتمالاً کهکشان ما تا ۲۰۰ خوشه‌ی کروی دارد و دیگر کهکشان‌ها بسیار بیش‌تر از این خوشه‌ی کروی دارند. خوشه‌های کروی نه تنها زیبا هستند، بلکه اهمیت علمی بسیاری دارند. ستاره‌های آن‌ها از پیرترین ستاره‌های کهکشان‌اند و به اخترشناسان برای تعیین سن عالم کمک می‌کنند. در سال‌های اخیر، اخترشناسان خوشه‌های کروی جوان‌تری را در دیگر کهکشان‌ها کشف کرده‌اند. حتی در دوره‌ی کنونی کیهان نیز ممکن است این خوشه‌ها در برخوردهای کهکشانی از درهم‌رفتن و فشرده شدن ابرهای عظیم گاز شکل بگیرند.

خوشه‌های کروی چه شکلی هستند؟

خوشه‌های کروی، مانند خوشه‌ی جذاب ۴۷-توکان، از خوشه‌های باز بزرگ‌تر و درخشان‌ترند و تعداد ستاره‌های آن‌ها هم اغلب هزار برابر خوشه‌های باز است. خوشه‌های باز شکل نامنظمی دارند؛ اما خوشه‌های کروی، تقریباً کروی هستند. قطر بیش‌تر خوشه‌های کروی حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ سال نوری است و ستاره‌های آن‌ها به کمک نیروی گرانش خود کنار هم قرار گرفته‌اند. این گرانش چنان قوی است که نیروهای کشندی گرانش کهکشان آن‌ها را از هم نپاشیده است. ظاهر خوشه‌های باز، آبی رنگ است؛ زیرا ستاره‌های داغ جوان را شامل می‌شود. اما ظاهر خوشه‌های کروی زرد و سرخ است؛ زیرا ستاره‌های آن‌ها سردتر و پیرترند.

قطر خوشه‌ی ۴۷-توکان ۱۴۰ سال نوری است و جرمی حدود ۱ میلیون برابر خورشید دارد.


خوشه‌های کروی احتمالاً کوتوله‌های سفید بسیاری دارند؛ اما این ستاره‌ها آن‌قدر کم‌نورند که دیده نمی‌شوند.

بیش‌تر ستاره‌های درخشان غول هستند.

در هسته‌ی خوشه، حدود ۱۰۰ ستاره در هر سال نوری مکعب، کنار هم فشرده شده‌اند. در مقایسه با فاصله‌ی ۴ سال نوری خورشید از نزدیک‌ترین همسایگانش، فاصله‌ی برخی ستاره‌ها از هم فقط چند هفته‌ی نوری است.

بیش‌تر خوشه‌های کروی در مدارهای بیضوی و کشیده‌ای دور مرکز کهکشان می‌گردند و تا هاله‌ی کهکشان نیز دور می‌شوند.

برخی خوشه‌های کروی، نزدیک به پراکندگی مرکزی می‌گردند.



نقشه‌ی پراکندگی خوشه‌های کروی

برخلاف خوشه‌های باز، که فقط در صفحه‌ی راه شیری یافت می‌شوند، خوشه‌های کروی ناحیه‌ای کروی در اطراف برآمدگی مرکزی کهکشان را اشغال می‌کنند. اخترشناسان با بررسی ستاره‌های RR شلیاقی درون خوشه‌های کروی، فاصله‌ی خوشه‌ها را می‌سنجند. ستاره‌های RR - شلیاقی نوعی ستاره‌ی متغیر تپنده‌اند. همه‌ی ستاره‌های RR شلیاقی درخشندگی مشابهی دارند. به این سبب، اخترشناسان می‌توانند با اندازه‌گیری روشنایی ظاهری این ستاره‌ها و آگاهی از درخشندگی واقعی آن‌ها، فاصله ستاره‌ها و در نتیجه فاصله‌ی خوشه را محاسبه کنند.

خوشه‌های کروی مهم

نام	صورِت فلکی	فاصله به سال نوری	قطر به سال نوری
M۴	عقرب	۷۰۰۰	۵۰
M۲۲	قوس	۱۰/۰۰۰	۷۰
۴۷-توکان	توکان	۱۵/۰۰۰	۱۴۰
اُمگا - قنطورس	قنطورس	۱۷/۰۰۰	۱۸۰
M۱۳ (خوشه‌ی هرکول)	جائی	۲۳/۰۰۰	۱۱۰
M۹۲	جائی	۲۵/۰۰۰	۸۵
M۵	مار	۲۵/۰۰۰	۱۳۰
M۱۵	اسب پالدار	۳۱/۰۰۰	۱۱۰
M۳	تازی‌ها	۳۲/۰۰۰	۱۵۰
M۲	ذئو	۳۷/۰۰۰	۱۴۰

بیش‌تر بدانیم

ویژگی‌های ستاره‌ها ۱۸۸، ستاره‌های متغیر ۱۸۴، ستاره‌ها چه‌قدر دورند؟ ۱۸۶ خوشه‌ها و دوتایی ۱۹۴، راه شیری ۲۱۴

شناسایی خوشه‌های کروی

• در سال ۱۶۷۷، ادموند هالی در سفری به جزیره‌ی سنت هلنا در اقیانوس اطلس جنوبی، خوشه‌ی کروی آمگا - قنطورس را ثبت کرد. این خوشه از دوران باستان به صورت ستاره‌ای عادی ثبت شده بود.


• در دهه‌ی ۱۸۳۰، اخترشناس انگلیسی، جان هرشل، دریافت که آمگا - قنطورس از بی‌شمار ستاره‌ی جداگانه تشکیل شده است.

• در سال ۱۸۹۹ اخترشناس آمریکایی، سولان بیلی (۱۹۳۱ - ۱۸۵۴)، ۸۵ ستاره‌ی تپنده‌ی RR، شلیاکی در خوشه‌ی کروی M۵ یافت.

• هارلو شپیپلی در سال ۱۹۱۸، با استفاده از ستاره‌های RR، شلیاکی و متغیرهای قیفاووسی برای اندازه‌گیری فاصله تا خوشه‌های کروی، دریافت که خوشه‌های کروی در کره‌ای قرار دارند که مرکز آن همان هسته‌ی کهکشان است.

شکل‌گیری خوشه‌های کروی


بیش‌تر خوشه‌های کروی بیش از ۱۰ میلیارد سال سن دارند. اخترشناسان تصور می‌کردند که همه‌ی خوشه‌های کروی هم‌زمان با شکل‌گیری کهکشان مادر خود شکل گرفته‌اند. اما تلسکوپ فضایی هابل خوشه‌های بسیار جوان‌تری را، به‌خصوص در کهکشان‌هایی که در حال برخورد با هم هستند، یافت. ممکن است برخی خوشه‌های کروی خود ما هم با کهکشان‌های کوچک‌تری، که با راه شیری برخورد کرده‌اند، به کهکشان ما آمده باشند. اخترشناسان خوشه‌ی باز عظیم R۱۳۶ را کشف کردند که آن‌قدر بزرگ است که شاید در میانه‌ی فرآیند تبدیل شدن به خوشه‌ای کروی باشد.



خوشه‌ی R۱۳۶، در سحابی زئیل در ابر بزرگ ماژلان، احتمالاً طی ۱۰۰ میلیون سال آینده به خوشه‌ای کروی تبدیل می‌شود.

یافتن سن خوشه‌های کروی

اخترشناسان می‌توانند با رسم ستاره‌های یک خوشه‌ی کروی بر نمودار هرتسپرونگ - راسل (HR)، سن خوشه را تخمین بزنند. این کار نشان می‌دهد که کدام‌یک از ستاره‌های رشته‌ی اصلی، هیدروژن خود را به پایان رسانده است. نمودار HR یک خوشه‌ی بسیار پیر، هیچ ستاره‌ی درخشانی در رشته‌ی اصلی ندارد و در عوض غول‌های بسیاری دارد. در سال‌های اخیر، مشاهداتی انجام شد که نشان داد برخی خوشه‌های کروی حتی پیرتر از کیهان‌اند و به‌نظر می‌رسد در تخمین سن آن‌ها یا سن کیهان اشتباهی صورت گرفته باشد.



ستاره‌ها در مرکز خوشه‌ی کروی تا حدود ۱ میلیون بار چگال‌تر از ستاره‌ها در نزدیکی خورشیدند.

خوشه‌ی ۴۷، توکان دومین خوشه‌ی کروی پرنور آسمان است که در نیم‌کره‌ی جنوبی دیده می‌شود.


آمگا - قنطورس

بیش‌تر خوشه‌های کروی کم‌نورند؛ اما دست کم سه خوشه را در شبی صاف و تاریک به راحتی می‌توان با چشم غیر مسلح دید: M۱۳ (در آسمان شمالی)، ۴۷- توکان، و آمگا - قنطورس (در آسمان جنوبی). آمگا - قنطورس در صورت فلکی قنطورس، درخشان‌ترین خوشه است (از قدر مطلق ۱۰- و قدر ظاهری ۳-). فاصله‌ی آن از زمین نسبتاً کم است. این خوشه با حدود ۱۰ میلیون ستاره در قطری معادل ۱۸۰ سال نوری، بزرگ‌ترین خوشه‌ی راه شیری است. آن را از مرکز و نیمه‌ی جنوبی ایران نیز می‌توان در شب‌های زمستان و بهار در افق جنوب به خوبی دید.




آمگا - قنطورس با چشم شبیه ستاره‌ای نسبتاً درخشان و کمی مه‌آلود است.

دیگر منظومه‌های شمسی



سیاره‌های دیگر چه شکلی هستند؟

بیش‌تر سیاره‌هایی که تا به حال کشف شده‌اند، تقریباً هم‌چون مشتری یا حتی بزرگ‌ترند. اخترشناسان بر این باورند که آن‌ها غول‌های گازی شبیه مشتری و زحل هستند، نه سیاره‌های سنگی شبیه زمین و مریخ. بیش‌تر این سیاره‌ها به ستاره‌های مادرشان نزدیک و به این سبب، بسیار داغ‌اند. برای همین، به آن‌ها مشتری‌های داغ نیز می‌گویند. بزرگ‌ترین آن‌ها شاید حتی کوتوله‌های قهوه‌ای باشند؛ جرم‌هایی که برای به راه انداختن واکنش‌های هسته‌ای و تبدیل شدن به ستاره، جرم کافی ندارند و در عین حال از سیاره‌ها هم بزرگ‌ترند و حتی ممکن است سیاره‌هایی به دور خود داشته باشند. در سال‌های اخیر، روش‌ها و ابزارهای جدید به اخترشناسان کمک کرده است که سیاره‌های کوچک‌تری را نیز شناسایی کنند که فقط چند برابر زمین جرم دارند و در مرز سیاره‌های گازی و سنگی قرار می‌گیرند.



ستاره‌های لوزان


سیاره‌های فراخورشیدی را می‌توان با رصد آثار گرانشی آن‌ها بر ستاره‌ی مادرشان پیدا کرد. وقتی سیاره‌ی به دور ستاره‌ای می‌گردد، گرانش آن کششی بر ستاره وارد می‌کند و کمی آن را به حرکت وامی‌دارد. اخترشناسان با شکستن نور ستاره به طیف، این لرزش‌های خفیف را آشکار می‌کنند. اگر ستاره به سوی ما حرکت کند، امواج نور آن فشرده می‌شود و خطوط جذبی تیره‌ی طیف اندکی به سوی انتهای آبی منتقل می‌گردد. اگر ستاره از ما دور شود، امواج نور آن کشیده می‌شود و خطوط تیره‌ی طیف اندکی به سوی انتهای قرمز منتقل می‌گردد. در این روش، هرچه سیاره بزرگ‌تر و نزدیک‌تر به ستاره‌ی مادر باشد، احتمال کشف آن بیش‌تر است و احتمالاً به همین سبب هم بیش‌تر سیاره‌های فراخورشیدی کشف شده، غول‌های گازی نزدیک به ستاره‌ی مادرند.


آیا منظومه‌ی شمسی ما در عالم یگانه است؟ تا همین اواخر، اخترشناسان فقط می‌توانستند حدس بزنند که آیا منظومه‌های سیاره‌ای به دور دیگر ستاره‌ها در گردش است یا خیر. آشکارسازی سیاره‌های فراخورشیدی، آن‌هایی که دور ستاره‌ای به جز خورشید می‌گردند، مشکل است؛ زیرا درخشندگی آن‌ها ۱ میلیارد بار کمتر از درخشندگی ستاره‌ی مادرشان است. از دید ما، آن‌ها مانند شمع کم‌فروغی چسبیده به نورافکنی خیره‌کننده‌اند! اما از سال ۱۹۹۵، اخترشناسان با استفاده از ابزارهای بسیار حساس موفق به کشف غیر مستقیم سیاره‌های فراخورشیدی شدند. آن‌ها با ردیابی اثر گرانشی اندک سیاره بر حرکت و طیف ستاره و همین‌طور ردیابی افت نور حاصل از عبور سیاره‌های فراخورشیدی از مقابل ستاره‌ی مادر، موفق به کشف حدود ۵۰۰ سیاره شدند و پیش‌بینی می‌کنند که در سال‌های آینده نیز تعداد بسیار بیش‌تری کشف کنند. نسل جدیدی از تلسکوپ‌های فضایی طراحی شده‌اند تا تصاویر مستقیمی از این سیاره‌ها را در اختیار ما بگذارند.

مدارهای فراخورشیدی

در این نمودار، مدار زمین با مدار نخستین ۱۰ سیاره‌ی فراخورشیدی کشف شده مقایسه شده است؛ به طوری که گویی همه‌ی آن‌ها به دور ستاره‌ی واحدی می‌گردند. اخترشناسان با شگفتی بسیار دریافته‌اند که بیش‌تر این سیاره‌ها، در مقایسه با زمین تا خورشید، به ستاره‌ی خود نزدیک‌ترند. برخی از آن‌ها حتی از عطارد نزدیک‌ترند. یک توضیح این است که این سیاره‌ها، دور‌تر از ستاره‌ی مادرشان شکل گرفته‌اند و سپس به تدریج با حرکتی مارپیچ به درون منظومه آمده‌اند. نکته‌ی شگفت‌آور دیگر این است که برخی از آن‌ها در مقایسه با سیاره‌های منظومه‌ی شمسی، مدارهای بسیار بیضوی‌تری دارند.

مدارهای زمین و سیاره‌های فراخورشیدی و فواصل متوسط از ستاره‌ی مادر.






۱۰ سیاره‌ی نخست کشف‌شده‌ی فراخورشیدی					
نام ستاره‌ی مادر	فاصله‌ی ستاره‌ی مادر از خورشید به سال نوری	سال کشف سیاره	حد اقل جرم سیاره (زمین = ۱)	مدت گردش دور ستاره به روز	
۵۱- آسپ بال‌دار	۵۰	۱۹۹۵	۱۵۰	۴/۲	
۵۵- خرچنگ	۴۴	۱۹۹۶	۲۷۰	۱۴/۶	
۴۷- دب اکبر	۴۶	۱۹۹۶	۸۹۰	۱۰۹۰	
تاو- عوا	۴۹	۱۹۹۶	۱۲۳۰	۳/۳	
اوپسیلون - آندرومدا	۵۴	۱۹۹۶	۲۲۰	۴/۶	
۷۰- سنبله	۵۹	۱۹۹۶	۲۱۰۰	۱۱۷	
۱۶- دجاجة	۷۲	۱۹۹۶	۴۸۰	۸۰۴	
رو- اگیل شمالی	۵۵	۱۹۹۷	۳۵۰	۳۹/۶	
گلیس ۸۷۶	۱۵	۱۹۹۸	۶۷۰	۶۰/۸	
۱۴- جانی	۵۵	۱۹۹۸	۱۰۵۰	۱۶۲۰	

دیگر روش‌های مکان‌یابی

روش دیگری برای کشف سیاره‌های فراخورشیدی، جست‌وجو به دنبال کاهش روشنایی ستاره، به سبب گذر سیاره از مقابل آن است. این فقط برای محدود منظومه‌هایی رخ می‌دهد که صفحه‌ی مداری آن‌ها درست در امتداد دید ما باشد. در این روش، روشنایی متغیر ستاره را بر نموداری به نام منحنی نوری رسم و افت نور حاصل از گذر سیاره را در منحنی پیدا می‌کنند. اخترشناسان با این روش حتی به کمک تلسکوپ‌های بسیار کوچک مجهز به آشکارسازهای حساس، امکان کشف سیاره‌های فراخورشیدی دارند. طرح TRES، که تاکنون چند فراخورشیدی یافته، نمونه‌ای از این موفقیت است. حتی منجمان آماتور نیز با این روش به دنبال جست‌وجوی سیاره‌های فراخورشیدی وارد شده‌اند. روش دیگر، که اثر ریزهم‌گرایی نام دارد، رصد روشنایی ناگهانی است؛ زمانی که میدان گرانشی ستاره‌ی مادر و سیاره‌ی همراه آن مانند یک عدسی عمل می‌کند و نور ستاره‌ی دورتر را افزایش می‌دهد.



روشنایی ستاره به سبب عبور سیاره‌ای به اندازه‌ی زمین، یکده‌هزارم کاهش می‌یابد.

سیاره‌هایی به گرد تپ‌اخترها

تپ‌اختر PSR ۱۲۵۷+۱۲ دست کم سه سیاره به گرد خود دارد که هریک جرمی برابر زمین دارند. سیاره‌ی دیگری هم به دور تپ‌اختر ۲۶- PSR ۱۶۲۰ کشف شده است. تپ‌اخترها بازمانده‌ی ستاره‌های مرده‌اند و زمانی شکل می‌گیرند که ستاره‌ی بزرگ به شکل ابرنواختر منفجر شود. این‌که چگونه امکان دارد این سیاره‌ها از چنین انفجار مهیبی جان سالم به‌در برند، خود معمای است. یک احتمال این است که سیاره‌ها پس از انفجار، از بقایای مانده از انفجار شکل گرفته باشند.

تصویری هنری از تپ‌اختر آن‌طور که از سیاره‌اش دیده می‌شود.



به دنبال زمین‌های دور

فضایی‌های کپلر متعلق به ناسا، که در سال ۲۰۰۹ به فضا رفت، حدود ۱۰۰ هزار ستاره را به دنبال سیاره‌های گذرکننده بررسی خواهد کرد. کپلر به دنبال سیاره‌های زمین‌مانند خواهد بود و نسبت این سیاره‌ها را در مقایسه با غول‌های گازی به‌دست خواهد آورد. سازمان فضایی اروپا نیز طرح سیاره‌یاب فضایی غول‌پیکری با سه آینده‌ی سه متری به نام داروین دارد که پس از سال ۲۰۱۵ پرتاب خواهد شد. در دهه‌ی آینده‌ی میلادی، با راه‌اندازی تلسکوپ‌های غول‌آسای ۲۰ تا ۴۰ متری، کشف سیاره‌های زمین‌مانند از روی زمین نیز ممکن می‌شود. این سال‌ها دوره‌ی بی‌نظیری در علم است که شاید پاسخ این پرسش به‌دست آید که آیا زمین تنها سیاره‌ی زیست‌پذیر کیهان است یا خیر؟

جست‌وجوی منظومه‌های خورشیدی

• در سال ۱۹۶۴، اخترشناس آمریکایی پیتر وین دکمپ (۱۹۰۱-۱۹۹۵)، ادعا کرد که سیاره‌ای را دور ستاره‌ی بارنارد، یکی از نزدیک‌ترین ستاره‌ها به خورشید، کشف کرده است اما ای کشف تأیید نشد.

• در سال ۱۹۸۴، مشخص شد که تابش‌های فروسرخ از ستاره‌ی بتا-سمپایه از قرصی از غبار و گاز در اطراف آن ارسال می‌شود که محل شکل‌گیری سیاره‌هاست.

• نخستین نمونه‌ی قطعی از یک سیاره‌ی فراخورشیدی در سال ۱۹۹۵ در مداری دور ستاره‌ی ۵۱- آسپ بال‌دار کشف شد.

• نخستین تصویر مستقیم از سیاره‌ای فراخورشیدی در سال ۲۰۰۴ با یکی از تلسکوپ‌های ۸ متری VLT در شیلی گرفته شد و یک سال بعد وجود این سیاره دور کوتولم‌ی قهوه‌ای کم‌فروغ PM1۳۰۷ تأیید شد.




کوتولم‌ی قهوه‌ای PM1۳۰۷ و سیاره‌ی آن

بیش‌تر بدانیم

منظومه‌ی شمسی ۹۴، تولد منظومه‌ی شمسی ۱۰۰ حیات در دنیا‌های دیگر ۲۵۶ هوش‌مندان فرازمینی ۲۵۸

قرص در مقایسه با زمین، از لبه دیده می‌شود.

قرص گاز و غبار



تلسکوپ روی ستاره را با قرص تیره‌ای می‌پوشاند تا قرص گاز و غبار اطراف نمایان شود

بتا - سه پایه

اخترشناسان قرص پیش‌سیاره‌ای یافته‌اند که دور ستاره‌های بسیار جوان در حال تکامل است. بتا - سه پایه، ستاره‌ی جوانی است که قرصی از گاز و غبار چرخان اطراف آن را احاطه کرده است. این قرص نسبتاً خنک، اما در طول موج فروسرخ درخشان است. احتمالاً سیاره‌هایی، به همان روشی که سیاره‌های منظومه‌ی شمسی خودمان دور خورشید جوان شکل گرفتند، درون این قرص در حال شکل‌گیری‌اند.

غول‌های سرخ

ستاره‌ها تا ابد زندگی نمی‌کنند. زمانی می‌رسد که ذخیره‌ی هیدروژن به پایان می‌رسد و واکنش‌های هسته‌ای در مرکز آن‌ها رو به خاموشی می‌رود. اما ستاره، به جای کم‌فروغ و ناپدید شدن، باد می‌کند و به غول سرخ درخشان، شاید صدبار بزرگ‌تر از خودش، تبدیل می‌شود. ستاره‌های پُرجرم‌تر اَبَرغول‌هایی قدرت‌مند می‌شوند که آن‌قدر درخشان‌اند که از میان فضای میان‌کهکشانی هم دیده می‌شوند. این تغییر و تبدیل‌ها به این سبب رخ می‌دهد که در اعماق هسته‌ی ستاره از منبع انرژی جدیدی، که همان هلیوم است، استفاده می‌شود و ستاره را تا مدتی دیگر هم درخشان نگه می‌دارد.

درون غول سرخ

منبع حرارت غول سرخ نیز، مانند هر ستاره‌ی دیگری، واکنش‌های هسته‌ای در مرکز آن است. مرکز ستاره، که ذخیره‌ی هیدروژن خود را تمام کرده است، تا یک‌دهم اندازه‌ی پیشین خود منقبض می‌شود و در این حالت، کمی بزرگ‌تر از زمین است. دما و فشار زیاد درون این هسته‌ی کوچک شده، باعث می‌شود ستاره هم‌جوشی هلیوم را آغاز کند و با تبدیل آن به عناصر سنگین‌تری مانند کربن و اکسیژن، انرژی تولید کند. در اطراف هسته‌ی درونی، پوسته‌ی نازکی از هیدروژن به تولید هلیوم ادامه می‌دهد.

درون یک ستاره‌ی غول سرخ

سلول‌های همرفتی حرارت را با جریان‌های بالا و پایین‌رونده‌ی گاز داغ از هسته به سطح هدایت می‌کنند. برخی عناصری که در هسته تولید می‌شوند نیز به سطح می‌آیند.

پوسته‌ی داخلی هلیوم‌سوز با دمای ۱۰۰ میلیون درجه‌ی سانتی‌گراد

کربن و اکسیژن محصولات هم‌جوشی هلیوم هستند.

هلیوم حاصل هیدروژن‌سوزی در رشته‌ی اصلی است.

هیدروژن همچنان در پوسته‌ای خارج از هسته به سوختن ادامه می‌دهد.

نمای بزرگ‌شده‌ی هسته

نقطه‌ی داغ جایی است که جریانی از گاز داغ به سطح می‌رسد. نقاط داغ را می‌توان بر سطح غول‌های سرخ نزدیک آشکار کرد.


غول‌های سرخ بر نمودار هرتسپرونگ-راسل

ستاره‌های پُرجرم به سرعت سوخت خود را مصرف می‌کنند و پس از فقط چند میلیون سال به اَبَرغول تبدیل می‌شوند.

نوار ناپایداری ناحیه‌ای است که ستاره‌های آن می‌تپند و درخشندگی آن‌ها تغییر می‌کند.


تحول ستاره‌های غول

وقتی هیدروژن در هسته‌ی ستاره‌ها تمام شود، وارد مرحله‌ی غولی می‌شوند. وقتی ستاره باد می‌کند و سطح بیرونی آن خنک و سرخ می‌شود، از رشته‌ی اصلی خارج می‌گردد. در این مرحله، ستاره‌های کم‌جرم‌تر به‌طور چشم‌گیری درخشان و وارد ناحیه‌ی غول سرخ می‌شوند. اما درخشندگی ستاره‌های پُرجرم، که خیلی زود به دوره‌ی پایانی زندگی رسیده‌اند، زیاد تغییر نمی‌کند و وارد ناحیه‌ی اَبَرغول‌ها می‌شوند. رنگ ستاره‌ی غول به دمای سطحی آن بستگی دارد؛ ممکن است ستاره‌های اَبَرغول آبی (داغ‌ترین)، سفید، زرد یا قرمز باشند.




بادهای ستاره‌ای

جوّ خارجی بیش‌تر ستاره‌های غول به صورت باد ستاره‌ای تا چند سال نوری در فضا پراکنده می‌شود. سحابی IC ۲۲۲۰ ابری از گاز و غبار است که از ستاره‌ی غول درونش به فضا پراکنده شده است.



آبرغول‌ها

ستاره‌هایی با بیش از ۸ برابر جرم خورشید پس از ترک رشته‌ی اصلی، آبرغول می‌شوند. منبع انرژی آن‌ها هم، مانند غول‌ها، هم‌جوشی هلیوم است. اما برخلاف غول‌ها، در این ستاره‌ها کربن و اکسیژن تولید شده هم در فرآیند هم‌جوشی شرکت می‌کنند و عناصر سنگین‌تری می‌سازند.



قلب العقرب ابرغولی سرخ است.


ستاره‌ی ابرغول قلب العقرب

خورشید با مقیاسی متناسب با غول سرخ

اندازه‌ی خورشید کمتر از ۱۰ درصد از قطر غول سرخ عادی است.

اندازه‌ی غول‌های سرخ

ستاره‌های غول اندازه‌های متفاوتی دارند. وقتی ستاره‌ای عادی تازه رشته‌ی اصلی را ترک می‌کند، ممکن است تا ۲۰۰ برابر قطر خورشید، یعنی تا مدار زمین، باد کرده باشد. وقتی هلیوم سوزی آغاز می‌شود، ستاره کمی کوچک‌تر و تا ۱۰ تا ۱۰۰ برابر قطر خورشید منقبض می‌شود. امکان دارد آبرغول‌ها از این هم بزرگ‌تر و تا هزار برابر قطر خورشید باشند. یکی از بزرگ‌ترین ستاره‌های آسمان، ستاره‌ی آبرغول سرخ مو - قیفاووس است که قطری بیش از قطر مدار زحل دارد.




ممکن است ستاره‌ی غول سرخ بزرگ در مرکز منظومه‌ی شمسی، عطارد، زهره و زمین را در خود فروببرد.

ممکن است ابرغول عادی در مرکز منظومه‌ی شمسی، سیاره‌ها را حتی تا مریخ و مشتری در خود فروببرد.

آینده‌ی خورشید

در حدود ۵ میلیارد سال آینده، ذخیره‌ی هیدروژن خورشید به پایان می‌رسد. در آن زمان، خورشید دو برابر درخشان‌تر از اکنون خواهد بود. وقتی خورشید به غولی سرخ تبدیل شود، به شدت منبسط می‌شود. شاید از مرز زهره هم بگذرد و هزار بار درخشان‌تر از امروز می‌درخشد. وقتی هم‌جوشی هلیوم آغاز شود، خورشید پایدارتر می‌شود و تا ۲ میلیارد سال بعد هم به صورت ستاره‌ای غول، با قطر حدود ۳۰ برابر امروز، خواهد درخشید.



نمای خورشید غول سرخ از زمین

غول‌های برگزیده

نام	قدر	رده‌ی طیفی	فاصله به سال نوری
سهیل	۰/۶-	F۰ آبرغول سفید	۳۱۰
سماک رامح	۰/۰	K۲ غول نارنجی	۳۷
عیوق	۰/۱	G۲ و G۶ غول‌های زرد	۴۲
رجل الجبار	۰/۲	B۸ آبرغول آبی	۸۰۰
یدالجوزا	۰/۵	M۲ ابرغول سرخ	۴۰۰
بتا - قنطورس	۰/۶	B۱ غول آبی	۵۳۰
ذیران	۰/۹	K۵ غول سرخ	۶۵
قلب العقرب	۱/۱	M۱ آبرغول سرخ	۵۰۰
پلوکس	۱/۲	K۰ غول نارنجی	۱۲۹
ردف	۱/۲	A۲ آبرغول سفید	۱۵۰۰
بتا - صلیب جنوبی	۱/۲	B۰ غول آبی	۳۵۰
گاما - صلیب جنوبی	۱/۶	M۴ غول سرخ	۸۸

بیش‌تر بدانیم

ویژگی‌های ستاره‌ها ۱۸۸، چرخه‌ی زندگی ستاره‌ها ۱۹۰، سیاهی‌های سیاره‌ها ۲۰۲ آبرئوناخترها ۲۰۴

دانه‌های سیاه غبار در جو بیرونی ستاره متمرکز شده‌اند و با باد ستاره‌ای به اطراف پراکنده می‌شوند. غبار در فضای میان‌ستاره‌ای پراکنده می‌شود؛ جایی که ممکن است نسل جدید ستاره‌ها را بسازد.

قلب العقرب و ستاره‌های نزدیکش در عقرب



غول‌های سرخ را کجا ببینیم؟

ستاره‌های غول و آبرغول از شناخته شده‌ترین ستاره‌های آسمان هستند. دو غول درخشان آسمان، سماک رامح در عوا و ذبران در ثورند. ستاره‌ی عیوق در اربهران در حقیقت، دو ستاره‌ی غول است که دور هم می‌گردند. برخی آبرغول‌های آسمان، سهیل در شاه‌تخته، رجل الجبار و یدالجوزا در زانو و شانه‌ی شکارچی (جبار)، قلب العقرب در عقرب، و ردف در دجاجة‌اند. ستاره‌ی مو - قیفاووس، که یکی از بزرگ‌ترین آبرغول‌هاست، به سبب رنگ قرمز به ستاره‌ی گارنت (نارسنگ) مشهور است.

سحابی‌های سیاره‌نما

مانند غنچه‌ی گلی که باز می‌شود، سحابی سیاره‌نما هم در فضا گسترده می‌شود. غول سرخ باد کرده مرده است و لایه‌های بیرونی خود را به صورت ابری منبسط شونده، که تا ده‌ها هزار سال دیگر می‌درخشد (چشم بر هم زدنی در مقایسه با عمر ستاره)، به فضا پرتاب می‌کند. همه‌ی ستاره‌ها با جرمی کمتر از ۸ برابر جرم خورشید به این صورت زندگی خود را پایان می‌دهند که موادشان به صورت حلقه‌ها و پوسته‌های درخشان و زیبایی در فضا پراکنده می‌شود. این سحابی به تدریج محو و ناپدید می‌شود؛ اما در قلب آن یک کوتوله‌ی سفید، بقایای داغ و چگال هسته، قرار دارد که طی میلیاردها سال بعدی سرد و خاموش می‌شود تا به کوتوله‌ای سیاه تبدیل شود.

سحابی چشم گربه

وقتی غول سرخی هلیوم بیش‌تری برای سوزاندن نداشته باشد، هسته‌ی آن دوباره منقبض و خود ستاره دوباره منبسط می‌شود. اما این بار انبساط آن‌قدر ناگهانی است که لایه‌های خارجی ستاره برای همیشه در فضا پراکنده می‌شوند. تابش قوی از هسته به شدت داغ ستاره، گازهای فرّار را روشن و یک سحابی سیاره‌نما ایجاد می‌کند (نام این نوع سحابی را ویلیام هرشل سحابی سیاره‌نما گذاشت؛ زیرا به نظر او، این ابرهای قرص‌مانند شبیه سیاره‌ها بودند). سحابی‌های سیاره‌نما فقط چند هزار سال دوام می‌آورند و به دلیل همین عمر کوتاه نیز تقریباً نادرنند؛ در سراسر کهکشان راه شیری فقط حدود ۱۵۰۰ سحابی سیاره‌نما شناخته شده است. سحابی چشم گربه یکی از پیچیده‌ترین آن‌هاست که سنّ آن حدود هزار سال است.

سحابی چشم گربه

کوتوله‌ی سفید در مرکز قرار دارد. در حقیقت، این ستاره هسته‌ی سوخته‌ی عولی سرخ است که اخترشناسان تصور می‌کنند شاید بخشی از یک منظومه‌ی ستاره‌ای دوتایی باشد.

سحابی حلقه و ستاره‌های نزدیک آن


رصد سحابی‌های سیاره‌نما

سیاره‌نماها کم‌فروغ‌اند و بدون تلسکوپ یا دوربین دوچشمی مناسب دیده نمی‌شوند. یکی از سحابی‌هایی که یافتن آن بسیار ساده است، سحابی حلقه در شلیاق است که در جنوب شرقی ستاره‌ی سر و شرق ستاره‌ی تا - شلیاق قرار دارد با تلسکوپ و در بزرگنمایی مناسب، این سحابی شبیه حلقه‌ی کوچک و کم‌بوری از دود به‌نظر می‌رسد.



سحابی پروانه

یکی از زیباترین سیاره‌نماها، سحابی پروانه (با نام رسمی مینکوسکی ۲-۹) نمونه‌ای از سیاره‌نماهای دوقطبی است. اخترشناسان بر این باورند که کوتوله‌ی سفید در مرکز این سحابی مواد را از ستاره‌ی هم‌دم بزرگ‌تری به سوی خود می‌کشد و قرص چرخانی را گار و عبار دور آن ایجاد می‌کند. وقتی غول سرخ لایه‌های خارجی خود را به بیرون پرتاب می‌کند، این قرص مواد را در دو سو، به شکل دو فوران یا جت، منحرف می‌کند که با سرعت بیش از ۳۰۰ کیلومتر بر ثانیه گسترش می‌یابند این سحابی در فاصله‌ی حدود ۲۱۰۰ سال نوری از زمین در جهت صورت فلکی مارافسای قرار دارد و سنّ آن حدود ۱۲۰۰ سال است.





ستاره‌ی شباهنگ B نزدیک‌ترین کوتوله‌ی سفید به خورشید است که در این تصویر به صورت ستاره‌ی کوچکی دور ستاره‌ی درخشان شباهنگ دیده می‌شود.

کوتوله‌های سفید


در مرکز هر سحابی سیاره‌نما، ستاره‌ای داغ و کوچک به نام کوتوله‌ی سفید وجود دارد. این ستاره هسته‌ی سوخته‌ی غول سرخ اصلی است؛ جرمی پُر از کربن و اکسیژن که از هم‌جوشی هلیوم تولید شده است. در این حالت، لایه‌های بیرونی غول سرخ پراکنده شده و هسته‌ی عریان آن تنها مانده است. کوتوله‌های سفید، که دیگر انرژی تولید نمی‌کنند، آن‌قدر روی خود رُمبیده‌اند که به حجم کوچکی تبدیل شده‌اند. کوتوله‌ی سفید عادی به جرم خورشید، تا حجمی به اندازه‌ی زمین فشرده می‌شود. امکان دارد حدود ۱۰ درصد از کل ستاره‌های کهکشان، کوتوله‌های سفید باشند؛ اما آن‌قدر کم‌نورند که فقط می‌توان نزدیک‌ترین‌ها را دید.

هیدروژن بیشتر ماده‌ی درون سحابی را تشکیل می‌دهد. در این تصویر تلسکوپ فضایی هابل، هیدروژن به رنگ قرمز نشان داده شده است.

عناصر سنگین‌تر، مانند اکسیژن و نیتروژن، به رنگ سبز و آبی نشان داده شده‌اند.


تکامل کوتوله‌های سفید

وقتی غول سرخی لایه‌های خارجی خود را پس می‌زند، هسته‌ی عریان آن به صورت ستاره‌ی مرکزی درخشان در سحابی سیاره‌نما، در گوشه‌ی چپ نمودار هرتسپرونگ-راسل، دیده می‌شود. این هسته به شدت داغ است و مانند نقطه‌ای نورانی با دمایی تا ۱۰۰ هزار درجه‌ی سانتی‌گراد به نظر می‌رسد. به مرور که هسته خنک می‌شود، به سوی پایین چپ نمودار، بخش کوتوله‌های سفید، منتقل می‌شود. این ستاره دیگر هیچ سوخت هسته‌ای برای سوزاندن ندارد و به تدریج سرد و ناپدید و در نمودار به گوشه‌ی پایین راست منتقل می‌شود.



چگالی کوتوله‌های سفید

مواد ستاره‌ی کوتوله‌ی سفید ۱ میلیون بار چگال‌تر از آب است. بنابراین، میدان گرانشی اطراف یک کوتوله‌ی سفید بسیار شدید است. شخصی که روی کوتوله‌ی سفیدی بایستد، حدود ۲۰۰ تن وزن خواهد داشت. یک قوطی کبریت از ماده‌ی کوتوله‌ی سفید به اندازه‌ی یک فیل وزن دارد!



کوتوله‌ی سفید کم‌جرم‌تر، بزرگ‌تر است.

هرچه کوتوله‌ی سفید پُرجرم‌تر باشد، کوچک‌تر و چگال‌تر است.

حد چاندراسکار

هیچ کوتوله‌ی سفیدی نمی‌تواند پُرجرم‌تر از ۱/۴ جرم خورشید باشد. این کشف عجیب را سوبرامانیان چاندراسکار در سال ۱۹۳۰ انجام داد. او دریافت که هرچه کوتوله‌ی سفید پُرجرم‌تر باشد، بر اثر نیروی گرانش، بیش‌تر روی خود فرومی‌ریزد و اندازه‌اش کوچک‌تر می‌شود. اگر هسته‌ی ستاره‌ی سوخته (در آخرین مرحله‌ی غول سرخ) سنگین‌تر از ۱/۴ جرم خورشید باشد (حد چاندراسکار)، رمبش هسته به جای تولید کوتوله‌ی سفید، جرم کوچک‌تر و بسیار فشرده‌تری می‌سازد که ستاره‌ی نوترونی یا سیاه‌چاله است.



سحابی درخشان از گازی ساخته می‌شود که از ستاره در مرحله‌ی غول سرخی آن به فضا پراکنده شده است. این گاز از تابش کوتوله‌ی سفید مرکز سحابی گرم می‌ماند.

سحابی‌های سیاره‌نمای مهم			
نام	صورت فلکی	فاصله به سال نوری	اندازه به سال نوری
هلیکس (NGC ۷۲۹۳)	دلو	۴۵۰	۱/۰
ذمیل (M ۲۷)	روباهک	۱۰۰۰	۱/۵
چغد (M ۹۷)	دب اکبر	۱۳۰۰	۱/۰
حشره (NGC ۶۳۰۲)	عقرب	۶۵۰۰	۰/۵
حلقه (M ۵۷)	شلیاق	۲۰۰۰	۱/۵
زحل (NGC ۷۰۰۹)	دلو	۳۰۰۰	۱/۵
اسکیمو (NGC ۲۳۹۲)	دوبیکر	۳۰۰۰	۰/۵
سیاره‌نمای چشم‌ک‌زن (NGC ۶۸۲۶)	دجاجة	۳۲۰۰	۲/۵
ذمیل کوچک (M ۷۶)	برسائوش	۳۵۰۰	۵/۰
چشم‌گریبه (NGC ۶۵۴۳)	اژدها	۳۰۰۰	۶/۰
بیش‌تر بدانیم			
ویژگی‌های ستاره‌ها ۱۸۸، غول‌های سرخ ۲۰۰			
ابر نواخترها ۲۰۴، ستاره‌های نوترونی ۲۰۶، سیاه‌چاله‌ها ۲۰۸			


آبرنواخترها



انواع دیگر آبرنواختر

آبرغولی که منفجر شود، آبرنواخترها نوع دوم (II) است؛ آبرنواختر نوع اول (Ia) حتی از این هم بسیار پر قدرت‌تر است. وقتی کوتوله‌ی سفید کوچک و چگال از ستاره‌ی همدم خود گاز جذب کند، ممکن است جرم آن به اندازه‌ای افزایش یابد که نتواند بیش از آن فشار گرانشی خود را تحمل کند و بر سر خود فرو بریزد (پُر می‌شد) و در انفجاری مهیب نابود شود. آبرنواختر نوع اول همیشه به درخشندگی یکسانی می‌رسد؛ زیرا جرم آستانه‌ی رمیش کوتوله‌ی سفید $1/4$ جرم خورشید، یعنی حد چاندرا سکار است. در نتیجه می‌توان از آن برای اندازه‌گیری فاصله تا کهکشان‌های دوردست استفاده کرد.

پُر جرم‌ترین ستاره‌های عالم، زندگی خود را با انفجاری عظیم به نام آبرنواخترها به پایان می‌برند. ستاره ماده‌ی خود را به سوی فضا پرتاب می‌کند و ممکن است درخشندگی آن چند روزی از کل یک کهکشان هم بیش‌تر باشد. ما هنوز هم می‌توانیم بقایای درخشان ستاره‌های منفجر شده را، که صدها یا هزاران سال پیش از هم پاشیده‌اند، ببینیم. آبرنواخترها نادرند؛ در کهکشان خودمان به طور میانگین در هر قرن یک یا دو آبرنواختر رخ می‌دهد که برخی از آن‌ها نیز در پس غبار کهکشان پنهان می‌شوند. آخرین آبرنواختر قطعی که در راه شیری دیده شد، آبرنواختر کپلر در سال ۱۶۰۴ بود. اما اخترشناسان، به‌خصوص رصدگران آماتور، تعداد بسیار بیش‌تری را در دیگر کهکشان‌ها یافته‌اند.




رُمبش یک ستاره

وقتی ستاره‌ای پُر جرم‌تر از حدود ۸ برابر جرم خورشید، ذخیره‌ی هیدروژن خود را به پایان می‌رساند، باد می‌کند و به یک آبرغول تبدیل می‌شود. آبرغول‌ها، برخلاف غول‌ها، در درون به حد کافی گرم‌اند و می‌توانند کربن و اکسیژن حاصل از هلیوم‌سوزی را نیز به جای سوخت مصرف و عناصر سنگین‌تری تولید کنند. آبرغول‌ها می‌توانند عناصری به سنگینی آهن تولید کنند.

در فرآیند واپاشی آهن، در هسته فورانی از درات ریز اتمی نوترینو ایجاد می‌شود. آن‌ها بدون مزاحمت از لایه‌های ستاره به بیرون می‌گریزند.


لایه‌های خارجی هسته به سوی درون می‌ریزند.

موج‌ضربه‌ی زمبش از میان ستاره به بیرون هجوم می‌برد و با انفجاری مهیب، آن را متلاشی می‌کند. عناصر سنگینی که به فضا پرتاب می‌شوند، به ساختن نسل بعدی ستاره‌ها کمک می‌کنند.




هسته‌ی آهنی به حد $1/4$ جرم خورشید می‌رسد و نمی‌تواند وزن خود را تحمل کند. در نتیجه، به روی خود می‌ریزد و با واپاشی آهن، باعث ایجاد واکنش‌هایی می‌شود که به تولید ایزوتوپ‌های گوناگون و عناصر سنگین‌تر از آهن می‌انجامد.

از هسته‌ی رُمبیده، ستاره‌ی نوترونی یا سیاهچاله شکل می‌گیرد.



ابر نواختر ۱۹۸۷ا تا بیستم ماه مه آن سال، درخشندگی‌اش شد و عامل درخشندگی آن هم عناصر رادیواکتیوی بودند که در انفجار تولید شده بودند. ساختار و جرم ستاره‌ی اولیه بر پیش‌بینی درخشندگی آن تأثیر می‌گذارد.



سه سال پیش از انفجار، ستاره‌ای که ابر نواختر ۱۹۸۷ا را ساخت، ابرغول آبی رنگی بود که به زحمت دیده می‌شد. جرم این ستاره ابتدا ۴۰ برابر خورشید بود.

آبرنواختر ۱۹۸۷ا

درخشان‌ترین آبرنواختر دیده شده از زمین در چهار قرن گذشته، روز بیست و سوم فوریه‌ی سال ۱۹۸۷ در ابر بزرگ ماژلان، یکی از کهکشان‌های کوچک قمر راه شیری، رخ داد. طی ۸۵ روز، درخشندگی ستاره به قدر $2/8$ رسید. به‌طوری که به سادگی با چشم غیر مسلح دیده می‌شد. اما درخشندگی حقیقی آن به‌نحو شگفت‌انگیزی در مقایسه با آبرنواخترهای کهکشان‌های دوردست، کمتر بود. اخترشناسان سه ساعت پیش از آغاز درخشان شدن ستاره، فورانی از نوترینو را از رُمبش هسته‌ی آن ثبت کردند.

بازمانده‌ی ابرنواختر

بقایای ستاره‌های منفجر شده بسیار داغ‌اند و تا هزاران سال به انبساط و درخشش ادامه می‌دهند. تاکنون بیش از ۲۵۰ بازمانده‌ی انفجار ابرنواختری شناسایی شده‌اند. این تصویر پرتو ایکس بازمانده‌ی ابرنواختری را نشان می‌دهد که در سال ۱۵۷۲ در صورت فلکی ذات‌الکرسی منفجر شد. این ابرنواختر به نام تیکو براهه، رصدگری که آن را به دقت بررسی کرد، مشهور شده است.

بقایای ابرنواختر تیکو



لایه‌ی خارجی ستاره در فضا به شدت متبسط می‌شود.

ابرنواخترهای برگزیده

سال	صورت فلکی	قدر	فاصله به سال نوری
۱۸۵	قنطورس	۲-	۸۲۰۰
۳۸۶	قوس	۱/۵	۱۶۰۰۰
۳۹۳	عقرب	۳-	۳۴۰۰۰
۱۰۰۶	گرگ	۷/۵-	۷۱۰۰
۱۰۵۴	ثور	۵/۵-	۶۵۰۰
۱۱۸۱	ذات‌الکرسی	۱-	۸۸۰۰
۱۵۷۲	ذات‌الکرسی	۴-	۷۵۰۰
۱۶۰۴	مار افسای	۳-	۱۲۵۰۰
۱۹۸۷	ماهی‌طلایی	۲/۸	۱۶۰۰۰۰




بقایای ستاره‌ای

سحابی بازمانده‌ی ابرنواختری بادبان، باقی‌مانده‌ی ستاره‌ای است که حدود ۱۱ هزار سال پیش منفجر شد. مرکز آن حدود ۱۵۰۰ سال نوری از خورشید فاصله دارد. موادی که با سرعت هزاران کیلومتر بر ثانیه متبسط می‌شوند، با لایه‌های گاز در فضا برخورد، آن‌ها را گرم و وادار به تابش کردند. نور سرخ، حاصل هیدروژن و نور آبی، حاصل اکسیژن است. تابش داغ بازمانده‌ی ابرنواختری بادبان را می‌توان با تلسکوپ‌های پرتو ایکس مشاهده کرد.



عکسی از سال ۱۹۴۰ از کهکشان NGC ۴۷۲۵ در صورت فلکی گیسوان برنیکه.

مکان ابرنواختر



عکسی از سال ۱۹۴۱ از همان منطقه که در آن ابرنواختری درخشان دیده می‌شود. با مقایسه‌ی چنین عکس‌هایی می‌توان تغییرات ستاره‌های کهکشان را آشکار کرد.

جست‌وجوی ابرنواخترها

اخترشناسان نمی‌توانند زمان دقیق انفجار ستاره‌ها را پیش‌بینی کنند و تا همین اواخر ابرنواخترها فقط بر حسب تصادف کشف شدند. در روزگار ما، اخترشناسان حرفه‌ای برای جست‌وجوی صدها کهکشان دوردست در یک شب، از تلسکوپ‌های خودکار و رایانه استفاده می‌کنند. اخترشناسان آماتور نیز در شکار ابرنواخترها نقش مهمی دارند. برخی از روش عکاسی سنتی و برخی از دوربین‌های الکترونیکی استفاده می‌کنند، در حالی که بسیاری نیز فقط از چشم‌ان و حافظه‌ی خود بهره می‌برند. از سال ۱۹۵۷، که نخستین کشف آماتوری یک ابرنواختر رخ داد، تا به حال منجمان آماتور صدها ابرنواختر کشف کرده‌اند. آن‌ها به‌طور مستقل یا در شبکه‌ی جهانی جست‌وجوگران ابرنواخترها، این جرم‌ها را در کهکشان‌های گوناگون می‌یابند.

اکتشاف ابرنواخترها

• نخستین رصد ثبت شده‌ی یک ابرنواختر را اخترشناسان چینی در قرن دوم میلادی انجام دادند.

• ابرنواختر سال ۱۰۵۶ میلادی به روش‌نایی ۱۵ برابر سیاره‌ی زهره رسید و به پرنورترین ابرنواختر ثبت شده در تاریخ بدل شد. اخترشناسانی از آسیای شرقی تا کشورهای اسلامی، آن را ثبت کردند.

• ابرنواختر درخشانی که چینی‌ها در سال ۱۰۵۴ میلادی ثبت کردند، به شکل‌گیری سحابی خرچنگ در صورت فلکی ثور منجر شد. احتمالاً این ابرنواختر در نقاشی‌های دیواری بومیان آمریکا در آن زمان نیز ثبت شده است.

• آخرین ابرنواختری را که در کهکشان ما رصد شده، یوهانس کپلر در سال ۱۶۰۴ ثبت کرده است. این ابرنواختر در درخشان‌ترین حالت به قدر ۳ رسید (در سال ۱۶۸۰ نیز جان فلامستید ستاره‌ی کم‌نوری را در ذات‌الکرسی ثبت کرد که شاید ابرنواختر سازنده‌ی سحابی و منبع رادیویی ذات‌الکرسی A باشد).

• نخستین بار سحابی خرچنگ (M1) را شارل مسیه در فهرست سال ۱۷۷۱ خود ثبت کرد.

• در سال ۱۸۸۵، ارنست هارتویگ (۱۸۵۱-۱۹۲۳) اخترشناس آلمانی، ستاره‌ی جدید درخشانی را در کهکشان فسیلسله (آندرومدا) کشف کرد که نخستین ابرنواختری بود که در کهکشان دیگر رصد می‌شد. اما آن زمان، که از ماهیت کهکشانی جرم‌ها، مانند کهکشان مسلسله خبر نداشتند، این ستاره را نواختر دانستند.

• واژه‌ی ابرنواختر (سوپرنوا) را والتر باده و فریتزر زوییگی در سال ۱۹۳۴ ابداع کردند.

• در سال ۱۹۴۲، دانشمندان دریافتند که سحابی خرچنگ بقایای درخشان ابرنواختر سال ۱۰۵۴ میلادی است.

• در دهه‌ی ۱۹۵۰ میلادی، ویلیام فولر (۱۹۱۱-۱۹۹۵) اخترشناس آمریکایی و فرد هویل توضیح دادند که ولتی سوخت ستاره‌ای پر جرم به پایان می‌رسد، چگونه ابرنواختری شکل می‌گیرد.

• ابرنواختر ۱۹۸۷A در ابر بزرگ ماژلان نخستین ابرنواختر نزدیک بود که با ابزارهای جدید بررسی شد.

بیش‌تر بدانیم

تلسکوپ‌های عجیب ۴۰
چرخه‌ی زندگی ستاره‌ها ۱۹۰
ستاره‌های نوترونی ۲۰۶
سیاه‌چاله‌ها ۲۰۸
مقیاس کیهان ۲۳۸

ستاره‌های نوترونی

سحابی خرچک

انفجار یک ابرنواختر نشان از مرگ یک ستاره دارد؛ اما همان ستاره به گونه‌ای دیگر دوباره متولد می‌شود. بخش‌های خارجی ستاره زمانی در فضا پراکنده می‌شوند که هسته‌ی آن بر خود می‌رُمبد و به ستاره‌ی نوترونی تبدیل می‌شود؛ در این حالت، جسمی کوچک و اُبرچگال $1/5$ برابر جرم خورشید را در فضایی به پهنای نصف شهر تهران فشرده کرده است. ستاره‌های نوترونی، به سبب میدان‌های گرانشی و مغناطیسی بسیار قدرت‌مند خود، معمولاً به تپ‌اختر تبدیل می‌شوند. تپ‌اخترهای رادیویی، تپ‌های منظمی از امواج رادیویی و تپ‌اخترهای پرتو ایکس مانند هم‌نوعان خود، فوران‌های منظمی دارند اما در تابش پرنرژی ایکس، شاید کهکشان راه شیری مملو از بقایای تیره‌ی این اجسام عجیب باشد.

سحابی خرچک


شناخته شده‌ترین ستاره‌ی نوترونی در قلب سحابی خرچک قرار دارد که بازمانده‌ی انفجار ابرنواختری سال ۱۰۵۴ میلادی است. با آن‌که بیش‌تر ماده‌ی ستاره در ناحیه‌ای به گستردگی ۱۵ سال نوری در فضا پراکنده شده، هسته‌ی رُمبیده‌ی ستاره باقی مانده و $1/5$ جرم خورشیدی در خود حفظ کرده است. این ستاره‌ی نوترونی، که با سرعت سرسام‌آور ۳۰ بار در ثانیه دور خود می‌چرخد، انرژی را به شکل نور مرئی، امواج رادیویی و پرتو ایکس ارسال می‌دارد و مانند اجاقی روشن، سبب درخشش سحابی بازمانده‌ی ابرنواختری می‌شود.

گاز حاصل از انفجار با سرعت هزار کیلومتر بر ثانیه به بیرون پرتاب می‌شود.

درون ستاره‌ی نوترونی

ستاره‌های نوترونی از گاز ساخته نشده‌اند؛ بلکه ترکیبی از ماده به حالت جامد و مایع‌اند. پوسته‌ی خارجی از آهن جامد و زیر آن مایعی است که بیش‌تر از ذرات ریز اتمی به نام نوترون تشکیل شده است. وقتی هسته‌ی ستاره رُمبید، بیش‌تر اتم‌ها در فشار گرانشی شدید واپاشیدند الکترون‌ها و پروتون‌ها با فشار با هم ترکیب و نوترون‌ها تشکیل شدند.

درون ستاره‌ی نوترونی



پرتوهای تابش تپ‌اختر، گاز اطراف را روشن می‌کند.

ستاره‌ی مرکزی یک تپ‌اختر است؛ ستاره‌ی نوترونی چرخانی با میدان مغناطیسی بسیار قدرتمند که انرژی آن موجب تابش سحابی می‌شود.

تپ‌اخترهای برگزیده

نام	دوره‌ی تناوب به ثانیه	فاصله به سال نوری	توضیحات
میلی‌ثانیه‌ای	۰/۰۰۲	۳۱/۰۰۰	نخستین تپ‌اختر رده‌ی میلی‌ثانیه‌ای
بیوه‌ی سیاه *	۰/۰۰۲	۵/۰۰۰	تپ‌اختر دوتایی
خرچنگ	۰/۰۳۳	۸/۱۰۰	در سال ۱۰۵۴ شکل گرفته است
دوتایی	۰/۰۵۹	۲۳/۰۰۰	نخستین تپ‌اختر دوتایی
بادبان	۰/۰۸۹	۱/۵۰۰	منبع پرتو گاما
PSR ۱۹۱۹+۲۱	۱/۳۳۷	۲/۱۰۰	نخستین تپ‌اختر رادیویی
J ۱۹۵۱+۱۱	۵/۰۹۴	۵/۴۰۰	یکی از بلندترین دوره‌های تناوب
جمینگا	۰/۲۳۷	۵۲۰	تپ‌اختر پرتو ایکس و گاما
جائی ۱ - X	۱/۲۴	۱۵/۰۰۰	تپ‌اختر پرتو ایکس
قنطورس ۳ - X	۴/۸۴	۲۵/۰۰۰	نخستین تپ‌اختر پرتو ایکس

* بیوه‌ی سیاه نام نوعی عنکبوت بسیار سخی است. در این روش نام‌گذاری، اعداد مختصات استوایی جرم‌اند و ابتدا بعد و سپس میل آن‌را نشان می‌دهند.

چگالی ستاره‌ی نوترونی

نوترون‌های ستاره‌ی نوترونی ذراتی بسیار کوچک‌اند و بسیار تنگ به هم فشرده شده‌اند. به همین سبب، این ستاره‌ها به نحو خارق‌العاده‌ای چگال‌اند و در قلمرو اطرافشان گرانش آن‌ها قوی است. به‌طوری که یک موشک برای بلند شدن از سطح آن‌ها باید سرعت اولیه‌ای معادل نصف سرعت نور داشته باشد. چگالی ستاره‌ی نوترونی چنان زیاد است که به اندازه‌ی یک سکه‌ی ۵۰ تومانی از ماده‌ی آن برابر تمام جمعیت انسانی روی زمین جرم دارد. ستاره‌ی نوترونی سنگین‌تر از حدود ۳ برابر جرم خورشید، در اثر گرانش خود دوباره می‌رُمبد و به سیاه‌چاله تبدیل می‌شود.




یک سر سوزن از ماده‌ی ستاره‌ی نوترونی، دو برابر بزرگ‌ترین گشتی ابرتانکر جهان وزن، یا به‌طور دقیق‌تر، جرم دارد.

تپاخترها

از سال ۱۹۶۷، که نخستین تپاختر از تپ‌های رادیویی منظم و شگفت‌انگیز آن کشف شد، اخترشناسان حدود ۲ هزار تپاختر کشف کرده‌اند. تپاخترها ستاره‌های نوترونی چرخان و بسیار مغناطیسی‌اند که فوران‌های منظم امواج رادیویی ارسال می‌کنند. سریع‌ترین تپاختر بیش از ۷۰۰ بار در ثانیه می‌تپد (سریع‌ترین مخلوط‌کن‌های آشپزخانه ۵۰۰ بار در ثانیه می‌چرخند). از سوی دیگر، آرام‌ترین تپاخترها هر ۸ ثانیه یک تپ ارسال می‌کنند. بیش‌تر تپاخترهای شناخته شده، در کهکشان راه شیری قرار دارند و بسیاری از آن‌ها در خوشه‌های کروی پیدا شده‌اند. مگنتارها یا مغناطیخترها نوع تازه شناخته شده‌ای از ستاره‌های نوترونی‌اند که میدان مغناطیسی بسیار قدرتمندی دارند. شاید آن‌ها منشأ برخی فوران‌های اسرارآمیز پرتو گاما از فضا باشند.

ولتی پرتوهای رادیویی تپاختر با گاز اطراف آن برخورد می‌کند، دو رشته‌ای موج‌گازمانند در بیرون دو فوران ظاهر می‌شود.



سازوکار تپاخترها


قطب‌های مغناطیسی ستاره‌ی نوترونی، به سبب چرخش سریع و میدان مغناطیسی بسیار قدرتمندی که دارد، به نواحی فعال و تابانی تبدیل می‌شود. ممکن است امتداد یکی از این قطب‌ها به سمت زمین باشد (امتداد قطب‌های مغناطیسی با محور چرخش یکی نیست). در این صورت، هربار که این پرتو در جهت دید ما باشد، می‌توانیم آن را درست مانند نور یک چراغ دریایی آشکار کنیم. این تپ‌ها مانند ساعتی فوق دقیق‌اند و هزاران سال طول می‌کشد که دوره‌ی تناوب آن‌ها تغییر اندکی پیدا کند. اما به هر حال، ستاره‌ی نوترونی چرخان به تدریج تمام انرژی خود را تابش می‌کند و آرام می‌گیرد. پس از میلیون‌ها سال، گردش آن به اندازه‌ای کند می‌شود که قطب‌های مغناطیسی امواج رادیویی ارسال نمی‌کنند و سرانجام ستاره از نظر ناپدید می‌شود.

تپاخترهای باز یافته

برخی اخترهای رادیویی بسیار به سرعت می‌چرخند و در هر ثانیه صدها تپ ارسال می‌کنند. به تندرست‌ترین آن‌ها تپاخترهای میلی‌ثانیه‌ای می‌گویند. اخترشناسان بر این باورند که بیش‌تر آن‌ها تپاخترهای قدیمی‌اند که مدت‌ها پیش آرام گرفته و مرده‌اند؛ اما دوباره به سبب بلعیدن گاز ستاره‌ی هم‌دم، که در حال گذر از مرحله‌ی غول سرخی است، دوباره تند و فعال شده‌اند و تپ‌هایی می‌فرستند. شاید دوتایی‌های پرتو ایکس مثالی از تپاخترهای قدیمی باشند که به زندگی بازگشته‌اند.

بیش‌تر بدانیم

اخترشناسی پرتو ایکس ۳۴
چرخشی زندگی ستاره‌ها ۱۹۰
غول‌های سرخ ۲۰۰
ابرنواخترها ۲۰۴، سیاهچاله‌ها ۲۰۸




تپاخترهای مرئی

تعداد کمی از تپاخترها، علاوه بر امواج رادیویی، تپ‌هایی از نور مرئی هم ارسال می‌کنند. تپاختر درون سحابی خرچنگ مانند ستاره‌ای است که در هر ثانیه ۳۰ بار خاموش و روشن می‌شود. تپاختری دیگر، در بازمانده‌ی ابرنواختری بادبان، ۱۱ بار در هر ثانیه می‌تپد.

دوتایی‌های پرتو ایکس

برخی تپاخترها به جای امواج رادیویی، پرتوهای ایکس ارسال می‌دارند. ستاره‌ی نوترونی در منظومه‌ای دوتایی از ستاره‌ی عادی هم‌دم خود گاز می‌کشد. این گاز در میدان مغناطیسی قوی ستاره‌ی نوترونی به دام می‌افتد و به سوی قطب‌ها، جایی که گاز با سطح برخورد می‌کند، سرازیر می‌شود. نقطه‌ای داغ و تابان در پرتو ایکس، با دمای حدود ۱۰۰ میلیون درجه‌ی سانتی‌گراد، شکل می‌گیرد و هرگاه که نقطه‌ی داغ در دیدرس ما قرار می‌گیرد، تپی از پرتو ایکس می‌بینیم.



جفت ستاره‌ی نوترونی در مداری گردابی دور هم می‌گردند و آرام‌آرام به هم نزدیک می‌شوند.


تپاخترهای دوتایی

برخی تپاخترها دور ستاره‌های دیگری می‌گردند و منظومه‌ای به نام تپاختر دوتایی شکل می‌دهند. ممکن است ستاره‌ی هم‌دم، ستاره‌ای عادی، کوتوله‌ای سفید یا ستاره‌ای نوترونی باشد. اخترشناسان ارسال تپ‌ها را در منظومه‌هایی با دو ستاره‌ی نوترونی اندازه گرفتند و دریافتند که ستاره‌های نوترونی به آهستگی در حرکتی مارپیچی به سوی هم می‌روند. آن‌ها سرانجام با هم برخورد می‌کنند و در زمبش انفجاری شدیدی، شاید حتی سیاهچاله‌ای بسازند.

سیاه چاله‌ها

سیاه چاله‌ها عجیب‌ترین اجسام کیهان‌اند که به درستی چنین نام گرفته‌اند؛ زیرا هیچ نوری از آن‌ها فرستاده نمی‌شود که اطلاعاتی به دست دهد. علاوه بر این، بیش‌تر سیاه چاله‌ها مرحله‌ی نهایی زندگی درخشان‌ترین ستاره‌های کیهان، یعنی ستاره‌های غول هستند که آبرنواختر شده‌اند. هسته‌ی بی‌نهایت فشرده‌ای که پس از انفجار باقی می‌ماند، چنان گرانش قدرتمندی دارد که حتی نور هم نمی‌تواند از آن بگریزد؛ پس این جسم سیاه است و چون هیچ چیز نمی‌تواند سرعتی بیش از سرعت نور داشته باشد، هر آن‌چه بر این جسم سقوط کند، تا ابد آن‌جا به دام افتاده است. بنابراین، این جسم چاله‌ای در فضا نیز به حساب می‌آید. ردیابی سیاه چاله‌ها در پس‌زمینه‌ی سیاه فضا، کار بسیار مشکلی است؛ اما اخترشناسان مطمئن هستند که آن‌ها وجود دارند.

بقایای ابرنواختری



پرتوهای ایکسی که از گاز داغ انفجار روانه شده‌اند.

بدون ستاره‌ی نوترونی مرکزی

شکل‌گیری

وقتی آبرنواختری منفجر می‌شود، هسته‌ی ستاره ناگهان چنان روی خود می‌رُمید که به ستاره‌ی نوترونی تبدیل می‌شود. اما همیشه این اتفاق نمی‌افتد. در این طرح خیالی از باقی مانده‌ی آتشین آبرنواختر، هیچ نشانی از ستاره‌ی نوترونی مرکزی نیست. اگر هسته‌ی رُمیده، سنگین‌تر از حدود ۳ برابر جرم خورشید باشد، حتی نوترون‌های کاملاً به هم فشرده نمی‌توانند در برابر این گرانش دوام بیاورند و ستاره به کلی بر خود می‌رُمید تا به سیاه چاله تبدیل شود. هیچ نیرویی جلودار این فروریزش گرانشی نیست و از دید محاسبات ریاضی، ستاره تا ابد می‌رُمید و به سوی نقطه‌ای در فضا با چگالی بی‌نهایت به نام تکینگی میل می‌کند.

جریان سرازیر شده از ستاره با گاز اطراف سیاه چاله برخورد و نقطه‌ی داغ درخشانی ایجاد می‌کند.

آشکارسازی


بیش‌تر سیاه چاله‌ها را فقط در صورتی می‌توان آشکار کرد که به ستاره‌ی دیگری نزدیک باشند. گرانش قدرتمند این سیاه چاله‌ها نهرهایی از گاز را با سرعت بسیار زیاد از ستاره‌ی همدم خود می‌رباید. گاز به سوی مرکز سیاه چاله سرازیر می‌شود و گردابی مارپیچی، به نام قرص برآفرایشی، دور آن شکل می‌دهد. اصطکاک آن‌قدر این گاز چرخان را داغ می‌کند که به شدت می‌تابد. داغ‌ترین بخش‌ها به دمای ۱۰۰ میلیون درجه‌ی سانتی‌گراد می‌رسند و پرتو ایکس روانه می‌کنند.

سیاه چاله‌های ابربرجرم


جرم برخی سیاه چاله‌ها چند میلیون یا حتی چند میلیارد برابر خورشید است. آن‌ها در مرکز کهکشان‌ها خانه دارند و نه بر اثر یک انفجار آبرنواختری، بلکه به سبب رُمبش ابرهای گازی عظیم در گذشته‌ی کهکشان یا بر اثر ادغام انبوه سیاه چاله‌های ستاره‌ای در مرکز کهکشان شکل گرفته‌اند. گرانش شدید آن‌ها غبار و گاز را از نواحی عظیمی از فضا جذب می‌کند و قرص‌های برآفرایشی پُرجرمی را شکل می‌دهد. امکان دارد این قرص‌ها به سبب غبار یا فعالیت کم، تیره به نظر برسند؛ مانند سیاه چاله‌ی کهکشان NGC ۴۲۶۱ یا به روشنی بدرخشند که به آن‌ها اختروش گفته می‌شود. در سال‌های اخیر، نشانه‌هایی از وجود دسته‌ی سوم از سیاه چاله‌ها به نام میان‌وزن نیز پیدا شده است. آن‌ها با جرم چند هزار خورشید نه ستاره و نه کهکشان‌اند و احتمالاً در مرکز خوشه‌های کروی شکل می‌گیرند.

حلقه‌ی غبار، قرص برآفرایشی را تغذیه می‌کند.

ناحیه‌ی سیاه چاله



کهکشان فعال NGC ۴۲۶۱



وزن کشی سیاه چاله‌ها

وقتی اخترشناسان ستاره‌ای را در مدار همدمی ناپیدا می‌یابند، می‌توانند از چگونگی گردش مداری، ستاره همدم را وزن‌کشی کنند تا دریابند که آیا ستاره‌ای نوترونی است یا یک سیاه چاله. ستاره‌ی نوترونی بیش از ۳ برابر خورشید جرم ندارد؛ پس سنگین‌تر از این حد، باید سیاه چاله باشد. هر دو جسم دور یک نقطه‌ی تعادل یا مرکز جرم در منظومه می‌گردند و جرم نسبی این دو ستاره را می‌توان با یافتن موقعیت دقیق این نقطه‌ی تعادل محاسبه کرد. اخترشناسان جرم ستاره‌ی مرئی را به کمک درخشندگی و رنگ آن تخمین می‌زنند و سپس می‌توانند جرم همدم را محاسبه کنند.

سیاه چاله‌های منتخب		
نام	جرم	جرم ستاره‌ی همدم
MGRO ۱۶۵۵-۴۰	۵/۵ خورشید	۱/۲ خورشید
LMC X-۳ (در ابر کوچک ماژلان)	۶/۵ خورشید	۲۰ خورشید
JO ۴۲۲۴۳۲	۱۰ خورشید	۰/۳ خورشید
A ۰۶۲۰۰۰	۱۱ خورشید	۰/۵ خورشید
دجاجة ۷۴۰۴	۱۲ خورشید	۰/۶ خورشید
دجاجة ۱-X	۱۶ خورشید	۳۰ خورشید

گاز به سبب گرانش بسیار قوی سیاهچاله، از ستاره‌ی همدم ربوده می‌شود.

گاز نه‌ری طولانی را شکل می‌دهد که هرچه به سیاهچاله نزدیکتر می‌شود، با سرعت بیش‌تری حرکت می‌کند.

ستاره‌ی همدم غول آبی

جست‌وجوی سیاهچاله‌ها

در ابتدا، ماهواره‌ها فوران‌های پرتو ایکس آسمانی را شکار می‌کنند. سپس تلسکوپ‌های زمینی همان ناحیه‌ی آسمان را به دنبال هر چیز غیرعادی می‌کاوند. مثلاً در سال ۱۹۹۱، ماهوره‌ی گینگا متعلق به ژاپن و تلسکوپ ویلیام هرشل در جزایر قناری، ستاره‌ای کم‌فروغ کشف کردند که همدمی ناپیدا به جرم ۱۲ برابر خورشید دور آن در گردش بود. این جرم، به نام ۴۰۴۷-دجاجة، تابشی در طول موج‌های دیگر نمی‌فرستد؛ پس باید سیاهچاله باشد.



تلسکوپ ویلیام هرشل

دراتی که در میدان گرانشی قوی تولید شده‌اند، تابش ضعیفی دارند.

سرانجام سیاهچاله با فورانی از پرتو گاما منفجر و ناپدید می‌شود.




سیاهچاله می‌رمبد و با گسیل تابش هاوکینگ جرم از دست می‌دهد.

وقتی گاز بسیار داغ شده به درون سیاهچاله سقوط می‌کند، از خود پرتو ایکس می‌فرستد



ماهواره‌ی گینگا



گاز در اطراف حاله گرداب چرخشی به نام قرص برافراشتی را شکل می‌دهد.

قرص در لبه‌ها نازک و سرد است. گرانش سیاهچاله آن‌را گرم می‌کند تا این‌که نزدیک مرکز درخشان می‌شود

ریزسیاهچاله‌ها

رحی اخترشناسان بر این باورند که نیروی شدید حاصل از انفجار بزرگ، سیاهچاله‌های سیار کوچکی در کیهان شکل داده است. این سیاهچاله‌ها به اندازه‌ی اتم هستند؛ اما جرم آن‌ها به چند میلیارد تن می‌رسد. محاسبات استفان هاوکینگ، فیزیک‌دان معروف انگلیسی، نشان داد که ممکن است گرانش شدید اطراف یک ریزسیاهچاله، به گسیل هسته‌ی «تاش هاوکینگ» منجر شود که به مرور انرژی و جرم سیاهچاله را از بین می‌برد. این ریزسیاهچاله سرانجام در فوری از پرتوهای گاما ناپدید خواهد شد. گر این نظریه درست باشد، ممکن دارد ریزسیاهچاله‌ها در زمان حال نیز منفجر شوند.

آیا سیاهچاله‌ها همه چیز را می‌بلعند؟

برخلاف تصور عمومی، که سیاهچاله‌ها مانند جاروبرقی کیهانی همه‌ی ماده‌ی اطراف را می‌بلعند، آن‌ها فقط در قلمرو نزدیک خود چنین عمل می‌کنند. به‌علاوه، مدت‌ها طول می‌کشد تا گاز و غبار از قرص برافراشتی دور سیاهچاله‌ها، به درون آن‌ها برسد. حتی از ذرات بزرگ به صورت فوران‌های حث به بیرون پرتاب می‌شود. سیاهچاله‌ها از فواصل دور، گرانشی مانند جرم‌های عادی هم‌جرم خود دارند. اگر سیاهچاله‌ی فرضی به جرم خورشید به جای ان قرار می‌گرفت، تفاوت چندانی در مدار و حرکت زمین ایجاد نمی‌شد؛ اما برای جرمی نزدیک به آن، گرانش بسیار قوی‌تری ایجاد می‌شد. ریز- نیروی گرانش به جای آن‌که از کره‌ای بزرگ و پخش برسد، از نقطه‌ی متمرکزی به جرم‌های نزدیک وارد می‌شود.

بیش‌تر بدانیم


اخترشناسی پرتو ایکس ۳۴
اکنون‌آنها ۲۰۴
درون سیاهچاله ۲۱۰
قلب راه شیری ۲۲۴
کهکشان‌های فعال ۲۳۶

درون سیاہ چالہ

سیاه‌چاله‌ها زندان نورند، جایی که گرانرش چنان قوی است که هیچ چیزی نمی‌تواند از آن بگریزد. اما سیاه‌چاله‌ها آثار عجیب‌تری هم دارند: گرانرش آن‌ها در فضا و زمان، تغییر شکل ایجاد می‌کند و در مرکز آن قوانین فیزیک به هم می‌خورد. هیچ‌کس نمی‌تواند به درون سیاه‌چاله نگاهی بیندازد؛ اما ریاضی‌دانان می‌توانند با استفاده از مفاهیم نسبیت ایششتین و بر اساس روابط و محاسبات پیچیده، وضعیت درون سیاه‌چاله را بررسی کنند. این پیش‌بینی‌های ریاضی حاکی از محیطی عجیب در لبه‌ی سیاه‌چاله و در اعماق آن است؛ جایی که ماده تا مرز تکینگی رمبیده است. تکینگی نقطه‌ای بی‌نهایت کوچک با چگالی بی‌نهایت است که تا ابد روی خود می‌رمبد. بر اساس برخی نظریه‌های ریاضی و فیزیک، ممکن است سیاه‌چاله‌ها دروازه‌هایی به دنیاهای دیگر باشند.


چاه گرانشی

بر اساس نظریه‌ی نسبیت عام اینشتین، گرانش که به صورت نیرویی بین اجسام تصور می‌شود، انحنای خود فضا است. این بهترین روش برای مجسم کردن آثار گرانش در اطراف یک سیاه‌چاله است. فضا را می‌توان صفحه‌ی پلاستیکی نازکی در نظر گرفت. اگر جسم سنگینی مانند توپ بیلیارد را روی این صفحه بگذارید، فرورفتگی‌ای در آن ایجاد می‌کند. به همین ترتیب، خورشید نیز فضای اطراف خود را خمیده می‌کند و یک چاه گرانشی شکل می‌دهد. مدارهای سیاره‌ها با مسیرهای منحنی در شیب این فرورفتگی قرار دارند. ستاره‌های چگال‌تر، چاه‌های گرانشی عمیق‌تری با دیواره‌های پرتیب‌تر می‌سازند.



کالبدشناسی سیاه چاله

ساختار ابتدایی همه‌ی سیاه‌چاله‌ها یکسان است. اطراف نقطه‌ی تکینگی در مرکز را مرزی ناپیدا به نام افق روی‌داد احاطه کرده است. هرچه به سیاه‌چاله نزدیک‌تر شویم، سرعت لازم برای فرار از گرانش آن یا سرعت فرار، بیش‌تر می‌شود. سرانجام، در افق روی‌داد، سرعت به نور می‌رسد. جلوتر از آن، سرعت بیش از این می‌شود و دیگر هیچ چیز، حتی خود نور هم نمی‌تواند از این مرز خارج شود. اندازه‌ی افق روی‌داد را شعاع شوارتز شیلد می‌نامند که به نام فیزیک‌دانی نام‌گذاری شده که نخستین بار به اهمیت آن پی برد. هر جرمی برای این که سیاه‌چاله شود، باید تا اندازه‌ی شعاع شوارتز شیلد فشرده شود. این اندازه به میزان جرم و سرعت چرخش و شدت میدان مغناطیسی بستگی دارد. اگر محاسبات فقط بر پایه‌ی جرم جسم باشد، سیاره‌ی زمین وقتی به شعاع فقط ۹ میلی‌متر و خورشید به شعاع ۳ کیلومتر کوچک شود، به سیاه‌چاله تبدیل می‌شود. این شعاع برای سیاه‌چاله‌ای به جرم ۱۰ خورشید به همان نسبت بزرگ می‌شود و به ۳۰ کیلومتر می‌رسد. برای آب‌سیاه‌چاله‌ی مرکز راه شیری، به جرم ۲/۵ میلیون خورشید، این شعاع حدود ۵/۵ میلیون کیلومتر است؛ یعنی فقط $\frac{1}{4}$ شعاع مدار زمین. وقتی سیاه‌چاله‌ها را چرخان تصور کنیم، همه چیز پیچیده‌تر می‌شود و مطابق روابط ریاضی، افق روی‌داد شکلی غیرکروی می‌یابد، یک افق روی‌داد درونی اضافی ایجاد و شکل تکینگی مرکزی حلقه‌مانند می‌شود.



شناخت سیاهچاله‌ها

• کشیش انگلیسی، جان میچل (۱۷۹۳-۱۷۲۴)، در سال ۱۷۸۴ پیش‌بینی کرد که ممکن است برخی ستاره‌ها آن قدر بزرگ و پرجرم باشند که نور را به دام بیندازند.

• در سال ۱۹۱۵، اینشتین آگار گرانش بی‌نهایت را شرح داد. بعدها کارل شوارتز شیلد (۱۹۱۶-۱۸۷۳) دریافت که سیاهچاله نتیجه‌ی طبیعی نظریه‌ی نسبیت اینشتین است.

• در سال ۱۹۳۹، جی. رابرت اوپنهاইمر (۱۹۰۴-۱۹۶۷) فیزیکدان آمریکایی، در محاسبات خود به این نتیجه رسید که سیاهچاله، مرحله‌ی نهایی رمیش ستاره‌ی بسیار پرجرم است.



• در سال ۱۹۶۷، اخترفیزیکدان آمریکایی جان ویلر (۱۹۱۱-۲۰۰۸)، واژه‌ی سیاهچاله را ابداع کرد.

• دجاجة X، نخستین سیاهچاله‌ی شناسایی شده را ماهواره‌ی پرتو ایکس اوهورو در سال ۱۹۷۱ کشف کرد.

• در سال ۱۹۷۴، استفان هاوکینگ پیش‌بینی کرد که امکان دارد سیاهچاله‌ها منفجر شوند و شاید ریزسیاهچاله‌های احتمالی، که در انفجار بزرگ شکل گرفته‌اند، تاکنون منفجر شده باشند.

• در سال ۱۹۹۷، اخترشناسان نشانه‌های سیاهچاله‌ای آب‌پرجرم را در مرکز کهکشان ما تأیید کردند که تازه‌ترین یافته‌ها جرم آن را ۴ میلیون برابر خورشید تخمین می‌زنند.

• از سال ۲۰۰۰ نشانه‌های متعددی از گونه‌ی جدیدی سیاهچاله به نام میان‌وزن پیدا شد که با جرم بیش از صد و کمتر از ۱۰ هزار خورشید در بین دو نوع اصلی سیاهچاله‌های ستاره‌ای و کهکشانی قرار می‌گیرد. مرکز خوشه‌های گروهی بزرگ یکی از مکان‌های احتمالی شکل‌گیری سیاهچاله‌های میان‌وزن است.

بیش‌تر بدانیم

ستاره‌های نوترونی ۲۰۶
سیاهچاله‌ها ۲۰۸
کهکشان‌های فعال ۲۳۶
ماده‌ی تاریک ۲۵۰
شکل فضا ۲۵۲

ماکارونی شدن

اجسامی که درون سیاهچاله سقوط می‌کنند، مانند رشته‌های ماکارونی کشیده می‌شوند. فضاوردی فرضی که با پا به درون سیاهچاله سقوط می‌کند، در مقایسه با سر، کشش گرانشی قوی‌تری بر پاهای خود حس می‌کند. به این سبب، بدن او کش می‌آید. نزدیک به چاله، ماده به ذرات سازنده‌ی خود تجزیه می‌شود. این فرآیند در سیاهچاله‌های کوچک‌تر، وخیم‌تر است؛ زیرا آن‌ها چاه‌های گرانشی بسیار پرشیب‌تری می‌سازند. اگر آن‌ها که گرانش، نور و زمان را در اطراف چاله تغییر شکل می‌دهد، همراهان فضاورد، که سقوط او را از بیرون نگاه می‌کنند، آثار عجیب بسیاری می‌بینند.

دهان کرم‌چاله، افق رویداد ندارد. به همین سبب، رفت و آمد دو طرفه در آن امکان‌پذیر است.

تونل کرم‌چاله را می‌توان از مواد فرضی ضد گرانش ساخت. تصور دانشمندان این است که تونل سیاهچاله در نقطه‌ی تکینگی بسته می‌شود.

کرم‌چاله‌ها

زمانی دانشمندان بر این باور بودند که ممکن است سیاهچاله‌های چرخان، راه میان‌بری به بخش دیگری از کیهان یا حتی کیهانی دیگر باشند. گذشته از این که چگونه باید از این سفر به سیاهچاله جان سالم به در برد، محاسبات بعدی نشان داد تونلی که سیاهچاله ایجاد می‌کند، ناپایدار است. امکان دارد چاه‌های گرانشی بدون وجود سیاهچاله نیز شکل بگیرند. برخورد امواج گرانشی یا پدیده‌های نظری دیگر، که فقط در روابط و محاسبات آشکار شده است، در فضا وضعیتی ایجاد می‌کند که تونل‌هایی در ساختار فضا - زمان به نام کرم‌چاله شکل بگیرند. آن‌ها می‌توانند ما را در فضا و زمان جابه‌جا کنند؛ اما این تونل‌ها نیز ناپایدارند و شاید آیندگان وقتی کرم‌چاله‌ای بیابند یا بسازند، درون چاه گرانشی را با ماده یا انرژی‌ای ضد گرانش پایدار کنند. اما این افکار اکنون بلندپروازی‌هایی در حیطه‌ی نظری و ریاضی است.

۱ زمانی که فضاورد سقوط به درون سیاهچاله را آغاز کند، حالت طبیعی دارد. اگر از بیرون به او نگاه کنیم، اعوجاجی ندارد و ساعتش زمان را درست نشان می‌دهد.


۲ نزدیک‌تر به سیاهچاله، بدن فضاورد کش می‌آید. وقتی نور ارسال شده از فضاورد در مسیر به سوی بالا در برابر گرانش قوی مقاومت می‌کند، دچار افت انرژی و قرمزگرایی می‌شود. در این حالت، ساعت فضاورد هم برای ناظر بیرونی کند می‌شود.

۳ تا مدتها پس از سقوط فضاورد به درون افق رویداد، سرابی منجمد، قرمز شده و کش آمده از او با ساعتی متوقف شده، دیده می‌شود.

نور بیرون‌زده از دهانه‌ی دیگر کرم‌چاله، در فضای خمیده انحنای می‌یابد.

انحنای فضا - زمان


نمودارهای این دو صفحه ساده‌سازی شده‌اند: در آن‌ها فضا دوبعدی و مانند یک برگ کاغذ نشان داده شده است؛ در حالی که در واقعیت فضا حداقل سه بعدی است. طبق نظریه‌ی نسبیت اینشتین، جسمی پرجرم مانند یک ستاره، فضا را خمیده می‌کند. نشان دادن این اثر در دو بعد ساده‌تر است؛ به‌خصوص زمانی که انحنای بی‌نهایتی را نشان می‌دهیم که سیاهچاله در فضا ایجاد می‌کند. زمان، بعد اضافی چهارم است. این بعد هم مانند بقیه، تحت تأثیر میدان‌های گرانشی قوی قرار می‌گیرد. اما نمی‌توان آن را مانند بقیه تصویر کرد.




فضا در نزدیکی ستاره به سبب جرم آن درهم فشرده شده است.

فضا در نزدیکی ستاره به سبب جرم آن خمیده شده است.

نمای دو بعدی از جسمی پرجرم که در فضا - زمان فرورفتگی ایجاد کرده است. این فرورفتگی به کمک خطوطی نمایش داده شده است که اگر ستاره‌ای در آن‌جا نبود، صاف قرار می‌گرفت.



نمای سه بعدی نشان می‌دهد که گرانش ستاره به شیوه‌ای پیچیده‌تر فضا را خمیده می‌کند. اجسامی که در حالت عادی مسیر مستقیمی طی می‌کنند، ناچار می‌شوند در امتداد خطوط انحنایافته حرکت کنند.



کهکشان‌ها و ورای آن‌ها

راه شیری ۲۲۹-۲۱۴


کهکشان‌ها ۲۳۷-۲۳۰

کیهان ۲۵۵-۲۳۸

حیات فرازمینی ۲۵۹-۲۵۶

کیهان‌شناسی، مطالعه‌ی کیهان در بزرگ‌ترین مقیاس، پرتکاپوترین حیطه‌ی اخترشناسی است. به‌علاوه، جدیدترین بخش نجوم نیز به‌شمار می‌آید که از یک قرن پیش متولد شده است. پیش از آن، از گستردگی کیهان اطراف خود بی‌خبر بودیم. ابتدا کشف کردیم که خورشید یکی از ۲۰۰ میلیارد ستاره‌ی کهکشان ماست و کهکشان ما فقط یکی از صد میلیارد کهکشان عالم است. سپس متوجه شدیم همه‌ی کهکشان‌ها از هم دور می‌شوند که نشان می‌داد کیهان ما زمانی بسیار پرتراکم‌تر بوده است. اکنون اخترشناسان می‌دانند کیهان ما ۷/۱۳ میلیارد سال پیش، در مه‌بانگ یا انفجار بزرگ به‌وجود آمده است. اما آینده‌ی آن هنوز نامشخص است. امروز می‌دانیم که کیهان از زمان مه‌بانگ، در حال انبساط است و گروه‌ها و خوشه‌های کهکشانی در حال دور شدن از هم هستند و از انبساط فضای کیهانی سواری می‌گیرند. هنوز مشخص نیست که این انبساط تا ابد ادامه می‌یابد یا گرانش ماده‌ی موجود در عالم بر آن غلبه می‌کند. اما چه‌قدر ماده در عالم وجود دارد؟ در کنار این پرسش‌ها، بزرگ‌ترین پرسش بی‌پاسخ این است که آیا حیات در جای دیگری از کیهان هم وجود دارد؟ آیا کسی آن‌جاست؟


راه شیری



برآمدگی مرکزی صفحه هاله

ساختار راه شیری کهکشان
اگر از کنار به آن نگاه شود، مانند صفحه‌ی تختی است که برآمدگی‌ای در مرکز آن قرار دارد. در اطراف صفحه، منطقه‌ی کروی شکل بزرگی به نام هاله قرار دارد که از کهکشان اولیه بازمانده که مانند توبی از گاز بوده است. هاله دربردارنده‌ی خوشه‌های ستاره‌ای کروی و ماده‌ی تاریک مرموز است.

خانه‌ی ما در کیهان، کهکشان راه شیری است. اگر بتوانید از بالا به کهکشان راه شیری نگاه کنید، آنچه می‌بینید مانند شهری با چراغ‌های روشن در شب است. خورشید فقط یکی از ۲۰۰ میلیارد ستاره‌ی ساکن کهکشان راه شیری است. در میان این ستارگان، ابرهای عظیم گاز و غبار وجود دارد که ستاره‌های آینده از آن‌ها متولد خواهند شد. در برخی قسمت‌ها، این ابرها به سحابی‌های درخشانی تبدیل شده‌اند که به تازگی ستاره‌های جدیدی در آن‌ها متولد شده‌اند. راه شیری، کهکشان مارپیچی شکل و چرخانی است که ۱۰۰ هزار سال نوری پهنا دارد؛ اما ضخامت آن فقط ۲ هزار سال نوری است. این کهکشان میلیاردها سال پیش متولد شد. ابتدا ابر وسیع و کروی شکلی از گاز بود که بر اثر گرانش به خود فرو ریخت و سپس بر اثر چرخش دور خود، به شکل قرص مانند کنونی درآمد.



نمای راه شیری از بالا

در صفحه، بازوهای مارپیچی بلند و چرخان وجود دارد.

ابرهای بزرگی از گاز هیدروژن در لایه‌های خارجی

بازمانده‌ی ابرنواختری کپلر، باقی‌مانده از ابرنواختری است که یوهان کپلر در سال ۱۶۰۴ میلادی رصد کرد.

بیشتر منابع پرتو ایکس، قرص‌های گاز داغ‌اند که اطراف ستاره‌های نوترونی یا سیاهچاله‌ها را فرا گرفته‌اند.


یکی از هزار ابر ملکولی درون کهکشان؛ بزرگترین آن‌ها در بازوهای مارپیچی جمع شده‌اند.

کهکشان کوتوله قوس، از نزدیکی راه شیری می‌گذرد و بر اثر نیروهای گرانشی کهکشان به آرامی، تکه‌تکه می‌شود.

برآمدگی مرکزی کهکشان، دربردارنده‌ی ستاره‌های سرد و پیر بسیاری است که به رنگ قرمز یا زرد می‌درخشند و به همین سبب، برآمدگی تهرنگ زردی دارد.

بازوی قوس، درون‌ترین بازوی اصلی، دور کهکشان کشیده شده است.

بازوهای مارپیچی دربردارنده‌ی ستاره‌های جوان و داغی هستند که به رنگ‌های آبی و سفید و بسیار تابان می‌درخشند.



ساختار راه شیری

با آن‌که نمی‌توانیم کهکشان خود را از بیرون ببینیم، نقشه‌برداری از جرم‌های درون کهکشان، شکل واقعی کهکشان ما را آشکار کرده است. دو بازوی مارپیچی اصلی و قطعه‌هایی از بازوهای دیگر، دور برآمدگی کشیده‌ی مرکزی می‌گردند. ستاره‌های درخشان جوان، سحابی‌های روشن گاز و غبار و ابرهای ملکولی تیره و ضخیم، ساختار بازوها را تشکیل می‌دهند. برخلاف بازوها، برآمدگی مرکزی محل تجمع ستاره‌های پیر کهکشان است و مقدار بسیار کمی گاز دارد.

بازوی حنجر (شکارچی) یا بازوی محلی، یکی از بازوهای اصلی کهکشان است که بین بازوهای برساوش و قوس کشیده شده است. منظومه‌ی شمسی ما، در لبه‌ی درونی آن قرار دارد.

بازوی برساوش، بازوی اصلی خارجی است. این بازو، وسیع و ناهموار است و در بخش‌هایی با بازوی حنجر برخورد می‌کند.

راهنمای نقشه

- گروه‌های ستاره‌ای
- ابرهای گاز هیدروژن
- ابرهای ملکولی
- سحابی‌ها
- منابع پرتو X و بازمانده‌های ابرنواختری


نظراتی درباره‌ی راه شیری

• در حدود ۵۰۰ سال پیش از میلاد، یونانی‌های باستان تصور می‌کردند نوار راه کهکشان، ردی از شیر است که الهی‌ها بر آسمان جاری کرده است. آن‌ها آن را «دایره‌ی شیری» می‌نامیدند.

• ایرانیان باستان تصورات گوناگونی از این نوار شبح‌گون داشتند. در باورهای زرتشتی، آن را کمربندی گرد زمین می‌دانستند که در مرز فلک ستارگان است و زمین را از بدی‌ها و شیطان‌ها دور نگه می‌دارد. بر اساس افسانه‌ای دیگر، این راهی بود که کاروانی از بارگاه در آسمان پیچیده و گاه‌های ریخته شده، نوار راه کهکشان را پدید آورده بودند. پس از اسلام، زایران بسیاری که به سوی خانه‌ی خدا می‌رفتند، آن را راه مکه می‌دانستند که پر نورترین بخش آن در افق جنوب دیده می‌شد.

• گالیله، زمانی که در سال ۱۶۰۹ با تلسکوپ خود به راه شیری نگاه کرد، متوجه شد که این راه چیزی جز توده‌های بی‌شمار ستاره نیست که کنار هم جمع شده‌اند.


• در سال ۱۷۸۵، ویلیام هرشل با نقشه‌برداری از پراکندگی ستاره‌ها متوجه شد که کهکشان ما عده‌ی شکل است.



• بین سال‌های ۱۹۱۵ و ۱۹۲۰، هارلو شپیلی اندازه و شکل حقیقی کهکشان راه شیری را با اندازه‌گیری فواصل خوشه‌های کروی، که پوسته‌ی بیرونی کهکشان ما را تشکیل می‌دهند، به‌دست آورد.


رصد کهکشان راه شیری

به‌خصوص در فصل تابستان که بخش پر نور و پرستاره‌ی آن در آسمان شب زمین دیده می‌شود، بسیار دیدنی است. مانند این تصویر که راه شیری را در آسمان کویر توران در جنوب شاهرود نشان می‌دهد. ستاره‌های کهکشان، به سبب ضخامت کم آن و این‌که ما در درون آن زندگی می‌کنیم، مانند نوار روشنی در آسمان شب دیده می‌شوند. نواحی تاریک میان نوار روشن ستاره‌ها، سحابی‌های غبار وسیعی هستند که نور ستارگان را می‌گیرند.



در این نمودار مشاهده می‌شود ستاره‌هایی که در حدود فاصله ۲۰ هزار سال نوری هستند، بیش‌ترین سرعت گردش را دارند. با آن‌که در لبه‌های بیرونی تعداد ستاره‌ها کمتر است و نیروی گرانش حاصل از آن‌ها کمتر، سرعت گردش چندان کاهش نمی‌یابد؛ زیرا گرانش ماده تاریک، که در هاله قرار دارد، بر آن‌ها اثر می‌گذارد.

سرعت‌های گردش نسبی در راه شیری



خورشید در بازوی شلوغ جبار، ستاره‌ای سریع است.

چرخش کهکشان

کهکشان جسم صلب و یک‌دستی نیست؛ به همین سبب همه‌ی بخش‌های آن با سرعتی یکسان دور مرکز کهکشان نمی‌گردد. زیرا سرعت گردش به نیروی گرانش بستگی دارد. در لبه‌های بیرونی و دورتر از مرکز، بر ستاره‌ها و سایر جرم‌ها، نیروی کمتری وارد می‌شود و با سرعت کمتری دور مرکز می‌گردند. (اما) در دورترین مرزهای کهکشان به دلیل وجود ماده‌ی تاریک، سرعت گردش به‌نحو چشم‌گیری زیاد می‌شود. در برآمدگی مرکزی، از همه جهت بر ستاره‌ها نیرو وارد می‌شود. به همین سبب در آن‌جا نیز میانگین سرعت کم است. جرم‌هایی که در مناطق چگال میانی هستند، نیروی گرانش میلیاردها ستاره را بر خود احساس می‌کنند و با سرعت بیش از ۲۵۰ کیلومتر بر ثانیه دور مرکز کهکشان می‌گردند.

نقشه‌برداری از کهکشان

اخترشناسان برای نقشه‌برداری از کهکشان، از تلسکوپ‌های رادیویی استفاده می‌کنند. زیرا امواج رادیویی، برخلاف امواج مرئی، از درون ابرهای غبار که نور ستارگان را می‌گیرد، عبور می‌کنند. کلید اصلی در نقشه‌برداری، اندازه‌گیری سرعت گردش اجسام است. این سرعت از راه اندازه‌گیری تغییرات جزئی در طول موج امواج رادیویی به‌دست می‌آید که از آن اجرام به ما می‌رسد. اخترشناسان می‌دانند هر ناحیه از کهکشان با چه سرعتی می‌گردد. به همین سبب با استفاده از سرعت به‌دست آمده، می‌توانند فاصله‌ی آن‌ها را از مرکز کهکشان و از خورشید محاسبه کنند.

این تلسکوپ رادیویی کوچک، با بشقاب‌های به قطر ۱/۲ متر، ابرهای گازی کهکشان را از فراز ساختمانی در نیویورک رصد می‌کند.




شناسنامه‌ی راه شیری

نام	جرم
نوع کهکشان	مارپیچی (نوع میله‌ای SBC)
درخشندگی	۱۴ میلیارد درخشندگی خورشید
جرم کل (با ماده‌ی تاریک)	۱۰۰۰ میلیارد جرم خورشید
جرم ستاره‌ها	۲۰۰ میلیارد جرم خورشید
جرم گاز	۲۰ میلیارد جرم خورشید
جرم غبار	۲۰۰ میلیون جرم خورشید
قطر	۱۰۰/۰۰۰ سال نوری
ضخامت قرص	۲۰۰۰ سال نوری
ضخامت برآمدگی مرکزی	۶۰۰۰ سال نوری
فاصله‌ی خورشید از مرکز	۲۵/۰۰۰ سال نوری
زمان گردش خورشید به دور مرکز	۲۲۰ میلیون سال
سرعت خورشید در مدار	۲۴۰ کیلومتر بر ثانیه
سن پیرترین خوشه‌های ستاره‌ای	۱۲ میلیارد سال
تعداد خوشه‌های کروی	۱۵۰ عدد شناخته شده (احتمالاً مجموع ۲۰۰ عدد)
بیش‌تر بدانیم	
اخترشناسی رادیویی ۳۰، فضای میان ستاره‌ای ۲۱۶	
همسایگان محلی ما ۲۱۸، بازوی برساوش ۲۲۰، بازوی قوس ۲۲۲	
قلب راه شیری ۲۲۴، کهکشان‌ها ۲۳۰، ماده‌ی تاریک ۲۵۰	

فضای میان ستاره‌ای

ستاره‌ها، شکل و ساختار کهکشان را نشان می‌دهند؛ اما آنچه در میان آن‌ها قرار دارد نیز مهم است. فضا کاملاً خالی نیست؛ گاز بسیار رقیقی از هیدروژن و ذرات غبار آن را فرا گرفته است. به‌طور میانگین، در حجم کوچکی به اندازه‌ی یک قوطی کبریت از فضا، حدود ۶ اتم هیدروژن و یک ذره‌ی غبار وجود دارد. در راه شیری، این توده‌های گاز و غبار رقیق، ۱۰ درصد جرم عادی، به‌جز ماده‌ی تاریک کهکشان را تشکیل می‌دهند. این مقدار گاز برای به‌وجود آوردن ۲۰ میلیارد ستاره کافی است. ستاره‌ها از این توده‌های گاز و غبار، که ماده‌ی میان‌ستاره‌ای نام دارد، شکل می‌گیرند. زمانی که ستاره‌ها از بین بروند، آنچه باقی می‌ماند، این ماده را به‌وجود می‌آورد. ماده‌ای که از مرگ ستاره بر جا می‌ماند، با آنچه ستاره از آن شکل می‌گیرد، تفاوت دارد، بنابراین، ماده‌ی میان‌ستاره‌ای پیوسته در حال تغییر و تکامل است.



ترکیبات کهکشان
بیش‌تر ماده‌ی مرئی کهکشان را ستاره‌ها تشکیل داده‌اند. فقط ۱۰ درصد از این ماده، گاز و غبار میان‌ستاره‌ای است که تقریباً به‌طور مساوی بین ابرهای ملکولی سرد و محیط گرم ماده‌ی میان‌ستاره‌ای تقسیم شده است.

ابر گرم، بیش‌تر از گاز هیدروژن تشکیل شده است، که در مناطق چگال به رنگ صورتی می‌درخشد.

سحابی سر اسب در جبار

میدان‌های مغناطیسی در فضا ذرات غبار را هم‌سو می‌کنند و موجب می‌شوند در پشت سحابی سر اسب منطقه‌ای به شکل خطوط موازی از گاز دیده شود.

در میان ستاره‌ها

ماده‌ی میان‌ستاره‌ای یک‌دست نیست. بیش‌تر گاز میان‌ستاره‌ای، به شکل گازهای «گرم» به معنی ۸ هزار درجه‌ی سانتی‌گراد (داغ‌تر از خورشید) است. در میان آن‌ها حباب‌های نازک گاز وجود دارد. دمای این حباب‌ها به بیش از ۱ میلیون درجه‌ی سانتی‌گراد می‌رسد. این دما از انرژی آزاد شده از ابرنواخترها و گروه‌های ستارگان داغ و جوان به‌وجود می‌آید. برخی از آن‌ها نیز ابرهای سردی از اتم‌های هیدروژن‌اند. این ابرهای منحنی شکل و رشته‌مانند، نواحی بیرونی پوسته‌ی حباب‌های گازی قدیمی هستند. گروه آخر، ابرهایی از گاز و غبار چگال و بسیار تیره‌اند که ستاره‌ها از آن‌ها متولد می‌شوند و ابرهای ملکولی نام دارند.


ابرهای ملکولی، توده‌های غبار ضخیم‌اند که نور ستاره‌های تازه متولد شده درون سحابی را جذب می‌کنند.

سحابی سر اسب، بخشی از ابر ملکولی چگالی است که از «پوزه» تا «پا» ۴ سال نوری است.


ابرهای غبار در اطراف ستاره‌های جوان به رنگ آبی دیده می‌شوند؛ زیرا ذرات غبار نور ستاره‌ها را پراکنده می‌کنند. پدیده‌ی مشابهی برای نور خورشید، که در جو زمین پخش می‌شود، رخ می‌دهد. به همین سبب رنگ آسمان روز، آبی است.

ذره غبار گرافیتی

بورگنمایی
۱۰,۰۰۰ برابر



خطوط میدان مغناطیسی



ذرات غبار با میدان
مغناطیسی همسو شده‌اند.

غبار کیهانی


ذرات غبار کیهانی، مانند ذرات دوده‌ای هستند که از جو ستاره‌های پیر و سرد به فضا پراکنده شده‌اند. این ذرات پوشیده از یخ، کمتر از یک هزارم میلی‌متر هستند و از گرافیت (ماده‌ای که نوک مداد از آن ساخته می‌شود) یا مواد معدنی به نام سیلیکات‌ها، تشکیل شده‌اند. آن‌ها از پوسته‌های هم‌مرکزی که مانند پیاز روی هم قرار گرفته‌اند، شکل گرفته‌اند.

غبار و اثر مغناطیسی

ذرات غبار کیهانی دور خود می‌چرخند. میدان مغناطیسی ضعیفی که در فضای میان‌ستاره‌ای وجود دارد، موجب می‌شود این ذرات به گونه‌ای در فضا قرار بگیرند که جهت چرخش آن‌ها با خطوط میدان مغناطیسی منطبق شود. احتمالاً دلیل ساختار خط‌دار در پشت سحابی سر اسب، همین پدیده است.

ماده‌ی میان
ستاره‌ای گرم


در این تصویر فروسرخ حلقه
دجاجة به رنگ زرد - سبز است.



حباب‌های گاز داغ

داغ‌ترین، اما چگال‌ترین بخش فضای میان‌ستاره‌ای، حباب‌های گاز مانند «حلقه‌ی دجاجة» است. این سحابی از انفجاری ابرنواختری در بیش از ۲۰ هزار سال پیش شکل گرفته و همچنان بر اثر موج‌ضربه‌های حاصل از انفجار، داغ است.

شکاف دجاجة



ابره‌های ملکولی


در ناحیه‌ی صورت فلکی دجاجة در نوار کهکشان راه شیری، یکی از این ابرهای ملکولی با چشم غیر مسلح دیده می‌شود. در این قسمت، ابر ملکولی بزرگی نور ستاره‌های پشت خود را جذب می‌کند و از دید ما منطقه‌ای خالی از ستاره به نمایش می‌گذارد که شکاف دجاجة یا شکاف بزرگ نام دارد؛ همان‌طور که در این تصویر از راه شیری منطقه‌ی مثلث تابستانی زیر آسمان کویر یزد دیده می‌شود.

پرتوهای نامرئی کیهانی، که
بیشتر پروتون‌های آزاد شده
از ابر نواخترها هستند، در خلا،
میان ستاره‌ای حرکت می‌کنند.

نطاق، یکی از ستاره‌های
کمربند جبار است.

NGC ۳۵۷۶ بخشی از مجموعه سحابی‌های
شاه‌تخته، رابینگاه بزرگ ستاره‌ای است.

NGC ۳۶۰۳ پرچم‌ترین سحابی کهکشان است
که با تلسکوپ‌های مرئی دیده می‌شود.



آثار غبار


غبار کیهانی نور را جذب می‌کند و تأثیر بسیار زیادی بر آنچه از ستاره‌ها می‌بینیم، می‌گذارد. برای مثال، دو سحابی NGC ۳۶۰۳ و NGC ۳۵۷۶ از روی زمین بسیار شبیه به هم دیده می‌شوند؛ اما در حقیقت NGC ۳۶۰۳ بسیار درخشان‌تر است؛ وجود غبار بین این سحابی و ما، موجب شده است سحابی کم‌نورتر و سرخ‌تر از حالت عادی دیده شود.

ساختار شیمیایی کیهان

در ابرهای ملکولی چگال، که دما پایین است، اتم‌ها به یک‌دیگر می‌پیوندند و ملکول‌ها شکل می‌گیرند. حدود صد نوع ملکول در فضا شناسایی شده است که نام ۱۰ نوع شناخته‌شده‌تر آن‌ها را آورده‌ایم:

نام علمی	نام ملکول
H_2O	آب
CH_4O	فورمالدهید
HCN	سیانید هیدروژن
CH_3O	اسید فورمیک
H_2S	سولفید هیدروژن
HC_3N	سیانو استیلین
NH_3	آمونیاک
$C_2H_5NO_2$	گلیسین
CH_3OH	متانول
C_4H_5N	آکریلونیتریل

واکنش‌های شیمیایی درون ابرهای ملکولی، از ملکول‌های ساده، ملکول‌های پیچیده‌تر و بزرگ‌تری می‌سازد؛ مانند مجموعه واکنش‌هایی که به شکل‌گیری ملکول آلی متانول منجر می‌شود.



بیشتر بدانیم

چرخه‌ی زندگی ستاره‌ها ۱۰ تا ۱۰۰ میلیارد سال می‌شود ۱۹۲
راه شیری ۲۱۴، همسایگان محلی ما ۲۱۸، بازوی قوس ۲۲۲، ماده‌ی تاریک ۲۵۰

سحابی ہلیکس (مارپیچ)

حلقه II (دوم) و III سوم،
بازمانده‌ی ستاره‌های پُر جرم
و جوانی هستند که با انفجار
ابر نواختار نبود شده‌اند.

خوشه پروین، ۱۰۰ ستاره
آبی - سفید با سن حدود
۷۸ میلیون سال دارد.

OBI - زرافه جمع ستاره‌ای از
ستارگان نسبتاً جوان، مانند جمع
ستاره‌ای OBI - سومبار است.

سبحانی رو - مارافیسای

بسته‌ی زغال، در نزدیکی
خلیب جنوبی، مانند سوراخی
در آسمان است. این ناحیه‌ی
ریک، ابر ملکونی به پهنای
۶ سال نوری است.

تیپ اختر یادبان، در سحابی یادبان،
هسته‌ی چرخان و زمبیده‌ی
ستاره‌ای است که ۱۲ هزار سال
پیش منجر شده است.

بازمانده ابر نواختری بادبان

سحابی پارچه

منطقه‌ی جبار، شامل سحابی
جبار و حلقه‌ی بارنارد است.

حلقه‌ی بارنارد، بازمانده‌ی
ایرواختری با پهنای ۳۰۰
توری است.

این نقشه بخشی از بازوی
جتار را به پهنای ۵ هزار سال
نوری نشان می‌دهد.

۲۲- تک‌شاخ در برادر ندهی ستاره‌ای با درخشندگی ۱۰ هزار برابر خورشید است. این ستاره با ابری از غبار پوشیده شده است؛ اما می‌توان آن را با تلسکوپ‌های فروسرخ رصد کرد.

اطراف ما، در بازوی جبار، پُر از مکان‌های تولّد ستاره‌هاست؛ مانند سحابی جبار، آمریکای شمالی و رو-مارافسای. ستاره‌های جوانی که اطراف آن‌ها را ابرهای ملکولی، محل تولّد ستاره‌ها، فرا گرفته‌اند، در گوشه و کنار دیده می‌شوند. بازمانده‌ی ستاره‌هایی که به پایان عمر خود رسیده‌اند نیز دیده می‌شوند.

ابرمای گاز هیدرون


ابره‌ای مولکولی

حباب‌های میان ستاره‌ای

مسحابیها

○ خوشه‌های ستاره‌ای و ستاره‌های غول


کرک محلی، توده‌ای گاز است که حلقه‌ی ۱ آن‌ها را به سمت خورشید می‌راند.



حباب محلی خورشید

در منطقه‌ای از کهکشان با شکل حبابی قرار گرفته است که پهنای ۳۰۰ سال نوری دارد و حباب محلی نامیده می‌شود. با آن‌که چگالی این حباب در مقایسه با گاز میان‌ستاره‌ای اطراف بسیار کم است، دمای زیاد آن را متورم نگه داشته است. به علاوه، در این منطقه ابرهایی از گازهای چگال‌تر نیز وجود دارد.

- راهنمای نقشه**
ابرهای گاز هیدروژن
- ستاره‌های سرد (رده K و M)
 - ستاره‌های داغ (رده A، F، و G)
 - ستاره‌های بسیار داغ (رده O و B)
 - خوشه‌ها



ستارگان خوشه‌ی قللص، مانند «V» بزرگی در آسمان قرار گرفته‌اند. دبران نقطه‌ای از شکل V است.

«سر» صورت فلکی گاو (ثور)

با ستاره‌های خوشه‌ی قللص تزئین شده است. «چشم» گاو، ستاره‌ی دبران که غول سرخ درخشانی است، در میان آن‌هاست. اما به این خوشه تعلق ندارد. قللص نزدیک‌ترین خوشه‌ی ستاره‌ای به ما، با فاصله‌ی ۱۵۰ سال نوری است. این خوشه در مرکز مجموعه‌ی محلی از ستاره‌هاست که خورشید را نیز شامل می‌شود.



مهم‌ترین بازوی محلی (جبار)

نام	فاصله (سال نوری)	نوع	توضیحات
قللص	۱۵۰	خوشه‌ی ستاره‌ای	سن آن ۶۳۰ میلیون سال است
سپیل	۳۱۰	ستاره‌ی غول	صد هزار بار درخشان‌تر از خورشید است
یدالجوزا	۴۰۰	غول سرخ	قطری ۴۰۰ برابر خورشید دارد
حلقه ۱	۴۰۰	حباب داغ	پهنای ۷۰۰ سال نوری
قلب العنقرب	۵۰۰	غول سرخ	قلب سرخ رنگ صورت فلکی عقرب است
کندوی عسل	۵۲۰	خوشه‌ی ستاره‌ای	شبهه به کندوی زنبور عسل است
گونی زغال	۵۵۰	ابر ملکولی	جرمی ۴۰ هزار برابر خورشید
رجل الجبار	۸۰۰	ستاره‌ی غول	ستاره‌ای آبی-سفید با دمای ۲۰ هزار درجه‌ی سانتی‌گراد
مربع سرخ	۹۰۰	غول سرخ	دو فوران گاز دارد
سحابی دمیل	۱۰۰۰	سحابی سیاره‌نما	پهنای ۲ سال نوری
سحابی بادبان	۱۵۰۰	بازمانده‌ی ابرنواختری	سن ۱۲ هزار سال، یک تپ‌اختر دارد
سحابی جبار	۱۶۰۰	سحابی	حداقل ۱۰۰ ستاره تازه متولد شده دارد
سحابی سر اسب	۱۶۰۰	ابر ملکولی	از «پوزه» تا «یال» ۴ سال نوری است
چلپاسه OBI	۱۹۰۰	جمع ستاره‌ای	سن زیر ۳۰ میلیون سال
اپسیلون- ابر اهرمان	۱۹۰۰	ستاره‌ی دوتایی	یکی از ستاره‌ها در قرص تیره‌ای پنهان است
AE - ابر اهرمان	۱۹۰۰	ستاره‌ی جوان	از سحابی جبار «فرار کرده است»
سحابی دوک (کاج)	۲۴۰۰	سحابی	گاز روشن با «مخروطی» تیره
شکاف دجانه	۲۴۰۰	ابر ملکولی	طول ۱۵۰۰ سال نوری
تکشاخ K۲	۲۶۰۰	ابر ملکولی	ستاره‌های تازه متولد شده‌ای درون آن پنهان‌اند
Zرافه OBI	۳۰۰۰	جمع ستاره‌ای	ستاره‌هایی با سن کمتر از ۱۰ میلیون سال دارد

سحابی آمریکای شمالی

اگر به تصویر این سحابی نگاه کنید، به آسانی متوجه می‌شوید که دلیل نام‌گذاری آن، چه بوده است؛ سحابی، شباهت بسیاری به این قاره دارد. آمریکای شمالی و سحابی کناری آن، پلیکان، نواحی مرئی سحابی عظیمی به پهنای ۱۰۰ سال نوری، ۶ بار بزرگ‌تر از سحابی جبار هستند.

سحابی آمریکای شمالی




بیشتر بدانیم

- اندازه‌های ستاره‌ها ۱۸۲
- سحابی‌های سیاره‌نما ۲۰۲
- ابر نواخترها ۲۰۴
- راه شیری ۲۱۴
- بازوی پرساوش ۲۲۰
- بازوی قوس ۲۲۲

«خلیج مکزیک»، فضای خالی نیست، بلکه ابر ملکولی است که نور گازهای درخشان را گرفته است.

رشته‌های منحنی‌وار گاز
سحابی، مانند چنگال‌های
یک خرچنگ هستند.

گازها با سرعت ۱۵۰۰
کیلومتر بر ثانیه به بیرون
پرتاب می‌شوند.




سحابی خرچنگ

بیشتر سحابی‌های بازمانده‌ی ابرنواختری، پوسته‌ای کروی شکل‌اند. اما سحابی خرچنگ از رشته‌های بی‌شمار بلندی تشکیل شده است که تا ۱۵ سال نوری در فضا پراکنده شده‌اند. نور محو آبی رنگی که در رشته‌های گاز دیده می‌شود، درخششی است که از الکترون‌های بسیار سریع ارسال شده است. این الکترون‌ها از تپ‌اختر مرکزی، که با سرعت زیادی دور خود می‌چرخد، خارج می‌شوند. تپ‌اختر سحابی خرچنگ فقط ۲۵ کیلومتر قطر دارد؛ اما جرم آن بیش‌تر از خورشید است.

مناطق زرد و قرمز نشان‌دهنده‌ی
شدیدترین امواج رادیویی هستند.

امواج رادیویی از الکترون‌هایی
که در میدان‌های مغناطیسی قوی
حرکت می‌کنند، ساطع می‌شود.



ذات‌الکرسی A

درخشان‌ترین منبع رادیویی که از زمین رصد می‌شود. ذات‌الکرسی A بازمانده‌ی ستاره‌ای است که ۳۰۰ سال پیش منفجر شده است. تلسکوپ‌های رادیویی نشان می‌دهند گازهای این سحابی با سرعت ۶ هزار کیلومتر بر ثانیه از مرکز دور می‌شوند. بخش‌های روشن، نواحی چگال و داغ پوستانده. بر اثر انفجار این ستاره و پوسته‌ای که منبسط می‌شود، ابرهای سردتر فضای میان‌ستاره‌ای اطراف جارو می‌شوند.

آبرنواخترهای تاریخی

ابرنواختر سال ۱۵۷۲ در
ذات‌الکرسی



ستارگان نمایش‌دهنده‌ی صورت
فلکی ذات‌الکرسی

• در سال ۱۵۰۶ میلادی، ابرنواختری بسیار درخشان در صورت
فلکی گرگ ظاهر شد. از آن ستاره‌ی منفجر شده، اکنون یک
سحابی به گستردگی ۷۰ سال نوری باقی مانده است.

• در سال ۱۰۵۴ میلادی، اخترشناسان چینی «ستاره‌ی مهمانی» را
در میان ستارگان ثور دیدند. این ستاره‌ی تابان تا سه هفته حتی
در نور روز دیده می‌شد و تا ۲ سال در آسمان شب قابل مشاهده
بود. امروز، باقی‌مانده‌ی آن انفجار را سحابی خرچنگ می‌نامیم.

• در سال ۱۵۷۲، تیکو براهه در صورت فلکی ذات‌الکرسی
ستاره‌ی جدیدی (یک ابرنواختر) دید.

• در سال ۱۶۸۰، جان فلامستید ستاره‌ی کم‌نوری را به نام «۳-
ذات‌الکرسی» ثبت کرد که احتمالاً ستاره‌ای است که با انفجار خود
سحابی ذات‌الکرسی A را به‌وجود آورده است.

سحابی روزت در صورت
فلکی تک‌شاخ است.

ستاره‌های جوان سوراخی به بزرگی
سحابی جنار به‌وجود آورده‌اند.



ستاره‌های مرکز خوشه
ستاره NGC ۲۲۴۴

سحابی روزت

این سحابی گل‌سرخ‌مانند با اندازه‌ای بزرگ‌تر از ماه کامل در آسمان، در
۵۵۰۰ سال نوری از ما قرار دارد. با گذشت زمان، بر اثر تابش و بادهای
شدیدی که از ستاره‌هایی که در مرکز سحابی شکل می‌گیرند، می‌وزد، گاز
سحابی به اطراف پراکنده می‌شود و سحابی بزرگ‌تر و کم‌نورتر خواهد شد.

جرم‌های اصلی در بازوی برساوش

نام	فاصله (سال نوری)	نوع	توضیحات
M۳۶	۴۱۰۰	خوشه‌ی ستاره‌ای باز	سن ۲۰ میلیون سال
M۳۸	۴۲۰۰	خوشه‌ی ستاره‌ای باز	شبیه به صلیب
M۳۷	۴۶۰۰	خوشه‌ی ستاره‌ای باز	سن ۳۰۰ میلیون سال
ستاره پلاسکت	۵۰۰۰	ستاره‌ی دوتایی	۵۱ و ۴۳ برابر جرم خورشید
سحابی روزت	۵۵۰۰	سحابی نشری	پهنای ۱۰۰ سال نوری
W۳	۵۵۰۰	ابر ملکولی	زایشگاه عظیم ستاره‌ای
سحابی خرچنگ	۶۵۰۰	بازمانده‌ی ابرنواختری	تپ‌اختر فعالی دارد
خوشه‌ی دوتایی	۷۴۰۰	خوشه‌های ستاره‌ای باز	سن ۳ و ۵ میلیون سال
بازمانده‌ی ابرنواختری تیکو	۷۵۰۰	بازمانده‌ی ابرنواختری	از ابرنواختر سال ۱۵۷۲
۳C۵۸	۸۸۰۰	بازمانده‌ی ابرنواختری	از ابرنواختر سال ۱۱۸۱
فی - ذات‌الکرسی	۹۴۰۰	ستاره‌ای درخشان	۲۰۰ هزار بار پرنورتر از خورشید
ذات‌الکرسی A	۱۰۰۰۰	بازمانده‌ی ابرنواختری	منبع رادیویی پرنور

بیش‌تر بدانیم


اخترشناسی رادیویی ۳۰، خوشه‌ها و دوتایی‌ها ۱۹۴
ابرنواخترها ۲۰۴، ستاره‌های نوترونی ۲۰۶، راه شیری ۲۱۴، بازوی قوس ۲۲۲

بازوی قوس



اتا - شاه تخته

این ستاره با درخشندگی هیلون برابر خورشید، یکی از درخشان ترین و ناپایدارترین ستاره های شناخته شده است. در این تصویر تلسکوپ هابل، این ستاره در پوششی از غبار، که در سال ۱۸۴۳ به فضا پرتاب کرده است، دیده می شود. احتمالاً در چند هزار سال آینده، این ستاره به ابرنواختری تبدیل خواهد شد.



جایگاه نقشه زیر در راه شیری

بازوی قوس یکی از دو بازوی مارپیچی اصلی راه شیری، میان بازوی جبار و مرکز کهکشان قرار گرفته و حدود ۵ هزار سال نوری به مرکز نزدیک تر است. این بازو بسیار پهن تر است و پیش از آن که در فضا محو شود، کاملاً به دور کهکشان می پیچد. بازوی شاه تخته یا کارینا نیز احتمالاً ادامه ی همین بازوست. بازوی قوس در امتداد صورت های فلکی مار، سپر، قوس، عقرب، قنطورس، و شاه تخته گسترده است. از جایگاه ما در بازوی جبار، مشاهده ی بازوی قوس چندان ساده نیست؛ زیرا توده های غبار آن را می پوشانند. امواج رادیویی و فرو سرخ از این غبار می گذرند و اخترشناسان با رصد در این طول موج ها، به آنچه در پشت توده های غبار پنهان شده است، پی می برند. برای اخترشناسان، این منطقه از آسمان، پُر از جلوه های ویژه و عجیب است؛ به خصوص که مرکز کهکشان نیز در پشت همین بازو، از دید ما مخفی است.

تپ اختر میلی ثانیه ای، در هر ثانیه ۶۴۲ بار دور خود می چرخد و جزو سریع ترین تپ اخترهای چرخنده است. این سرعت زیاد علاوه بر ماهیت عمومی تپ اخترها، احتمالاً حامل از همدمی است که مواد خود را بر این ستاره می ریزد. اکنون تپ اخترهای میلی ثانیه ای بسیاری در کهکشان شناخته شده اند.

سحابی عقاب، نام سحابی غبار آلود و تیره رنگی به شکل عقاب است که در زمینه ی گاز های روشن خودنمایی می کند.

سحابی امگا یا گو بخش متورم شده ای از گازی داغ در گوشه ای از ابر ملکولی چگالی با پهنای ۶۵ سال نوری است.


SN ۱۰۰۶ سحابی بازمانده ی ابرنواختری است که در سال ۱۰۰۶ ظهور کرد.

جعبه ی جواهر خوشه ای از ستارگان آبی بسیار زیبایی است که در نزدیکی صورت فلکی صلیب جنوبی قرار گرفته اند. یکی از ستاره ها، کاپا - صلیب جنوبی، غولی سرخ است.

سحابی شاه تخته، خانه ی ستاره ی HD ۹۳۱۲۹۸ (اتا - شاه تخته) است که ۵ میلیون بار درخشندگی تر از خورشید است.

نقشه، نشان دهنده ی بخشی از بازوی قوس، با پهنای تقریباً ۱۲ هزار سال نوری است.

دجابه X-۱ ستاره ای دوتایی است که یکی از آن ها به سیاه چاله تبدیل شده است.



راهنمای نقشه
ابرهای گاز هیدروژن

سحابی ها

ابرهای ملکولی

جمع های ستاره ای

تپ اخترها و بازمانده های ابرنواختری

خوشه های ستاره ای

ساختار بازوی قوس

سحابی های بزرگ و ابرهای ملکولی چگال، بخش هایی از بازو را، که در نزدیکی ما قرار دارد، فرا گرفته اند؛ سحابی های عقاب، امگا، سه تکه، مرداب و شاه تخته، که محل تولد ستارگان هستند، در نزدیکی ما قرار دارند. تپ اخترها، سیاه چاله ها و بازمانده های ستاره های مرده نیز در این بخش دیده می شوند. در نزدیکی مرکز کهکشان، ابرهای ملکولی بسیاری در بازوی قوس پیدا می شوند.

PSR ۱۹۱۹+۲۱ اولین تپ اختر بود که کشف شد. تپ های بسیار منظمی که آن زمان از ستاره ثبت کردند، بسیار غیر طبیعی و ساختمانی هوش مندان سیاره ای دیگری می نمود. به همین سبب، در آن زمان کاشفان تپ اختر، نام آن را LGM-۱ (کوتاه شده ی مردان سبز کوچک-۱) گذاشتند.



عقرب X-۱، ستاره ی نوترونی مرده ای است که اولین چشمی پرتو ایکس کشف شده در خارج از منظومه ی شمسی بود.

سیاهچاله‌های دجاجة

در بازوی قوس سیاهچاله‌های بسیاری پیدا می‌شود؛ سیاهچاله‌هایی که اگر در منظومه‌های دوتایی قرار داشته باشند، ستاره‌شناسان می‌توانند جرم آن‌ها را محاسبه کنند. جرم دو ستاره، تعیین می‌کند که دو جرم چگونه و در چه مداری به دور هم می‌گردند. در منظومه‌ی ۷۴۰۴ - دجاجة، مرکز جرم تقریباً درون سیاهچاله قرار دارد و ستاره‌ی همدم دور سیاهچاله می‌گردد. در دجاجة ۱-X، ستاره پُرجرم‌تر از سیاهچاله است و سیاهچاله دور ستاره می‌گردد.

دجاجة ۷۴۰۴ - دجاجة

دجاجة ۱-X



سحابی‌های سه تکه و مرداب

این دو سحابی، در فاصله‌ی بیش از ۵ هزار سال نوری از ما در امتداد مرکز کهکشان در قوس، از مناظر بسیار زیبای آسمان به‌شمار می‌آیند. در سحابی سه تکه (بالا) نواحی تیره غبار، سحابی روشن را به سه بخش تقسیم کرده‌اند. درون سحابی، خوشه‌ی ستاره‌ای فشرده قرار دارد که تابش ستارگان آن، گاز هیدروژن سحابی را برانگیخته می‌کند و موجب می‌شود به رنگ صورتی بدرخشد. سحابی مرداب (پایین) اطراف خوشه‌ی ستاره‌ای جوانی به عمر حدود ۲ میلیون سال پراکنده است. این ستاره‌ها آن قدر پُرجرم و درخشان‌اند که اجتماع آن‌ها و سحابی مرداب با چشم غیر مسلح نیز به صورت تکه ابری در زمینه‌ی راه شیری تابستان دیده می‌شوند.

جرم‌های اصلی در بازوی قوس

نام	فاصله (سال نوری)	نوع	توضیحات
عقرب ۱-X	۱۸۰۰	منبع پرتو ایکس	اولین منبع پرتو ایکس که خارج از منظومه‌ی شمسی کشف شد
PSR ۱۹۱۹+۲۱	۲۱۰۰	تپ‌اختر	اولین تپ‌اختر کشف شده
SN ۱۰۰۶	۳۵۰۰	بازمانده‌ی ابرنواختری	بازمانده از درخشان‌ترین ابرنواختر دیده شده در سال ۱۰۰۶
۷۴۰۴ - دجاجة	۴۸۰۰	سیاهچاله	۸ تا ۱۵ جرم خورشیدی
تپ‌اختر بیوه	۵۰۰۰	تپ‌اختر	همدم خود را نابود می‌کند
سحابی اومگا	۵۰۰۰	سحابی	می‌تواند یک میلیون ستاره بسازد
سحابی مرداب	۵۴۰۰	سحابی	سن ستاره‌های جوان آن ۲ میلیون سال است
سحابی سه تکه	۵۲۰۰	سحابی	نام آن به سبب وجود نوارهای تیره غبار است
قوس - FG	۶۲۰۰	ستاره‌ی ناپایدار	لایه‌های گاز به بیرون پرتاب می‌کند
سحابی عقاب	۷۰۰۰	سحابی	ستاره‌های آن ۶ میلیون سال دارند
دجاجة ۱-X	۷۵۰۰	سیاهچاله	۱۶ جرم خورشیدی
جعبه‌ی جواهر	۷۶۰۰	خوشه‌ی ستاره‌ای	سن ۷ میلیون سال
آل‌ا - شاه تخته	۹۰۰۰	ستاره‌ی متغیر	به صورت ابرنواختر منفجر خواهد شد
SNR کپلر	۱۲۵۰۰	بازمانده‌ی ابرنواختری	یوهان کپلر ابرنواختر را در سال ۱۶۰۴ دید
SS ۴۳۳	۱۸۰۰۰	ستاره‌ی دوتایی	فوران‌ها با سرعت ۷۰ هزار کیلومتر بر ثانیه پرتاب می‌شوند
تپ‌اختر دوتایی	۲۳۰۰۰	تپ‌اختر	دور ستاره‌ی نوترونی می‌گردد
NGC ۶۳۰۳	۲۵۰۰۰	سحابی	پُرجرم‌ترین سحابی کهکشان
تپ‌اختر میلی‌ثانیه‌ای	۳۱۰۰۰	تپ‌اختر	یکی از سریع‌ترین تپ‌اخترها در چرخش به دور خود

تپ‌اختر بیوه

این تپ‌اختر، یکی از عجیب‌ترین تپ‌اخترهای آسمان است. انرژی آزاد شده از چرخش سریع این تپ‌اختر، گازهای ستاره‌ی همدم خود را داغ و تبخیر کرده و موجب شده است ستاره گازهای خود را از دست بدهد و در فضا پراکنده کند. اکنون تپ‌اختر در هاله‌ای از گاز تابان، که از ستاره‌ی همدم آزاد شده است، قرار دارد. تپ‌اختر، سرانجام همه‌ی ستاره‌ی همدم خود را تبخیر خواهد کرد.


بیش‌تر بدانیم

ستاره‌های متغیر ۱۸۴
ستاره‌های نوترونی ۲۰۶، سیاهچاله‌ها ۲۰۸
راه شیری ۲۱۴، همسایگان محلی ما ۲۱۸




ابر گازی ستاره‌ی همدم


آن‌طور که تپ‌اختر بیوه همدم خود را از بین برد.



قلب راه شیری



مرکز راه شیری، که بیش از ۲۵ هزار سال نوری از ما فاصله دارد، با بخش‌های دیگر کهکشان بسیار متفاوت است. مرکز کهکشان، برآمدگی میله‌ای شکلی از ستارگان پیر زرد و قرمز و مقدار کمی گاز است. تا مدت‌ها، اخترشناسان از آن چه درون این برآمدگی بود، اطلاع نداشتند؛ زیرا حجم زیاد گاز و غبار، آن منطقه را از دید تلسکوپ‌های نور مرئی پنهان می‌کرد. اما اکنون تلسکوپ‌های رادیویی و فروسرخ به آن مناطق نفوذ می‌کنند و از اسرار آن مانند فوران‌های عظیم و بسیار پرسرعت گاز و مناطقی با میدان مغناطیسی قوی پرده برمی‌دارند. به سمت مرکز کهکشان، دما افزایش می‌یابد. این شواهد نشان می‌دهد مرکز کهکشان، مکانی آشوبناک و پُرانرژی است. شکل‌گیری و تولد ستارگان جوان و ریزش گاز به درون سیاه‌چاله‌ای ابرپُر جرم در قلب کهکشان، از جمله فعالیت‌هایی است که در مرکز رخ می‌دهد.



جایگاه نقشه زیر در راه شیری

تصویر رادیویی از مرکز

این تصویر رادیویی از مرکز کهکشان، منطقه‌ای به پهنای ۴۵۰ سال نوری را پوشش می‌دهد. نقطه‌ی روشنی که در پایین تصویر دیده می‌شود، مجموعه‌ی قوس A است. ناحیه‌ی منحنی شکل، «کمان» نام دارد و در بالا، سمت چپ، ابر ملکولی بزرگ قوس B۲ قرار دارد. اخترشناس ایرانی، دکتر فرهاد یوسف‌زاده، از نخستین دانشمندانی بود که به کمک داده‌های آرایه‌ی تلسکوپ‌های رادیویی VLA، جرم سیاه‌چاله‌ی مرکزی کهکشان را تخمین زد. امروز می‌دانیم این سیاه‌چاله بیش از ۴ میلیون خورشید جرم دارد.

لُب رادیویی، منطقه‌ی وسیعی از گاز مغناطیس‌شده است.
کمان، از نوارهای باریک و پیچان گاز تشکیل شده است.
منطقه‌ی درون حلقه‌ی ملکولی، هزار سال نوری پهنا دارد.
قوس B۲ چگال‌ترین و پُر جرم‌ترین ابر ملکولی کهکشان است. در این منطقه، ستاره‌های بسیاری متولد می‌شود.

مجموعه‌ی قوس A، ابر گازی داغی در قلب راه شیری است که از دو بخش قوس A شرقی و قوس A غربی تشکیل شده است. تصور می‌شود فوران‌های جت‌مانند ذرات از قرص گاز اطراف سیاه‌چاله‌ی مرکزی کهکشان، وقتی در ماده‌ی میان‌ستاره‌ای چگال قلب کهکشان نفوذ می‌کند، ابرهای داغی پدید می‌آورد.

قوس A غربی، دقیقاً اطراف مرکز کهکشان را پوشانده است. این منطقه از نوارهای گاز، که حرکت‌های پیچیده‌ای دارند، تشکیل شده است.


قوس A، چشمه‌ی رادیویی فشرده و کوچکی است که دقیقاً مرکز کهکشان را نشان می‌دهد.

قوس A شرقی، پشت مرکز کهکشان قرار دارد و احتمالاً حباب گاز داغی از یک ابرنواختر است.

میلیون‌ها ستاره، فشرده‌تر از هر مکان دیگری در کهکشان، در مرکز جمع شده‌اند.

حلقه‌ی ملکولی، دربردارنده‌ی تعدادی ابر ملکولی است. حلقه با سرعت ۱۵۰ کیلومتر بر ثانیه گسترده می‌شود. این مجموعه، حدود یک میلیون سال پیش، از یک انفجار بروجود آمد.

هنوز ستاره‌شناسان به‌طور دقیق مکان بسیاری از جرم‌ها و ساختارهای دیده شده در طول موج رادیویی مرکز کهکشان را نمی‌دانند



ساختار مرکز کهکشان

مرکز مکانی است که بزرگ‌ترین و پُر جرم‌ترین جرم‌های کهکشان در آن جمع شده‌اند. در هسته‌ی آن، خوشه‌ی ستاره‌ای با ستاره‌های ابرغول سرخ‌رنگی وجود دارد که در دام نیروی گرانش قوی چشمه‌ی رادیویی قوس A افتاده‌اند. سرعت زیاد ستاره‌ها و نزدیکی آن‌ها به مرکز جرم نشان می‌دهد قوس A، سیاه‌چاله‌ای بسیار پُر جرم در رده‌ی سیاه‌چاله‌های کهکشانی پُر جرم است.

راه‌نمای نقشه سحابی‌ها

ابرهای ملکولی

ابرهای گاز هیدروژن

کشف مرکز کهکشان

• در سال ۱۹۱۸، هارلو شیپلی مکان خورشید را در کهکشان و فاصلهی آن را از مرکز، با اندازه‌گیری فاصلهی خوشه‌های گروهی پیمود.


• پس از بررسی ابرهای گاز پُرسرعت در مرکز کهکشان، یان اورت در سال ۱۹۵۷ احتمال وجود نوعی فوران و انفجار را در مرکز مطرح کرد.

• در سال ۱۹۵۸، یوسف شکوفسکی اعلام کرد «عارضه‌ی عجیبی» در مرکز کهکشان وجود دارد.

• در اواسط دهه‌ی ۱۹۶۰، نشانه‌هایی از ملکول‌ها در مرکز کهکشان مشاهده و حلقه‌ی ملکولی کشف شد.

• رصدهای فروسرخ در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ جزئیاتی درباره‌ی خوشه‌ی ستاره‌ای مرکزی آشکار کرد.

• در سال ۱۹۸۳، تلسکوپ رادیویی آرایی بسیار بزرگ (VLA)، گازهای چرخان در مارپیچ مرکزی کهکشان را کشف کرد.



چرخش مارپیچ مرکزی

• در سال ۱۹۸۴، ستاره‌شناسان کمان را کشف کردند.


• ستاره‌شناسان با اندازه‌گیری و مطالعه‌ی سرعت و حرکت ستاره‌ها، در سال ۱۹۹۷ کشف کردند سیاه‌چاله‌ای با جرم ۲/۵ میلیون خورشید در مرکز کهکشان قرار دارد. اما در سال‌های اخیر، بررسی ستاره‌های بیش‌تری در مرکز، جرم سیاه‌چاله را بیش از ۴ میلیون خورشید نشان می‌دهد.

بیش‌تر بدانیم

سیاه‌چاله‌ها ۲۰۸
راه شیری ۲۱۴
فضای میان‌ستاره‌ای ۲۱۶
کهکشان‌های فعال ۲۳۶

ساختارهای مغناطیسی

درونی‌ترین بخش به پهنای ۱۰۰ سال نوری، دارای میدان‌هایی مغناطیسی، هزار بار قوی‌تر از آن چیزی است که در هر کجای دیگر راه شیری دیده می‌شود. این میدان‌ها از ساختارهای کمانی شکلی که در گاز میان‌ستاره‌ای می‌سازند، تشخیص داده می‌شوند. این منطقه بخشی از لب رادیویی، ناحیه‌ی وسیع دودکش‌مانندی از گاز مغناطیس شده است و در آن جرم‌های عجیب و بی‌نظیری وجود دارند که مختص این ناحیه از کهکشان‌اند؛ مانند ساختاری به نام موش. منشأ میدان‌های مغناطیسی این ناحیه به‌درستی مشخص نیست.




طول دم، ۱۰۰ سال نوری است.

موش، احتمالاً ستاره نوترونی است که با سرعت در فضا حرکت می‌کند.

مارپیچ مرکزی


در شعاع ۱۰ سال نوری از مرکز سه منطقه وجود دارد: قوس A غربی، قوس A* و خوشه‌ی ستاره‌ای مرکزی. قوس A غربی مانند یک کهکشان کوچک مارپیچی است. اما بازوهای مارپیچی کوچک‌تر گازهایی هستند که به درون فرومی‌ریزند و دو باروی اصلی بخش‌هایی از قرص چرخانی را گار دارند. این قرص برافزایشی اطراف سیاه‌چاله‌ی مرکزی است. سرعت چرخش قرص نشان می‌دهد ماده‌ای که درون آن است، جرمی برابر ۵ میلیون خورشید دارد.

قوس A*




خوشه‌ی ستاره‌ای مرکزی

درون قوس A غربی، خوشه‌ی ستاره‌ای مرکزی با ۲/۵ میلیون ستاره وجود دارد. این تصویر فروسرخ ستاره‌ها را تا شعاع ۲ سال نوری از مرکز کهکشان نشان می‌دهد. در مرکز قوس A، سیاه‌چاله‌ای با جرم ۲/۵ میلیون خورشید قرار دارد. اکنون این سیاه‌چاله چندان فعال نیست؛ اما در گذشته فعال بوده است. اگر مقدار کافی گاز برای «تغذیه» سیاه‌چاله وجود داشته باشد، ممکن است دوباره در آینده نآرام شود.



کمان، که مانند زبانه‌ی عظیم خورشیدی خم شده است، از گازهایی با طول ۱۵۰ سال نوری تشکیل شده است؛ اما فقط یک سال نوری پهنای دارد.



قوس A*


جرم‌های مرکزی کهکشان

نام	فاصله از مرکز (سال نوری)	توضیحات
قوس A*	۰	سیاه‌چاله‌ای با جرم ۲/۵ میلیون خورشید
IRS ۱۶	۰/۱	خوشه‌ی ستاره‌ای آبی
قوس A غربی	۱۰	قرص گاز داغ
منبع‌ی پیراهن‌ستاره‌ای	حدود ۲۰	منبع گاز سرد
قوس A شرقی	۳۰	حبابی از گاز داغ
کمان	۱۰۰	کمان مغناطیسی
موش	حدود ۱۰۰	ستاره‌ای نوترونی با دم
لب رادیویی	حدود ۳۰۰	«دودکش» مغناطیسی
نابودکننده‌ی بزرگ	۳۴۰	سیاه‌چاله‌ای با فوران ماده (ب)
قوس B۲	۴۰۰	ابر ملکولی پر جرم
حلقه‌ی ملکولی	۵۰۰	حلقه‌ای از ابرهای ملکولی

ابره‌های ماژلان

آبرنواختر ۱۹۸۷A

در بیست و سوم فوریه سال ۱۹۸۷، رصدگران در شیلی، ستاره‌ی جدیدی را در ابر بزرگ ماژلان دیدند. با وجود فاصله‌ی زیاد این ستاره در کهکشان‌ی دیگر، آبرنواختر تا ۱۰ ماه در آسمان تاریک، با چشم غیر مسلح دیده می‌شد و در بیش‌ترین درخشندگی خود، برابر ۲۵۰ میلیون خورشید می‌درخشید.



ابر بزرگ ماژلان ۶۵۰۰ خوشه‌ی ستاره‌ای دارد.

ساختار مارپیچی محوی در این گوشه‌ی میله‌ی مرکزی مشاهده می‌شود. برخی ستاره‌شناسان ابر ماژلانی بزرگ را «کهکشان‌ی با یک بازو» می‌نامند.

ابر بزرگ ماژلان

با آن‌که جرم ابر بزرگ ماژلان فقط یک بیستم جرم راه شیری است، نسبت ستاره‌ها و گاز درون آن با کهکشان ما یکسان است. ابر بزرگ ماژلان یا LMC کوچک‌تر از آن است که مانند راه شیری، بازوهای مارپیچی داشته باشد. این ابر با فاصله‌ی ۱۶۰ هزار سال نوری، نزدیک‌ترین کهکشان یک‌پارچه به ماست؛ فقط کوتوله‌هایی مانند کهکشان کوچک قوس، که راه شیری آن را تکه‌تکه کرده است، نزدیک‌ترند.

NGC ۴۱۹ خوشه‌ی کروی با تقریباً ۱ میلیون ستاره است


NGC ۳۴۶ سحابی بزرگی است که با خوشه‌ای از ستاره‌های جوان پر جرم احاطه شده است.

ابره‌های تیره غبار در ابر بزرگ ماژلان کمتر از راه شیری هستند.

S - ماهی طلایی، یکی از پر نورترین ستاره‌های ابر بزرگ ماژلان است. درخشندگی این ستاره‌ی متغیر ۵۰۰ هزار برابر خورشید است.

ابر کوچک ماژلان

ابر کوچک ماژلان یا SMC یک چهارم هم‌دم خود جرم دارد و کمی دورتر، در فاصله‌ی ۱۹۰ هزار سال نوری قرار گرفته است به سبب اندازه‌ی کوچکش، گرانش راه شیری شکل آن را تغییر داده و تکه‌تکه‌اش کرده است. این کهکشان ۲ هزار خوشه‌ی ستاره‌ای دارد که بسیاری از آن‌ها صدمیلیون سال پیش بر اثر انفجاری ناگهانی به وجود آمده‌اند.



تاریخچه ابرهای ماژلان

• مردم قبیله کارانگا در آفریقا، نام ابرها را «قراوانی» و «قطعی» گذاشتند. بومیان استرالیا تصور می‌کردند ابر بزرگ ماژلان، بخش جدا شده‌ای از نوار راه شیری است.



فردیناند ماژلان

• در کتاب صور الکواکب عبدالرحمن صوفی رازی منجم ایرانی، که هزار سال پیش می‌زیست، به ابر بزرگ ماژلان اشاره شده است.

• فردیناند ماژلان (۱۴۸۰-۱۵۲۱) اولین فرد اروپایی بود که طی سفر دریایی خود به دور دنیا، در سال‌های ۱۵۱۹ تا ۱۵۲۱، ابرها را ثبت کرد.

• در سال ۱۹۰۸، هنریتا لویت، ستاره‌های متغیر قیفاووسی را در ابر کوچک ماژلان کشف کرد و برای اولین بار، فاصله‌ی آن‌ها را به کمک قیفاووسی‌ها محاسبه کرد. روش او در سال‌های بعد اساس شناخت فاصله‌های کهکشانی شد.



• پرنورترین ابرنواختر در حدود ۴ قرن اخیر، در سال ۱۹۸۷ در ابر کوچک ماژلان مشاهده شد.

بیش‌تر بدانیم

ابر نواخترها ۲۰۴
راه شیری ۲۱۴
گروه محلی ۲۲۸
کهکشان‌ها ۲۳۰
کهکشان‌های برخوردی ۲۳۲


سحابی رتیل

سحابی رتیل یکی از بزرگ‌ترین و درخشان‌ترین سحابی‌هاست. پهنای آن حدود ۸۰۰ سال نوری و ۵۰ بار بزرگ‌تر از سحابی جبار در کهکشان راه شیری است. اگر سحابی رتیل در جای جبار قرار داشت، اندازه‌اش از کل صورت فلکی جبار بزرگ‌تر و درخشان‌تر از ماه کامل می‌شد. این ابر گازی بزرگ با ستاره‌های داغ جوان روشن می‌شود. خوشه‌ی در مرکز آن بیش از صد ستاره دارد که هر یک پُر جرم‌تر از ۵۰ خورشیدند.



نهر ماژلانی

گرانش راه شیری، گازهای ابرهای ماژلان را به فضا پراکنده است. نوری از گاز، به نام «پل» دو کهکشان را به هم پیوند داده و دم طولی از گاز، به نام نهر ماژلانی، در پشت کهکشان‌ها در مدار بیضوی آن‌ها بر جای مانده است. مقداری گاز به نام بازوی پیش‌رو نیز پیشاپیش کهکشان‌ها پخش شده است.



رصد ابرهای ماژلان

این ابرها، به سادگی از نیم‌کره‌ی جنوبی رصد می‌شوند و در فصل نابستان بیش‌ترین ارتفاع را در آسمان دارند. اگر در نیم‌کره‌ی جنوبی هستید، در یک شب بدون مهتاب، به قوس جنوبی نگاه کنید؛ دو ابر مانند دو تکه‌ی جدا شده از راه شیری، در آسمان مشخص هستند. با دوربین‌های دوچشمی، سحابی رتیل و خوشه‌های پرنور آن‌ها نیز دیده می‌شود.


مکان ابرنواختر ۱۹۸۷A
سحابی رتیل بزرگ‌ترین و درخشان‌ترین ابر گازی در ابر بزرگ ماژلان است.

NGC ۲۱۰۰ خوشه‌ی ستاره‌ای باز بسیار بزرگی است که فقط ۲۰ میلیون سال عمر دارد.


میلی‌متری مرکزی ستاره‌ها، ۱۰ هزار سال نوری طول دارد.

تحول ابرها


ابرهای ماژلان هر ۱/۵ میلیارد سال یک‌بار دور راه شیری می‌گردند و در هر بار نزدیک شدن به راه شیری، گرانش این راه گاز و ستاره‌های آن‌ها را پراکنده می‌کند. در نتیجه، این دو ابر به‌طور مداوم در حال تغییر و تحول‌اند. ابر کوچک ماژلان تقریباً تکه‌تکه شده است و ستاره‌های آن سرانجام به راه شیری خواهند پیوست. ابر بزرگ ماژلان نیز آینده‌ی مشابهی دارد.



امروز: ابرها دوباره دور می‌شوند و ردی از گاز در پشت خود بر جای می‌گذارند. ابر کوچک ماژلان نیز کم‌کم تکه‌تکه می‌شود.




۲۵۰ میلیون سال پیش: هنگامی که ابرها از فاصله‌ی ۱۵۰ هزار سال نوری راه شیری می‌گذشتند، گاز و بخشی از ستاره‌های آن‌ها جدا شدند.



۵۰۰ میلیون سال پیش: ابرها از دورترین مکان مدار خود، ۴۰۰ هزار سال نوری دورتر، به سمت راه شیری آمدند.

گروه محلی


اثر گرانشی راه شیری از ابرهای ماژلان فراتر می‌رود و کهکشان‌های کوچک بسیاری را در فاصله‌های دورتر جذب می‌کند. خوشه‌ی کهکشان‌هایی که در اطراف راه شیری قرار دارند و نزدیک‌ترین آن‌ها کهکشان‌های مسلسله (آندرومدا) و مثلث هستند، گروه محلی نامیده می‌شوند. این گروه از حدود ۵۰ کهکشان تشکیل شده است که در ۵ میلیون سال نوری از فضا پراکنده شده‌اند و بیش‌تر آن‌ها کوچک و کم‌نورند. گروه محلی نیز عضوی از ابرخوشه‌ی محلی، مجموعه‌ای از گروه‌های کهکشانی است که در مرکز آن‌ها خوشه‌ی بزرگ سنبله در فاصله‌ی حدود ۵۰ میلیون سال نوری از ما قرار دارد.



بیضوی NGC ۲۰۵

کهکشان‌های بیضوی

بیش از نیمی از کهکشان‌های گروه محلی، مانند NGC ۲۰۵ یکی از قمرهای مسلسله، بیضوی هستند. کهکشان‌های بیضوی، توپ‌های منظمی از ستاره‌های سرخ پیرند، که برخلاف کهکشان‌های نامنظم که توده‌های فراوان گاز دارند، گازی برای تولد ستاره‌های جدید ندارند. کهکشان‌های کوتوله‌ی بیضوی، آن‌قدر کوچک و کم‌نورند که ستاره‌شناسان نمی‌توانند آن‌ها را در خوشه‌های کهکشانی دوردست ببینند.



کهکشان مسلسله (آندرومدا)

کهکشان مسلسله یا M31، در فاصله‌ی ۲/۵ میلیون سال نوری، معمولاً دورترین جرمی است که با چشم غیر مسلح دیده می‌شود. این کهکشان با ۴۰۰ میلیارد ستاره، بزرگ‌ترین کهکشان گروه محلی و یکی از مارپیچی‌های بزرگ شناخته شده است (با ۱/۵ برابر پهنای راه شیری). مسلسله بسیار شبیه به کهکشان ما است؛ حتی مانند راه شیری، دو کهکشان اقماری نزدیک، M32 و NGC ۲۰۵ دارد. متأسفانه زاویه‌ی دید ما به مسلسله، از لبه است و به همین سبب، مشاهده‌ی ساختار مارپیچی آن کار ساده‌ای نیست.

همسایه‌های کهکشانی

کهکشان مسلسله و راه شیری پُر جرم‌ترین کهکشان‌های گروه محلی‌اند و گرانش زیاد آن‌ها، کهکشان‌های کوچکی را در اطرافشان جمع کرده است. کهکشان‌های دورتر نیز، با گرانش، دور هم جمع شده‌اند و گروه‌هایی تشکیل داده‌اند. کهکشان‌های بزرگی مثل کهکشان ما و مسلسله، در گروه محلی استثنا هستند. سایر کهکشان‌ها، کهکشان‌های کوتوله‌ی بیضوی یا کهکشان‌های کوتوله‌ی نامنظم‌اند.

کهکشان مسلسله با کهکشان مثلث از یکسو و کهکشان‌های اقماری M32 و NGC ۲۰۵ احاطه شده است. مسلسله ۸ کهکشان اقماری شناخته شده دارد.

NGC ۱۸۵

NGC ۱۳۷

گرانش، مسلسله و راه شیری را به سمت هم می‌کشاند. آن‌ها ۳ میلیارد سال دیگر به هم می‌رسند. سرانجام ممکن است همگی کهکشان‌های گروه محلی به هم بپیوندند و یک ابرکهکشان به‌وجود آورند.

مسلسله II

SaGDIG

NGC ۶۸۲۲

قوس

ابرهای ماژلان، کوتوله‌ی قوس و بسیاری کوتوله‌های بیضوی دیگر، از قمرهای کهکشان راه شیری هستند.

اسد اصغر

ازدها

سکستانت (شدس)

اسد II

اسد I


شاه تخته
ماژلان
ابر کوچک
ابر بزرگ
حبار
کوره

کهکشان صب

بازوهای مارپیچی که گاز زیادی دارند.

کهکشان مثلث

سومین کهکشان بزرگ راه شیری، کهکشان مثلث یا M33، یک سوم ستاره‌های مسلسله را دارد و فقط نصف راه شیری است. مانند سایر اعضای بزرگ گروه محلی، مثلث نیز کهکشانی مارپیچی است. این کهکشان، سحابی‌های بزرگ و درخشان بسیاری دارد که یکی از آن‌ها، NGC ۶۰۴، از بزرگ‌ترین مکان‌های شناخته شده‌ی تولد ستاره‌هاست.




NGC ۶۰۴



صورت فلکی مسلسله

رصد کهکشان مسلسله

کهکشان مسلسله یا آندرومدا در شب‌های تابستان و پاییز در آسمان نیم‌کره‌ی شمالی به‌خوبی دیده می‌شود؛ مانند این تصویر که در آسمان کوهستانی ایران گرفته شده است. به افق جنوبی نگاه کنید تا مربع بزرگ صورت فلکی اسب بال‌دار (فرس اعظم) را ببینید. در بالا، سمت چپ مربع، دنباله‌ای از ستاره‌هاست. سومین ستاره را ببینید؛ کمی بالاتر از آن، کهکشان مسلسله در زیر آسمانی تاریک، به شکل توده‌ای محو بزرگ‌تر از ماه کامل، با چشم غیر مسلح دیده می‌شود.



کهکشان‌های نامنظم در بردارنده‌ی ستاره‌های جوان و سحابی‌های ستاره‌ساز بسیاری هستند.

کهکشان نامنظم NGC ۶۸۲۲

کهکشان‌های نامنظم

بسیاری از کهکشان‌های گروه محلی، مانند مارپیچی‌ها، کوچک و نامنظم‌اند. آن‌ها گاز و غبار بسیاری دارند که ستاره‌ها از آن‌ها متولد می‌شوند؛ اما هیچ ساختار و شکل مشخصی ندارند. NGC ۶۸۲۲ (کهکشان کوتوله‌ی بارنارد) و کهکشان مسلسله، کهکشان‌هایی بودند که در سال ۱۹۲۳، فاصله‌ی آن‌ها به کمک متغیرهای قیفاووسی اندازه‌گیری و هریت فراکهکشانی آن‌ها مشخص شد. فاصله‌ی محاسبه شده نشان می‌داد کهکشان‌هایی در ورای کهکشان ما وجود دارند و بسیاری از سحابی‌هایی که در آسمان دیده می‌شوند، شاید کهکشان‌هایی مستقل باشند.

مهم‌ترین کهکشان‌های گروه محلی				
نام	فاصله (سال نوری)	قطر (سال نوری)	درخشندگی (میلیون خورشید)	نوع
راه شیری	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	مارپیچی
کوتوله‌ی قوس	۷۸,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۰	بیضوی
ابر بزرگ ماژلان	۱۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	نامنظم
ابر کوچک ماژلان	۱۹۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۵۰	نامنظم
کوتوله‌ی دب‌اکبر	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰/۳	بیضوی
کوتوله‌ی اژدها	۲۴۸,۰۰۰	۵۰۰	۰/۳	بیضوی
کوتوله‌ی حجار	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱/۵	بیضوی
کوتوله‌ی شاه‌تخته	۲۸۰,۰۰۰	۵۰۰	۰/۴	بیضوی
کوتوله‌ی سکستان	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰/۸	بیضوی
کوتوله‌ی کوره	۴۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۰	بیضوی
کوتوله‌ی اسد II	۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۱	بیضوی
کوتوله‌ی اسد I	۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	بیضوی
کوتوله‌ی لگنوس	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰/۸	نامنظم
NGC ۶۸۲۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۳۰۰	نامنظم
کوتوله‌ی مسلسله II	۱,۹۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵	بیضوی
NGC ۱۴۷	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۰	بیضوی
NGC ۱۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۱۰	بیضوی
مسلسله (آندرومدا)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	مارپیچی
M ۳۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۰۰	بیضوی
NGC ۲۰۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵۰	بیضوی
مثلث (M ۳۳)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	مارپیچی
IC ۱۶۱۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۸۰	نامنظم
LGS ۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰/۶	نامنظم
کوتوله‌ی مسلسله I	۲,۵۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵	بیضوی
کوتوله‌ی مسلسله III	۲,۵۷۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱	بیضوی
EGB ۰۴۲۷+۶۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰/۸	بیضوی
کوتوله‌ی توکان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰/۶	بیضوی
WLM	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۳۰	نامنظم
SagDIG	۳,۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲	نامنظم
IC ۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	نامنظم
کوتوله‌ی اسب بال‌دار	۵,۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۵۰	نامنظم

بیش‌تر بدانیم

راه شیری ۲۱۴، ابرهای ماژلان ۲۲۶، کهکشان‌ها ۲۳۰
کهکشان‌های برخوردی ۲۳۴، خوشه‌های کهکشانی ۲۳۴، مقیاس کیهان ۲۳۸



مسطحه مرکزی گروه محلی

کهکشان‌ها



مایلین ۱، در فاصله‌ی ۸۰۰ میلیون سال نوری از ما، یکی از بزرگ‌ترین کهکشان‌های کیهان است. اخترشناسان در این کهکشان، ساختاری مارپیچی یافته‌اند. قطر این مارپیچی عظیم بیش از ۶ برابر راه شیری است.

بزرگ‌ترین کهکشان‌ها

اخترشناسان گونه‌ی جدیدی از کهکشان‌ها را کشف کرده‌اند که به سبب درخشندگی کم، تاکنون دیده نشده بودند. این کهکشان‌های کم‌فروغ، ستاره‌های کمی دارند؛ اما پُر از گازند. برخی از آن‌ها چند برابر راه شیری هستند.

دسته‌بندی کهکشان‌ها

کهکشان‌ها از نظر اندازه، جرم و درخشندگی تفاوت‌های بسیار دارند؛ اما اخترشناسان آن‌ها را به چند دسته‌ی اصلی تقسیم می‌کنند. سه گروه اصلی، بیضوی، مارپیچی و مارپیچی - میله‌ای است. گروه‌های اصلی خود زیرگروه‌هایی پیدا می‌کنند. کهکشان‌های دیگر نامنظم هستند و هیچ ساختار مشخصی ندارند. ممکن است انواع متفاوتی از کهکشان‌ها شکل بگیرد که به سرعت چرخش بیش کهکشان و شکل‌گیری ستاره‌ها بستگی دارد. کهکشان‌های مارپیچی تقریباً اندازه‌های یکسانی دارند؛ اما امکان دارد بیضوی‌ها بزرگ‌ترین یا کوچک‌ترین کهکشان‌ها باشند.

کهکشان M۵۹
نوع: E۵



کهکشان M۳۲
نوع: E۲



کهکشان NGC ۳۳۷۹
نوع: E۰



بیضوی‌ها

بیش از نیمی از کهکشان‌های کیهان، توپ‌هایی از ستاره‌های پیر، بدون هیچ بازوی مارپیچی یا قرص مشخصی هستند. بیضوی‌ها گاز و غبار بسیار کمی دارند و تقریباً ستاره‌ای در آن‌ها متولد نمی‌شود. جرم آن‌ها بسیار گوناگون است. برخی از کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین کهکشان‌ها، بیضوی‌اند. بیضوی‌ها با حرف E که در مقابل آن عددی قرار می‌گیرد، دسته‌بندی می‌شوند. ظاهر کهکشان‌های E۰ بسیار نزدیک به دایره است و کهکشان‌های E۷ بیضی‌های کشیده‌اند.

نامنظم‌ها

برخی از کهکشان‌ها در دسته‌ی بیضوی‌ها، مارپیچی‌ها یا مارپیچی - میله‌ای‌ها قرار نمی‌گیرند. کهکشان‌های نامنظم (Irr)، هیچ شکل مشخصی ندارند و حاوی گاز و غبار زیادی هستند. ابرهای ماژلان، دو کهکشان اقماری راه شیری، از این دسته‌اند. کهکشان M۸۲، که فوران‌های عظیم شکل‌گیری ستاره‌ای دارد نیز، کهکشانی نامنظم است.

کهکشان‌های عدسی‌گون (نوع SO) گروهی از کهکشان‌ها بین مارپیچی‌ها و بیضوی‌ها هستند. عدسی‌گون‌ها، برآمدگی مرکزی با ستاره‌های پیر و صفحه‌ای از ستارگان جوان دارد، اما بازوی مارپیچی وجود ندارد.

مناطق روشن، محل تولد ستاره‌هاست. ستاره‌شناسان زمانی می‌پنداشتند M۸۲ کهکشانی منفجرشده است.



کهکشان نامنظم M۸۲


برخی کهکشان‌های گوناگون

نام	صورت فلکی	نوع	فاصله (میلیون سال نوری)
M۱۰۵	اسد	E۰	۳۸
M۳۲	مسله	E۲	۲/۵
M۵۹	سنبله	E۵	۵۰
کلاه مکزیکی	سنبله	Sa	۵۰
NGC ۲۴۴۱	دب اکبر	Sb	۳۳
مسله (M۳۱)	مسله	Sb	۲/۵
فرغره (M۱۰۱)	دب اکبر	Sc	۲۰
مفلث (M۳۳)	مفلث	Sc	۲/۵
گرداب (M۵۱)	تازی‌ها	Sc	۲۰
NGC ۲۸۵۹	اسد اصغر	SBa	۷۲
NGC ۵۸۵۰	سنبله	Sb	۱۰۰
NGC ۷۴۷۹	اسب بالدار	Sb	۱۱۰
M۸۲	دب اکبر	Irr	۱۲
ابر بزرگ ماژلان	ماهی طلایی	Irr	۰/۱۶

مارپیچی‌ها

کهکشان‌هایی مانند راه شیری، شکل مارپیچی، مانند چرخ گاری یا فرفره دارند. در این کهکشان‌ها، مرکز بیضوی شامل ستاره‌های پیر با قرص تختی از ستاره‌هاست که دو یا چند بازو را تشکیل می‌دهند. بازوها محل ستاره‌های جوان و سحابی و گاز و غبارهای درخشان‌اند. مارپیچی‌ها با حرف S که به دنبال آن حرف کوچکی مانند a, b, c یا d می‌آید، دسته‌بندی می‌شوند. کهکشان‌های Sa مرکزی بزرگ و بازوهای فشرده و کوچک دارند. کهکشان‌های Sd مرکزی کوچک و بازوهای پراکنده دارند. حدود یک سوم کهکشان‌ها مارپیچی یا مارپیچی - میله‌ای هستند.

کهکشان M101: نوع Sc



کهکشان‌های Sb و Sc، مارپیچی‌های کم‌تراکم‌تر با برآمدگی مرکزی کوچک‌تر هستند.


کهکشان NGC ۲۸۴۱: نوع Sb



کهکشان M104: نوع Sa



بازوهای مارپیچی فشرده




کهکشان NGC ۴۶۵۰: نوع SBa میله ستاره‌ای

مارپیچی - میله‌ای‌ها

گونه‌ی خاصی از کهکشان‌های مارپیچی، جداگانه دسته‌بندی می‌شوند: در این دسته، میله‌ای از مرکز کهکشان، از هر دو طرف، خارج می‌شود. میله جرم صلبی نیست و از ستاره‌های در حال حرکت تشکیل شده است. به علاوه، ممکن است تجمع موقتی از ستاره‌ها باشد، نه بخشی دائمی از کهکشان. مارپیچی میله‌ای‌ها با حروف SB که به دنبال آن‌ها حروف کوچک a, b, c یا d می‌آید، مشخص می‌شوند و مانند مارپیچی‌های عادی فشرده‌گی بازوها و انداز‌های هسته را مشخص می‌کنند. راه شیری نیز کهکشانی مارپیچی میله‌ای است.

کهکشان NGC ۵۸۵۰: نوع SBb



کهکشان NGC ۷۴۷۹: نوع SBc



مارپیچی از لبه

کهکشان‌های مارپیچی، صفحه‌های تختی هستند. وقتی یکی از آن‌ها را از لبه نگاه می‌کنیم، به نوار راه شیری ظریف و کوچکی می‌مانند که یک برآمدگی مرکزی در خط قرص کهکشان آن دیده می‌شود. در NGC ۸۹۱، خط تیره‌ای از غبار در میان انبوه روشن ستاره‌های صفحه دیده می‌شود.


تاریخچه‌ی کهکشان

• عبدالرحمان صوفی، منجم ایرانی، «سحابی مسلسل» را در سال ۹۶۴ میلادی رصد کرد که امروز آن‌را به نام کهکشان مسلسل یا آندرومدا می‌شناسیم. او در کتاب راهنمای آسمان، به سحابی‌ای اشاره کرده است که امروز به نام ابر بزرگ ماژلان می‌شناسیم.

• در سال ۱۷۵۵، ایمانوئل کانت، فیلسوف آلمانی (۱۸۰۴-۱۷۲۴) سحابی‌ها را جزیره‌های کیهانی دوردستی از ستاره‌ها دانست.

• در سال ۱۸۰۲، ویلیام هرشل رصد و بررسی ۲۵۰۰ سحابی را به پایان رساند. بسیاری از آن‌ها کهکشان‌هایی در ورای راه شیری بودند. اما اخترشناسان هنوز در آن زمان به ماهیت این جرم‌ها پی نبرده بودند.

کهکشان مارپیچی - طرحی از راس



• در سال ۱۸۴۵، ویلیام پارسون ایرلندی، معروف به لرد راس، با تلسکوپ غول‌پیکر خود در برخی سحابی‌ها ساختار مارپیچی مشاهده کرد.

• در سال ۱۹۲۴، ادوین هابل ثابت کرد که بسیاری از این سحابی‌ها در ورای راه شیری قرار گرفته‌اند و خود، کهکشان‌هایی مستقل‌اند. او طرحی برای دسته‌بندی کهکشان‌ها ارائه کرد.

پیش‌تر بدانیم

راه شیری ۲۱۴، ابرهای ماژلان ۲۲۶
گروه محلی ۲۲۸
کهکشان‌های برخوردی ۲۳۲
شکل‌گیری کهکشان‌ها ۲۴۸


کهکشان‌های برخوردی

ستارگان در کهکشان برخوردی آتن تا یک میلیون سال نوری کشیده شده‌اند.

NGC ۴۰۳۹

NGC ۴۰۳۸

تصویر هابل از آتن



تلسکوپ فضایی هابل این تصویر نزدیک را از کهکشان‌های آتن تهیه کرده است. در این تصویر، آشوب مرکز به شکل گازهای عظیمی که با هم ادغام می‌شوند، نشان داده شده است.

گاز و غبار بازوهای مارپیچی به درون هسته‌ها فرو ریخته و موجب شده است ستاره‌های اینجا سردتر دیده شوند.

نمای باز از کهکشان‌های آتن


هر دو کهکشان پیش از برخورد مارپیچی‌های عادی بودند.

غبار، منطقه‌ی مرکزی را فراگرفته و خوشه‌های عظیم ستاره‌ای را پنهان کرده است.

کهکشان چرخ‌ارابه‌ای

کهکشان چرخ‌ارابه‌ای، که زمانی مانند کهکشان ما بود، نمونه‌ی خوبی از نتیجه‌ی برخورد مستقیم دو کهکشان است. حدود ۳۰۰ میلیون سال پیش، کهکشان کوچکی به سمت مرکز آن هجوم برد. برخورد، موجب شکل‌گیری تعداد زیادی ستاره‌ی جدید شد که حلقه‌ای از ستاره‌های جوان آبی‌رنگ در اطراف کهکشان به وجود آورد.

حلقه به سادگی تمام راه شیر را در بر می‌گیرد.






گاز و غبار، با فشار مرکز، به شکل موج به بیرون پخش شده‌اند و ستاره‌های جدیدی شکل داده‌اند.

برخورد دو کهکشان بسیار پیچیده‌تر از برخورد دو توپ بیلیارد با هم است. کهکشان توده‌ای از گاز و ستاره‌های جدا از هم است. هنگام برخورد، آن‌ها مانند دو روح از میان هم عبور می‌کنند. فاصله‌ی بین ستاره‌ها چنان است که به هم نمی‌خورند؛ اما هنگام برخورد هر کهکشان تمایل دارد با نیروی گرانش، جرم‌های دیگری را به سمت خود بکشد. در مرکز، در حالتی که در لبه‌ها، ستاره‌ها به فضا پرتاب و بازوهای مارپیچی کشیده و آشفته می‌شوند، ابرهای گاز با هم برخورد می‌کنند. در کهکشان‌های برخوردی NGC ۴۰۳۸ و NGC ۴۰۳۹، معروف به کهکشان‌های آتن، ردی از ستاره‌ها، منحنی‌وار، در پشت دو کهکشان کشیده شده که یادآور شاخک‌های حشره است.

NGC ۴۰۳۹

NGC ۴۰۳۸




۳ ۶۰۰ میلیون سال پیش، که کهکشان‌ها شروع به گردش دور هم کردند، شکل و ساختارشان تغییر کرد.


۲ ۹۰۰ میلیون سال پیش، برخورد دو کهکشان آغاز شد.

۱ تا ۱/۲ میلیارد سال پیش، کهکشان‌های آتن، دو کهکشان مارپیچی جداگانه بودند.


برخورد نزدیک این شبیه‌سازی نشان می‌دهد جفت کهکشان آتن چگونه شکل گرفته است. رایانه آن‌قدر قوی نبود که شبیه‌سازی را برای تمام میلیاردها ستاره‌ی دو کهکشان انجام دهد؛ به همین سبب در شبیه‌سازی، هر کهکشان فقط ۳۵۰ ستاره دارد که دور مرکز پرجرمی می‌گردند. با نزدیک شدن دو کهکشان و آغاز گردش آن‌ها دور هم، رایانه محاسبه کرده است که ستاره‌ها چگونه به کشش‌های پیچیده‌ی گرانشی دو کهکشان پاسخ می‌دهند.




۳۰۰ میلیون سال پیش



۴۰۰ میلیون سال پیش



۱۰۰ میلیون سال پیش




امروز

نبرد نابرابر

حدود ۳۰۰ میلیون سال پیش، کهکشان گرداب از کنار کهکشانی کوچکتر عبور کرد. در این شبیه‌سازی رایانه‌ای، برخورد از کنار دیده می‌شود. در حالی که گوشه‌ای از قرص کهکشان کوچکتر به کهکشان بزرگ کشیده می‌شود، کهکشان گرداب تقریباً بدون آسیب دور می‌شود. در این برخورد، کهکشان گرداب ستاره‌های کهکشان کوچکتر را جدا می‌کند و پلی از آن‌ها بین دو کهکشان شکل می‌دهد و کهکشان کوچکتر کاملاً تغییر شکل می‌دهد و از هم می‌پاشد.

این تصویر ترکیبی از نور مرئی و رادیویی است و رنگبندی آن کاذب است.




مناطق آبی گاز هستند.

سبز، ستاره‌ها هستند.

قرمز نشان‌دهنده میدان مغناطیسی قوی است.

کهکشان گرداب

در تصاویر تلسکوپ‌های امروزی، در کنار کهکشان گرداب، کهکشان کوچک دیگری نیز دیده می‌شود. این کهکشان صدها میلیون سال پیش با گرداب برخورد کرده و اکنون در کنار آن است. گرانش کهکشان کوچک، گاز و ستاره‌های بخشی از گرداب را به سمت خود کشیده و ساختار مارپیچی غیرعادی بارزی برای آن ساخته که سبب نامیدن آن به گرداب شده است.



مناطق آبی، مکان‌های شکل‌گیری ستارگان‌اند که بر اثر برخورد بوجود آمده‌اند. در برخی، یک میلیون ستاره‌ی آبی داغ و جوان وجود دارد.


برخورد، بیش از هزار خوشه‌ی ستاره‌ای جدید بوجود آورده است.

ستاره‌های داغ، با عمری کمتر از ۱۰ میلیون سال، نشان می‌دهند که مدت کوتاهی است که برخورد رخ داده است.

آینده‌ی راه شیری: در ۳ میلیارد سال آینده، کهکشان ما با کهکشان مسلسله برخورد خواهد کرد و احتمالاً مجموعه‌ای مانند آتن خواهد ساخت.

کهکشان ستاره فوران

کهکشان‌های ستاره فوران، معمولاً از پیش آمده‌ای پس از برخوردند که ابرهای گاز کهکشانی با هم ادغام می‌شوند و به طور ناگهانی شروع به ستاره‌سازی می‌کنند. کهکشان‌های ستاره فوران، که در سال ۱۹۸۳ ماهواره‌ی نجومی فروسرخ (IRAS) آن‌ها را کشف کرد، مملو از ستاره‌های داغ جوان‌اند که در این تصویر فروسرخ از MAX (کهکشانی در دب اکبر) به شکل نقاط سرخ رنگ ثبت شده‌اند. نمودار، شدت انرژی تابش شده از مناطق گوناگون کهکشان را نشان می‌دهد.



ستاره‌های NGC ۴۰۳۹

اکنون هسته‌های کهکشانی در مداری به دور یکدیگر قفل شده‌اند.

ستاره‌های NGC ۴۰۳۸

بازوهای مارپیچی به اطراف کشیده می‌شوند.

امروز، دو نوار از ستاره‌های پرتاب شده، در دو طرف کهکشان‌های اصلی کشیده شده است.

۴ در طی ۳۰۰ میلیون سال، ستاره‌هایی که بازوهای مارپیچی را شکل داده بودند، از هر دو کهکشان جدا شدند.

بیشتر بدانیم

اخترشناسی فروسرخ ۲۸
اخترشناسی رادیویی ۳۰
جایی که ستاره‌ها متولد می‌شوند ۱۹۲
ابره‌های ماژلن ۲۲۶، کهکشان‌ها ۲۳۰
خوشه‌های کهکشانی ۲۳۴
شکل‌گیری کهکشان‌ها ۲۴۸

خوشه‌های کهکشانی

کهکشان‌ها جرم‌های منزوی و تنهایی نیستند. آن‌ها به سبب گرانش در گروه‌هایی دور هم جمع می‌شوند؛ گروه‌هایی از جفت‌های کهکشانی تا خوشه‌هایی شامل هزاران کهکشان. برخی از خوشه‌ها شکل منظمی دارند، تقریباً کروی‌اند و بیش‌تر از کهکشان‌های بیضوی تشکیل شده‌اند. سایر آن‌ها، خوشه‌های نامنظمی هستند که کهکشان‌های مارپیچی بیش‌تری دارند. برخی اخترشناسان عقیده دارند خوشه‌ها در اثر ادغام، گسترش می‌یابند و خوشه‌های نامنظم، آن‌هایی هستند که ادغام آن‌ها به تازگی رخ داده است. گاز داغ کهکشان‌ها در ملاقات‌هایی نزدیک میان کهکشانی، در مرکز خوشه جمع می‌شود و پرتو ایکس تابش می‌کند که در زمین قابل دریافت است و ساختار خوشه را به خوبی نشان می‌دهد. خوشه‌ها نیز در مجموعه‌های بزرگ‌تری به نام ابرخوشه‌ها جمع می‌شوند که بزرگ‌ترین ساختار متداول کیهانی است.

خوشه‌ی سنبله

کهکشان ما یا راه شیری، عضو خوشه‌ی کوچکی با حدود ۵۰ کهکشان است که بیش‌تر آن‌ها کوچک و کم‌نورند. نام این خوشه، گروه محلی است. نزدیک‌ترین خوشه‌ی بزرگ به ما، خوشه‌ی سنبله است که در فاصله‌ی ۵۰ میلیون سال نوری، در امتداد صورت فلکی سنبله قرار دارد. سنبله، خوشه‌ای نامنظم با بیش از ۲ هزار کهکشان است. ویلیام و کارولین هرشل، حدود دو قرن پیش در دهه‌های ۱۷۸۰ و ۱۷۹۰، در این بخش آسمان ۳۰ «سحابی» ثبت کردند. در آن زمان، آنان نمی‌دانستند به کهکشان‌هایی در ورای راه شیری می‌نگرند. با آن‌که در این خوشه ۳ کهکشان بیضوی غول‌پیکر وجود دارد، بیش‌تر اعضای پرنور سنبله، مارپیچی‌اند.

کهکشان‌های بیضوی و نامنظم کوچک بسیار فراوان، اما کم‌نورند و دیدن آن‌ها در خوشه‌های دوردست دشوار است.

MAF نوع E۳



MAF نوع E۱

NGC ۴۳۸۸
Sb نوع

NGC ۴۴۱۳
SBb نوع

تصویر پرتو X از مرکز خوشه‌ی سنبله

تصویر پرتو X از مرکز ایبل ۲۲۵۶



تکامل خوشه


خوشه‌ها از جمع شدن گروه‌های کوچک‌تر کهکشان‌ها ساخته می‌شوند. تصویر پرتو ایکس گاز خوشه‌ی ایبل ۲۲۵۶، نقطه‌ی روشنی را سمت راست مرکز نشان می‌دهد. این روشنایی گروه کهکشانی دیگری است که به سمت خوشه جذب می‌شود. در خوشه‌هایی که دیگر گروه‌های جدیدی به دام نمی‌اندازند، گاز به شکل منظم‌تری در خوشه پخش شده است.

گاز داغ درون خوشه‌ها

رصد‌های پرتو ایکس ماهواره‌ها نشان می‌دهد خوشه‌های کهکشانی پر از گاز داغ با دمای ده‌ها میلیون درجه‌ی سانتی‌گرادند. گاز از کهکشان‌ها می‌آید و مانند استخری در مرکز خوشه جمع می‌شود. این تصویر پرتو ایکس خوشه‌ی سنبله، ابری از گاز داغ را نشان می‌دهد که جرمی بیش از جرم همه‌ی کهکشان‌های خوشه دارد.

خوشه‌های مهم کهکشانی

نام	فاصله (میلیون سال نوری)	اندازه (میلیون سال نوری)	دمای گاز (میلیون °C)
سنبله	۵۰	۱۱	۳۰
کوره	۷۰	۸	-
قنطورس	۱۴۰	۵	۴۵
خرچنگ	۲۱۰	۱۱	-
برسائوش	۲۴۰	۱۷	۷۵
گیسو	۲۹۰	۲۰	۹۵
جائی	۴۹۰	۱۵	۴۵
ایبل ۲۲۵۶	۷۶۰	۱۰	۸۵
اکلیل شمالی	۹۴۰	۸	۱۰۰
دو پیکر	۱۰۰۰	۹	-



کهکشان‌های بیضوی غول پیکر

بسیاری از خوشه‌ها، مانند کهکشان MAV در قلب خوشه‌ی سنبله، کهکشان‌های عظیمی شاید با قطر ۵۰۰ هزار سال نوری در مرکز خود دارند. این کهکشان‌های بیضوی غول پیکر ساختاری مانند بیضوی‌های عادی دارند. اما بسیار بزرگ‌ترند. آن‌ها معمولاً منابع قوی امواج رادیویی و ایکس هستند. هاله‌ای از ستاره‌های کم‌نور و خوشه‌های ستاره‌ای اطراف آن‌هاست و حداقل یکی از آن‌ها بیش از دو هسته مرکزی دارند. کهکشان‌های بیضوی غول پیکر، با بعدین سایر کهکشان‌های خوشه، چین بزرگ شده‌اند و هسته‌های متعددی به دست آورده‌اند.

NGC ۴۴۸۹ نوع E۴ خوشه کهکشانی گیسو

NGC ۴۴۷۴ نوع E۰



خوشه‌ی گیسو

بزرگ‌ترین خوشه‌ی چگال و مطمئن به راه شیری، در جهت صورت فلکی، گیسوان بریکه است خوشه‌ی گیسو بیش از ۳ هزار کهکشان دارد و در فاصله‌ی حدود ۳۰۰ میلیون سال نوری از ما است. بیش‌تر کهکشان‌های خوشه، بیضوی و عدسی‌گون هستند. برخلاف خوشه‌ی نامنظم و به هم ریخته‌ی سنبله، گیسو ساختاری فشرده دارد که با توده‌ی نسبتاً کروی از گازهای داغ احاطه شده است. این خوشه، دو دسته دارد که در مرکز هریک، کهکشان بیضوی غول پیکری قرار گرفته است. ممکن است خوشه‌ی گیسو، حاصل برخورد دو خوشه‌ی هم‌بزرگ، مدت‌ها پیش از این باشد. خوشه‌ی گیسو، خود نیز در مرکز ابرخوشه‌ی گیسوست.

پیش‌تر بدانیم

اخترشناسی پرتو ایکس ۳۴
گروه محلی ۲۲۸، کهکشان‌ها ۲۳۰
کهکشان‌های برخوردی ۲۳۲
مقیاس کیهان ۲۳۸
شکل‌گیری کهکشان‌ها ۲۴۸

NGC ۴۴۷۳ نوع E۴

NGC ۴۴۳۵ نوع E۴

NGC ۴۴۶۱ نوع Sa


ARP ۱۲۰ نوع Sa

خوشه‌ی سنبله از کهکشان‌های مارپیچی شکل گرفته است. اما بسیاری از خوشه‌ها بیش‌تر از بیضوی‌ها تشکیل شده‌اند.

NGC ۴۴۲۵ نوع Sb

ابرخوشه‌ی محلی

همان‌گونه که مجموع کهکشان‌ها خوشه‌ها را می‌سازند، خوشه‌ها نیز ابرخوشه‌ها را می‌سازند. ممکن است یک ابرخوشه، چند خوشه را در فضایی بیش از ۱۰۰ میلیون سال نوری دربرگیرد. ابرخوشه‌ها شکل‌های پیچیده‌ای دارند؛ برخی رشته‌هایی از کهکشان‌ها دارند و برخی تخت‌اند. گروه محلی ما یکی از اعضای ابرخوشه‌ی محلی است که خوشه‌ی سنبله در مرکز آن است. این ابرخوشه، ۱۱ توده‌ی اصلی، در ساختاری تخت تشکیل شده که پهنایش ۱۰ بار بیش‌تر از ضخامت آن است.



خوشه‌ی سنبله

خوشه‌ی نازی‌ها

خوشه‌ی جام

خوشه‌ی اسد

گروه محلی، با سرعت ۴۵۰ کیلومتر بر ثانیه به سمت مرکز ابرخوشه می‌رود

کهکشان‌های فعال

شمار کمی از کهکشان‌ها، با بقیه بسیار متفاوت‌اند. آن‌ها از منطقه‌ی کوچکی در مرکز خود، که چندان از منظومه‌ی شمسی بزرگ‌تر نیست، انرژی بسیار زیادی آزاد می‌کنند. چنین کهکشان‌هایی، از جمله اختروش‌ها، کهکشان‌های رادیویی، کهکشان‌های سیفرت و بلازارها، از یک خانواده‌اند. آن‌چه می‌بینیم، به فاصله‌ی کهکشان و زاویه‌ای بستگی دارد که کهکشان نسبت به خط دید ما دارد.

درون کهکشان فعال

کهکشان‌های فعال ساختار مشابه بسیاری دارند؛ اما فقط کهکشان‌های رادیویی همه‌ی این ساختارهای پیچیده را به نمایش می‌گذارند. از فاصله‌های دور، بارزترین ساختاری که مشاهده می‌شود، فوران‌های جت‌مانند ذرات است که از دو سوی کهکشان به بیرون پرتاب می‌شود و از میان ابرهای عظیم کهکشانی می‌گذرد و آن‌ها را گرم و برانگیخته می‌کند. نزدیک‌تر، در قلب کهکشان، حلقه‌ای از گاز و غبار داغ و درخشان وجود دارد که یک قرص برافزایشی است. در قلب آن، سیاه‌چاله‌ای ابر پُرچرم قرار دارد و چنان پرتابی است که قرص داغ دور آن برابر یک تریلیون خورشید می‌درخشد.

فوران‌ها امواج رادیویی و گاهی امواج نور مرئی تابش می‌کنند.

حلقه‌ی غبار مرکزی

در مرکز کهکشان‌های فعال، منبعی بسیار پرتابی وجود دارد که در حلقه‌ای از گاز و غبار پوشیده شده است. لبه‌های بیرونی حلقه تاریک است؛ اما لبه‌ی درونی، جایی که تابش‌های هسته را جذب می‌کند، می‌درخشد. فوران‌ها یا جت‌ها از دو طرف مرکز حلقه خارج می‌شوند.

لب یا ناحیه‌ی عظیم گازی امواج رادیویی تابش می‌کند.

کهکشان

منطقه مرکزی

لبه‌ی درونی ابر گاز و غبار داغ است و با سرعت زیادی می‌چرخد.

انرژی هسته، درون حلقه را گرم می‌کند و موجب درخشش آن می‌شود.

سیاه‌چاله، گازهایی را که به درونش می‌ریزد، می‌بلعد.

لبه‌های بیرونی ابر گاز و غبار سرد و آرام هستند.

لب‌های رادیویی

فوران‌های گاز داغ تا صدها هزار سال نوری از مرکز کهکشان خارج می‌شوند. زمانی که با ابرهای گاز میان‌کهکشانی برخورد می‌کنند، به ناحیه‌ها یا جفت لب‌های عظیم با تابش رادیویی قوی تبدیل می‌شوند.


میدان مغناطیسی، ذرات باردار را اطراف سیاه‌چاله به حرکت درمی‌آورد. امکان دارد آن‌هایی که سرعت بسیار زیادی دارند، به صورت فوران‌های جت فرار کنند.

برخی کهکشان‌های فعال

نام	صورت فلکی	نوع	فاصله (میلیون سال نوری)
قنطورس A	قنطورس	رادیویی	۱۵
M۷۷	قیطس	سیفرت	۴۵
NGC ۱۵۶۶	اژدها	سیفرت	۵۰
M۸۷	سنبله	رادیویی	۵۰
NGC ۴۱۵۱	تازی‌ها	سیفرت	۶۵
دجاجة A	دجاجة	رادیویی	۷۴۰
BL - چلیپاسه	چلیپاسه	بلازار	۹۰۰
PKS ۲۳۴۹-۰۱	حوت	اختروش	۱۵۰۰
۳C ۲۷۳	سنبله	اختروش	۲۱۰۰
OJ ۴۸۷	خرچنگ	بلازار	۳۸۰۰
۳C ۴۸	مثلث	اختروش	۴۵۰۰
۳C ۲۷۹	سنبله	بلازار	۵۸۰۰
۳C ۳۶۸	مارافسای	رادیویی	۸۴۰۰

درون هسته

در قلب کهکشان فعال، سیاهچاله‌ی عظیمی، شاید با جرم یک میلیارد برابر خورشید، جای دارد. این جا منبع انرژی یا موتور کهکشان است؛ جایی که سوخت آن گاز میان‌ستاره‌ای است. زمانی که گاز به سمت سیاهچاله کشیده می‌شود، قرص برافزایشی چرخانی در اطراف آن شکل می‌گیرد. ذرات باردار الکتریکی، که از گاز داغ شده آزاد شده‌اند، در میدان مغناطیسی شدیدی گرفتار می‌شوند و از قطب‌ها فرار می‌کنند و فوران‌های جت را به وجود می‌آورند.



اختروش ۱-۲۳۴۹ PK: تصویر تلسکوپ هابل از این اختروش، در فاصله‌ی ۱/۵ میلیارد سال نوری، کهکشان کمپوری را نشان می‌دهد که در مرکز آن موتور درخشان و پرنوری قرار دارد.

فوران‌ها شامل ذرات باردار و میدان‌های مغناطیسی هستند.

فوران‌ها زمانی که هسته را ترک می‌کنند با سرعتی نزدیک به سرعت نور حرکت می‌کنند.

گاز حتی یک ستاره‌ی بلعیده‌شده، سوخت کافی برای فعال کردن ابرسیاهچاله‌ی کهکشانی به مدت یکسال است.

بخش مرکزی صیقله آن‌قدر داغ است که تابش ایکس گسیل می‌کند.

لیمه‌های بیرونی قرص برافزایشی (ماده‌ی دور سیاهچاله) پر است از ستاره‌های فروپاشیده و گاز میان‌ستاره‌ای

قرص برافزایشی از گاز میان‌ستاره‌ای و بازمانده ستاره‌ها تشکیل می‌شود.


اختروش‌ها

اختروش‌ها از پرنورترین جرم‌های کیهان‌اند؛ اما آن قدر دورند که مانند ستاره‌های کم‌نور می‌درخشند. آن‌ها علاوه بر نور مرئی، تابش رادیویی، ایکس، فرسرخ نیز دارند و گاهی فوران‌های مرئی هم در آن‌ها دیده می‌شود. اختروش‌ها هسته‌های فعال و درخشان کهکشان‌های دور دست‌اند و حلقه‌ی غباری قرص برافزایشی سیاهچاله‌ی مرکزی آن‌ها در زاویه‌ای نسبت به ماست که اجازه می‌دهد بخشی از قرص بسیار درخشان برافزایشی دیده شود.



کهکشان‌های سیفرت

به‌طور میانگین، از هر ۱۰ کهکشان مارپیچی بزرگ، یکی هسته‌ی بسیار پرنوری در مرکز خود دارد. این یک کهکشان سیفرت است که شاید نمونه‌ی کم‌انرژی‌تری از یک اختروش باشد و سیاهچاله‌ی کوچک‌تری نیز در مرکز خود داشته باشد. برخی اخترشناسان بر این باورند که امکان دارد همه‌ی مارپیچی‌های بزرگ، مثل راه شیری، در دوره‌ای از زندگی خود به سیفرت تبدیل شوند.



کهکشان سیفرت NGC ۱۵۶۶ در ۵۰ میلیون سال نوری از ما، نمونه‌ی کم‌نور یک اختروش است (تصویر در نور فرسرخ با رنگ آمیزی کاذب).


کهکشان‌های رادیویی

کهکشان‌های رادیویی از بزرگ‌ترین جرم‌های کیهان‌اند. یک یا دو فوران جت از آن‌ها خارج شده که تا هزاران سال نوری از مرکز کشیده شده و نواری از گاز را به ابرهای عظیم تابانی در دو طرف کهکشان تبدیل کرده است. در کهکشان‌های رادیویی، حلقه‌ی غبار مرکزی از لیه دیده می‌شود. به این سبب، هسته پنهان است و فوران‌های جت، که کم‌نورترند، فرصت خودنمایی پیدا می‌کنند.




بلازارها

بلازارها شبیه اختروش‌ها هستند؛ اما درخشندگی آن‌ها بسیار سریع، تا ۱۰۰ بار، روزبه‌روز تغییر می‌کند. به نظر می‌رسد بلازارها کهکشان‌های فعالی هستند که فوران‌های جت آن‌ها درست رو به ماست. ما مستقیم به فوران‌ها و هسته نگاه می‌کنیم و همه‌ی نور و سایر تابش‌های قرص برافزایشی اطراف سیاهچاله مرکزی را می‌بینیم.



کهکشان رادیویی ۳۶۸: در این تصویر، خطوط آبی شدت تابش‌های رادیویی کهکشان را نشان می‌دهد




بلازار ۲۷۹: این تصویر رصدخانه‌ی پرتو گامای کامپتون، تابش پرنورترین هسته‌ی یک بلازار را نشان می‌دهد

تاریخچه‌ی کهکشان‌های فعال

• در سال ۱۹۴۳، توجه کارل سیفرت، اخترشناس آمریکایی (۱۹۱۱-۱۹۶۰)، به گروهی از مارپیچی‌ها با هسته‌های بسیار درخشان جلب شد که کهکشان‌های سیفرت بودند.

• در سال ۱۹۴۶، استنلی هی اخترشناس انگلیسی (۱۹۰۹-۲۰۰۰)، منبع رادیویی بسیار قوی‌ای به نام دجابه A در دجابه کشف کرد.

• در سال ۱۹۵۴، والتر باده اخترشناس آمریکایی آلمانی‌الاصل (۱۸۹۳-۱۹۶۰) و رودولف مینکوسکی (۱۸۹۵-۱۹۷۶)، کهکشان غیرعادی و کم‌نوری را در مکان منبع رادیویی دجابه A پیدا کردند.



کهکشان رادیویی دجابه A

• در سال ۱۹۶۳، مارتین اشمیت اخترشناس هلندی (متولد ۱۹۲۹)، جرم ستاره‌مانندی در مکان منبع رادیویی ۲۷۳C، در ورای کهکشان کشف کرد که اولین اختروش بود.

• در سال ۱۹۶۸، تابش‌های رادیویی از جرمی عجیب به نام BL چلپاسه، که پیش از این تصور می‌شد متغیر است، دریافت شد. BL چلپاسه یک بلازار بود؛ اما تا مدت‌ها به جرم‌های مشابه آن گروه BL چلپاسه می‌گفتند.


• در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، بسیاری از اخترشناسان کوشیدند نشان بدهند چگونه انواع گوناگون کهکشان‌های فعال، با کهکشان‌های عادی، که سیاهچاله‌ی ابر پُر جرمی در مرکز خود دارند، توضیح داده می‌شوند. سرانجام، در سال‌های اخیر، مشخص شد زاویه‌ی دید ما عامل اصلی این گوناگونی است. وقتی فوران یا جت بیرون آمده از مرکز کهکشان در امتداد دید ما باشد، مرکز کهکشان مانند اختروش‌ها، بسیار درخشان می‌شود؛ در حالی‌که وقتی فوران زاویه‌ی زیادی با دید ما دارد، کهکشان فعال رادیویی پدیدار می‌شود.

میش‌تر بدانیم

- اخترشناسی رادیویی ۳۰
- اخترشناسی پرتو ایکس ۳۴
- سیاهچاله‌ها ۲۰۸
- قلب راه شیری ۲۲۴
- مقیاس کیهان ۲۳۸

مقیاس کیهان


بزرگی کیهان تصورناپذیر است. دورترین کهکشان‌ها آنقدر از ما دورند که حدود ۱۳ میلیارد سال طول می‌کشد نور آن‌ها به ما برسد؛ در حالی که نور آنقدر سریع حرکت می‌کند که در یک ثانیه، هفت بار دور کره‌ی زمین می‌گردد. حتی اخترشناسان نیز نمی‌توانند این فاصله‌های زیاد را محسوس کنند؛ اما می‌توانند کیهان را در مقیاس‌های گوناگون دسته‌بندی کنند. برخی از این مقیاس‌ها برای فاصله‌های سیاره‌ها (مانند واحد نجومی) و برخی برای ستاره‌ها و کهکشان‌ها (مانند سال نوری و پارسک) مناسب‌اند. معمولاً اخترشناسان برای اندازه‌گیری فاصله‌های دورتر، از سنجش دقیق فاصله‌ی جرم‌های نزدیک‌تر کمک می‌گیرند. هر اندازه‌گیری، پله‌ای از یک نردبان را می‌سازد که به فاصله‌های دورتر کیهان می‌رود.



آدمک

اولین نقشه‌ای که از قرارگیری کهکشان‌های ویرای ابرخوشه‌های محلی، تا فاصله‌ی ۷۵۰ میلیون سال نوری گرفته شد، شکلی شبیه به یک «آدمک» داشت. دست‌ها و پاها، آدمک رشته‌های بلندی از کهکشان‌ها بودند که فضای خالی میان آن‌ها، مناطق وسیع فضای تهی را تشکیل می‌دادند.

اندازه کیهان



کیهان در همسایگی ما

ابرخوشه‌های کهکشانی، به شکل رشته‌هایی که تا صدها میلیون سال نوری در فضا کشیده شده‌اند، به هم متصل‌اند. آن‌ها با فضاها، نسبتاً خالی (وُید یا تهی‌جا) که کهکشان‌های کمی در آن‌هاست، از هم جدا شده‌اند. این فضاها، خالی معمولاً ۱۰۰ میلیون سال نوری پهنا دارند و پهنای بزرگ‌ترین نمونه‌ی شناخته‌شده‌ی آن‌ها در سال ۲۰۰۷ به ۱ میلیارد سال نوری رسید.

ابرخوشه‌ی محلی

ابرخوشه‌ی محلی شامل تعدادی خوشه‌های کهکشانی کوچک‌تر است که گروه محلی ما یکی از آن‌ها، در لبه‌ی ابرخوشه است. خوشه‌ی کهکشانی بزرگ سنبله، در ۵۰ میلیون سال نوری از راه شیری، در مرکز قرار دارد.


جغرافیای کیهان

برای درک بزرگی کیهان، اخترشناسان نقشه‌هایی در مقیاس‌های گوناگون از کیهان می‌کشند؛ درست مانند جغرافی‌دانان، که نقشه‌هایشان از نقشه‌های خیابانی تا همه‌ی کره زمین را دربرمی‌گیرد. در این بخش، نقشه‌ی سه بُعدی از حیاط فضایی ما (منظومه‌ی شمسی) تا کهکشان‌هایی که فقط با تلسکوپ‌های بزرگ دیده می‌شوند، شروع می‌شود. اندازه‌ها بنا بر سال نوری داده شده است: یک سال نوری فاصله‌ای است که نور در یک سال طی می‌کند و برابر ۹/۵ میلیون میلیون (تریلیون) کیلومتر است.

روش چرخش کهکشان

با بررسی کهکشان‌های نزدیک و فاصله‌سنجی آن‌ها به کمک ستاره‌های قیفاووسی، اخترشناسان دریافته‌اند که درخشندگی کل کهکشان مارپیچی به سرعت چرخش آن بستگی دارد. این سرعت را از انتقال به سرخ و انتقال آبی نور کهکشان در هر لبه، می‌توان از راه طیف‌سنجی به دست آورد. می‌توان از کهکشان‌هایی که سرعت چرخش یکسانی دارند، برای محاسبه‌ی فاصله‌های تا بیش از یک میلیارد سال نوری استفاده کرد.


کهکشان مارپیچی چرخش





انتقال به آبی در لبه‌ای که به سمت ما می‌آید. انتقال به سرخ در لبه‌ای که از زمین دور می‌شود.

اندازه‌گیری فاصله

اخترشناسان برای اندازه‌گیری فاصله بین سیاره‌ها از رادار و برای فاصله‌ی ستاره‌ها از اختلاف منظر استفاده می‌کنند. هیچ‌کدام این دو روش برای فاصله‌های دورتر از راه شیری مناسب نیستند. بنابراین اخترشناسان نردبانی ساخته‌اند که به کمک آن فاصله‌ها را به دست بیاورند. فاصله‌ی کهکشان‌های نزدیک را با مقایسه ستاره‌هایی که شبیه برخی ستاره‌های درون راه شیری‌اند، به دست می‌آورند. سپس با کمک این کهکشان‌ها، به دنبال یافتن فاصله‌های کهکشان‌های دورتر می‌روند.




رشته‌های کهکشانی



شمع استاندارد قیفاووسی‌ها

اگر دو ستاره مقدار نور مشابهی تولید کنند، اما یکی کم‌نورتر باشد، نشان می‌دهد دورتر است. اخترشناسان از متغیرهای قیفاووسی برای اندازه‌گیری فاصله با این روش استفاده می‌کنند. زیرا در این گونه متغیرها، دوره‌ی تناوب با درخشندگی میانگین آن‌ها رابطه دارد؛ هرچه ستاره درخشان‌تر باشد، دوره‌ی تناوب آن طولانی‌تر است. اخترشناسان درخشندگی واقعی قیفاووسی‌ها را از دوره‌ی تناوب آن‌ها به دست می‌آورند و آن را با روشنایی ظاهری آن‌ها در آسمان مقایسه می‌کنند تا فاصله‌ی کهکشانی را که در آن قرار دارند، محاسبه کنند.




فاصله‌یابی به کمک ابرنواخترها

ابرنواختر، ستاره‌ی منفجر شده‌ای است که آن‌قدر پرنور می‌شود که اخترشناسان می‌توانند آن را در کهکشان‌هایی صدها میلیون سال نوری دورتر رصد کنند. اخترشناسان ابرنواخترها را بنا بر چگونگی درخشان شدن و سپس محو شدن آن‌ها (منحنی نوری)، دسته‌بندی می‌کنند. ابرنواخترهای نوع اول Ia، همواره به درخشندگی بیشینه‌ی ثابتی می‌رسند؛ بنابراین شمع‌های استاندارد مناسبی هستند. اما در یک کهکشان نمونه، در هر قرن فقط یک یا دو بار دیده می‌شوند.

کیهان رو به گسترش

• ارسطو در حدود سال ۳۶۰ پیش از میلاد، متوجه شد کیهان بسیار بزرگتر از زمین ماست؛ بنا بر رصدهای او، خورشید ۷ میلیون کیلومتر دورتر از زمین بود.



تصور قرون وسطانی از کیهان

• در سال ۱۶۱۹، یوهان کپلر ثابت کرد سیاره‌ها چگونه دور خورشید می‌گردند و نشان داد که زحل تقریباً ۱۰ بار دورتر از زمین است.

• در دهه‌ی ۱۷۸۰، ویلیام هرشل محاسبه کرد راه شیری حدود ۱۰ هزار سال نوری قطر دارد؛ اندازه‌ای که ویلیام هرشل به دست آورد از اندازه‌ای که یک‌دهم اندازه‌ی واقعی راه شیری (که حالا می‌دانیم) بود.

• در سال ۱۹۱۸، هارلو شیلیپ اعلام کرد راه شیری به قطر ۳۰۰ هزار سال نوری، همگی کیهان را در برمی‌گیرد.

• در سال ۱۹۲۳، ادوین هابل متوجه شد کهکشان مسلسل‌ها یا آندرومدا مجموعه‌ای جدا از راه شیری است و اکنون می‌دانیم ۲/۵ میلیون سال نوری از ما فاصله دارد. مسلسل‌ها نخستین جرمی بود که ثابت شد در ورای راه شیری است.

• در سال ۱۹۶۳، اخترشناسان اولین اختروش را به نام ۳C ۲۷۳، در فاصله‌ی ۲ میلیارد سال نوری کشف کردند.

• در سال ۱۹۹۵، تلسکوپ فضایی هابل کهکشان‌هایی را در فاصله‌ی بیش از ۱۰ میلیارد سال نوری از ما، به تصویر کشید.

• دورترین کهکشان‌ها و اختروش‌هایی که در سال‌های اخیر پیدا شدند، حدود ۱۳ میلیارد سال نوری از ما فاصله دارند.

بیش‌تر بدانیم



- منظومه‌ی شمسی ۹۴
- ستاره‌های متغیر ۱۸۴
- ستاره‌ها چه قدر دورند؟ ۱۸۶
- ابرنواخترها ۲۰۴
- گروه محلی ۲۲۸
- خوشه‌های کهکشانی ۲۳۴

انبساط کیهان


به اعماق کیهان بنگرید؛ چیزی عجیب و غیرعادی در حال رخ دادن است. در همه‌ی جهات، خوشه‌های کهکشان‌ها از ما دور می‌شوند و هر چه خوشه دورتر باشد، با سرعت بیش‌تری می‌گریزد. گویا کهکشان راه شیری ما چندان دوست‌داشتنی نیست! در حقیقت، هر جای کیهان که باشیم، همین پدیده رخ می‌دهد. یعنی هر کهکشانی از سایر کهکشان‌ها در حال دور شدن است؛ مانند کشمش‌های روی کیک کشمش‌ی در حال پختن که با پف کردن کیک، از هم دور می‌شوند. انبساط کیهان بسیار مورد استفاده‌ی اخترشناسان است: زمانی که شتاب یا آهنگ انبساط را برای کهکشان‌های نزدیک به دست آورند، با داشتن سرعت دور شدن کهکشان (از روی طیف آن)، فاصله‌ی آن را به کمک قانون هابل (سرعت دور شدن = ثابت هابل یا شتاب انبساط \times فاصله) محاسبه می‌کنند.

انبساط فضا

با آن‌که کیهان در حال انبساط است، درون محیط دیگری منبسط نمی‌شود. بلکه خود فضا بزرگ می‌شود و خوشه‌های کهکشانی را نیز با خود می‌برد. فضا را مانند یک بادکنک تصور کنید که خوشه‌های کهکشانی روی آن چسبیده‌اند. با باد شدن و بزرگ شدن بادکنک، آن‌ها نیز از هم دور می‌شوند. همه‌ی بخش‌های کیهان با سرعت ثابتی منبسط می‌شوند. بنابراین هرچه دو خوشه از هم دورتر باشند، فضای میان آن‌ها با سرعت بیش‌تری گسترش می‌یابد.




قانون هابل، ادوین هابل کشف کرد سرعت دور شدن کهکشان به فاصله‌ی آن بستگی دارد. خطوط تیره از موادی به‌وجود آمده‌اند که در کهکشان‌ها هستند و نور را جذب می‌کنند.



انتقال به سرخ در کهکشان‌ها

اخترشناسان با بررسی کردن خطوط تیره‌ی طیف کهکشان‌ها، سرعت آن‌ها را تخمین می‌زنند. مکان این خط‌ها به حرکت کهکشان بستگی دارد (اثر دوپلر). اگر کهکشان در حال دور شدن از ما باشد، خطوط به سمت طول موج‌های بلندتر و قرمزتر می‌روند (پدیده‌ی انتقال به سرخ). هرچه انتقال به سرخ بیش‌تر باشد، سرعت بیش‌تر است. کهکشان‌های دورتر، با سرعت بیش‌تری دور می‌شوند.



انبساط و گرانش

درست نیست که بگوییم همه چیز در کیهان در حال انبساط است. زمین بزرگ‌تر نمی‌شود؛ منظومه‌ی شمسی و کهکشان راه شیری هم همین‌طور. حتی اندازه‌ی خوشه‌های کهکشان نیز تغییر نمی‌کند؛ زیرا گرانش آن‌ها را در کنار هم نگه‌داشته است. فقط در فاصله‌های زیاد بین خوشه‌های کهکشانی، انبساط فضا بر نیروی جذب‌کننده‌ی گرانش غلبه می‌کند.

پی بردن به انبساط

• در سال ۱۹۱۷، وستو ملوین اسلیفر اخترشناس آمریکایی (۱۸۷۵-۱۹۶۹)، سرعت ۲۵ کهکشان یا به بیان آن دوره، سخابی، را محاسبه کرد. بیش‌تر آن‌ها با سرعت دور می‌شدند.

• در سال ۱۹۲۹، ادوین هابل مقدار انبساط کیهان را به‌دست آورد (ثابت هابل). اندازه‌ی محاسبه شده‌ی او ۵۰۰ کیلومتر بر ثانیه به ازای افزایش هر مگاپارسک (۳/۲۶ میلیون سال نوری) فاصله بود.



هابل در پشت تلسکوپ رصدخانهی مونت ویلسون

• در سال ۱۹۴۸، گروه بین‌المللی فرد هویل (۲۰۰۱-۱۹۱۵)، هرمان باندی (۲۰۰۵-۱۹۱۹) و تامی گولد (۲۰۰۴-۱۹۲۰) اعلام کردند ماده در فضای میان کهکشان‌های دور شونده به‌وجود می‌آید. این نظریه به نام حالت پایدار، با ازنهی نظریه‌ی مه‌بانگ در سال ۱۹۶۵ رد شد.

• والتر باده، اخترشناس آلمانی-آمریکایی (۱۹۶۰-۱۸۹۳) در سال ۱۹۵۲ ثابت هابل را دوباره اندازه گرفت. این‌بار ۲۲۵ کیلومتر بر ثانیه به ازای هر مگاپارسک به‌دست آمد.

• در سال ۱۹۶۳، مارتن اسمیت اخترشناس هلندی-آمریکایی (۱۹۲۹-) با استفاده از انتقال به سرخ، فاصله‌ی اختروش ۳۴۲۷۳ را به‌دست آورد.

• رصدهای تلسکوپ فضایی هابل در سال ۱۹۹۸، عدد ثابت هابل را به ۷۳ کیلومتر بر ثانیه به ازای هر مگاپارسک تغییر داد.

بیش‌تر بدانیم

طرح‌های جدید و بزرگ‌ترین رصدخانه‌های


جهان ۲۲

تحلیل نور ۲۴


اندازه‌های ستاره‌ها ۱۸۲

کهکشان‌های فعال ۲۳۶

مقیاس کیهان ۲۳۸




امروز هر مربع در این چارچوب فرمی فضا، ۱۰۰ میلیون سال نوری قطر دارد که با گذشت هر سال، ۰/۰۱ سال نوری بزرگ‌تر می‌شود.



اندازه‌گیری انتقال به سرخ

بسیاری از کهکشان‌ها آن‌قدر کم‌نورند که به سختی حتی می‌توان آن‌ها را دید و سخت‌تر از آن، گرفتن طیف نور و تجزیه‌ی نور آن‌ها به شکلی است که بتوان انتقال به سرخ و در نتیجه فاصله‌ی آن‌ها را به‌دست آورد. به همین سبب، تلسکوپ‌های بسیار بزرگی ساخته می‌شوند تا حداکثر میزان نور را جمع‌آوری کنند. اخترشناسان طیف‌سنج‌های الکترونیک بسیار دقیقی طراحی کرده‌اند که هم‌زمان، انتقال به سرخ بسیاری از کهکشان‌ها را به‌دست آورد.

طیف‌سنج ۲DF، روی تلسکوپ آنگلو-استرالیای، برای گرفتن طیف صدها کهکشان در یک زمان طراحی شده است.



کشف اختروش‌ها

در دهه‌ی ۱۹۵۰، اخترشناسان جرم‌های ستاره‌مانندی را، که تابش رادیویی شدیدی داشتند، کشف کردند. در طیف این جرم‌ها، خطوط ناآشنایی دیده می‌شد. سرانجام، آنان متوجه شدند خطوط طیف یکی از درخشان‌ترین این جرم‌ها، ۳۴۲۷۳، همان خطوط حاصل از اتم‌های هیدروژن است که ۱۶ درصد به سرخ انتقال یافته‌اند. با استفاده از قانون هابل، انتقال به سرخ نشان داد ۳۴۲۷۳ باید در فاصله‌ی ۲ میلیارد سال نوری از ما باشد؛ در فاصله‌ای که به نظر می‌رسید این جرم درخشان‌تر از هر کهکشانی باشد. اکنون می‌دانیم این جرم‌های شبیه به ستاره (اختروش)، هسته‌ی کهکشانی بسیار فعال‌اند.

مهبانگ

مهبانگ یا انفجار بزرگ، فرضیه ایست در چگونگی ظهور بخش مادی عالم هستی یعنی کیهان؛ آغاز همه چیز آن: زمان، فضا و بلوک‌های سازنده‌ی ماده در کیهان. ساعت بزرگ کیهانی، حدود ۱۳/۷ میلیارد سال پیش در توپ آتشین بی‌اندازه متراکمی، که در آن ماده و پادماده خودبه‌خود از انرژی ساخته شد، شروع به تیک‌تاک کرد. در لحظه‌ی خلقت، این جهان بی‌نهایت داغ و چگال بود. سپس شروع به انبساط و سرد شدن کرد و اکنون نیز در حال انبساط و سرد شدن است.

زودترین زمان ممکن برای مهبانگ: ۱۵ میلیارد سال پیش

محتل‌ترین زمان برای مهبانگ: ۱۳/۷ میلیارد سال پیش

دیرترین زمان ممکن برای مهبانگ: ۱۱ میلیارد سال پیش

کیهان بسیار داغ و جوان

کهکشان‌های جوان بسیار فشرده کنار هم‌اند

گرانش، خوشه‌های کهکشانی را کنار هم نگه می‌دارد.

کیهان امروز

عقب بردن انبساط

کیهان در حال انبساط است، بنابراین، نشانی است بر این‌که در گذشته، همه چیز به هم نزدیک‌تر بود. اگر حرکت کهکشان‌هایی که امروز می‌بینیم، برعکس شود، در زمانی حدود ۱۳ میلیارد سال پیش به تک‌نقطه‌ای می‌رسد. آن‌جا مبدأ انبساط است که مهبانگ نام دارد. محل این نقطه کجای کیهان است؟ همه‌جا! زیرا زمانی همه‌ی کیهان بوده است.

کیهان، با نیرویی بسیار قوی، ناگهان شروع به انبساط می‌کند. اندازه‌ی کیهان هر ۱۰ کوادریلیون کویتیلیونیم ثانیه (۱۰^{-۳۳} ثانیه) دو برابر می‌شود.

لحظه‌ای پس از خلقت، این جهان بی‌نهایت داغ بود و با سرعت کمی منبسط می‌شد.

گذشت زمان

مهبانگ

پیش از مهبانگ

پیش از مهبانگ قابل تصور نیست؛ زیرا زمان وجود نداشته است. فضا و زمان همیشه به‌طور مستقیم، به شکل آنچه آلبرت اینشتین آن را پیوستار فضا-زمان نامید، به هم مرتبط بوده‌اند. هنگامی که زمان متولد شد، فضا نیز شروع به انبساط کرد. همین‌طور هنگامی که فضا خلق شد، زمان جریان یافت.

فضا-زمان بدون آشفته‌گی، در تصویری خیالی از بیرون کیهان، این گونه است.

قلمه‌ها نشان‌دهنده آشفته‌گی فضا-زمان‌اند

فضا-زمان آشفته، قلمه‌هایی دارد که ممکن است هریک به یک مهبانگ تبدیل شود و جهانی مانند این جهان به‌وجود آورد.


تورم

بسیاری از اخترشناسان بر این باورند که مهبانگ همه‌ی ماجرای خلقت نیست. وضعیت موجود در عالم اولیه، انرژی را مستقیماً به مقادیر مساوی ماده و پادماده تبدیل کرد. لحظاتی بعد، رخداد شگرف‌تری به وقوع پیوست: تورم کیهانی. عالم منبسط شد و اندازه‌ی آن در کسری از ثانیه، صدها تریلیون کویتیلیون کویتیلیون (بیش از ۱۰^{۵۰}) بار بزرگ شد. تورم مقادیر بسیار زیاد انرژی آزاد کرد که ماده‌ی بیش‌تری تولید کرد و نیروهایی را ساخت که اکنون عالم ما را کنترل می‌کنند.

ماده و پادماده، ذراتی با جرم برابرند که ویژگی‌های دیگرشان، مثل بار الکتریکی، مساوی اما مخالف هم است.

نیروی تورم مانند پادگرانش عمل و همه چیز را از هم دور می‌کند.

دما به سرعت کاهش یافت و منافصله پس از تورم و پیش از افزایش مجدد، در زمان کوتاهی به صفر مطلق رسید.



نیروهای بنیادی

چهار نیروی اصلی کیهان امروز را در دست دارند. قلمرو نیروی الکترومغناطیس خواص مغناطیسی و الکتریکی است؛ نیروی هسته‌ای ضعیف همان چیزی است که بر فرآیند هم‌جوشی هسته‌ای درون ستاره‌ها حکم‌فرماست؛ نیروی هسته‌ای قوی چسب قدرت‌مندی است که اجزای هسته‌ی اتم را نگه می‌دارد و گرانش همان نیرویی است که سیاره‌ها و ستاره‌ها را در مدار حرکت خود حفظ می‌کند. در ابتدای آفرینش، این چهار نیرو یکی بودند. اما با انبساط کیهان و سرد شدن آن، جدا شدند و سبب رها شدن انرژی عظیمی گردیدند که تورم را پدید آورد.

ذرات مجازی

برزی حاصل از مهبانگ، جفت‌های ذرات مجازی، یکی ماده و دیگری پادماده را به وجود آورد. آن‌ها بلافاصله هم‌دیگر را از بین می‌بردند.

ماده و پادماده، خود به خود، به‌وجود آمدند و هم‌دیگر را نابود کردند.

جفت ذرات مجازی دو دسته بودند: کوارک‌های سنگین (قرمز) و لپتون‌های سبک (سبز).

فوتون‌ها ذراتی هستند که نور و نیروی الکترومغناطیس را حمل می‌کنند.

مقیاس تورم

در کسری از ثانیه، کیهان از اندازه‌ای کوچک‌تر از یک اتم به بزرگ‌تر از یک کهکشان گسترش یافت.

رد ذرات

امروزه در فیزیک ذرات ریز اتمی، مانند آن‌هایی که در وضعیت داغ، چگال و پرتکاپوی عالم اولیه شکل گرفتند، در شتاب‌گرهای بزرگ ذرات ایجاد و بررسی می‌شوند.

جدا شدن نیروهای ضعیف و الکترومغناطیس در پایان تورم، به ذرات و پادذرات، انرژی لازم را برای جدا شدن و دوری از نابود شدن داد.

نظریه مهبانگ

• در سال ۱۹۲۹، ادوین هابل دریافت کیهان در حال انبساط است.


• در سال ۱۹۳۱، ژرژ لومتر اعلام کرد کیهان از انفجار یک «اتم آغازین» به‌وجود آمده است.

• در سال ۱۹۴۸، ژرژ گاموف شکل جدیدی از نظریه اتم آغازین را منتشر کرد (مهبانگ).

• در سال ۱۹۷۹، آلن گات با بررسی منشأ نیروهای بنیادی، نظریه تورم را مطرح کرد.

بیش‌تر بدانیم

انبساط کیهان ۲۴۰
نخستین سه دقیقه ۲۴۴
پژواک مهبانگ ۲۴۶



نخستین ۳ دقیقه

ماده‌ی تاریک

خوشه‌های بزرگ معمولاً هزاران کهکشان درخشان دارند. اما ماده‌ی تاریک و نامرئی، که پس از تورم به‌وجود آمد، از ماده‌ی مرئی مانند کهکشان‌ها، ستاره‌ها و گاز و غبار آن‌ها بسیار بیش‌تر است. یکی از نامزدهای ماهیت ماده‌ی تاریک ویسپ‌ها و نوترینوهای است که از سه دقیقه نخستین باقی ماندند.

عالم اولیه‌ی ما داغ و سوزان، پس از پایان تورم، گسترده‌ی وسیعی از ذرات ریز اتمی ساخته بود که احتمالاً به‌طور مساوی در دسته‌های ماده و پادماده قرار می‌گرفتند. زمانی که عالم منبسط و سرد می‌شد، ساختن، به جای ویرانی، آغاز شد. به مرور زمان، ذرات در دسته‌های بزرگ‌تر و پایدارتری جمع شدند و سوپ ضخیم ذرات، باریک‌تر شد. پس از پایان سومین دقیقه، این جهان مواد اولیه‌ی همه‌ی ماده‌ای را که امروز اطراف ماست، هسته‌ی سه عنصر آغازین هیدروژن، هلیوم و لیتیوم ساخته بود.

زمانی که ذرات و پادذرات هم‌دیگر را نابود می‌کردند، انرژی تابشی شدید آزاد شده جفت‌های ذره و پادذره جدید را می‌ساخت.



ذرات جدید، از جمله بوزون‌های X، بوزون‌های هیگز و ویسپ‌ها.


کوارک‌ها (قرمز) و لپتون‌ها (سبز) در طی تورم آزاد شده‌اند.

مراحل بلوغ

عالم اولیه ما پر بود از ذرات و پادذرات نامتعارف، برخی با طول عمرهای بسیار کوتاه. کوارک‌ها، لپتون‌ها و ویسپ‌ها، در دمایی حدود ۱۰ هزار ترلیون ترلیون (10^{12}) درجه‌ی سانتی‌گراد، با هم برخورد می‌کردند. در طول سه دقیقه، دما به کمتر از ۱ میلیارد درجه‌ی سانتی‌گراد کاهش یافت و این جهان به مکان آرام‌تری با ذرات کمتر و پایدارتری تبدیل شد.

بوزون‌های W و Z، گلون‌ها، فوتون‌ها و گراویتون‌ها، نیروها را بین ذرات حمل می‌کردند.

واپاشی بوزون X



در جست‌وجوی پادماده

کهکشان پادماده باید به‌جز در اطراف لبه‌ها، کاملاً مانند کهکشانی عادی باشد. در آن‌جا زمانی که پادماده و ماده‌ی عادی (مثلاً گاز رقیق میان کهکشانی) یکدیگر را ملاقات می‌کنند و از بین می‌برند، درخش‌های نورانی انرژی دیده می‌شود. اما تاکنون چنین پدیده‌ای با قطعیت در کیهان مشاهده نشده است.

پیروزی ماده

تورم، مقادیری مساوی از ماده و پادماده به‌وجود آورد. طبق یکی از نظریه‌های امروز، دلیل این‌که آن‌ها به‌طور کامل هم‌دیگر را از بین نبردند، مربوط به ذره‌ی بوزون X و پاد X است. این‌ها پُرچرم‌ترین ذرات بودند و فقط انرژی زیاد تورم می‌توانست آن‌ها را به‌وجود آورد. زمانی که عالم سرد شد، این دو ذره ناپایدار شدند و به کوارک‌ها و لپتون‌های سبک‌تر واپاشی کردند. اما به ازای هر ۱۰۰ میلیون کوارک و لپتون تولید شده، ۹۹,۹۹۹,۹۹۹ پادذره به‌وجود می‌آمد، یعنی در هر صدمیلیون فقط یک ذره ماده بیش‌تر از ذرات پادماده بود. این بی‌توازی کوچک، همه‌ی ماده‌ی کنونی عالم ما را تشکیل داده است.

پروتون‌ها و نوترون‌ها

هنگامی که کیهان سرد شد، گلوئون‌ها، کوارک‌ها را برای ساختن تعداد مساوی پروتون و نوترون در گروه‌های سه‌تایی جمع کردند. در پایان اولین ثانیه، برخی نوترون‌ها به پروتون تبدیل شدند و در همان زمان دما به ۹۰۰ میلیون درجه سانتی‌گراد کاهش یافت. در آن زمان، به ازای هر نوترون، ۷ پروتون بود. نوترون‌های باقی‌مانده در کنار پروتون‌ها قرار گرفتند و هسته‌ای اتم‌ها را ساختند. پس از ۳ دقیقه، هیچ نوترون آزادی وجود نداشت.

پروتون نوترون

کوارک‌ها بین پروتون‌ها و نوترون‌ها هستند.

پروتون‌های آزاد (هسته هیدروژن)

نوترون‌های اتم هلیوم

لپتون‌ها همچنان آزادانه حرکت می‌کنند.

فوتون‌ها نور را در جهان شفاف‌شده حمل می‌کنند.

ذرات بنیادی

بسیاری از ذرات ریز اتمی، که در کیهان اولیه بودند، دیگر وجود ندارند یا به ذرات دیگر تبدیل شده‌اند. مهم‌ترین ذرات آغازین، که مطابق فیزیک امروز به ذرات سازنده‌ی کوچک‌تری تبدیل نمی‌شوند، در زیر توضیح داده شده‌اند:

ریسمان کیهانی

رشته‌ی بسیار سنگینی از ماده با طول میلیون‌ها سال نوری که نظریه‌ها آن را پیش‌بینی کرده‌اند.

بوزون X: ذره‌ای بسیار سنگین و نقری است که هنوز مشاهده نشده است.



بوزون‌های هیگز: ذره‌ی بسیار سنگینی که فیزیکدان انگلیسی، پیتر هیگز، آن را کشف کرد.



ویپ: ذرات پُر جرم با برهم‌کنش ضعیف با محیط مادی اطراف که به‌منظر می‌رسد مادی تاریک کیهان را تشکیل داده باشد.



بوزون‌های W و Z: ذراتی مشابه فوتون‌ها، اما دارای جرم، که نیروی ضعیف را حمل می‌کنند.

کوارک: سازنده‌های پروتون‌ها و نوترون‌ها که ۶ گونه از آن‌ها کشف شده است.



لپتون: ذراتی تأثیرپذیر از نیروی ضعیف؛ الکترون‌ها سبک‌ترین نوع لپتون‌ها هستند.



نوترینو: ذرات بسیار کم‌جرم و بسیار فراوان که سه گونه از آن‌ها یافت شده است. آن‌ها از میان همه‌چیز به راحتی عبور می‌کنند.



گلوئون: انتقال‌دهنده‌های نیروی قوی که کوارک‌ها را در کنار هم نگه می‌دارد.



فوتون: ذرات بدون جرم (در حالت سکون) که تابش نور و الکترومغناطیس را حمل می‌کنند و متداول‌ترین ذرات هستند.



گراویتون: ذراتی نظری که تصور می‌شود نیروی گرانش را حمل می‌کنند.




بیش‌تر بدانیم

انبساط کیهان ۲۴۰
مهبانگ ۲۴۲
پژواک مهبانگ ۲۴۶
ماده‌ی تاریک ۲۵۰

به وجود آمدن هسته

در حدود یک ثانیه پس از مهبانگ، پروتون‌ها و نوترون‌ها به‌وجود آمدند و در ۳ دقیقه‌ی بعدی با هم ترکیب شدند تا هسته‌ی سبک‌ترین اتم‌ها، بیش‌تر هیدروژن و هلیوم را بسازند. هر عنصر تعداد مشخص و یگانه‌ای پروتون دارد؛ اما تعداد نوترون آن ممکن است تغییر کند و ایزوتوپ‌های گوناگون آن عنصر را بسازد. کیهان بسیار سریع به دما و چگالی کمتری از حد مورد نیاز هم‌جوشی هسته‌ای رسید و عنصر دیگری شکل نگرفت.



ترکیبات کیهان

محاسبات دقیق پیش‌بینی می‌کنند خاکسترهای مهبانگ عناصر ساخته شده در نخستین ۳ دقیقه، باید ۷۷ درصد هیدروژن، ۲۳ درصد هلیوم و ۰/۰۰۰۰۰۰۰۱ درصد لیتیوم باشد. بررسی ابرهای گازی، مانند سحابی عقاب، این نتایج را دربرداشتند.

پژواک مهبانگ

پس از نخستین ۳ دقیقه‌ی آشوبناک و به وجود آمدن اولین هسته‌ی اتم‌ها، عالم ما تا حدودی آرام شد. تا یک ربع قرن، مواد کیهان تغییر نکرد؛ اما با انبساط این عالم، به شدت کم‌تراکم شد. بیش‌تر انرژی به شکل تابش بود؛ اما کیهان اولیه مه‌آلود بود و نور نمی‌توانست پیش از جهش از چیزی، مسافتی طولانی طی کند؛ زیرا بلافاصله جذب ذره‌ای در فضا می‌شد. سپس مه ناگهان ناپدید و فضا شفاف شد. پژواک‌های این رخداد به شکل تابش زمینه‌ی کیهان، آسمان را فراگرفت.



پنزیاس، ویلسون و آنتن آن‌ها

پس تابش
در سال ۱۹۶۵، دو فیزیک‌دان به نام‌های آرنو پنزیاس و رابرت ویلسون، امواج رادیویی ضعیفی را، که از همه جای آسمان می‌رسید، کشف کردند. پس تابش بر بر تابش جسمی در دمای ۲۷۰- درجه‌ی سانتی‌گراد (۳) درجه بالاتر از صفر مطلق یا ۳ کلوین) بود. تنها توضیح برای چنین تابشی کم‌انرژی اما سراسری، گرمای مرده و بازمانده از مهبانگ است که بر اثر انبساط جهان طی بیش از ۱۳ میلیارد سال سرد شده است. این تابش در همه‌ی جهات آسمان و در هر نقطه‌ای از کیهان به همین گونه دریافت می‌شود. ریزا در دوران کیهان کوچک اولیه نیز همه‌جا وجود داشته است.

تفاوت‌های جزئی دما، که احتمالاً توده‌های ماده‌ی تاریک آن‌ها را به وجود آورده است، در تابش زمینه دیده می‌شود.

ماده‌ی تاریک در عالم، با برهم‌کنش ضعیف، تحت تأثیر تابش‌های کیهانی قرار نگرفت و با نیروی گرانش خود شروع به انباشته شدن یا به اصطلاح پرافضایش کرد.

در سه دقیقه، ماده، مخلوطی از هسته‌های اتمی، الکترون‌ها و ذرات ماده‌ی تاریک بود.

زمان

با سرد شدن عالم، لپتون‌های سنگین‌تر به الکترون‌ها تبدیل شدند. کمی پس از آن ماده‌ی معمولی شامل هسته‌های اتمی و الکترون‌ها ساخته شدند.

فوتون‌ها فاصله‌های کوتاهی را بین برخوردها طی می‌کنند.

الکترون‌ها

هسته‌های هیدروژن

هسته‌های هلیوم

پراکنده شدن فوتون‌ها

در عالم اولیه، فوتون‌های نور، پیوسته با هسته‌های اتمی و الکترون‌ها واکنش می‌دادند. در نتیجه، نمی‌توانستند به جایی بروند. فوتون‌ها از یک ذره می‌جهیدند و بلافاصله با ذره‌ی بعدی برخورد می‌کردند و ... نور نمی‌توانست به خط مستقیم سیر کند به همین دلیل، عالم میره و کدر بود

(آخرین سطح پراکندگی): این شکاف، ۳۰۰ هزار سال پیش از مهبانگ به وجود آمد که بخش کدر را از بخش شفاف عالم جدا می‌کند. تابش گرمایی، که تابش زمینه‌ی کیهانی را تشکیل داده است، از این (سطح) می‌آید

عالم در حال سرد شدن

پس از سه دقیقه، فوتون‌ها و تابش پراانرژی گاما، کیهان را فراگرفته بود. عالم ما در حالی که منبسط و سرد می‌شد، انرژی تابشی از دست می‌رفت و تابش گاما به پرتو ایکس، مرئی و پس از آن نیز به امواج گرمایی تبدیل می‌شد. کاهش دما بر ذرات نیز اثر گذاشت و سرعت الکترون‌ها را آنقدر کاهش داد که با هسته‌های اتمی ترکیب شدند و اولین اتم‌ها را ساختند. این اتم‌ها با نور، برهم‌کنش زیادی نداشتند. در نتیجه، برای نور کیهان‌گذرپذیر شدند و سرانجام نور توانست در خط مستقیم، مسافت‌هایی طولانی طی کند و بین‌گونه عالم شفاف شد

افت وخیز تابش زمینه‌ی کیهان

ابتدا به نظر می‌رسید تابش زمینه یک‌دست باشد؛ اما در سال ۱۹۹۲، ماهواره‌ی جست‌و‌جوگر زمینه‌ی کیهان (کوبی COBE) نوسان‌هایی در آن مشاهده کرد؛ مناطقی که کمی گرم‌تر یا سردتر از میانگین بودند. مناطق آبی در نقشه‌ی سرسری کوبی، مناطق سردترند که نور تلاش می‌کند از گراش قوی فرار کند و در نتیجه دچار افت انرژی بیشتری می‌شود. این مناطق تجمع یا کلوخه‌ی ماده‌ی تاریک را نشان می‌دهد که بذر شکل‌گیری نخستین کهکشان‌ها را می‌افشانند.

کلوخه‌های ماده‌ی تاریک، ابرهای گازی هیدروژن و هلیوم را در اطراف خود جمع می‌کنند تا کهکشان‌ها به‌وجود آیند.

نقشه تابش پس‌زمینه‌ی کوبی

ثبت پرواک‌های مه‌بانگ


• والتر آدافر (۱۹۵۶-۱۸۷۶)، که در رصدخانه‌ی مونت ویلسون کار می‌کرد، در سال ۱۹۳۸ کشف کرد ملکول‌های درون یک ستاره با تابشی خارجی در دمای ۲/۳ درجه بالای صفر مطلق، تحریک می‌شوند؛ در آن زمان، هیچ‌کس به اهمیت این کشف پی نبرد.

• در سال ۱۹۴۸، رالف آلفر (۱۹۲۱-۲۰۰۷) و رابرت هرمان (۱۹۱۴-۱۹۹۷)، تابشی بازمانده از مه‌بانگ را در دمای ۵ درجه بالای صفر مطلق پیش‌بینی کردند.

• رابرت دیک (۱۹۱۶-۱۹۹۷)، در سال ۱۹۶۴، دریافت کننده‌ای برای ردیابی تابش زمینه، ساخت.

• پنزیاس و ویلسون در سال ۱۹۶۵ تابش زمینه را به‌طور تصادفی کشف کردند. آن‌ها کشف خود را در مقاله‌ای با توضیح منشأ تابش منتشر کردند.

• در سال ۱۹۷۷، هواپیمایی از ناسا متوجه شد تابش زمینه در نیمی از آسمان، در نتیجه‌ی پدیده‌ی دوپلر بر اثر حرکت زمین در کیهان، داغ‌تر از نیم دیگر است.



ماهواره‌ی کوبی

• در سال ۱۹۹۲، ماهواره‌ی کوبی نوسان‌هایی در تابش زمینه‌ی کیهانی کشف کرد که از افت و خیزهای دما و تراکم جرم در کیهان اولیه نشان داشت.

• در سال ۲۰۰۹ فضایی‌های سازمان فضایی اروپا به نام پلانک به فاصله‌ی ۱/۵ میلیون کیلومتری زمین پرتاب شد تا از آن‌جا نوسان‌های تابش زمینه‌ی کیهانی را بارها دقیق‌تر از کوبی ثبت کند.

بیش‌تر بدانیم

اخترشناسی رادیویی ۳۰ مه‌بانگ ۲۴۲ نخستین سه دقیقه ۲۴۴ شکل‌گیری کهکشان‌ها ۲۴۸

تابش منتشر شده از (آخرین سطح پراکندگی) با انبساط عالم، به سرد شدن ادامه می‌دهد و امواج نور و گرما به مرور به امواج رادیویی تبدیل می‌شوند.


فوتون‌ها مسافت‌های بیشتری را طی می‌کنند، برخورد‌ها کمتر است.

اتم هلیوم

اتم‌های هیدروژن

شکل‌گیری اتم‌ها

حدود ۳۰۰ سال پس از مه‌بانگ، دما به ۳ هزار درجه‌ی سانتی‌گراد کاهش یافت. اکنون الکترون‌های منفی‌القدر آرام شده‌اند که در مدارهایی اطراف هسته‌های مثبت هیدروژن و هلیوم قرار می‌گیرند و نخستین اتم‌ها را به‌وجود می‌آورند.



شکل‌گیری کهکشان‌ها

مکان میدان ژرف هابل



میدان ژرف هابل بخش کوچکی از آسمان را، به اندازه‌ی پهنای سر سوزنی که با بازوان کشیده به سمت آسمان گرفته شود، می‌پوشاند. این مکان بالای ستاره‌های مللکی دب‌اکبر بود.

کهکشان نامنظم کوچکی، به سبب فاصلهی کم (۱ میلیارد سال نوری) از ما، در مقایسه با دیگر کهکشان‌های تصویری بزرگ به‌نظر می‌رسد.

در فاصلهی ۸ میلیارد سال نوری، کهکشان‌های کوچک ادغام می‌شوند و کهکشان بزرگ‌تری به‌وجود می‌آورند.

کهکشانی جوان، ۱۰ میلیارد سال نوری دورتر

رشته

تصویر میدان ژرف هابل حدود ۳ هزار کهکشان را نشان می‌دهد که بسیاری از آن‌ها آن‌قدر کم‌نورند که در این نسخه از تصویر و بدون پردازش دقیق رابانه‌ای دیده نمی‌شوند.

فضای تهی

۳ پس از ۳۰۰ میلیون سال، کیهان از فضاهای خالی عظیمی تشکیل شده بود که رشته‌هایی از گاز چگال‌تر اطراف آن را فرا گرفته بودند. زمانی که گاز به شکل کهکشان‌ها درمی‌آمد، اولین نسل ستاره‌ها شروع به درخشیدن کردند.

۲ ۳۰ میلیون سال بعد، گرانش ماده‌ی تاریک، گازها را در شبکه‌ای رشته‌شده قرار داد.

نقاط پراکندگی گاز را نشان می‌دهند.

نمای نزدیک از نقشه تابش زمینه کوبی

۱ گاز ۳۰۰ هزار سال پس از مه‌بانگ، به درخشانی نور تولید می‌کند و نواحی داغ‌تر (صورتی) و سردتر (آبی) را به‌وجود می‌آورد. پس از آن کیهان تاریک می‌شود.

در جهان کنونی، ماده به صورت کهکشان‌ها جمع شده است؛ اما مه‌بانگ فقط مهی از گاز را در کیهان پخش کرده بود. یکی از اسرار بزرگ نجوم این است که این گاز چگونه دور هم جمع و متراکم شده و کهکشان‌ها را شکل داده است. آیا هر کهکشان یک‌باره و جداگانه ساخته شده است یا در ابتدا، تجمع‌ها یا کلوخه‌های کوچک ماده بوده‌اند و کم‌کم بزرگ شده‌اند؟ چرا برخی کهکشان‌ها مارپیچی‌های زیبایی با انبوهی از گازند، در حالی که برخی دیگر بیضوی‌هایی هستند که همه‌ی گاز خود را به ستاره تبدیل کرده‌اند؟ چرا کهکشان‌ها در رشته‌های عظیمی با نواحی تهی در میان خود قرار گرفته‌اند؟ اخترشناسان امروز به دنبال پاسخ این پرسش‌ها هستند.

میدان ژرف هابل

این تصویر تلسکوپ فضایی هابل، که در سال ۱۹۹۵ گرفته شد، نخستین نگاه بسیار عمیق به کهکشان‌هایی بود که تازه شکل گرفته و اولین ستاره‌هایشان شروع به درخشیدن کرده بودند. نور برخی از آن‌ها، تا به ما برسد، بیش از ۱۰ میلیارد سال در راه بود. به این ترتیب، تصویر آن‌ها دوران خردسالی کیهان را نشان می‌دهد؛ یعنی زمانی که دوران تاریک (۳۰۰ هزار سال نخست پس از مه‌بانگ) تازه به پایان رسیده و اولین ستاره‌ها متولد شده‌اند. اخترشناسان از هابل به جای یک ماشین زمان استفاده می‌کنند؛ زیرا نورهای باستانی کیهان را آشکار می‌کند. کهکشان‌هایی که تلسکوپ هابل آن‌ها را ثبت کرده، به گونه‌ای می‌بینیم که میلیارد‌ها سال پیش بوده‌اند؛ یعنی فقط مدتی پس از مه‌بانگ. برای ثبت چنین جرم‌های کم‌نوری، هابل از یک نقطه‌ی آسمان (به قطر فقط ۲/۵ دقیقه قوس) طی ۱۰ روز حدود ۱۵۰ بار نور جمع‌آوری کرد. در سال ۱۹۹۸ تصویر میدان ژرف جنوبی هابل از نقطه‌ای در صورت فلکی توکان تهیه شد و بین سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ از ترکیب ده‌ها تصویر عمیق از منطقه‌ای در صورت فلکی کوره، تصویر فزاینده هابل به‌دست آمد که ۱۰ هزار کهکشان را ثبت کرده است.

عصر تاریک این جهان

کیهان ۳۰۰ هزار سال پس از مه‌بانگ، شفاف شد. نور بسیار زیاد انفجار به فروسرخ و پس از آن نیز به امواج رادیویی تابش زمینه تبدیل شد. ماده‌ای که بر جای ماند، سرد و تاریک بود، قادر به جمع کردن نور نبود و عالم ما تا زمانی که اولین ستاره‌ها شروع به درخشیدن کردند، دوره‌ی طولانی تاریکی را سپری کرد. طی این دوره‌ی کم‌نور، توده‌های ماده‌ی تاریک، که پیش از این شکل گرفته بودند، گازهای اطراف را جمع کردند و شرایط لازم را برای شکل‌گیری کهکشان‌ها به‌وجود آوردند.

نخستین ستاره‌ها

نخستین ستاره‌ها کاملاً از گازهای دست اول هیدروژن و هلیوم بازمانده از مه‌بانگ ساخته شدند. این ستاره‌های غول، در طی زندگی کوتاه خود، عناصر دیگری مانند کربن و اکسیژن ساختند و آن‌ها را با انفجارهای ابرنواختری به فضا فرستادند تا نسل‌های بعدی ستاره‌ها و سیاره‌ها از آن‌ها شکل بگیرند. به‌جز هیدروژن، هلیوم و مقدار ناچیزی لیتیم، سایر عناصری را که اکنون در عالم ما وجود دارد، ستاره‌ها تولید کرده‌اند.

کهکشان مارپیچی، در ۵۰ میلیارد سال پیش، از برخورد و ادغام دو کهکشان کوچک‌تر شکل گرفته است

احتمالاً ماده‌ی تاریک با کنار هم قرار دادن هزاران ابرگازی کوچک، راه شیری را به وجود آورده است. این ماده امروز باید در هاله‌ی کهکشان باشد

نخستین ستاره‌ها در مناطق چگال گاز، جایی که ابرها با هم برخورد کرده بودند، به‌وجود آمدند.

خوشه‌های کروی و ستاره‌های نزدیک به مرکز کهکشان، از این رمان آمده‌اند.

نظریه‌های منشأ کهکشان

• در سال ۱۹۶۶، جیم پپل (۱۹۳۵ -) فیزیکدان آمریکایی، نظریه‌ی پایین به بالا را ارائه کرد. در این نظریه، کهکشان‌ها از ابرهای کوچک به‌وجود می‌آیند.

• در سال ۱۹۶۹، یاکوف زلدوویچ (۱۹۱۴ - ۱۹۸۷) فیزیکدان روس، نظریه‌ی بالا به پایین را اعلام کرد. گاز اولیه و اصلی ابرهای تخت عظیمی به‌وجود آورد که به شکل کهکشان‌ها تکه‌تکه شدند.

• کشف رشته‌های عظیم کهکشان‌ها در سال ۱۹۸۱، شاهی بر نظریه‌ی بالا به پایین بود.

• در سال ۱۹۹۵، تصویر ژرف هابل ادغام کهکشان‌های کوچک‌تر را نشان داد که شاهی بر نظریه‌ی پایین به بالا بود.

بیش‌تر بدانیم

تلسکوپ فضایی هابل ۱۴، کهکشان‌های برخوردی ۲۳۲، کهکشان‌های فعال ۲۳۶
پژواک مه‌بانگ ۲۴۶، ماده‌ی تاریک ۲۵۰

۲ گاز چگال در مرکز کهکشان می‌رسد و سیاهچاله‌ی پرچرمی با قرصی درخشان از گاز در اطراف آن به‌وجود می‌آورد که یک اختروش است.

نمای نزدیک از قرص
برافزایشی اطراف سیاهچاله

۳ دو فوران یا جت از الکترون‌ها از دو طرف هسته‌ی اختروش بیرون می‌زنند و ابرهای نامرئی از گاز داغ به پهنای ۱ میلیون سال نوری، به‌وجود می‌آورند. این ابرها در امواج رادیویی و پرتو ایکس نمایان می‌شوند.

راه شیری در امروز

ستاره‌های پیر

سیاهچاله درون
هسته اکنون آرام است.

ستاره‌های جوان و گاز

تولد یک کهکشان

تصویر ژرف هابل نشان می‌دهد بسیاری از کهکشان‌ها از ادغام ابرهای گاز به‌وجود می‌آیند. اگر گازها دور هم می‌گردند، کهکشان حاصل، مارپیچی چرخانی با مقداری گاز است که از ابر پیش‌کهکشان اولیه باقی مانده است. بنا بر یکی از نظریه‌های پیش‌رو، اگر ابرها چرخش نداشته باشند، همه‌ی گاز به ستاره تبدیل می‌شود و تویی ستاره‌ای بدون گاز یا کهکشانی بیضوی به‌وجود می‌آید. سایر بیضوی‌ها از برخورد دو کهکشان در سرعت‌های بالا فوران ستاره‌سازی و مصرف گازهای میان‌ستاره‌ای به‌وجود می‌آیند.

تکامل ادامه می‌یابد

تکامل کهکشان‌ها، با ادغام کهکشان‌های کوچک و به‌وجود آمدن کهکشانی بزرگ‌تر، امروز سیر ادامه دارد. معمولاً کهکشانی بزرگ، کهکشانی کوچک‌تر را جذب می‌کند. کهکشان رادیویی بیضوی غول‌پیکر قنطورس A به تازگی (البته در مقیاس زمان کیهانی) یک کهکشان مارپیچی را بلعیده است.

نوار تاریک از گاز و غبار در قنطورس A، بازمانده از کهکشان مارپیچی است که با آن ادغام شده است.

کهکشان مارپیچی شبیه راه شیری، اما ۶ میلیارد سال نوری دورتر.

ستاره‌ها در پیش‌زمینه و متعلق به راه شیری‌اند.


ماده‌ی تاریک

جرم‌هایی که در کیهان می‌بینیم، سیاره‌ها، ستاره‌ها، ابرهای گازی و کهکشان‌ها، فقط کسر کوچکی (حدود ۵ درصد) از تمام ماده و انرژی کیهان را به وجود می‌آورند. بیش از ۲۰ برابر آن‌ها به صورت ماده‌ی نامرئی یا ماده‌ی تاریک و پدیده‌ای به نام انرژی تاریک است که حتی با بزرگ‌ترین تلسکوپ‌ها نیز هیچ تابشی از آن‌ها دیده نمی‌شوند. گرانش ماده‌ی تاریک بر ستاره‌ها، کهکشان‌ها و امواج نوری که در کیهان سفر می‌کنند، تأثیر می‌گذارد. اخترشناسان اکنون می‌دانند که ماده‌ی تاریک وجود دارد. در حقیقت، انواع گوناگونی از آن، از ستاره‌های کوچک تا ذرات ریز اتمی، وجود دارد. اما ماهیت انرژی تاریک مبهم‌تر است و حتی برخی آن‌را به سبب اشتباه در نظریه‌ها و محاسبات می‌دانند.

سراب‌های کیهانی

قوس‌های روشنی که در این تصویر هابل دیده می‌شود، مانند رشته‌های تار عنکبوت کیهانی، شاهدهی قوی بر وجود ماده‌ی تاریک است. خوشه‌ی ایبل ۲۲۱۸، خوشه‌ای کهکشان‌ی در فاصله‌ی ۳ میلیارد سال نوری است که با نیروی گرانش خود مانند عدسی برای پرتوهای رسیده از دورتر عمل می‌کند. گرانش این ماده، مطابق نسبیت عام اینشتین، نور کهکشان‌های دور دست را منحرف می‌کند و کماتی از نور از آن‌ها می‌سازد که به آن سراب کیهانی می‌گویند. گرانشی که چنین تأثیری بر نور می‌گذارد، ۱۰ بار بیش‌تر از چیزی است که کهکشان‌های مرئی موجود در تصویر تولید می‌کنند. پس ۹۰ درصد از جرم این خوشه، از ماده‌ای نامرئی یا تاریک است.


مناطق قرمز از ما دور می‌شوند.
تابش رادیویی از هیدروژن



کهکشان‌های چرخان

چرخش سریع کهکشان‌های مارپیچی نشان می‌دهد هاله‌ی وسیعی از ماده‌ی تاریک، آن‌ها را دربر گرفته است. اگر این ماده‌ی تاریک نبود، جرم‌های خارجی کهکشان، که با سرعتی حدود ۲۰۰ کیلومتر بر ثانیه می‌گردند، به فضا پرتاب می‌شدند.


خوشه کهکشان‌ی ۱۶۵۴ + ۲۴ Cl



مناطق آبی به ما نزدیک می‌شوند.
کهکشان مارپیچی MA۱


کهکشان‌های پرسرعت

نخستین مدرک مبنی بر وجود ماده‌ی تاریک از خوشه‌های کهکشان‌ی به دست آمد. در دهه ۱۹۳۰، ویس زویبکی، متوجه شد کهکشان‌ها در خوشه‌های خود آن‌قدر با سرعت حرکت می‌کنند که باید خوشه از هم بپاشد؛ گرانش ماده‌ای که دیده نمی‌شود احتمالاً آن‌ها را کنار هم نگه می‌دارد. پس از آن، اخترشناسان در پرتو یکس گازهای دائمی در خوشه‌ها یافتند که آن‌ها نیز تحت تأثیر نیروی قوی گرانش ماده‌ی نامرئی بودند.



پرنورترین کهکشان خوشه‌ی ایبل ۲۲۱۸ (خوشه‌ای که در نقش عدسی است) ۳ میلیارد سال نوری از ما فاصله دارد.

تصویر کهکشان‌ی در فاصله‌ی ۱۰ میلیارد سال نوری که با عدسی گرانشی درخشان و البته آشفته شده است.



ماچوها

ممکن است ماده‌ی معمولی به صورت جرم‌های کوچکی (اندازه‌ی سیاره)، که نامرئی‌اند، مانند کوتوله‌های قهوه‌ای (ستاره‌های نازک) یا سیاه‌چاله‌ها، برآمده باشد. تصور می‌شود بیش‌تر این جرم‌ها در هاله‌ای اطراف کهکشان‌ها جمع شده‌اند. نام این جرم‌ها ماچو یا جرم‌های پُر جرم و فشرده‌ی هاله است. اخترشناسان با ثبت اثر عدسی گرانشی این جرم‌ها بر نور ستاره‌های کهکشان همسایه‌ی ما، ابر بزرگ ماژلان بزرگ، تعدادی از ماچوها را یافته‌اند اما نتیجه‌ی کلی نشان می‌دهد آن‌ها نمی‌توانند درصد قابل توجهی از ماده‌ی تاریک کهکشان‌ی باشند.

نوری که به زمین می‌رسد کانونی و پرنورتر می‌شود.

تلسکوپ در زمین

انرژی تاریک و ماهیت ماده‌ی تاریک

اخترشناسان می‌توانند بر اساس نظریه‌ی مه‌بانگ و پیش‌بینی‌های ریاضی آن، فاصله‌ی سنجیده شده‌ی کهکشان‌های دور را با سن کیهان مقایسه کنند و آهنگ یا شتاب انبساط کیهان را دریابند. این شتاب به ما می‌گوید که ماده یا اثر گرانشی کل کیهان چه قدر بوده است که با تأثیر کاهنده‌ی خود بر انبساط سبب شتاب امروزی شده است. بر اساس این روش سرعت کهکشان‌های دور چنان زیاد است که ۷۰ درصد از کل اثر گرانش عالم ما به صورت ماده یا پدیده‌ای با نیروی ضد گرانش است که در مقیاس‌های بزرگ همه چیز را به شدت از هم می‌گریزند. به این پدیده، که ماهیت ناشناخته‌ای دارد، انرژی تاریک می‌گویند. از ۳۰ درصد باقی‌مانده، ۲۵ درصد (بیش از ۸۰ درصد از آن) ماده‌ی تاریک و احتمالاً بیش‌تر به صورت درت اتمی نامرئی مانند ویس است و درصد جزئی نیز شامل ماچوها می‌شود. از ۵ درصد باقی‌مانده، ۴ درصد گاز هیدروژن و هلیوم میان‌ستاره‌ای و میان‌کهکشان‌ی است (یعنی ۸۰ درصد ماده‌ی عادی) و فقط ۰/۵ درصد از جرم کیهان را ستاره‌ها تشکیل می‌دهند. ۵/۵ درصد باقی‌مانده نیز نوترینوها و ذرات اتمی سنگین‌ترند.


عدسی گرانشی چگونه عمل می‌کند؟

نظریه‌ی نسبیت عام اینشتین پیش‌بینی کرده بود گرانش نور را در مسیر راست خود خم می‌کند. زمانی که نور کهکشان‌های دور دست در مسیر خود، به سمت زمین، از خوشه‌ای از کهکشان‌ها عبور می‌کند، گرانش خوشه‌ی نور را خم و کانونی می‌کند. اگر کهکشان دور دقیقاً در پشت خوشه قرار داشته باشد، نور آن به شکل دایره‌ای می‌شود که به آن حلقه‌ی اینشتین می‌گویند. معمولاً چون کهکشان دقیقاً در مرکز نیست، فقط بخش‌هایی از حلقه، مانند کمان‌هایی از دایره تشکیل می‌شوند.

دو پرتو نور کشیده شده
ار یک کهکشان در فاصله‌ی
۷ میلیارد سال نوری

کهکشان‌های خوشه‌ی ایبل ۲۲۱۸
با ۵۰ تریلیون برابر جرم خورشید.
ماده‌ی تاریک این خوشه ۱۰ بار
بیش از این جرم دارد

تصویر آشفته‌شده‌ی
کهکشان‌ها در فاصله‌ی
۸ میلیارد سال نوری
را نشان می‌دهند.
رنگ‌ها میزان درخشندگی



بدون ماده تاریک

کهکشان دور

خوشه‌ی کهکشان‌ها اثر کمی
بر نور گذرنده می‌گذارند.

تلسکوپی در زمین

ستاره‌شناسان تصویری
بدون آشفته‌گی می‌بینند.

با ماده تاریک

کهکشان دور

مسیر نور، به‌علت گرانش
خوشه، منحرف شده است.

ماده‌ی تاریک در مرکز
خوشه جمع شده است.

تلسکوپی در زمین

ستاره‌شناسان تصویری
آشفته می‌بینند.

ابر ماژلانی
بزرگ


عدسی گرانشی توسط ماچوها

نور ستاره‌ای به سمت
زمین می‌آید.

نور وارد هاله راه
شیری می‌شود.

گرانش ماچوها به
شکل «چاه گرانشی»
در فضا نشان داده
شده است.



چاه گرانشی ماچوها نور
را خم و کانونی می‌کند.



نوترینوها

مهبانگ، کیهان را پُر از نوترینو کرد. پیش از
این تصور می‌شد این ذرات جرم ندارند؛ اما
اکنون تجربه نشان داده است نوترینوها حدود
 $\frac{1}{100,000}$ جرم الکترون دارند؛ به سبب تعداد
بسیار زیاد نوترینوها در سراسر این جهان، این
جرم آنقدر هست که بخش کوچکی از ماده‌ی
تاریک را تشکیل دهد

ستاره
مشخص‌شده
در درخشندگی
عادی است.



در سال ۱۹۹۳ ستاره
بمطور موقت پرنور شد.

اثر ماچوها

هنگامی که ماچویی از مقابل ستاره‌ای
دور دست عبور کند، گرانش ماچو نور ستاره را
کانونی و مدتی درخشان می‌کند. اخترشناسان
در بر بزرگ ماژلان ستاره‌هایی یافته‌اند که با
همین روش درخشان‌تر شده‌اند.

ویمپ‌ها

تصور می‌شود مهبانگ ذرات ریز اتمی و پُر جرمی با برهم‌کش ضعیف ب ویمپ
به‌وجود آورده باشد. دره‌ی ویمپ از یک هیدروژن سنگین‌تر است و معمولاً
درون ماده‌ی بدون برهم‌کش، به خط مستقیم عبور می‌کند. اگر بیش‌تر ماده‌ی تاریک
از ویمپ‌ها باشد، کون هراتل ویمپ در حال عبور از درون بدن شما هستند.
فیریک دانان می‌گوید کشف کند که آیا ذرات ویمپ واقعاً وجود دارند یا نه؟

تعمیر و آماده‌سازی آشکارساز گرسنت ویمپ در ایتالیا



بیشتر بدانیم

اخترشناسی رادیویی ۳۰
ویژگی‌های ستاره‌ها ۱۸۸
خوشه‌های کهکشان‌ها ۲۳۴
نخستین سه دقیقه ۲۴۴
شکل فضا ۲۵۲

شکل فضا

از زمان‌های گذشته، مردم این جهان را به شکل کره‌ای توخالی، با مرکز و لبه می‌پنداشتند. اما امروز اخترشناسان می‌دانند که هندسه‌ی عالم ما چنین ساده نیست؛ شکل بزرگ مقیاس کیهان تحت تأثیر گرانش ماده‌ی درون آن است و در سلطه‌ی نیروهای پنهانی که در ساختار خود فضا هستند، قرار دارد. در حقیقت، این جهان هیچ مرکز یا لبه‌ای ندارد. بنا بر رصدهای اخیر، با آن‌که میزان جرم کیهان متناهی و قابل محاسبه است، مرز ندارد و در همه‌ی جهات تا ابد کشیده شده است. ما فقط می‌توانیم بخشی از این جهان بی‌نهایت (عالم قابل مشاهده) را ببینیم.

فضای خمیده

بنا بر نظریه‌ی نسبیت عام اینشتین، فضا فقط محیطی خلاء نیست؛ بلکه چارچوبی نامرئی است که ستاره‌ها و کهکشان‌ها در آن قرار گرفته‌اند. این جرم‌های بزرگ، چارچوب را تغییر می‌دهند و در فضای اطراف خود خمیدگی ایجاد می‌کنند. سه بعد عادی فضا، در فضای چهاربعدی خمیده می‌شود. چون تصور چنین رخدادی دشوار است، اخترشناسان این پدیده را این‌گونه ساده می‌کنند که کیهان صفحه‌ی پلاستیکی تختی می‌شود که جرم یک جسم خارجی آن را خم می‌کند.

نمایی سه بعدی از گرانش ستاره

در حقیقت، فضا به بعد چهارم خم می‌شود که در این‌جا قابل محسوس کردن نیست.

این مدل سه بعدی فضای خالی را با خطوط مستقیمی، که نشان‌دهنده‌ی چارچوبی نامرئی است، به تصویر می‌کشد.

زمانی که گرانش فضا را خم می‌کند خطوط موازی به هم می‌رسند.

جسمی پر جرم، مانند یک ستاره، ساختار فضا را بهم می‌زند. این آشفتگی به شکل نیروی گرانش حس می‌شود.

نمود دو بعدی فضای اطراف یک ستاره، فضای خالی را به صورت صفحه‌ای تخت نمایش می‌دهد.

نمای دو بعدی از گرانش ستاره

آشفتگی فضا بر اثر جرم ستاره، چاهی به وجود می‌آورد؛ مانند توپ سنگینی که روی برکه‌ای قرار بگیرد.

اجرامی که از نزدیکی چاه عبور می‌کنند، روی آن می‌غلتند. این عمل به صورت گرانش دیده می‌شود.

کیهان حد و اندازه‌ای در بزرگی ندارد و هرچه منبسط شود، فضا نیز ایجاد می‌شود.

اگر ماده‌ی کمتری در عالم باشد، فضا فقط بی‌نهایت و بدون لبه نخواهد بود. انبساط عالم فضا را به بیرون کش می‌دهد و انبساط تا ابد ادامه پیدا می‌کند (عالم باز).

اگر ماده‌ی زیادی در عالم باشد، فضا با گرانش این ماده، روی خود خم می‌شود. حتی ممکن است عالمی بسته به وجود آید و پس از مدتی انبساط متوقف شود و همه چیز برعکس آن روی خود فروبریزد (عالم بسته).

اگر درست به اندازه‌ی خاصی ماده باشد (به اندازه‌ی جرم بحرانی) فضا کاملاً تخت و بی‌نهایت و بدون هیچ لبه‌ای (عالم ایستا یا پایدار) می‌شود.

کیهان تاب‌خورده

در بزرگ‌ترین مقیاس ممکن، جرم کل کیهان، فضا را دور خود می‌پیچاند. نظریه‌ی نسبیت عام پیش‌بینی می‌کند این جهان به سه طریق، بسته به جگالی ماده‌ی درون آن، انحنای می‌یابد. دوباره ورقه‌ی پلاستیکی را به یاد آورید. ممکن است کیهان تخت باشد؛ ممکن است به درون انحنای پیدا کند و دوباره به خودش برسد یا امکان دارد مانند زین اسب، به بیرون انحنای پیدا کند.

فضا با انحنای منفی

فضا با انحنای مثبت

فضای تخت

همان‌طور که ماده از زمان مه‌بانگ به بیرون پرتاب شده است، فضا نیز همچنان در حال انبساط است

فضای تخت

ثابت کیهان‌شناختی به انبساط فضا سرعت می‌دهد.

کنده شدن فضای تخت

فضای کش‌سان

جرم هر جسمی تمایل دارد فضای اطراف را به سوی خود خم کند. اما اکنون بسیاری از اخترشناسان عقیده دارند نیروی دیگری، پنهان در خود فضا، اثر برعکس دارد و نیرویی رو به بیرون به فضا وارد می‌کند. نیروی پنهان، که ثابت کیهان‌شناختی نام دارد، اولین بار در معادلات نسبیت عام اینشتین دیده شد. اما او بعدها آن را بزرگ‌ترین اشتباه خود نامید. ثابت کیهان‌شناختی فضای بین ساختارهای بزرگ مقیاس عالم را آرام‌آرام می‌گستراند. امروزه به این اثر، انرژی تاریک می‌گویند.

عالم بی کران

مجسم کردن این جهان، آن طور که از دید موجودی خارج از فضا و زمان ما دیده شود، برای ما امکان پذیر نیست. این شبیه سازی سه بعدی فضا را در دو بعد نمایش می دهد. کیهان، مانند پوسته ی بادکنکی که باد می شود، در حال انبساط است و مانند سطح بادکنک، لبه یا مرکزی ندارد. زمانی که به فضای اطراف می نگریم، به نظر می رسد در مرکز کیهان (قابل مشاهده) هستیم که از هر جهت ۱۳ میلیارد سال نوری کشیده شده است. اما مکان ما در کیهان هیچ جایگاه ویژه ای ندارد و دو ناظر از هر جای کیهان به همین نتیجه می رسند. همه چیز نسبی است و عالم قابل مشاهده ی ما فقط بخشی کوچک از دنیای بی کران است.

به نظر می رسد راه شیری، مرکز عالم ماست. این عالم در هر جهت ۱۳ میلیارد سال نوری کشیده شده است و این بیشترین فاصله ای است که نور می تواند پس از زمان مهیابگ طی کند.

عالم بسته

اگر ماده ی موجود در این جهان کافی باشد، فضا چنان خمیده می شود که دوباره به خود می رسد و کیهانی بسته به وجود می آورد. نور یا فضا نوردی فرضی که در این عالم سفر می کند، بدون این که به انتهایی برسد، کیهان را دور می زند. گرانش ماده در عالم بسته سرانجام سبب توقف انبساط و آغاز رمبش بزرگی به سوی یک نقطه می شود. اخترشناسان دریافته اند که کهکشان های قابل مشاهده، برای بسته بودن کیهان جرم کافی ندارند و اندازه گیری های جدید نیز نشان می دهد اثر جاذبه ی ماده ی تاریک بسیار کمتر از دافعه ی انرژی تاریک است. در نتیجه، بعید است که ما در عالمی بسته باشیم.

راه شیری

این جهان بسته ی متناهی است و تا ابد منبسط نمی شود؛ اما لبه ای ندارد.



موشک در خط مستقیم از زمین بلند می شود. سرشنیان، برای سفر منجمد شده اند و قرار است در زمان معین بیدار شوند.



تربلیون ها سال بعد، سرشنیان بیدار می شوند و سیاره ی زمین را در مقابل خود می یابند با پرواز و حرکت در خط مستقیم، موشک در عالم چرخیده و به نقطه ی اول رسیده است.

هیچ مرکزی در درون خود کیهان وجود ندارد؛ مرکز در بعدی متفاوت و غیر قابل دسترس است.

کهکشان دور دست

خطوط منحنی، مختصات خمیدگی فضا را به درون، بر اثر ماده و به بیرون، بر اثر ثابت کیهان شناختی، نشان می دهد

فضای اطراف اجتماع بزرگی از ماده، به شدت به درون خم می شود.

گرانش ماده ی مرئی و تاریک، محنی های ملایمی را در شکل کلی و بزرگ مقیاس فضا ایجاد می کند.

کیهان قابل مشاهده از دید کهکشانی دور دست نیز شعاعی برابر ۱۳ میلیارد سال نوری دارد. این بخش از کیهان، ممکن است با کیهان قابل مشاهده ی ما هم پوشانی نداشته باشد؛ پس نمی توانیم آن را ببینیم و ساکنان آن نیز نمی توانند راه شیری ما را ببینند.

بیشتر بدانیم

درون سیاهچاله ۲۱۰
مقیاس کیهان ۲۳۸
انبساط کیهان ۲۴۰
مهیاگ ۲۴۲
ماده ی تاریک ۲۵۰
آینده ی دور ۲۵۴

آینده‌ی دور

تلسکوپ‌های بزرگ، ماشین‌های زمان هستند؛ زیرا میلیاردها سال طول می‌کشد تا نور کهکشان‌های دور دست، به زمین برسند و کیهان را در گذشته‌ای دور نشان می‌دهند. اما اخترشناسان می‌توانند آینده‌ی کیهان را نیز پیش‌بینی کنند. بنا بر مقدار ماده‌ای که در کیهان وجود دارد، سه آینده برای آن پیش‌بینی می‌شود: عالم چگال از جرم، سرانجام انبساط را متوقف می‌کند و زیر فشار گرانشی خود منقبض می‌شود؛ عالمی نسبتاً خالی از ماده، تا ابد به انبساط خود ادامه خواهد داد. حالت سوم عالمی که جرم آن درست در آستانه‌ی توقف انبساط، اما نه در حدی است که انقباض را شروع کند و در نتیجه، به عالمی ایستا منجر می‌شود. در هر حال، اکنون شواهد به سمت گزینه‌ی دوم است: عالم ما فقط با سرعت ثابتی منبسط نمی‌شود؛ بلکه انبساط آن شتاب‌دار است.

عالم باز

عالمی که جرم کمی دارد، باز است و تا ابد منبسط و سرد می‌شود. این شبیه به عمری ابدی است؛ اما در حقیقت، مرگی آرام و تدریجی است. پس از تریلیون‌ها سال، همه‌ی ستاره‌های همه‌ی کهکشان‌ها خواهند مرد. حتی سیاه‌چاله‌های ابرپرجرم در مرکز کهکشان‌ها باقی نخواهند ماند. سرانجام عالم ما به شکل تصورناپذیری سرد و تاریک خواهد شد و فقط خانه‌ای برای دسته‌ی کوچکی از ذرات ریز اتمی به حساب خواهد آمد.


عالم امروز

امروز، کهکشان‌ها، مانند راه شیری، هنوز در آغاز راه خود هستند. در کهکشان‌های مارپیچی و نامنظم، ستاره‌ها متولد می‌شوند و گاز و غبار زیادی برای تولد آن‌ها در آینده وجود دارد. بازوهای مارپیچی راه شیری با سحابی‌های درخشان و ستاره‌های داغ، جوان و آبی، جواهرشان شده‌اند.

ستاره‌های پیر در مرکز

تولد ستاره‌ها در بازوهای مارپیچی

مسیر تحول عالم



آینده‌های محتمل

سرنوشت و آینده‌ی کیهان به مقدار ماده‌ی درون آن بستگی دارد. ماده‌ی بسیار کم سبب عالمی باز می‌شود که تا ابد انبساط دارد. اگر ماده‌ی کافی برای خم کردن فضای اطراف باشد، عالم بسته‌ای پدید می‌آید که روزی بر خود خواهد رُمبید. ممکن است آن قدر ماده باشد که فقط انبساط را کند و سرانجام، آن را متوقف کند؛ اما نتواند سبب رُمبش و انقباض شود.

۲ پس از ۱۰ تریلیون تریلیون سال، راه شیری قبرستانی از اجساد ستاره‌ای خواهد شد که دور سیاه‌چاله‌ی ابرپرجرم مرکزی می‌گردند.

عالم باز

عالم بسته

پس از چند تریلیون تریلیون سال انبساط، عالم آرام‌آرام متوقف می‌شود. تا آن زمان، کهکشان مدت‌هاست که با تک سیاه‌چاله‌ی مرکزی، که بقایای ستاره‌ها آن را دربرگرفته‌اند، مرده است.


۱ تریلیون سال پس از مهبانگ، راه شیری همه‌ی گاز و غبار خود را مصرف خواهد کرد و دیگر ستاره‌ی جدیدی متولد نخواهد شد. حتی ستاره‌هایی با بیش‌ترین طول عمر نیز خواهند مرد و بازوهای مارپیچی ناپدید خواهند شد.

عالم بسته

اگر مقدار کافی ماده باشد، عالم بسته است. انبساط متوقف خواهد شد و گرانش کیهان را بر خود می‌بندد و انقباضی عظیم رخ خواهد داد: رُمبش بزرگ که درست برعکس انفجار بزرگ است. مواد فشرده می‌شوند و دمای کیهان بالا می‌رود. ماده‌ی باقی‌مانده به اتم‌ها و سپس به ذرات ریز اتمی متلاشی می‌شود. سیاه‌چاله‌ها تحت تأثیر گرمای زیاد قرار می‌گیرند و با هم ادغام می‌شوند. در نهایت، یک مگاسیاه‌چاله به وجود می‌آورند که همه‌ی ماده باقی‌مانده را می‌بلعد.


عالم شتاب‌دار

سرنوشت نهایی این جهان هرچه باشد، گرانس باید آن را کُند کند؛ اما رصدهای اخیر نشان می‌دهد امکان دارد انبساط با شتاب مثبت ادامه یابد. کهکشان‌های دور دست از زمان مه‌بانگ بسیار دورتر از انتظارند و بسیار سریع‌تر سفر می‌کنند. اخترشناسان نیروی رانشی را، که کهکشان‌ها را از هم دور می‌کند، ثابت کیهان‌شناختی یا انرژی تاریک می‌نامند. ممکن است این نیرو را خود فضای در حال کشیده شدن به وجود آورده باشد.



فاصله‌های ابرنواختری

ستاره‌های منفجر شونده‌ای به نام ابرنواخترهای نوع اول، بیشینه‌ی درخشندگی ثابت و مشخصی دارند. با ثبت این ستاره‌ها در کهکشان‌ها، اخترشناسان می‌توانند فاصله‌های کیهان را بیابند. آن‌ها متوجه شدند که دورترین کهکشان‌ها، دورتر از آن هستند که نظریه‌ی مه‌بانگ پیش‌بینی می‌کند. پس انبساط کیهان باید تندشونده باشد.



کیهان باز تا ابد به شکل تهی‌جایی بسیار سرد منبسط می‌شود. ذرات ریز اتمی پراکنده و کمی در فضاهای خالی آن حرکت می‌کنند. همگی آن‌ها مدت‌ها پیش در مه‌بانگ به وجود آمده‌اند.


بسیار بسیار دورتر در آینده، کوتوله‌های سفید و ستاره‌های نوترونی برهم می‌زمیند و نسل جدیدی از سیاه‌چاله‌ها به وجود می‌آیند. سرانجام، آن‌ها نیز به صورت تابش تبخیر و نابود می‌شوند.

تا ۱۰۰۰ سال (یک یا صد عدد صفر) پس از مه‌بانگ حتی سیاه‌چاله‌های ابربزرگ نیز به صورت تابش از بین می‌روند. ممکن است شمار کمی ستاره‌ی نوترونی و کوتوله‌های سفید تا آن زمان باقی بمانند.

۳ میلیون سال تا زمبش بزرگ

۱۰۰,۰۰۰ میلیون سال تا زمبش بزرگ

عالم نوسان‌کننده



عالم‌های جدید

برخی اخترشناسان می‌پندارند زمبش بزرگ، پایان کار عالم بسته نیست. آن‌ها عقیده دارند عالم نوسان می‌کند، منبسط، فشرده و سپس دوباره متولد می‌شود. آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند عالم جدید منبسط‌شونده از مگاسیاه‌چاله‌ی نهایی پدید می‌آید. چون ماده کاملاً در مرحله‌ی زمبش بزرگ از بین رفته است، عالم جدید ذرات و قوانین فیزیکی کاملاً متفاوتی خواهد داشت.



با انقباض کیهان، کهکشان‌ها نیز ادغام می‌شوند. دمای زمبشی کیهانی تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد افزایش می‌یابد.

دمای زمبشی کیهان بیش‌تر از ستاره‌هاست، بنابراین، مواد ستاره‌ها در فضا پخش و کیهان، دریایی از اتم‌ها می‌شود.

سیاه‌چاله‌های ابربزرگ در مرکز کهکشان‌ها ادغام می‌شوند. کیهان آن‌قدر داغ می‌شود که هسته‌ی اتم‌ها دیگر نمی‌توانند کنار هم بمانند و به ذرات ریز اتمی شکسته می‌شوند که سیاه‌چاله‌ها آن‌ها را می‌بلعند.

سرانجام، همگی کیهان به یک مگاسیاه‌چاله، به زمبش بزرگ تبدیل می‌شوند.

سرنوشت‌های کیهان

• در دهه‌ی ۱۸۵۰ میلادی، فیزیکدان انگلیسی، لرد کلونین (۱۸۲۴-۱۹۰۷) و فیزیکدان آلمانی، ردلف کلاوسیوس (۱۸۲۲-۱۸۸۸) مستقل از هم پیشنهاد کردند که کیهان به آهستگی از سرما می‌میرد.

• در سال ۱۹۲۲، اخترشناس روس، الکساندر فریدمان (۱۸۸۸-۱۹۲۵)، بر اساس محاسباتی به این نتیجه رسید که کیهان سه سرنوشت محتمل دارد.


• در سال ۱۹۲۳، فیزیکدان آمریکایی هوارد م. کنورگی (متولد ۱۹۴۷) به این نتیجه رسید که ممکن است پروتون‌ها در کوتوله‌های سفید و ستاره‌های نوترونی سرانجام واپاشیده و «تبخیر» شوند.

• در سال ۱۹۲۴، استفان هاوکینگ پیش‌بینی کرد که امکان دارد سیاه‌چاله‌ها در چشم برهم زدن ناپدید شوند.

• در سال ۱۹۷۹، فیزیکدان انگلیسی فریچن ج. دایسون (متولد ۱۹۲۳)، بر اساس محاسباتی به این نتیجه رسید که کوتوله‌های سفید و سیاه نوترونی سرانجام با ادغام در هم، سیاه‌چاله می‌شوند.

• اندازه‌گیری‌های جدید در سال ۱۹۹۷ نشان داد که کیهان آن‌قدر جرم ندارد که به سوی زمبش بزرگ برود.

تلسکوپ‌ی که برای کاوش آینده‌ی کیهان به کار می‌رود.



• در سال ۱۹۹۸، گروه‌های متعددی از اخترشناسان فاصله‌های ابرنواخترهای کهکشان‌های دور دست را اندازه گرفتند و به این نتیجه رسیدند که انبساط کیهان در حال شتاب گرفتن است. این نخستین مدرک رصدی از انرژی تاریک بود.

بیش‌تر بدانیم

- سیاه‌چاله‌ها ۲۰۸
- مقیاس کیهان ۲۳۸
- مهبانگ ۲۴۲
- ماده‌ی تاریک ۲۵۰
- شکل فضا ۲۵۲

حیات در دنیاهای دیگر

یکی از مهم‌ترین پرسش‌های انسان این است که آیا حیات بیرون از زمین وجود دارد؟ آیا ما در کیهان تنها هستیم؟ اکنون سیاره‌های بسیاری در اطراف ستاره‌های دیگر کشف شده‌اند و میلیارد‌ها ستاره‌ی مادر، که برای زندگی مناسب هستند، در کهکشان ما وجود دارند. می‌دانیم عناصر سازنده‌ی حیات، کربن، هیدروژن و اکسیژن، در فضا فراوان‌اند. اما اگر ما حیات فرازمینی را بیابیم، متوجه آن می‌شویم؟ شاید حیات بیگانه، شبیه حیات ما نباشد؛ همان‌گونه که حیات در زمین، گوناگونی بسیار دارد.

سیاره‌ی اورسا

ستاره‌ی ۴۷- دب‌اکبر حداقل دو سیاره‌ی شناخته شده‌ی پرچرم‌تر از مشتری دارد و به‌نظر می‌رسد سیاره‌های بسیار دیگری نیز داشته باشد. این شبیه‌سازی، سیاره‌ی فرضی کوچکی به نام اورسا را با گرانش کمی در مرزهای بیرونی این منظومه‌ی سیاره‌ای نشان می‌دهد که برخی گونه‌های حیات در آن تحول یافته است. این موجودات قد بلند، زمانی که سرد است در خود می‌پیچند؛ چشمان بزرگی دارند که در تاریکی می‌بیند و به گونه‌ای تحول یافته‌اند که در هوای رقیق تنفس می‌کنند. ستاره‌ی ۴۷- دب‌اکبر در فاصله‌ی حدود ۴۶ سال نوری از ما قرار دارد. سن آن حدود ۶ میلیارد سال، ستاره‌ای شبیه خورشید، اما با ۶۰ درصد درخشندگی بیش‌تر است. این ستاره از قدر ۵ در شبی تاریک حتی با چشم غیر مسلح نیز دیده می‌شود.

زن اورسایی دور نوزاد خود، که از یک شاخک به‌وجود آمده، حلقه زده است. زمانی که نوزاد بزرگ شود، به اندامی جدا و حیاتی مستقل تبدیل خواهد شد.

اندام‌های جنسی، شاخک‌هایی لقله شونده‌اند.


دهان در سطح زمین، گیاهانی را که غذای اورسایی‌هاست، می‌خورد.

حلقه‌ای از چشمان شبکه‌ای، در محیط پرنور کار می‌کند و نمایی در همگی جهت می‌دهد.


چشمان در شب در نور کم باز می‌شود.

حیات متفاوت

ممکن است تکامل در راه‌های عجیبی سیر کند. این موجود خیالی به نام آرنولد را زیست‌شناسی طراحی کرده است که نشان می‌دهد اگر موجودات دیگری در ۵۷۰ میلیون سال پیش در مسیر تکامل قرار می‌گرفتند، حیات هوش‌مند در زمین چگونه می‌شد. محیط پیرامونی که آرنولد را به‌وجود آورده، کاملاً شبیه محیطی است که انسان در آن به وجود آمده است.




آرنولد - بیگانه‌ای از زمین



لازمه‌های حیات

این‌که حیات دقیقاً چگونه از عناصر بنیادی، که در زمین وجود داشتند، شکل گرفته است، مشخص نیست. اما بی‌شک یکی از عوامل بسیار مهم، محیط مساعد بوده است. این استروماتولیت‌ها، بازمانده‌هایی از حیات ابتدایی زمین‌اند که در استرالیا، غربی زندگی می‌کنند. محیط آن‌ها وضعیت ابتدایی لازم برای حیات را نشان می‌دهد: گرما، نور و جو مناسب (برای حیات روی سطح) و آب برای کمک کردن به واکنش ترکیبات شیمیایی لازم برای حیات.



استروماتولیت‌ها در خلیج کوسه، استرالیا، غربی

استروماتولیت‌ها خزانه‌های بزرگ هستند.

گیاهان اورسایی به جای سبز، بنفش‌اند؛ زیرا عمل فوتوسنتز در آن‌ها از گونه‌ی دیگری از کلروفیل استفاده می‌کند. در گرانش کم، گیاهان قد بلندی پیدا می‌کنند.

هوا در اورسا بسیار رقیق است. در نتیجه، حیوانات و گیاهان برای جذب آن، به سطوح پهنی نیاز دارند.

آب، درست مانند زمین، برای حیات در اورسا ضروری است. چون آب برای حل کردن مواد شیمیایی ماده‌ای بسیار مناسب است، آن‌ها را در کنار هم قرار می‌دهد و واکنش‌های پیچیده‌ی شیمیایی به سادگی انجام می‌گیرد.

ماهی در اورسا مانند ماهی زمینی است؛ زیرا به جای گرانش، خاصیت شناوری آب شکل بدن آن‌ها را تعیین می‌کند.

احتمال حیات

از دید ما، برای آفرینش حیات شرایط بسیاری باید فراهم شود تا حیات هوش‌مند، که توانایی برقراری ارتباط در فاصله‌های میان ستاره‌ای داشته باشد، روی سیاره‌ای به‌وجود آید. فرانک دریک، نخستین اخترشناسی بود که در سال ۱۹۶۰، احتمال وجود حیات هوش‌مند فرازمینی را بررسی کرد و برخی شرایط لازم را در رابطه‌ای، که به نام خود او مشهور شده است، تعیین کرد.



میزان تولّد ستاره‌ها باید به حدّ کافی باشد که جای ستاره‌های مرده را پر کند. در کهکشان ما، هر سال حدود ۶ ستاره متولد می‌شود.

ستاره‌ها باید سیاره‌هایی داشته باشند.

سیاره‌ای با اندازه‌ی مناسب، باید در فاصله‌ی مناسب و در جایی نه خیلی سرد و نه خیلی گرم از ستاره‌ی خود قرار گرفته باشد.

حیات باید در سیاره شکل بگیرد.

حیات سیاره باید به حیات هوش‌مند تبدیل شود؛ زیرا یک برگ سبز قادر نیست خود را از دمه‌ها یا صدها سال نوری دورتر برای ما نمایان کند.

حیات هوش‌مند باید فن‌آوری پیشرفته‌ای داشته باشد که با فاصله‌های میان ستاره‌ای ارتباط برقرار کند.

گونه‌ی حیات باید پیام‌وزد که خود را با فن‌آوری پیشرفته از بین نبرد.


بلایای طبیعی، برخورد دنباله‌دار و سیارک و فوران‌های عظیم آتشفشانی باید کم باشد تا به حیات هوش‌مند فرصت تکامل بدهد.

با دیدی خوش‌بینانه به هر یک از عوامل حیات هوش‌مند، تخمین زده می‌شود در هر زمان، هزاران حیات هوش‌مند در کهکشان راه شیری وجود خواهد داشت.

با دیدی بدبینانه به هر یک از عوامل حیات هوش‌مند، در زمان حال فقط یک تمدن در کهکشان ما وجود دارد.


پیش‌تر بدانیم

سیاره‌ی زنده ۱۰۸
جست‌وجوی حیات در مریخ ۱۳۴
هوش‌مندان فرازمینی ۲۵۸



هوش مندان فرازمینی

جست‌وجوی حیات هوش‌مند فرازمینی (SETI)، که زمانی عجیب و دور از ذهن شمرده می‌شد، اکنون در کانون توجه است. این جست‌وجو با علوم متفاوتی مانند نجوم، فیزیک، شیمی، فن‌آوری اطلاعات (IT) و زیست‌شناسی مرتبط است. بسیاری از دانشمندان طرح سِتی از تلسکوپ‌های رادیویی برای ردیابی احتمالی سیگنال‌های مصنوعی از فضا استفاده می‌کنند و برخی، به دنبال تابش‌های لیزری هوش‌مندان دنیاهای دورند. هر پیام آگاهانه‌ای حتماً به صورتی می‌رسد که دریافت آن ساده باشد. ما نیز پیام‌های خود را به فضا فرستاده‌ایم؛ اما هنوز منتظر دریافت پیامی هستیم.



تولد سِتی

در دهه‌ی ۱۹۵۰، در روزهای نخستین نجوم رادیویی، آمریکایی جوانی به نام فرانک دریک متوجه شد تلسکوپ‌های رادیویی، ابزارهای مناسبی برای برقراری ارتباط با هوش‌مندان فرازمینی‌اند. آن‌ها سیگنال‌ها را در طول کهکشان، دریافت و مخابره می‌کنند. دریک با سایر اخترشناسان تحقیق خود را ادامه داد. بلندپروازانه‌ترین طرح آن‌ها، پروژه‌ی سایکلوپوس بود؛ ساخت آرایه‌ای با ۱۵۰۰ تلسکوپ رادیویی. اما این طرح چنان پرخارج بود که هرگز انجام نشد.

ستِی در خانه

میلیون‌ها نفر در جهان با رایانه‌های شخصی خود به جست‌وجوی هوش‌مندان فرازمینی کمک می‌کنند. داده‌های تلسکوپ رادیویی آرسیبو از آسمان به صورت بسته‌های اطلاعاتی از طریق اینترنت در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. در این طرح، که سِتی در خانه نام دارد، رایانه‌ی اطلاعات حاوی داده‌های رادیویی از آسمان در نرم‌افزار مخصوص نصب شده روی رایانه غریب می‌شود تا شاید نشانی از فرازمینی‌ها پیدا شود. این طرح در سال ۲۰۰۶ به طرح جدید بوئینک (BOINC) گسترش یافت که در آن کاربران و رایانه‌های آن‌ها می‌توانند به تجزیه و تحلیل خودکار اطلاعاتی در زمینه‌ی بیماری‌های خطرناک مانند ایدز و موارد مشابهی در پزشکی نیز پردازند یا به پردازش داده‌های طرح‌های بزرگ دیگر علمی نیز کمک کنند.

پیام آرسیبو

در سال ۱۹۷۴، تلسکوپ رادیویی آرسیبو در پورتوریکو پیامی به سمت ستاره‌ها فرستاد. این پیام شامل ۱/۶۷۹ تپ خاموش و روشن بود که به سمت خوشه‌ی کروی ۱۳M، تویی چگال از ستاره‌ها در فاصله‌ی ۲۵ هزار سال نوری از ما فرستاده شد. بیگانه‌ای هوش‌مند متوجه خواهد شد عدد ۱/۶۷۹ حاصل ضرب دو عدد اول ۲۳ و ۷۳ است. تپ‌ها به شکل مستطیلی با ۲۳ ستون پهنا و عمق ۷۳ ستون فرستاده شده‌اند که به شکل تصویری پایه‌ی حیات در زمین را نشان می‌دهند.

امواج رادیویی که پیام آرسیبو را حمل کردند، این پروتوها حتی در پرفشارترین بخش‌های فضا، با سرعت نور حرکت می‌کنند و راه مطلوبی برای ارتباط میان ستاره‌ای به‌شمار می‌آیند.



تلسکوپ رادیویی آرسیبو


تکامل ستی

• در سال ۱۹۵۹، زمانی که جوزپه کوکونی (متولد ۱۹۱۴) و فیلیپ ماریسون (۲۰۰۵-۱۹۱۵) مقاله‌ای به نام «در جست‌وجوی ارتباطات میان‌ستاره‌ای» در مجله علمی نیچر چاپ کردند، اندیشه‌ی ستی آغاز شد.

• در سال ۱۹۶۰، فرانک دریک طرح آزما (OZMA) را آغاز کرد که نخستین جست‌وجوی امواج فرازمینی‌ها با تلسکوپ رادیویی بود.

• پایونیر ۱۰ و ۱۱، کاوشگرهای مشتری و زحل ناسا، که در سال‌های ۱۹۷۲ و ۱۹۷۳ پرتاب شدند، هر دو حاوی لوح‌های کنده‌کاری شده‌ای با پیامی ابتدایی از زمین بودند. لوح‌هایی که شاید هزاران سال بعد در مسیر این کاوش‌گرها در ورای منظومه شمسی به‌دست فرازمینی‌ها برسند.

لوح پایونیر



• در سال ۱۹۷۴، پیام آرسیپو به سمت خوشه‌ی کروی M۱۳ فرستاده شد.

• در سال ۱۹۷۷، تلسکوپ رادیویی در اوهایو (آمریکا) پیامی عجیب دریافت کرد. این مهم‌ترین پیام ناشناخته‌ای است که تا امروز کشف شده است. اما متأسفانه پس از آن دیگر چنین پیامی تکرار نشد که تأییدکننده و رمزگشا باشد.

• دو فضایی‌های ویجر که در سال ۱۹۷۷ پرتاب شدند، هر یک پلاک طلایی با خود بردند که حامل صداها و تصاویری از زمین بود.

• در سال ۱۹۹۵ طرح فونیکس (ققنوس) جست‌وجوی جدید و منظمی را برای دریافت سیگنال‌های فرازمینی آغاز کرد.

• در سال ۱۹۹۸، طرح ستی در خانه با ارائه‌ی داده‌های تلسکوپ‌های رادیویی ستی به کاربران علاقه‌مند به سراسر دنیا، از طریق بسته‌های اطلاعاتی از راه اینترنت آغاز شد.

پیش‌تر بدانیم

اخترشناسی رادیویی ۳۰
تلسکوپ‌های عجیب ۴۰
حیات در دنیاها دیگر ۲۵۶

طرح فونیکس (ققنوس)

مؤسسه‌ی ستی بین سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ که به کمک چند تلسکوپ بزرگ رادیویی، از جمله تلسکوپ ۶۴ متری گرین‌بنک، مجموع ۸۰۰ ستاره‌ی منتخب را به دنبال علائم رادیویی غیر طبیعی زیر نظر گرفت؛ اما چیزی پیدا نشد.



تلسکوپ رادیویی گرین‌بنک

تماس

تماس با حیات بیگانه، بزرگ‌ترین روی‌داد خبری همدی‌دوران خواهد بود. گروه‌های گوناگون مردم، ارتش‌ها، مجامع مذهبی، دانشمندان و سیاستمداران، هریک بنا بر دستور کار خود، واکنش متفاوتی خواهند داشت. آیا ما باید پاسخ دهیم؟ یا ممکن است معرفی مکان خود به تمدنی پیش‌رفته‌تر بسیار خطرناک باشد؟ چه کسی تصمیم خواهد گرفت چه بگوییم؟



آینده‌ی ستی


جست‌وجوی رادیویی هوش‌مندان فرازمینی هر روز دشوارتر می‌شود. افزایش نویز یا نوفه‌های الکتریکی از ابزارهایی مانند تلفن‌های همراه و دستگاه‌های پخت مایکروفر، امکان ثبت امواج ضعیفی را که ممکن است از هوش‌مندان فرازمینی برسد، از بین می‌برد. یک راه حل اجرای ستی و دیگر تحقیقات نجوم رادیویی، در نیمه‌ی دور ماه و دور از اختلالات زمینی است. دانشمندان ستی حتی این مکان را پیدا کرده‌اند: دهانه‌ی ۱۰۰ کیلومتری ساها. با وجود این ممکن است تحقق چنین رؤیایی چنددهه‌ی دیگر طول بکشد.




اولین ستون، اعداد ۱ تا ۱۰ را با یک دودویی، به شکل اعدادی که در رایانه از آن‌ها استفاده می‌شود، نشان می‌دهد.



مهم‌ترین عناصر حیات، کربن، هیدروژن، نیتروژن، اکسیژن و فسفر هستند. این ستون عدد اتمی این ۵ عنصر را نشان می‌دهد.



نسبت عناصر کلیدی در برخی ملکول‌های مهم زیستی در این ستون نشان داده شده است. شکر (C₆H₁₂O₆)، پارنگ سبز، فسفات (پفش) و نوکلئوتید (نارنجی) ساختار DNA را تشکیل می‌دهد؛ ملکولی که پامی همگی گونه‌های حیات در زمین را شکل داده است.




دو رشته‌ی درهم تنیده، ساختار ملکول DNA را نمایش می‌دهد؛ ملکول عظیمی که با تقسیم و تکثیر، پامی‌های حیات را می‌سازد. گونه‌های حیات بیگانه نیز باید بر پامی ملکولی شبیه به DNA باشند تا اطلاعات ژنتیک را منتقل کنند.



قد انسان = ۱٫۷۰ متر


شکل بدن انسان احتمالاً متعین‌کننده‌ترین تصویر برای موجود بیگانه است. در پهلوی آن اعدادی است که جمعیت جهان (چپ) و قد انسان (راست) را نمایش می‌دهد.



منظومه شمسی و اعضای آن که تقریباً با مقیاس نمایش داده شده است. زمین از جایگاه خود بیرون آورده شده است، تا بارز شود.



تلسکوپ رادیویی آرسیپو، با طرحی از چگونگی انتقال اطلاعات با امواج رادیویی.



پایگاه ماه ستی

تلسکوپ زیرزمینی نوترینو به دنبال سیگنال‌هایی از ذرات ریز اتمی است.

صفحات خورشیدی، انرژی را تأمین می‌کنند.

آنتن‌های ارتباطی

این تلسکوپ در جست‌وجوی امواج لیزری و تابش‌های فروسرخ است.

امکان دارد بشقاب رادیویی اصلی، در گرانش کم ماه، حتی از آرسیپو بزرگتر باشد.

محل‌های زندگی

ساها محلی با دسترسی آسان است؛ نزدیک استوای ماه و درست در مرز نیمه‌ی دور آن.




اخترشناسی آماتوری

آغاز کار ۲۶۵-۲۶۲

رصد آسمان ۲۹۵-۲۶۶

اخترشناسی یکی از آن علوم نادری است که برای نقش داشتن در آن یا لذت بردن از آن، نباید حتماً دانشمند باشید. آزمایشگاه اخترشناسی نه در یک اتاق یا کشور و شهر خاصی در زمین، بلکه در آسمانی بی‌مرز و متعلق به همه است و به‌رایگان در اختیار هر چشم کنجکاو قرار دارد. شاید به همین سبب، نجوم آماتوری بیش‌تر از علاقه‌های آماتوری در هر رشته‌ی علمی دیگری رشد کرده است. منجم آماتور، حتی بدون دوربین دوچشمی و تلسکوپ هم می‌تواند کار خود را انجام دهد. مثلاً می‌تواند هم با رصد بارش‌های شهاب لذت ببرد و هم در کاری علمی سهیم شود. رصد آسمان برای اهداف کاربردی، سنتی دیرینه است که برای اموری مانند جهت‌یابی، سنجش زمان و درست کردن تقویم انجام می‌شده است. فراگرفتن نجوم سبب می‌شود راه خود را در آسمان پیدا کنید و در فصل‌های متفاوت، صورت‌های فلکی آسمان را بیابید. دوربین دوچشمی شگفتی‌های بیش‌تری به نمایش می‌گذارد و حتی به منجمان آماتور کمک می‌کند رصدهای ارزش‌مندی مانند بررسی ستاره‌های متغیر انجام دهند. با تلسکوپ، آسمان بدون اغراق بی‌مرز می‌شود. برخی تلسکوپ‌های آماتوری امروز، از بسیاری از تلسکوپ‌های حرفه‌ای، که تا چند دهه‌ی پیش از آن‌ها استفاده می‌شد، پیش‌رفته‌ترند.

زمین چرخان



منطقه‌های زمانی


با چرخش زمین، مناطق گوناگون جهان، خورشید را در زمان‌های متفاوتی در آسمان می‌بینند. مثلاً زمانی که در آمریکا صبح دم است، در اروپا ظهر، در ایران بعدازظهر و در استرالیا شامگاه است. جهان به ۲۴ منطقه‌ی زمانی اصلی تقسیم شده است که یک ساعت با هم تفاوت دارند. در هر منطقه، حدود ظهر به وقت محلی، خورشید بیش‌ترین ارتفاع را در آسمان دارد.

زمان روز

در هر زمان، نیمی از کره رو به خورشید و روشن و نیمی دیگر پشت به جهت تابش خورشید است و در تاریکی به‌سر می‌برد.

تاریکی موجب می‌شود بتوانیم ستاره‌ها را در آسمان ببینیم. با چرخش زمین، به‌نظر می‌رسد ستاره‌ها از شرق به غرب حرکت می‌کنند.

این‌جا، در ریه، شب است. زیرا در نیمی تاریک زمین قرار دارد که پشت خورشید است.



جهت چرخش زمین

شب

روز

آفریقا

اقیانوس

آتلانتیس

ریو د ژانیرو

چرخش زمین ریه را به سمت خورشید می‌برد و در این میان، در ریه سپیده‌دم می‌شود.

مسیر خورشید در آسمان

نور خورشید

خورشید

مسیر خورشید در آسمان

چند ساعت بعد، چرخش زمین ریه را درست مقابل خورشید قرار می‌دهد. زمانی که خورشید دقیقاً بالای سر باشد، ظهر است.

در نیمکره‌ی شمالی، مسیر خورشید (به‌جز در نواحی قطبی) در نیمه‌ی جنوبی آسمان است. به همین سبب، از چپ به راست حرکت می‌کند.

زمین از غرب به شرق می‌چرخد. به همین دلیل، به‌نظر می‌رسد خورشید از شرق طلوع و در غرب غروب می‌کند.


در نیمکره‌ی جنوبی، مسیر خورشید (به‌جز در نواحی قطبی) در نیمه‌ی شمالی آسمان است. به این سبب، از راست به چپ حرکت می‌کند.

روز و شب

زمین دور محور خود، با سرعت ثابتی می‌چرخد و همه جای این دنیا را از روز به شب و دوباره به روز باز می‌گرداند. با چرخش کره، تصویر ما از آسمان نیز تغییر می‌کند. پس از یک چرخش کامل، زمین به جهت اولیه‌ی خود در فضا برمی‌گردد و ستاره‌ها تقریباً به جای اول خود بازمی‌گردند. این رخداد ۲۳ ساعت و ۵۶ دقیقه طول می‌کشد (یک روز نجومی). در این زمان، زمین ۲/۵ میلیون کیلومتر از مدار خود را به دور خورشید طی کرده است و باید یک درجه‌ی دیگر بچرخد تا خورشید به جای اولش در آسمان برگردد. این کار ۴ دقیقه زمان می‌برد. بنابراین، روز اندازه‌گیری شده بر اساس خورشید (یک روز خورشیدی) ۲۴ ساعت است.

محاسبه‌ی طول جغرافیایی


طول جغرافیایی فاصله‌ی شرقی یا غربی یک مکان از خط یا نصف‌النهار مبنای شمال - جنوب است که از گرینویچ، در انگلستان، می‌گذرد. زمین طی ۲۴ ساعت، ۳۶۰ درجه می‌چرخد، بنابراین در هر ساعت، ۱۵ درجه‌ی چرخش دارد. اگر زمان در گرینویچ (GMT) یا زمان میانگین گرینویچ (۶ عصر باشد، ۱۸۰ درجه‌ی شرق آن ساعت ۶ صبح است. چرخش زمین به دریانوردان کمک می‌کند طول جغرافیایی خود را، در صورت داشتن زمان گرینویچ، به‌دست آورند.



ستاره‌ی قطبی و عرض جغرافیایی

در نیم‌کره‌ی شمالی، ارتفاع ستاره‌ی قطبی یا جُذی، با عرض جغرافیایی (فاصله‌ی زوایای شمالی از استوا) تغییر می‌کند. در قطب شمال (عرض ۹۰ درجه‌ی شمالی)، ستاره‌ی قطبی دقیقاً بالای سر، یعنی در سرسره است (۹۰ درجه بالای افق). در استوا (عرض صفر درجه)، در افق دیده می‌شود (ارتفاع صفر درجه). در ۶۰ درجه‌ی شمالی، ۶۰ درجه بالای افق است و در ۴۵ درجه‌ی شمالی، ۴۵ درجه از افق ارتفاع دارد. در آسمان ایران، ارتفاع ستاره‌ی قطبی در جنوبی‌ترین نقاط ۲۵ درجه‌ی و در شمالی‌ترین نقاط حدود ۴۰ درجه است و در تهران به ۳۵ درجه می‌رسد.

ارتفاع ستاره‌ها: اخترشناسان ارتفاع ستاره‌ها را در بالای افق به درجه بیان می‌کنند. از افق تا بالای سر ۹۰ درجه است. نیمی از این فاصله ۴۵ درجه می‌شود و ستاره‌ای در افق صفر درجه ارتفاع دارد.



عرض جغرافیایی جنوبی

در نیم‌کره‌ی جنوبی هیچ ستاره‌ی قطبی وجود ندارد؛ اما صلیب جنوبی، که در ۲۷ درجه‌ی قطب جنوب آسمان قرار دارد، راهنمایی برای یافتن عرض جغرافیایی است. در بهار (زمانی که در آسمان رو به بالاست) یا در پاییز (که رو به پایین است) کمک گرفتن از آن ساده‌تر است. ارتفاع ستاره‌ی تیر نیم (آلفا - صلیب جنوبی) را از افق یابید. اگر صلیب رو به بالا بود، ۲۷ درجه از آن کم کنید و اگر رو به پایین بود، ۲۷ درجه اضافه کنید.

صلیب جنوبی در ابتدای پاییز: اگر تیر ۶۳ درجه‌ی از افق ارتفاع داشت، ۲۷ درجه به آن اضافه کنید. عرض جغرافیایی شما ۹۰ درجه‌ی جنوبی است.

ساعت‌های آفتابی

اصول ساعت‌های آفتابی این است که با چرخیدن زمین و حرکت ظاهری خورشید در آسمان، سایه‌ها نیز با آن در جهت مخالف حرکت می‌کنند. همه‌ی ساعت‌های آفتابی میلیله‌ای به نام شاخص دارند. سایه‌ی شاخص روی صفحه‌ای می‌افتد که با ساعت‌های روز علامت‌گذاری شده است. یک ساعت آفتابی ساده را می‌توان با وسایل ساده ساخت. دستور کار را از بالا راست بخوانید.

۱. برای شاخص ساعت، از یک سوزن خیاطی یا یک سیخ بلند استفاده کنید.

۲. یک شیشمی مربا یا در فلزی پیدا کنید.

۳. سایه‌ی شاخص روی نوار کاغذ، ساعت را به شما خواهد گفت.

۴. در ظرف را بردارید و سوراخی در آن ایجاد کنید تا سوزن یا سیخ از آن عبور کند.

۵. توپ پلیستیکی چسبنکی مثل یک تکه خمیر یا آدامس جوییده شده را به یک انتهای سوزن بزنید. در ظرف را بندید تا توپ چسبنک به انتهای ظرف بچسبد.

نوار کاغذی را روی شیشه بچسباند. شیشه را طوری روی پایه بگذارید که عدد ۱۲ دقیقاً رو به پایین، یعنی رو به شمال در نیم‌کره‌ی شمالی و رو به جنوب در نیم‌کره‌ی جنوبی باشد.

۶. نواری کاغذی به عرض ۲۵ میلی‌متر و طولی به اندازه‌ای که دور شیشه بپیچد، ببرید. ۲۴ خط برابر روی آن رسم کنید و از راست به چپ اعداد ۱ تا ۲۴ را روی آن بنویسید (برای نیم‌کره‌ی جنوبی از چپ به راست).


۷. زاویه قائمه (۹۰°)

۸. زاویه برابر عرض جغرافیایی محل ساعت آفتابی است.

۹. پایه‌ای مقوایی به شکل مثلث درست کنید. برشی مقوایی روی پایه بچسباند که شیشه نلغزد.

۱۰. این انتهای پایه به سمت شمال است (در نیم‌کره‌ی جنوبی، به سمت جنوب).

نیم‌کره‌ی جنوبی



سایه‌ی شاخص ساعت آفتابی، در نیم‌کره‌ی جنوبی، در جهت عقربه‌های ساعت حرکت می‌کند.

نیم‌کره‌ی شمالی




سایه‌ی شاخص ساعت آفتابی، با چرخش زمین در نیم‌کره‌ی شمالی، در خلاف جهت عقربه‌های ساعت حرکت می‌کند.

دقت ساعت آفتابی

سایه‌ی شاخص، زمان را با دقت چند دقیقه به ما می‌گوید. در برخی زمان‌های سال، ممکن است ساعت آفتابی دقایقی جلوتر یا عقب‌تر باشد. دلیل این رخداد این است که مسیر ظاهری خورشید در آسمان تحت تأثیر تغییرات سرعت گردش زمین در مدار خود به دور خورشید است. در نتیجه، ساعت آفتابی، که ساعت طبیعی را نشان می‌دهد و ظهر آن درست اذان ظهر محلی است، با ساعت رسمی - که همیشه در ساعت ۱۲ ظهر اتفاق می‌افتد - کمی تفاوت دارد.

جهت ساعت آفتابی

ساعت آفتابی فقط در صورتی دقت لازم را دارد که شاخص آن موازی با محور زمین باشد. به این ترتیب، شاخص باید به‌نحوی قرار داده شود که در جهت شمال جنوب باشد و زوایای آن با افق نیز برابر عرض جغرافیایی محل باشد. ساعت‌های آفتابی محدودیت‌های دیگری نیز دارند. در شب (به‌جز ساعت‌های مهتابی) یا در روزهای ابری قابل استفاده نیستند و بسیاری برای زمان تابستانی و ساعت رسمی جلو کشیده‌شده، قابل تنظیم نیستند.



سایه شاخص بر روی ساعت آفتابی می‌افتد.

شاخص موازی محور زمین است.

پیش‌تر بدانیم


مدار زمین ۲۳٫۴°
نقشه‌برداری از آسمان شب ۲۷۰°
نقشه‌های آسمان قطبی ۲۷۲°

مدار زمین

مدار بیضوی

فاصله‌ی میانگین زمین از خورشید حدود ۱۵۰ میلیون کیلومتر است. اما مدار زمین بیضوی است؛ به طوری که زمین در دی ماه، در مقایسه با تیرماه، ۵ میلیون کیلومتر به خورشید نزدیک‌تر است. دی‌ماه، در نیم‌کره‌ی جنوبی، تابستان است. اما این تفاوت فاصله تأثیر چندانی بر آب و هوای زمین ندارد.

در پایان آذر و ابتدای دی، قطب جنوب رو به خورشید است.



ابتدای فروردین و مهر: در دو نقطه‌ی اعتدال، خورشید دقیقاً از بالای استوای زمین عبور می‌کند. طول روز و شب در همه جا برابر است (هر کدام ۱۲ ساعت).

دما در دی

در دی ماه، نیم‌کره‌ی جنوبی به سمت خورشید است. نور خورشید به طور مستقیم بر نیم‌کره‌ی جنوبی می‌تابد و موجب ایجاد تابستانی داغ می‌شود. در حالی که بر نیم‌کره‌ی شمالی نور ملایمی می‌تابد. دو نیم‌کره فصل‌های مخالف هم دارند: تابستان در جنوب به معنای زمستان در شمال و پاییز جنوبی هم‌زمان با بهار شمالی است.

آغاز تابستان

اعتدالین

آغاز زمستان

شمال شرق شرق جنوب شرق جنوب غرب غرب شمال غرب

مسیر شمالی خورشید

مسیر ظاهری و روزانه‌ی خورشید در آسمان با حرکت زمین در مدار خود تغییر می‌کند. در نیم‌کره‌ی شمالی، خورشید در تابستان ارتفاع زیادی دارد. در اعتدال‌ها، مسیر آن کم‌ارتفاع‌تر می‌شود و در زمستان، کمترین ارتفاع را دارد. نقاط طلوع و غروب نیز تغییر می‌کند و در زمان اعتدال‌ها شرق - غرب است. در تابستان بیش‌تر به سمت شمال و در زمستان به سمت جنوب می‌رود.

زمین ما، در حال چرخش دور خود، با سرعت ۱۰۰ هزار کیلومتر بر ساعت دور خورشید می‌گردد؛ یعنی هزار بار سریع‌تر از سرعت اتومبیل در بزرگراه. با این حرکت، زمین مناظر گوناگونی از کیهان را پیش چشمان ما قرار می‌دهد. در طی این مدار، زاویه‌ی تابش بر هر بخش زمین و در نتیجه ارتفاع خورشید در آسمان تغییر می‌کند و فصل‌ها را به وجود می‌آورد. با بررسی مدار زمین، اخترشناسی نشان داده است که چگونه برخی پدیده‌های فصلی هم‌زمان با «نشانه‌هایی در آسمان» رخ می‌دهد. مثلاً جاری شدن سالانه‌ی سیل در رودخانه‌ی نیل، هر سال پس از پدیدار شدن ستاره‌ی شباهنگ در آسمان صبحگاهی تابستان رخ می‌دهد. به همین سبب مصریان این ستاره را جزو الهه‌ی آسمان می‌دانستند.


سال‌ها، انقلابین و اعتدالین

زمین در ۳۶۵/۲۵ روز یا یک سال، مدار خود را دور خورشید طی می‌کند. در طول این سفر سالانه، از جهات متفاوتی به فضا نگاه می‌کنیم و در نتیجه، طی یک سال ستاره‌های گوناگونی در آسمان می‌بینیم. مسیر ظاهری و روزانه‌ی خورشید در آسمان نیز تغییر می‌کند؛ زیرا محور زمین بر مدارش عمود نیست و ۲۳/۵ درجه انحراف دارد. در نیم‌کره‌ی شمالی، خورشید در آخر خرداد یا اول تیر بیش‌ترین ارتفاع را دارد (طولانی‌ترین روز سال، بدون در نظر گرفتن اثر شکست نور جو‌ی) و در نیم‌کره‌ی جنوبی، آخر آذر یا اول دی، همان زمانی که در نیم‌کره‌ی شمالی انقلاب زمستانی است و مردم کمترین ارتفاع خورشید و کوتاه‌ترین روز سال را شاهدند. میان این دو انقلاب تابستانی و زمستانی، نقاط اعتدالین قرار دارند (اول بهار و پاییز) که خورشید در هر نیم‌کره به طور مساوی می‌درخشد.

خورشید نیمه‌شب

در خرداد و تیر، مناطق نزدیک به قطب شمال به سمت خورشید قرار می‌گیرند. در این هنگام درون دایره‌ی شمالگان (شمالی‌تر از عرض ۶۶ درجه‌ی شمالی)، خورشید همواره در آسمان است و طلوع و غروب نمی‌کند. در آسمان می‌چرخد و می‌چرخد و بین بیش‌ترین ارتفاع در نیم‌روز تا کمترین ارتفاع در نیمه‌شب، جابه‌جا می‌شود. رخداد مشابهی در آذر و دی در دایره‌ی جنوبگان مشاهده می‌شود.

این منطقه در خرداد، تحت تابش دائمی خورشید است.




خورشید در حوالی نیمه‌شب تابستانی مدار شمالگان



۹ شب ۱۰ شب ۱۱ شب نیمه شب ۱ صبح ۲ صبح

شکل مدار زمین (کشیدگی با اغراق)




دما در تیر

در این سمت مدار، انحراف محور زمین، قطب شمال سیاره را به سمت خورشید قرار می‌دهد. در تیرماه، خورشید مستقیم به نیم‌کره‌ی شمالی می‌تابد. دمای آن‌جا بالا می‌رود و فصل تابستان آغاز می‌شود. نور خورشید به‌طور متمایل به نیم‌کره‌ی جنوبی می‌تابد و ملایم‌تر و با شدت کمتری در آن‌جا پخش می‌شود. جنوب استوا دما کم و فصل زمستان آغاز می‌شود.

سال کیسه


هر چهار سال، یک روز به سال اضافه می‌شود تا فصل‌ها در جای خود بمانند. زیرا زمین یک دور کامل به دور خورشید را درست در ۳۶۵ روز نمی‌زند؛ بلکه ۱/۴ روز اضافه‌تر طول می‌کشد. یک سال در تقویم ما، درست ۳۶۵ روز محاسبه می‌شوند. بنابراین هر بار، سال کمی جلوتر و جلوتر می‌آید و فصل‌ها به مرور در ماه‌های گوناگون جابه‌جا می‌شوند. در نتیجه، هر ۴ سال اسفند را ۳۰ روز حساب می‌کنیم تا همواره نوروز اول فروردین باشد و فصل‌ها سر جای خود بمانند.



در طی مدار سالانه، جهت و سوی محور زمین تغییر نمی‌کند.

همان مقدار گرما در منطقه‌ی وسیع‌تری پخش می‌شود.

قطب شمال، در خرداد و تیر، رو به خورشید است.



مسیر ظاهری خورشید

با گردش زمین در مدار خود، به نظر می‌رسد خورشید در میان ستاره‌ها حرکت می‌کند. این حرکت متفاوت با حرکت روزانه‌ی شرق به غرب خورشید، جابه‌جایی سالانه است که هر شبانه‌روز حدود یک درجه پیش می‌رود. ما نمی‌توانیم به‌سادگی حرکت خورشید را ببینیم. زیرا نور شدید خورشید، ستاره‌ها را پنهان می‌کند و معیاری برای مقایسه نداریم. اگر آسمان روز روشن نبود، می‌توانستیم خورشید را در کنار ستاره‌های دیگر، صورت فلکی‌های دایرة البروجی ببینیم که هر ماه مکانش بین آن‌ها تغییر می‌کرد. خورشید هر ماه تقریباً در یکی از این صورت‌های فلکی یا برج‌ها قرار دارد.

مدار زمین

• در سال ۱۵۴۳، نیکولاس کوپرنیک در کتاب خود نوشت که زمین دور خورشید می‌گردد؛ گفته‌ای که برخلاف همگی تصورات پیشین بود که می‌پنداشتند همه چیز دور زمین می‌گردد.

• در سال ۱۶۰۹، یوهان کپلر، بنا بر محاسبات ریاضی اعلام کرد مدار زمین دور خورشید، بیضی است و نه دایره. او قوانینی را نیز برای شناخت حرکت سیاره‌ها مطرح کرد.


• در سال ۱۷۲۸، جیمز برَدلی اخترشناس انگلیسی (۱۶۹۳-۱۷۶۲) اختلاف منظر ستاره‌ها را رصد کرد. اختلاف منظر جابه‌جایی فصلی در نور ستاره است که بر اثر حرکت زمین به‌وجود می‌آید. علاوه بر دیگر شواهد به‌دست آمده، اختلاف منظر نیز ثابت کرد که زمین در حال حرکت است.

بیش‌تر بدانیم

زمین چرخان ۲۶۲
نقشه‌برداری از آسمان شب ۲۷۰
نقشه‌های آسمان قطبی ۲۷۲

حرکت تقدیمی

با آن‌که زاویه‌ی تمایل محور زمین ثابت است، امتداد آن در فضا ثابت نیست؛ بلکه به‌تدریج می‌چرخد. مانند محور فرقه‌ای که در حال افتادن است. اکنون رو به جُذی یا ستاره‌ی قطبی است. طی ۲۶ هزار سال، این محور به آرامی در آسمان می‌چرخد و یک دور می‌زند. پیش از آن‌که دوباره به سمت جُذی برسد، رو به (ستاره‌های قطبی) دیگری خواهد شد. این پدیده به نام حرکت تقدیمی، به سبب اثر نیروی گرانش ماه بر محور متمایل زمین است.



در حالی که زمین در مدار خود می‌گردد، ستاره‌های گوناگونی هر فصل در آسمان دیده می‌شوند.

اگر محور زمین انحراف نداشت، طول روز و شب همیشه ثابت بود و در نتیجه فصلی به‌وجود نمی‌آمد.

وسط تابستان

اعتدالین

وسط زمستان

جنوب غرب، شمال غرب، شمال، شمال شرق، شرق، جنوب شرق

مسیر جنوبی خورشید

ابتدای زمستان در نیم‌کره‌ی جنوبی خورشید در کمترین ارتفاع خود در آسمان است و در مسیر شمالی خود از شمال شرق طلوع و در شمال غرب غروب می‌کند. در اعتدال‌ها، مسیر مرتفع‌تر است و طلوع و غروب در نقاط شرق و غرب است. در دی ماه، خورشید به بالاترین نقطه می‌رسد و طلوع و غروب آن به سمت جنوب متمایل می‌شود.

اخترشناسی در روز


اخترشناسی رصدی در روز، به همان اندازه‌ی شب، زیبا و سرگرم‌کننده است؛ زیرا برخی جرم‌های آسمان آن‌قدر پرنورند که حتی زمانی که آسمان روشن است، دیده می‌شوند. بارزترین آن‌ها خورشید است؛ ستاره‌ی مادر ما و تنها ستاره‌ای که از زمین می‌توان جزئیات آن را به‌خوبی دید. رصد مستقیم خورشید بسیار خطرناک است. اما با استفاده از صافی‌های خورشیدی مطمئن، می‌توان تصویر آن را دید. نور شدید خورشید، دیدن سایر جرم‌های آسمانی را در روز دشوار می‌کند. اما باز هم جرم‌هایی مانند ماه و برخی سیاره‌های پرنور، دیده می‌شوند. برای برخی سیاره‌ها مانند زهره و عطارد رصد در روز گاهی حتی فوایدی دارد که دیدن آن‌ها در شب ندارد.

رصد خورشید

یکی از نشانه‌های فعالیت‌های خورشیدی، تغییر شکل لکه‌هاست. برای ثبت این تغییرات، دایره‌ای بر صفحه‌ی کاغذ بکشید و آن را هر روز روی مقوا بچسبانید. تصویر خورشید را روی دایره بیندازید و مکان لکه‌ها و مشعل‌هایی را که دیده می‌شوند، علامت بزنید.

تصویر خورشید بر صفحه

برای رصد خورشید، تصویر آن را به کمک دوربینی دوچشمی یا تلسکوپ با بزرگ‌نمایی کم، روی مقوایی بیندازید. ابزار را به سمت خورشید بگیرید و آن‌قدر آن را جابه‌جا کنید تا قرصی از نور روی صفحه پدیدار شود. ابزار خود را، تا جایی که تصویر دقیق خورشید به‌دست بیاید، کانونی کنید. اگر می‌خواهید تصویر بزرگ‌تر، اما خیلی کم‌نورتر نشود، فاصله‌ی صفحه تا ابزار را بیش‌تر کنید.



هر لکه از ناحیه‌ی درونی تیره‌ای به نام سایه، تشکیل شده است که بخش روشن‌تری به نام نیمه‌سایه اطراف آن را گرفته است.

دنبال کردن لکه‌های خورشیدی

ثبت روزانه‌ی مکان لکه‌ها، مسیر جابه‌جایی آن‌ها را روی خورشید نشان می‌دهد؛ زیرا خورشید، درست مانند زمین، می‌چرخد. گاهی اوقات لکه‌های بزرگ بعد از حدود ۲۹ روز چرخش به جای اول خود بازمی‌گردند؛ اما بیش‌تر لکه‌ها، در طی مسیر تغییر شکل می‌دهند و از بین می‌روند. لکه‌های بزرگ معمولاً جفت دیده می‌شوند که خط اتصال آن‌ها موازی استوای خورشید است.



لبه‌ی خورشید، تیره‌تر از مناطق مرکزی آن است. به این پدیده که در تمام ستارها وجود دارد، تاریکی لبه می‌گویند.

مشعل‌ها، مناطق روشنی هستند که معمولاً در نزدیکی لبه دیده می‌شوند.

لکه‌های خورشیدی مناطق تیره‌ای هستند که میدان‌های مغناطیسی خورشید اجاز می‌رسیدن گرمای جریان همرفتی گز لایمهای زیرین را به آن‌جا نمی‌دهد.



تصویر خورشید نیمگرفته (کسوف جزئی) که از روزنهای پارچهای توری روی کلاه انداخته شده است.

تصویر خورشید از روزنه‌های کوچک
تصویر خورشید را با عبور دادن نور آن از درون روزنه‌ای کوچک، مانند روزنه‌ی اتاق تاریک نیز، می‌توانید ببینید. این روش بیش‌تر برای رصد خورشیدگرفتگی‌های جزئی مناسب است تا لکه‌هایی که آن‌قدر کوچک‌اند که دیده نمی‌شوند. با دور کردن صفحه‌ی نمایش از روزنه‌ها تا حداقل یک متر، از روزنه‌ای با هر شکل، چه روزنه‌های بین شاخ و برگ درختان یا روزنه‌های کلاه حصیری یا حتی رنده‌ی آشپزخانه، می‌توانید تصویر خورشید را ببینید.

مراقب باشید

- هیچ‌گاه با چشم غیر مسلح، مستقیم به خورشید نگاه نکنید و با دوربین دوچشمی و تلسکوپ به نزدیکی آن نیز نگاه نکنید. حتی یک نگاه کوتاه به خورشید ممکن است آسیبی جدی به دید شما وارد کند.
- برای رصد خورشید، از روش انداختن تصویر آن روی صفحه استفاده کنید. اگر از تلسکوپ استفاده می‌کنید، دهانه‌ی منظر میاب یا جوینده‌ی آن را ببندید تا نوری از آن بر شما نیفتد.
- مراقب صافی‌های خورشیدی، که با تلسکوپ فروخته می‌شوند، باشید. آن‌هایی که به پشت چشمی نصب می‌شوند، ایمن نیستند. امکان دارد گرمای خورشید به آن‌ها آسیب بزند. از صافی‌های خورشیدی ایمنی استفاده کنید که بر سر دهانه‌ی تلسکوپ نصب می‌شوند.



بازتاب خورشید بر آب

خورشید پیش از غروب



رنگ خورشید

معمولاً خورشید به رنگ زرد توصیف می‌شود؛ اما در حقیقت، سفید خالص است. جو زمین طول موج‌های آبی طیف خورشید را پخش می‌کند و زرد و سرخ را بیش‌تر عبور می‌دهد. به علاوه، معمولاً هنگامی به آن نگاه می‌کنیم که نور خورشید با ابرها کم شده است یا در نزدیکی افق قرار دارد. در این زمان نیز نور بیش‌تر زردرنگ می‌شود. خورشید در فضا کاملاً سفید به چشم می‌آید و در زمین نیز بازتاب نور خورشید از آب، رنگ حقیقی سفید آن را به‌خوبی نشان می‌دهد.

زهره در آسمان شامگاهی




ستاره‌ها و سیاره‌ها

ستاره‌ها و سیاره‌های بسیار پرنور، در نور روز نیز با تلسکوپ و دوربین دوچشمی دیده می‌شوند؛ اما یافتن آن‌ها کمی دشوار است. مواظب باشید به اشتباه به خورشید نگاه نکنید. رصدگران تلسکوپی سیاره زهره و عطارد، ترجیح می‌دهند در طی روز یا هنگام عصر به آن‌ها نگاه کنند، زیرا در آن زمان ارتفاع بیش‌تری دارند و جو، نور آن‌ها را کمتر آشفته می‌کند.

بیش‌تر بدانیم

ماه ۱۱۰، جو زهره ۱۲۸
درون خورشید ۱۷۴
سطح خورشید ۱۷۶
گرفت‌های خورشید ۱۸۰



ماه در روز

دیدن ماه در آسمان روز، به‌خصوص هنگامی که در صورت‌های درخشان بین تریب تا بدر قرار دارد، معمولاً ساده است. پیش از زمان ماه کامل، در بعد از ظهر، در افق شرق و جنوب شرقی به دنبال آن بگردید (در نیم‌کره‌ی جنوبی، در افق شرق و شمال شرق) و در صبح‌هنگام، پس از زمان ماه کامل، در افق غرب یا جنوب غربی به دنبالش باشید (در نیم‌کره‌ی جنوبی، در افق غرب و شمال غربی). در نیم‌کره‌ی شمالی ماه در شب‌های زمستان یا صبح‌دم و عصر هنگام ارتفاع بیش‌تری از تابستان دارد. برخی رصدگران باتجربه صورت‌های کم‌نور ماه، یعنی هلال‌های باریک را در آسمان شفاف با چشم یا ابزار رصدی در روز روشن جست‌وجو می‌کنند.

آمادگی برای رصد

وضعیت دید خوب

برخی شب‌ها، شب‌های مناسبی برای دیدن ستاره‌ها و جرم‌های ژرفای آسمان است و برخی دیگر مناسب رصد سیاره‌هاست. عصرهایی که باد آمده و هوا بسیار تمیز و شفاف است، معمولاً هوای آشفته‌ای داریم که برای رصد جزئیات سیاره‌ها مناسب نیست. اما آسمان تاریک برای یافتن سحابی‌های کم‌نور مناسب است. وضعیت بدون باد برای بررسی ماه و سیاره‌ها مناسب است.

هرچه ستاره‌های کم‌نور
بیشتر دیده شود، شفافیت و
تاریکی آسمان بیشتر است.



لوازم ضروری

رصدگران خوب از آنچه می‌بینند، یادداشت برمی‌دارند. هر دقتی مناسب است. اما صفحات بدون خط برای طراحی مناسب‌تر است. برای هر رصد، زمان، روز، سال، مکان، وضعیت آب و هوا و به‌خصوص مه و ابر را ثبت کنید. اگر زمانتان به زمان تابستانی است، آن را یادداشت کنید. مشخصات ابزاری که از آن استفاده می‌کنید، مانند تلسکوپ یا دوربین دوچشمی را هم یادداشت کنید. برای خواندن نقشه‌های ستاره‌ای یا نوشتن یادداشت، از چراغ قوه‌ای با نور قرمز استفاده کنید. نور قرمز از توانایی دید چشمان شما در شب نمی‌کاهد.

فهرست وسایل


- لباس گرم و از جمله کفش ضدآب؛
- دفتر و مداد یا خودکار؛
- ساعت دقیق؛
- چراغ قوه با نور قرمز؛
- دوربین دوچشمی یا تلسکوپ؛
- وسیله‌ای برای نشستن؛
- نقشه‌های ستاره‌ای؛
- یک میز کوچک (برای گذاشتن وسایل روی آن).



دفتر یادداشت


شمال و جنوب

پیش از رصد باید جهت‌های جغرافیایی اطراف خود را بدانید. خورشید در هنگام ظهر رو به جنوب است (رو به شمال در نیم‌کره‌ی جنوبی)؛ بنابراین، مکان آن را نسبت به اشیای زمینی مثل درخت‌ها به‌خاطر بسپارید تا در شب اگر ستاره‌ی قطبی نیافتید جهات را بیابید.



آلودگی نوری

شهرها نور چراغ‌های خود را در شب به آسمان می‌فرستند که آسمان را روشن می‌کند و مانع دیدن ستاره‌های کم‌نور می‌شود. رصدگران باید تا جایی که می‌توانند از شهر دور شوند و به جایی برسند که هیچ نور مستقیمی در آنجا وجود نداشته باشد. البته اگر ماه کامل باشد، حتی ساکنان روستاها نیز برای دیدن ستاره‌های کم‌نور وضعیت مشکلی دارند.



چراغ قوه با پوشش قرمز



نور چراغ‌قوه‌ی خود را قرمز کنید. می‌توانید طلق قرمز رنگی روی شیشه‌ی چراغ‌قوه نصب یا از چراغ‌های کوچک و قرمز LED استفاده کنید.

پیش از رفتن به رصد، دفتر خود را به بخش‌های متفاوتی برای یادداشت‌های گوناگون تقسیم‌بندی کنید.

نکته‌های رصدی


• تقریباً ۳۰ دقیقه طول می‌کشد تا چشم‌ان شما کاملاً به تاریکی عادت کند و به بهترین دید شب برسد. برخی انواع نورها برای دید شب زیان‌آورند؛ مانند نورهای فلونورسنت و صفحه‌های نمایش تلویزیون و رایانه. سعی کنید در شب رصد از نگاه کردن به آن‌ها بپرهیزید.

• زمانی که بیرون هستید، فقط از نور قرمز استفاده کنید و اعضای خانواده را راضی کنید که چراغ‌های مزاحم خانه را روشن نکنند.

• اگر نورهای بیرون مزاحم هستند، سایه‌بان موقتی برای آن‌ها درست کنید. مثل گونی یا پارچه‌ای ضخیم که روی نردبانی انداخته‌اید و در مقابل نور مزاحم گذاشته‌اید.

جبار در نیم‌کره‌ی شمالی

به سبب چرخش زمین، ستاره‌ها و سیاره‌ها در طول شب در آسمان حرکت ظاهری می‌کنند. صورت فلکی جبار صورت فلکی بارز آسمان زمستان است که از شرق، در حالی که کمی کج است، طلوع می‌کند. سپس در جنوب به بیش‌ترین ارتفاع می‌رسد و در جهت دیگر کج می‌شود و در غرب پشت افق غروب می‌کند.



جبار در نیم‌کره شمالی


نشانه‌ای در آسمان

زمانی که جبار در آسمان است، راهنمای خوبی برای شناختن صورت‌های فلکی دیگر و آسمان منطقه است. مردم در نیم‌کره‌ی شمالی آن را به صورت شکارچی ایستاده می‌بینند؛ در حالی که از نیم‌کره‌ی جنوبی وارونه دیده می‌شود.



جبار در نیم‌کره‌ی جنوبی

در نیم‌کره‌ی جنوبی، جبار در تابستان دیده می‌شود. چرخش زمین موجب می‌شود این صورت فلکی از شرق طلوع کند، در شمال به مرتفع‌ترین نقطه‌ی خود برسد و سپس در غرب غروب کند. مانند دیگر جرم‌ها و ستاره‌ها در نیم‌کره‌ی جنوبی، به‌نظر می‌رسد جبار از راست به چپ حرکت می‌کند؛ برعکس حرکت آن‌ها در نیم‌کره‌ی شمالی.



زحل در آسمان شب

در جست‌وجوی سیاره‌ها

سیاره‌ها، مانند زحل، در این تصویر همیشه نزدیک دایره‌البروج، مسیر ظاهری سالانه‌ی خورشید در آسمان، دیده می‌شوند. اگر ستاره‌ی درخشانی دیدید که در نقشه نبود، احتمالاً سیاره است. از جدول‌های رصدی سیاره‌ها، نقشه‌های آسمان در ماه‌نامه‌ی نجوم و از نرم‌افزارهای آسمان‌نما جای آن‌ها را در هر زمان بیابید. توجه داشته باشید که زهره همواره در آسمان شامگاهی، در غرب، یا در آسمان صبحگاهی، در شرق، دیده می‌شود و عطارد نیز ممکن است پایین‌تر از آن و لب افق دیده شود.



سیاره‌ها را کجا بیابیم؟

سال	سیاره	فصل / ماه	مکان سیاره
۱۳۸۹	زهره	فروردین تا مهر	شامگاهی
۱۳۸۹	زهره	آبان تا اسفند	صبحگاهی
۱۳۸۹	مریخ	فروردین تا تیر	خرچنگ و اسد
۱۳۸۹	مریخ	مرداد تا مهر	سنبله و میزان
۱۳۸۹	مریخ	آبان تا دی	عقرب، مارافسای و قوس
۱۳۸۹	مریخ	دی تا اسفند	جدی و دلو
۱۳۸۹	مشتری	سراسر سال	دلو و حوت
۱۳۸۹	زحل	سراسر سال	سنبله
۱۳۹۰	زهره	فروردین تا تیر	صبحگاهی
۱۳۹۰	زهره	مهر تا اسفند	شامگاهی
۱۳۹۰	مریخ	فروردین تا خرداد	حوت و حمل
۱۳۹۰	مریخ	خرداد تا شهریور	ثور و جوزا
۱۳۹۰	مریخ	مهر تا اسفند	خرچنگ و اسد
۱۳۹۰	مشتری	فروردین تا خرداد	حوت
۱۳۹۰	مشتری	تیر تا اسفند	حمل
۱۳۹۰	زحل	سراسر سال	سنبله
۱۳۹۱	زهره	فروردین تا خرداد	شامگاهی
۱۳۹۱	زهره	خرداد تا اسفند	صبحگاهی
۱۳۹۱	مریخ	فروردین تا شهریور	اسد و سنبله
۱۳۹۱	مریخ	شهریور و مهر	میزان و عقرب
۱۳۹۱	مریخ	آبان و آذر	مارافسای و قوس
۱۳۹۱	مریخ	دی تا اسفند	جدی و دلو
۱۳۹۱	مشتری	فروردین و اردیبهشت	حمل
۱۳۹۱	مشتری	خرداد تا اسفند	ثور
۱۳۹۱	زحل	فروردین تا آذر	سنبله
۱۳۹۱	زحل	آذر تا اسفند	میزان
۱۳۹۲	زهره	فروردین تا دی	شامگاهی
۱۳۹۲	زهره	دی تا اسفند	صبحگاهی
۱۳۹۲	مریخ	فروردین و اردیبهشت	حوت و حمل
۱۳۹۲	مریخ	خرداد تا مرداد	ثور و جوزا
۱۳۹۲	مریخ	شهریور تا آبان	سرطان و اسد
۱۳۹۲	مریخ	آذر تا اسفند	سنبله
۱۳۹۲	مشتری	فروردین تا خرداد	ثور
۱۳۹۲	مشتری	تیر تا اسفند	جوزا
۱۳۹۲	زحل	فروردین تا مهر	بین جوزا و میزان
۱۳۹۲	زحل	آبان تا اسفند	میزان

بیش‌تر بدانیم

زمین چرخان ۲۴۲
نقشه‌برداری از آسمان شب ۲۷۰
نقشه‌های آسمان قطبی ۲۷۲



نقشه برداری از آسمان شب

کره‌ی آسمان

ستاره‌ها در جهت‌ها و فاصله‌های گوناگون در آسمان پراکنده‌اند. اما برای شناخت بهتر آن‌ها، ستاره‌ها را روی کره‌ی بسیار بزرگی به نام کره‌ی آسمان در نظر می‌گیریم که زمین در مرکز آن است. تصویر قطب شمال و جنوب و استوای زمین بر کره‌ی آسمان، قطب‌ها و استوای آسمان را به وجود می‌آورند. خطوط مختصاتی روی این کره تصور می‌شود که به اخترشناسان کمک می‌کند مکان ستاره‌ها را ساده‌تر بیابند.


به همان اندازه که نقشه‌ی زمین برای گردش‌گران و مسافران کارآمد است، نقشه‌ی آسمان نیز برای اخترشناسان اهمیت دارد. در آسمان حتی دستگاه مختصات مانند طول و عرض جغرافیایی زمین وجود دارد. راه‌های دیگری نیز برای شناخت آسمان هست؛ از جمله روش‌هایی مانند شناخت صورت‌های فلکی که از چند هزار سال پیش از آن‌ها استفاده می‌شده است. دانستن مکان این آرایش‌ها و شکل‌های ستاره‌ای، آسمان را از مجموعه درهمی از ستاره‌ها به مکانی آشنا تبدیل می‌کند؛ مانند کسی که کشورها را در نقشه‌ی زمین می‌شناسد.

کره‌ی آسمان




منظره‌ی آسمان در عرض‌های گوناگون جغرافیایی

با چرخش زمین، به نظر می‌رسد آسمان در جهت مخالف می‌چرخد. به جز در قطب‌ها، ستاره‌ها بسته به عرض جغرافیایی رصدگر، با زاویه‌ی مشخصی طلوع و غروب می‌کنند. برای رصدگری در استوا، همه‌ی آسمان در طی چهار فصل قابل مشاهده است؛ اما در سایر عرض‌های جغرافیایی همواره بخشی از آسمان پنهان است.



نقشه‌های ستاره‌ای

کره‌ی آسمان، گنبد دواری است که اطراف ما کشیده شده است؛ اما نقشه تخت است. تصویر کردن سطحی کروی روی نقشه‌ای تخت به این معناست که مکان برخی از ستاره‌ها کمی جابه‌جا می‌شود. برای این‌که جابه‌جایی به کمترین مقدار خود برسد، آسمان به چند بخش تقسیم می‌شود؛ مانند پوست کندن یک پرتقال و چسباندن تکه‌های پوست آن روی سطحی تخت.



دایرة البروج


مسیری که خورشید در آسمان می‌پیماید، دایرة البروج یا دایره‌ی برج‌ها نام دارد این دایره تصویر مدار زمین بر کره‌ی آسمان است. این مسیر با استوای آسمان ۲۳ درجه زاویه دارد؛ زیرا استوای زمین با صفحه‌ی مداری سیاره‌ی ما این زاویه را دارد. مسیر حرکت سیاره‌ها و ماه نیز در نزدیکی دایرة البروج قرار دارد.

مختصات سماوی

معادل عرض جغرافیایی در آسمان، میل نام دارد (میل در شمال استوای آسمان مثبت و جنوب آن منفی است). معادل طول جغرافیایی بُعد نام دارد و با ساعت، دقیقه و ثانیه بیان می‌شود. نصف‌النهار مبدأ سنجش آن دایره‌ای است که از دو قطب آسمان و نقطه‌ی اعتدال بهاری (محل قرارگیری خورشید در آغاز سال) می‌گذرد.

صورت‌های فلکی

صورت فلکی، چیدمان و شکل مشخصی از ستاره‌ها در آسمان است. کل آسمان به ۸۸ صورت فلکی تقسیم شده است. هیچ ارتباط واقعی بین اعضای یک صورت فلکی وجود ندارد. مثلاً ۵ ستاره اصلی صورت فلکی ذات‌الکرسی هریک در فاصله‌های گوناگونی و در جایی از فضا قرار دارند و هیچ‌یک نزدیک دیگری نیست. خطوطی که در نقشه‌های ستاره‌ای، ستاره‌ها را به هم وصل کرده، خطوطی فرضی برای کمک به تشخیص صورت‌های فلکی و شکل افسانه‌ای آن‌هاست.




ذات‌الکرسی

ستاره‌های صورت فلکی

ممکن است ستاره‌های اصلی و پر نورتر هر صورت فلکی، اسامی خاصی داشته باشند. اما علاوه بر آن، حروف یونانی هم بر آن‌ها گذاشته می‌شود که از آلفا برای پر نورترین ستاره تا امگا برای ستاره‌ی کم‌نور ادامه دارد. پس از حرف یونانی، نام صورت فلکی هم گفته می‌شود؛ آلفا - ذات‌الکرسی به معنای آلفای ذات‌الکرسی است. با شناخت ستاره‌های بیش‌تری در هر صورت فلکی، ۲۴ حرف الفبای یونانی برای نام‌گذاری همه کافی نبود و ستاره‌ها با عدد یا با بعد و میل هم فهرست شدند.



مکان حقیقی ستاره‌های ذات‌الکرسی



منطقه البروج

منطقه البروج

صورت‌های فلکی که روی دایره البروج قرار دارند، میزبان خورشید، ماه و سیاره‌ها هستند. این صورت‌ها در زمان‌های گذشته جایگاه خاصی داشتند. نام آن‌ها صورت‌های فلکی منطقه البروجی یا برج‌های فلکی است. از گذشته و به شکل نمادین ۱۲ صورت فلکی در منطقه البروج قرار دارد. اما بنا بر تقسیم‌بندی‌های جدید، دایره البروج از میان صورت فلکی سیزدهم نیز عبور می‌کند که مارافسای است.



دب اکبر یا خرس بزرگ، نشان‌دهنده‌ی شکل خرسی با دمی بلند است که ستارگان اصلی آن بیش‌تر شبیه به ملاقات‌های بزرگ هستند. شکل ستاره‌های مور فلکی به‌قدرت به نام آن‌ها شبیه است.

قنطورس، موجودی برگرفته از اساطیر یونان است که نیمی از بدن آن انسان و نیمی دیگر اسب است. دو ستاره‌ی پر نور به نام‌های آلفا - قنطورس یا رجل قنطورس و بتا - قنطورس یا حصار در این صورت فلکی قرار دارد. در میان ستاره‌های پر نور آسمان، آلفا - قنطورس نزدیک‌ترین ستاره به ما است.

نام‌گذاری صورت‌های فلکی

نام برخی از صورت‌های فلکی به هراوان سال پیش بازمی‌گردد. آن‌هایی که امروز نیز استفاده می‌شوند، بیش‌تر از رصدگران یونانی گرفته شده است که برگرفته از شخصیت‌های اسطوره‌ای آن‌هاست، مانند هرکول (جانی). اما برخی نام‌ها نیز، به خصوص در نیم‌کره‌ی جنوبی، جدیدترند.

تماشای صورت‌های فلکی

نام	بهترین ماه	مکان
حمل	آبان	۶۰ درجه‌ی جنوبی - ۹۰ درجه‌ی شمالی
ثور (گاو)	آذر	۶۰ درجه‌ی جنوبی - ۹۰ درجه‌ی شمالی
جوزا (دوپیگر)	دی	۶۰ درجه‌ی جنوبی - ۹۰ درجه‌ی شمالی
خرچنگ (سرطان)	بهمن	۶۰ درجه‌ی جنوبی - ۹۰ درجه‌ی شمالی
اسد (شیر)	فروردین	۸۰ درجه‌ی جنوبی - ۸۰ درجه‌ی شمالی
سنبله	اردیبهشت	۹۰ درجه‌ی جنوبی - ۸۰ درجه‌ی شمالی
میزان (ترازو)	خرداد	۹۰ درجه‌ی جنوبی - ۷۰ درجه‌ی شمالی
عقرب	تیر	۹۰ درجه‌ی جنوبی - ۵۰ درجه‌ی شمالی
قوس	تیر	۹۰ درجه‌ی جنوبی - ۵۰ درجه‌ی شمالی
جدی	شهریور	۹۰ درجه‌ی جنوبی - ۶۰ درجه‌ی شمالی
دلو	مهر	۸۰ درجه‌ی جنوبی - ۶۰ درجه‌ی شمالی
حوت (ماهی)	آبان	۶۰ درجه‌ی جنوبی - ۹۰ درجه‌ی شمالی
جتار (شکارچی)	دی	۸۰ درجه‌ی جنوبی - ۷۰ درجه‌ی شمالی
صلیب جنوبی	بیش‌تر سال (بهمن)	۹۰ درجه‌ی جنوبی - ۲۵ درجه‌ی شمالی
دب اکبر	بیش‌تر سال (بهمن)	۲۵ درجه‌ی جنوبی - ۹۰ درجه‌ی شمالی
قنطورس	بهمن	۹۰ درجه‌ی جنوبی - ۲۵ درجه‌ی شمالی

بیش‌تر بدانیم


زمین چرخان ۲۴۲، مدار زمین ۲۴۴، نقشه‌های آسمان قطبی ۲۷۲

نقشه‌های آسمان قطبی

جلوه‌های آسمان شمالی

۷ ستاره‌ی اصلی صورت فلکی دب اکبر، شکل بارزی به شکل یک ملاقه دارند. دو ستاره‌ی سر ملاقه، دُبه و مِراق‌اند که به سوی ستاره‌ی قطبی یا جُدی اشاره می‌کنند که هر شب تقریباً در جای ثابتی قرار دارد. در سوی دیگر ستاره‌ی قطبی، ذات‌الکرسی با شکل W مانند خود قرار دارد و ستاره‌های برساوش در کنار آن هستند. بین این دو صورت فلکی خوشه‌ی زیبای دوتایی قرار دارد.

این نقشه‌ها، ستاره‌هایی را که تقریباً در تمام طول سال در نیم‌کره‌های شمالی و جنوبی دیده می‌شوند، نشان می‌دهد. مکان جرم‌های بارز و زیبای آسمان، مانند خوشه‌های ستاره‌ای و کهکشان‌ها نیز روی این نقشه‌ها مشخص است. برای استفاده از نقشه در نیم‌کره‌ی شمالی، رو به شمال و در نیم‌کره‌ی جنوبی، رو به جنوب بایستید. نقشه را بچرخانید تا ماهی که در آن هستید، رو به بالا باشد. آن‌چه در نقشه می‌بینید، منظره‌ی آسمان در حدود ساعت ۱۰ شب است (در تابستان، ساعت ۱۱ شب). اگر زودتر از ۱۰ شب رصد می‌کنید، برای هر ساعت پیش از ۱۰ شب در نیم‌کره‌ی شمالی، نقشه را ۱ ساعت در جهت عقربه‌ی ساعت و در نیم‌کره‌ی جنوبی، برخلاف جهت عقربه‌ی ساعت بچرخانید. توجه داشته باشید که ممکن است در منظره‌ی پایین نقشه‌ی هر ماه، به سبب عرض جغرافیایی کمتر محل رصد شما یا به دلیل موانعی در افق دید، بخشی از ستاره‌های نزدیک افق دیده نشود.



ستاره‌ی درخشان عیوق در اربهران، دو ستاره‌ی غول زرد است. آن‌ها چنان به هم نزدیک‌اند که یکی دیده می‌شوند.

میل، معادل عرض جغرافیایی زمین در آسمان است که با خطوط دایره‌ای نشان داده می‌شود. میل بر حسب درجه است.

بعد، معادل طول جغرافیایی زمین در آسمان است که در این‌جا با خطوط صافی که از مرکز می‌گذرند، نشان داده می‌شود. خطوط میل مانند نصف‌النهار در زمین، دایره‌هایی روی کره‌ی آسمان هستند که از دو قطب آسمان عمود بر استوای آن می‌گذرند. آسمان به ۲۴ ساعت بعد تقسیم شده است.

دو خوشه‌ی ستاره‌ای باز که با چشم غیر مسلح نیز در آسمان تاریک مانند ابری کوچک دیده می‌شوند، خوشه‌ی دوتایی را بوجود می‌آورند.

صورت‌های فلکی

ابتدا صورت فلکی فقط آرایش و شکل مشخصی از تعدادی ستاره بود که نامی، اغلب اسطوره‌ای، بر آن می‌گذاشتند. در سال ۱۹۳۰، اخترشناسان آسمان را مانند کشورهای زمین، بر اساس صورت‌های فلکی رسم شده، به ۸۸ ناحیه تقسیم کردند که هریک قلمرو صورت فلکی خاصی است و هیچ ناحیه‌ای در آسمان خالی نمانده است. اکنون نام یک صورت فلکی، علاوه بر ستاره‌هایی که آن شکل خاص را کنار هم تشکیل داده‌اند، به همه‌ی ناحیه آن صورت فلکی داده می‌شود.




ستاره‌های دور قطبی

برای هر عرض جغرافیایی، ستاره‌هایی که هرگز طلوع و غروب نمی‌کنند، دور قطبی نام دارند. با آن‌که این ستاره‌ها همیشه در آسمان و نزدیک به قطب شمال یا جنوب آسمان هستند، مکان آن‌ها دور نقطه‌ی قطب آسمان همواره در حال تغییر است. با چرخش زمین (۱۵ درجه در هر ساعت) ستاره‌ها نیز به همان اندازه در آسمان جابه‌جا می‌شوند. ستاره‌های دور قطبی آسمان، بنا بر فاصله از استوا، تغییر می‌کنند. در قطب‌های زمین همه‌ی ستاره‌ها دور قطبی‌اند؛ در استوا، همه‌ی ستاره‌ها طلوع و غروب دارند. عدد هر عرض جغرافیایی روی زمین همان زاویه‌ی ارتفاع ستاره‌ی قطبی در آن محل است و محدوده‌ی ستاره‌های دور قطبی را نشان می‌دهد. مثلاً عرض جغرافیایی تهران حدود ۳۵ درجه است. در نتیجه ستاره‌ی قطبی نیز در همین ارتفاع از افق است و تا فاصله‌ی ۳۵ درجه‌ای آن ستاره‌ها دور قطبی به‌شمار می‌آیند.

جلوه‌های آسمان جنوبی

بازرترین عضو آسمان جنوبی، صلیب جنوبی است که از ۵ ستاره درخشان تشکیل شده است. اگر خطی را که ستاره‌ی نثر نیمیم (پرنورترین) را به گاما - صلیب جنوبی وصل می‌کند، ادامه دهید به قطب جنوب آسمان می‌رسید که در مرکز نقشه قرار دارد. دو ستاره‌ی درخشان آلفا - قنطورس و خصار (بتا - قنطورس) راهنمای یافتن صلیب جنوبی هستند.

موقعیات




صلیب جنوبی کوچکترین صورت فلکی آسمان، اما از بازترین آن‌ها نیز هست. ستاره‌های اصلی آن روی پرچم استرالیا و زلاندنو کشیده شده‌اند.

گردونه‌ی آسمان



ستاره‌های قابل مشاهده در آسمان، با توجه به زمان و مکان رصد.

آلفا - قنطورس در فاصله‌ی ۴۳ سال نوری، نزدیکترین ستاره‌ی درخشان به خورشید است. حتی یک تلسکوپ کوچک هم نشان می‌دهد که ستاره‌های دوتایی است.



نقشه‌ی آسمان قطب جنوب

ایرهای بزرگ و کوچک ماژلان، کهکشان‌هایی‌اند که دور راه شیری می‌گردند. هر دو کهکشان اقماری، با چشم غیر مسلح دیده می‌شوند؛ اما با دوربین‌های دوچشمی می‌توانید خوشه‌های ستاره‌ای و سحابی‌های درون آن‌ها را نیز ببینید.

پروین جنوبی


این خوشه‌ی ستاره‌ای باز به نام IC۲۶۰۲ به آسانی با چشم غیر مسلح دیده می‌شود. گاه به سبب شباهت به خوشه‌ی پروین، پروین جنوبی نامیده می‌شود. این خوشه حدود ۳۰ ستاره‌ی اصلی دارد که ۸ تای آن‌ها پرنورتر از قدر ۶ هستند.

استفاده از گردونه‌های آسمان

گردونه، نقشه‌ی ستاره‌ای دایره‌ای با پوششی طلوعی روی آن است که منظره‌ی آسمان را، در هر زمان که بخواهید، نشان می‌دهد. اگر آن را بالای سر خود، رو به آسمان، نگاه دارید، ستاره‌های قابل مشاهده در آسمان را نشان می‌دهد. گردونه‌ی آسمان برای عرض جغرافیایی خاصی طراحی می‌شود؛ بنابراین پیش از خرید گردونه مطمئن شوید که برای عرض جغرافیایی شما مناسب است.

زاویه‌سنجی در آسمان

برای اندازه‌گیری فاصله‌ها در آسمان و مقایسه‌ی نقشه‌ها با آسمان حقیقی، می‌توانیم از انگشتان دست‌هایمان استفاده کنیم. یک دایره‌ی کامل، که شما در مرکز آن ایستاده‌اید ۳۶۰ درجه است. بازوی خود را کاملاً بکشید و در امتداد نگاه خود قرار دهید. در این حالت، پهنای انگشت نشانه‌ی شما حدود ۱ درجه از آسمان را می‌پوشاند که ۲ برابر اندازه‌ی ماه کامل است. پنجه‌ی بسته حدود ۱۰ درجه، به اندازه‌ی کاسه‌ی ملاقی دب اکبر و پنجه‌ی باز برابر مربع فرس اعظم (اسب بالدار)، حدود ۱۶ تا ۲۰ درجه است.



بیشتر بدانیم

- اندازه‌های ستاره‌ها ۱۸۲
- آمادگی برای رصد ۲۶۸
- نقشه‌برداری از آسمان شب ۲۷۰
- نقشه‌های آسمان قطبی ۲۷۲
- اخترشناسی با دوربین دوچشمی ۲۸۸

آسمان نیم کره‌ی شمالی در تابستان و پاییز

جلوه‌های پاییزی

مربع بزرگ اسب بال‌دار یا فرس اعظم، راهنمای مناسبی در آسمان است. با آن که ۴ ستاره‌ی آن چندان پر نور نیستند، چون ستاره‌های کمی در اطراف آن‌هاست، به سادگی پیدا می‌شوند به کمک یکی از گوشه‌های آن، می‌توانید مسلسله را بیابید. که ستاره‌ی مشترکی با مربع بزرگ دارد. راس‌المسلسله، ستاره‌ی بالای چپ مربع، در حقیقت ستاره‌ی صورت فلکی مسلسله است. ضلع راست مربع به سوی پایین (جنوب) به ستاره‌ی پر نور فم‌الحوت در نزدیکی افق می‌رسد و خطی که ستاره‌ی بالای چپ مربع را به ستاره‌ی پایین راست آن وصل می‌کند، به سمت مجموعه‌ای از ستاره‌های پیکان‌مانند در صورت فلکی دلو یا آب‌بریر اشاره دارد.


نقشه‌های نیم کره‌ی شمالی، آسمان را برای رصدگری که رو به جنوب ایستاده است، نشان می‌دهد. نقشه‌ی ماهی را که در آن هستید، انتخاب کنید. نقشه، آسمان شب آن تاریخ را در حدود ساعت ۱۰ شب (در تابستان ساعت ۱۱ شب) نشان می‌دهد. ستاره‌هایی که غرب‌ترند، زودتر و ستاره‌های شرق‌تر کمی دیرتر دیده می‌شوند. ستاره‌های نزدیک به پایین نقشه در افق و آن‌هایی که در بالا قرار دارند، تقریباً در سراسر دیده می‌شوند. این نقشه برای عرض جغرافیایی حدود ۴۰ درجه‌ی شمالی است و در عرض‌های جنوبی‌تر، مانند نیمه‌ی جنوبی ایران، ستاره‌های پایین نقشه ارتفاع بیش‌تری دارند و ستاره‌های جدیدی در افق جنوب دیده می‌شوند.

نقشه‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که هم‌پوشانی می‌کنند و ستاره‌های لمبی نقشه، در نقشه‌های بعدی تکرار شده‌اند. ستاره‌های لمبی بالایی نیز در نقشه‌ی قطب شمال آسمان و ستاره‌های لمبی پایینی، در نقشه‌ی قطب جنوب آسمان تکرار شده است. اگر همگی این‌ها را کنار هم بگذارید، نقشه‌ای کامل بوجود می‌آید.

بعد، معادل طول جغرافیایی زمین، بر حسب ساعت در بالا و پایین نقشه نوشته شده است.

میل، معادل عرض جغرافیایی زمین، بر حسب درجه در دو سمت نقشه نوشته شده است.

کهکشان مسلسله یا آندرومدا دورترین جرمی است که با چشم غیر مسلح دیده می‌شود. این کهکشان در فاصله‌ی ۲/۵ میلیون سال نوری از ما قرار دارد. از ستاره‌ی راس‌المسلسله با دنبال کردن ستاره‌ها به سمت شمال شرقی، می‌توانید آن را بیابید.



خوشه‌ی کروی M15


این خوشه در ۲۰ درجه‌ای راست، در لمبی پایینی مربع بزرگ قرار دارد در دوربین‌های دوچشمی، M15 توده‌ای محو است؛ اما با تلسکوپ، تویی از انبوه ستاره دیده می‌شود

راهنما در صفحه‌ی ۲۷۲




جلوه‌های تابستانی

در این زمان در آسمانی تاریک، راه شیری به وضوح دیده می‌شود. مثلث زیبای تابستانی با ۳ ستاره‌ی پر نور ردف، نسر واقع (پرنده‌ی نشسته) و نسر طایر (پرنده‌ی در حال پرواز) در آسمان دیده می‌شود. دجاجة یا قو درون راه شیری قرار دارد و نوار باریکی به نام شکاف دجاجة، که میان دجاجة و مار قرار دارد، ستاره‌های پشت خود را پنهان می‌کند. به دنبال قوس و سیر بگردید؛ در بردیکی آن‌ها روشن‌ترین بخش نوار راه شیری قرار دارد. در جنوب، دو صورت فلکی بارر عقرب و قوس، در دو سمت راه شیری قرار دارند.



سحابی دمیل، بازمانده‌ی ستاره‌ای خورشیدمانند است که هزاران سال پیش مرده است.



سحابی دمیل

زیر دجاجة، سحابی سیاره‌نمای نسبتاً کوچک اما زیبایی قرار دارد که با دوربین دوچشمی به راحتی دیده می‌شود؛ اما گرچه رنگی از آن نخواهید دید. در تلسکوپ‌های کوچک، دو بخش روشن قرینه‌ی آن شبیه به دمیل یا ساعت شنی است.



خوشه‌ی مرغابی وحشی

این خوشه‌ی ستاره‌ای باز، در بالای سپر، با دو چشم تیزبین نیز در آسمان تاریک دیده می‌شود. تلسکوپی کوچک یا دوربین دوچشمی مناسب، نشان می‌دهد ستاره‌های آن آرایشی ۷ مانند دارند که شبیه به پرواز دسته جمعی مرغابی‌های وحشی است.

۳ ستاره‌ی پر نور، از سه صورت فلکی متفاوت: ردف در دجاجة، نسر واقع در شلیاق و نسر طایر در عقاب، مثلث تابستانی را می‌سازند.

بنا. دجاجة ستاره‌ای دوتایی است که سر دجاجة یا قو را می‌سازد. در دوربین‌های دوچشمی قوی، دو ستاره با رنگ‌های زیبای زرد و آبی تفکیک می‌شوند.

سحابی عقاب، درست زیر سر مار، در دوربین‌های دوچشمی نقطه‌ی محوی از نور است. با تلسکوپی مناسب، شکل تیره‌ای در میان سحابی می‌بینید که در عکس‌ها شبیه به عقابی با بال‌های گشوده است.

بیش‌تر بدانیم

- اندازه‌های ستاره‌ها ۱۸۲
- خوشه‌ها و دوتایی‌ها ۱۹۴
- خوشه‌های گروهی ۱۹۶
- سحابی‌های سیاره‌نما ۲۰۲
- راه شیری ۲۱۴
- نقشه‌برداری از آسمان شب ۲۷۰
- نقشه‌های آسمان قطبی ۲۷۲
- اخترشناسی با دوربین دوچشمی ۲۸۸




جلوه‌های آسمان زمستان

جبار، شکارچی آسمان، بارزترین شکل آسمانی در این زمان است. ۳ ستاره‌ی هم‌نور کمر بند جبار، به سوی ستاره‌ی دبران در نور نشانه رفته‌اند و بعد از آن به خوشه‌ی ستاره‌ای پروین می‌رسند. از سمت دیگر، یعنی به سوی جنوب شرقی نیز شباهنگ، پر نورترین ستاره‌ی آسمان را نشان می‌دهند. پیدالجوزا (شانه‌ی شکارچی)، شباهنگ و شعرای شامی (آلفا - کلب اصغر)، مثلث زمستانی را تشکیل می‌دهند. با ادامه دادن خط واصل رجل الجبار (پای شکارچی) و پیدالجوزا، به صورت فلکی جورا (دویبکر) می‌رسید. دو ستاره‌ی هم‌نور پلوکس و کاستور سر دو پیکر را نشان می‌دهند در بالای جبار نیز اربهران، با ستاره‌های درخشان عیوق و سه خوشه‌ی ستاره‌ای M۳۶، M۳۷ و M۳۸ دیده می‌شود.



موقعیت یاب



M۳۶ خوشه‌ی فشرده‌ای از ۶۰ ستاره است؛ در حالی که حدود ۱۰۰ ستاره در منطقه‌ی وسیع‌تری، M۳۸ را تشکیل می‌دهند.

خوشه‌های M۳۶ و M۳۸

M۳۶ خوشه‌ی پر نورتر است. هر دو خوشه با چشم غیر مسلح در آسمان تاریک دیده می‌شوند. به سبب نزدیکی M۳۶ و M۳۸ در اولین نگاه با چشم غیر مسلح، ممکن است دو خوشه با دنباله‌دار اشتباه شوند؛ اما در دوربین دوچشمی یا تلسکوپ کوچک، ستاره‌های آن‌ها به زیبایی تفکیک می‌شوند.



کندوی عسل

کندوی عسل، خوشه‌ی ستاره‌ای باز و پر نور در خربچنگ است که در شب‌های صاف و تاریک، با چشم غیر مسلح نیز به خوبی دیده می‌شود. منجم ایرانی، عبدالرحمن صوفی رازی، آن را حدود هزار سال پیش در کتاب راهنمای آسمان خود فهرست کرده است. با دوربین دوچشمی، منظره‌ی بی نظیری از خوشه خواهید دید که ستاره‌ها مانند انبوه زنبورهای داخل کند و به نظر می‌رسند.




خوشه‌ی M۳۵

خوشه‌ی باز M۳۵، در جوزا، با چشم برهنه دیده می‌شود. با دوربین دوچشمی برخی از ۱۲۰ ستاره‌ی آن تفکیک می‌شوند. با تلسکوپ خوشه‌ی دورتری نیز در کنار آن دیده می‌شود.

سحابی جبار، پر نورترین سحابی آسمان است. با چشم غیر مسلح، ابر کوچک مه‌آلودی است؛ اما در شبی تاریک با تلسکوپ کوچک، ابر کیهانی باشکوهی است که ۴ ستاره به شکل یک دوزنقه در مرکز آن دیده می‌شود.

بیانی‌تر بدایتیم

- جایی که ستاره‌ها متولد می‌شوند ۱۹۲
- همسایگان محلی ما ۳۱۸
- کهکشان‌ها ۲۳۰
- آمادگی برای رصد ۲۶۸
- نقشه‌برداری از آسمان شب ۲۷۰
- نقشه‌های آسمان قطبی ۲۷۲
- اخترشناسی با دوربین دوچشمی ۲۸۸



آسمان نیم کره‌ی جنوبی از شهر یورتا بهمن

نقشه‌های نیم کره‌ی جنوبی، آسمان را برای رصدگری که رو به شمال ایستاده است، نشان می‌دهد. این نقشه‌ها برای رصدگران نیم کره‌ی شمالی نیز کارآمد است. فقط کافی است که آنرا وارونه بگیرند. نقشه‌ی ماهی را که در آن هستید، انتخاب کنید. نقشه، آسمان شب آن تاریخ را در حدود ساعت ۱۰ شب (در تابستان ساعت ۱۱ شب)، نشان می‌دهد. ستاره‌هایی که غربی‌ترند، زودتر و ستاره‌های شرقی‌تر کمی دیرتر دیده می‌شوند. ستاره‌های نزدیک به پایین نقشه در افق شمال و آن‌هایی که در بالا قرار دارند، تقریباً در سراسر دیده می‌شوند. این نقشه برای عرض جغرافیایی حدود ۴۰ درجه‌ی جنوبی مناسب است و در عرض‌های نزدیک‌تر به استوا، ستاره‌های بیش‌تری از نقشه‌ی نیم کره‌ی شمالی در افق شمال پدیدار می‌شود.

جلوه‌های آسمان شهر یورتا تا آبان

پرنورترین ستاره‌ی این بخش آسمان، فم‌الحوث در حوت جنوبی است. مربع فرس اعظم یا مربع بزرگ، در آسمان شمالی است. به کمک گوشه‌های مربع، مسلسله، دلو، حوت و قیطس را بیابید. با وجود آن‌که ستاره‌های حوت کم‌نورند، گاهی با قرار گرفتن سیاره‌ی درخشانی در میان آن‌ها، بارز و دیدنی می‌شوند.


اگر در نیم کره‌ی شمالی از این دو نقشه استفاده می‌کنید، بالای سر در پایین و افق جنوب در بالا قرار می‌گیرد.



نقشه‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که هم‌پوشانی می‌کنند و ستاره‌های لبه‌ی نقشه، در نقشه‌های بعدی تکرار شده‌اند. ستاره‌های لبه‌ی بالایی نیز در نقشه‌ی قطب جنوب آسمان و ستاره‌های لبه‌ی پایینی در نقشه‌ی قطب شمال آسمان تکرار شده‌اند. اگر همگی این‌ها را کنار هم بگذارید، نقشه‌ی کاملی به‌وجود می‌آید.

بعد، معادل طول جغرافیایی زمین، بر حسب ساعت در بالا و پایین نقشه نوشته شده است.

میل، معادل عرض جغرافیایی زمین، بر حسب درجه در دو سمت نقشه نوشته شده است.



سحابی هلیکس


بزرگ‌ترین و نزدیک‌ترین سحابی سیاره‌نما، هلیکس در دلو است که با دوربین دوچشمی یا تلسکوپ، در آسمانی سیار تاریک دیده می‌شود. رنگ سرخ آن فقط در عکس‌ها ثبت می‌شود.

ککشان مثلث (M۳۳)، قرصی مه‌آلود به اندازه‌ی ماه کامل در آسمان است که با دوربین‌های دوچشمی در آسمان تاریک دیده می‌شود. این ککشان کمی از ککشان مسلسله، که در شمال شرقی آن قرار دارد، دورتر است.

راهنما در صفحه‌ی ۲۷۲

جلوه‌های آسمان آذر تا بهمن

جبار، راهنمای یافتن بسیاری از صورت‌های فلکی دیگر است. سه ستاره‌ی هم‌نور کمریند جبار، از سمت شمال شرقی به سوی شباهنگ و کلب‌اکبر و از سمت جنوب غربی به سوی دبران و ثور نشانه می‌روند. در نزدیکی دبران، خوشه‌ی ستاره‌ای به شکل V به نام قلائص قرار دارد. خوشه‌ی پروین، در غرب آن، چشم را به سوی خود جذب می‌کند؛ زیرا ستاره‌های پرنور کمی اطراف آن وجود دارد.



ستاره‌ی شباهنگ و خوشه‌ی M۴۱ (دایره) در حال طلوع بالای کوه‌های البرز

خوشه‌ی M۴۱

در جنوب شباهنگ، خوشه‌ی باز M۴۱، که با چشم غیر مسلح نیز دیده می‌شود، قرار دارد. از دید دوربین‌های دوچشمی پیداست که بسیاری از ستاره‌های آن، زنجیره‌هایی تشکیل می‌دهند. احتمالاً به این سبب که برحسب اتفاق، برخی ستاره‌های دورتر در خط دید ما، از ستاره‌های نزدیک، نزدیک‌تر دیده می‌شوند.

شباهنگ پرنورترین ستاره‌ی آسمان شب است که در فاصله‌ی ۸/۶ سال نوری از نزدیکترین ستاره‌ها نیز هست.

دوزنقه، ستاره‌ای چندتایی در قلب سحابی جبار، یعنی در سمت جنوب کمریند جبار است. سحابی با چشم غیر مسلح، توده‌ی محوی است. اما تلسکوپ ۴ ستاره را به شکل دوزنقه نشان می‌دهد که به تازگی متولد شده‌اند و اکنون سحابی را روشن می‌کنند.

یدالجوزا، نارنجی‌رنگ است؛ در حالی که سایر ستاره‌های جبار، بیشت‌ر سفید-آبی‌اند. یدالجوزا غول سرخی است که درخشندگی آن به آرامی و به‌طور نامنظم تغییر می‌کند.

سحابی خرچنگ در ثور نامش را از شکل خود گرفته است. این سحابی توده‌ی در حال انبساط بازمانده‌ی ابرنواختر درخشانی است که در سال ۱۰۵۴ میلادی دیده شد.

بیش‌تر بدانیم

- غول‌های سرخ ۲۰۰
- سحابی‌های سیارنما ۲۰۲
- ابرنواخترها ۲۰۴
- آمادگی برای رصد ۲۶۸
- نقشه‌برداری از آسمان شب ۲۷۰
- نقشه‌های آسمان قطبی ۲۷۲
- اخترشناسی یا دوربین دوچشمی ۲۸۸



جلوه‌های آسمان خرداد تا مرداد

از دید ما مرکز راه شیری در امتداد قوس قرار دارد. اما ابرهای غبار آن را از ما پنهان می‌کنند. برخی ستاره‌های اصلی قوس، شکل قوری کنار هم قرار گرفته‌اند و نوار روشن راه شیری، مانند بخاری است که از لوله‌ی قوری خارج می‌شود. غرب صورت فلکی قوس، عقرب با ستاره‌ی پرنور و سرخ قلب‌العقرب، که جای قلب عقرب است و رشته‌ای منحنی از ستاره‌ها که دم عقرب را می‌سازند، قرار دارد. راه شیری این ماه‌ها در آسمان جنوبی بسیار باشکوه‌تر از منظره‌ی آن در نیم‌کره‌ی شمالی است؛ زیرا مرکز کهکشان تا بالای سر می‌رسد و نوار راه شیری بسیار پرنورتر جلوه می‌کند.

موقعیت



سحابی مرداب

یکی از پرنورترین سحابی‌های راه شیری است که با چشم غیر مسلح نیز دیده می‌شود. نام آن به سبب رشته‌ی تیره‌ی خمیده‌ای است که در نماهای تلسکوپی درون سحابی دیده می‌شود؛ مانند مردابی درون جزیره‌ای بیابانی.



سحابی مرداب، در بخش شرقی قوس، ۵۲۰۰ سال نوری از ما فاصله دارد.

خوشه‌ی باز M۷ با چشم غیر مسلح مانند بخش روشنی از راه شیری به پهنای دو برابر اندازه‌ی کامل ماه به‌منظر می‌رسد. با دوربین‌های دوچشمی و تلسکوپ‌های کوچک، ستاره‌های بسیاری در این خوشه و خوشه‌ی باز کنار آن، M۶ (خوشه‌ی پروانه) دیده می‌شود.

قوس منطقه‌ای سرشار از جاذبه‌های آسمان است. نه تنها مرکز راه شیری در این بخش قرار دارد، بلکه در اینجا بیش از هر صورت فلکی دیگری سحابی‌های درخشان و خوشه‌های ستاره‌ای دیده می‌شود.

شکاف دجاجة نوار تاریکی است که در راه شیری دیده می‌شود. آن را ابرهای غباری در قرص کهکشان پدید می‌آورند که مقابل ستاره‌ها قرار گرفته‌اند.

سحابی حلقه بین دو ستاره‌ی هم‌طور بتا شلیاق و گاما شلیاق قرار گرفته است و شبیه شیرینی حلقه‌ای یا دونات دیده می‌شود. این سحابی سیاره‌نما نسبتاً روشن است؛ اما به سبب اندازه‌ی کوچکی که دارد، بدون تلسکوپ و بزرگنمایی مناسب به سختی دیده می‌شود.

بیش‌تر بدانیم

- خوشه‌ها و دوتایی‌ها ۱۹۴
- راه شیری ۲۱۴
- کهکشان‌ها ۲۳۰
- آمادگی برای رصد ۲۶۸
- نقشه‌برداری از آسمان شب ۲۷۰
- نقشه‌های آسمان قطبی ۲۷۲
- اخترشناسی با دوربین دوچشمی ۲۸۸



اخترشناسی غیر مسلح

یکی از لذت‌های اخترشناسی، به سادگی نگاه کردن به آسمان با چشمان غیر مسلح است. همه‌ی آنچه لازم است، اشتیاق، صبر و فقط تشخیص جرم‌های گوناگون آسمان، هم جرم‌های طبیعی و هم ساخته‌های انسان است. علاوه بر ماه، ستاره‌ها و سیاره‌ها، جرم‌های دیگری وجود دارند که گاه، مدت کوتاهی دیده می‌شوند. باید تمرین کنید آن‌ها را با دقت ببینید و آنچه را می‌بینید، ثبت کنید. رصدگران باتجربه، در مقایسه با رصدگران تازه‌کار، جرم‌ها و پدیده‌های بیش‌تری می‌بینند.

آسمان شلوغ

اگر بدانید در جست‌وجوی چه هستید، بسیاری از جرم‌های آسمان، از جمله ستاره‌ها و سیاره‌ها، از ظاهر و حرکتی که دارند، به سادگی شناسایی می‌شوند. هر جرم ناآشنایی که یافتید، زیر نظر بگیرید تا از روی حرکت و تغییر مسیر و سرعت آن تشخیص دهید که چه چیزی است. یکی از جرم‌های بسیار رایج، هواپیماست که به سادگی می‌توان آن را از سایر جرم‌ها شناخت. هواپیما چشمک می‌زند و تغییر مسیر می‌دهد. برای اطمینان بیش‌تر، به صدای آن گوش بسپارید. ممکن است در وضعیت مناسبی برای شنیدن صدای آن باشید.

شهابی نزدیک شباهنگ که در آسمان روستای ایبانه در نزدیکی نطنز در شب بارش شهاب جوزایی عکس‌برداری شده است.



رصد شهاب

رصد آماتوری شهاب‌ها بخش مهمی از نجوم رصدی است. رصدگران بارش‌های شهاب از مناطق متفاوت زمین، آسمان را در مدت زمانی مشخص، حداقل یک ساعت، زیر نظر می‌گیرند و زمان و مکان شهاب‌های پدیدار شده را ثبت می‌کنند و برخی را به مراکز بین‌المللی در این زمینه گزارش می‌دهند. دست‌اندرکاران مؤسسات بین‌المللی، این نتایج را با یک‌دیگر در میان می‌گذارند تا تصویر دقیقی از چگونگی پراکندگی ذرات سازنده‌ی شهاب‌ها در فضا به‌دست آورند.

نورهای هنگام فرود هواپیما شدیدند و ممکن است از ابرهای نازک در آسمان بازتاب شوند. اگر هواپیما در حال نزدیک شدن باشد، ممکن است این نورها تا دقایقی طولانی بدون حرکت در آسمان بمانند.

دنبالمدارهای پرنور ندارند. زمانی که پیدا می‌شوند، روزها یا هفته‌ها دیده می‌شوند و هر شب فقط اندکی در زمینه‌ی ستاره‌ها جابجا می‌شود.


ماهواره‌های بزرگ، مانند ایستگاه فضایی یا شاتل‌های فضایی، روشن‌تر از بیش‌تر ستاره‌ها هستند و چند دقیقه در آسمان در مسیر مستقیم حرکت می‌کنند.

ماهواره‌های کم‌نور، بنا بر ارتفاعشان، در عرض ۱۰ دقیقه یا بیش‌تر آسمان را طی می‌کنند.

ماهواره‌های ایریدیوم (پوشش‌دهنده‌ی تلفن‌های همراه ماهواره‌ای) آنتن‌های بسیار بازتابنده‌ای دارند که گاهی با بازتاب نور خورشید به شدت پرنور می‌شوند و پس از چند ثانیه درخش ایریدیوم ناپدید می‌شود.

زهره معمولاً در شفق و فلق، در ارتفاع کمی دیده می‌شود؛ به‌جز نزدیک به کشدگی سیاره که ممکن است تا بیش از ۴۰ درجه از افق فاصله بگیرد. عطارد اغلب پایین‌تر از زهره در لب افق یا پنهان در فروغ خورشید است.


راه شیری در شهریور



راه شیری

یکی از جذاب‌ترین مناظر با چشم غیر مسلح، پهنه‌ی راه شیری در شبی صاف و تاریک به‌دور از نور شهر است. در نیم‌کره‌ی شمالی، بخشی که در قوس و عقرب دیده می‌شود، بسیار زیباست. در نیم‌کره‌ی جنوبی، منطقه‌ی قنطورس، شاه‌تخته و بادبان ستاره‌های پرنور فراوانی دارند.

راه شیری در فروردین





ماه فزاینده



ماه تقریباً کامل

رصد ماه

ماه را در شب‌های متفاوت و طی اهله‌ی آن دنبال کنید. از هلال ماه شروع کنید. با پیش رفتن روزها، قرص ماه کامل‌تر و جزئیات بیش‌تری نمایان می‌شود. آن‌چه را

می‌بینید، طراحی کنید و سپس با نقشه‌های ماه تطبیق دهید. شما بیش‌تر دریا‌های ماه را با چشم غیر مسلح می‌بینید

ستاره‌ها و سیاره‌ها به آرامی طلوع و غروب می‌کنند و هر شب تقریباً در جایگاه ثابتی قرار دارند. جایگاه ستاره‌ها نسبت به هم ثابت است. اما سیاره‌ها به مرور بین آن‌ها جابه‌جا می‌شوند. سیاره‌های نزدیک به خورشید، یعنی عطارد و زهره، سریع‌ترین جابه‌جایی را در شب‌های متوالی دارند.


هواپیماها با نورهای قرمز و سبز روی بال‌های آن‌ها مشخص می‌شوند و بوری سفید در مرکز آن‌ها به سرعت در آسمان حرکت می‌کند و اغلب چشمک می‌زنند.

شهاب‌ها رد کوتاهی از نورند که در کسری از ثانیه می‌درخشند.


نورهای تبلیغاتی لیزر از کیلومترها دورتر، قابل مشاهده‌اند. امکان دارد بازتاب آن‌ها از ابرها، به شکل نقطه‌های نورانی سریعی دیده شود

مکان ماه بین ستاره‌ها هر شب به‌طور میانگین حدود ۱۲ درجه تغییر می‌کند.

دُم‌های کاذب، ردهایی از هواپیما هستند که پس از غروب خورشید به‌وجود می‌آیند. اگر هواپیما دور باشد، این دُم‌ها سرعت کمی دارند.



راه شیری در خرداد



راه شیری در آبان


نیم‌کره‌ی جنوبی: شامگاه‌های خرداد و تیر بهترین زمان برای رصد مناطق پرنور راه شیری در قوس و عقرب است که بالای سر قرار دارند. در اواخر پاییز دیدن نوار کهکشان دشوار می‌شود.

چه قدر کم‌نور را می‌بینید؟

قدر کم‌نورترین ستاره‌ای که در شبی رصدی، می‌بینید، حدّ قدر آسمان نام دارد. حدّ قدر با توجه به وضعیت‌های گوناگون تغییر می‌کند؛ مانند آلوده بودن یا صاف بودن هوا، وجود ماه کامل یا ماه نو و مقدار آلودگی نوری محل. در شهری بزرگ حدّ قدر حدود ۳/۵ تا ۴/۵ است. در شهر کوچک یا حاشیه‌ی شهر بزرگ، حدّ قدر به ۵ و در روستاها و بیابان‌ها به ۶ می‌رسد. برای تخمین زدن آلودگی نوری از یکی از نقشه‌های زیر استفاده کنید. زیر آسمان شب بروید و کم‌نورترین ستاره‌ی منطقه را بیابید. در این نقشه‌ها، مناطق نزدیک به استوای آسمان انتخاب شده‌اند که از هر دو نیم‌کره‌ی زمین دیده می‌شوند.

راه‌نمای قدر

A = ۳/۸	E = ۵/۳
B = ۴/۰	F = ۵/۶
C = ۴/۲	G = ۶/۲
D = ۴/۷	




طرف آب در دلو

راه‌نمای قدر

A = ۳/۴	E = ۵/۴
B = ۴/۲	F = ۶/۰
C = ۴/۳	G = ۶/۲
D = ۴/۴	

تابستان و پاییز (در نیم‌کره‌ی شمالی)، آسمان میزبان رشته‌ای از ستاره‌ها در دلو است که به طرف آب معروف است. مکان این سطل آب را بین مربع بزرگ فرس اعظم و هم‌الحوث بیابید (نقشه‌ی صفحه ۲۷۴ را ببینید).

سر شجاع



بیش‌تر بدانیم

سمت نزدیک ماه ۱۱۸
دنیاالمدارها ۱۶۲
شهاب‌ها ۱۶۴
راه شیری ۲۱۴
نقشه‌های آسمان قطبی ۲۷۲

زمستان و بهار (در نیم‌کره‌ی شمالی)، آسمان میزبان دسته‌ای از ستاره‌های صورت فلکی بزرگ شجاع است که سر شجاع گفته می‌شود. سر این مار را در کنار ستاره‌ی پرنور قلب اسد بیابید (نقشه‌های صفحه ۲۷۶ و ۲۷۷). برای سنجش حدّ قدر آسمان کم‌نورترین ستاره‌ای را که در این‌جا می‌بینید، بیابید. هنگام رصد جرم‌های کم‌نور، سعی کنید از گوشه‌ی چشم به ستاره‌ها بنگرید؛ زیرا سلول‌های خارجی از مرکز شبکیه چشم، در مقایسه با سلول‌های وسط، به نور حساسیت بیش‌تری دارند.




شفق‌های قطبی و هاله‌ها

شفق‌های قطبی در چه ارتفاعی به وجود می‌آیند؟

وقتی ذرات باد خورشیدی با میدان مغناطیسی زمین مواجه می‌شوند، جریانی از الکترون‌های شتاب گرفته ایجاد می‌کنند که در امتداد خطوط میدان مغناطیسی به قطب‌های مغناطیسی زمین (نزدیک به قطب‌های جغرافیایی) سقوط می‌کنند. در این مسیر، الکترون‌ها با جو زمین (بیش‌تر در نواحی قطبی) برخورد می‌کنند و سبب برانگیخته و درخشان شدن اتم‌های موجود در جو، به‌خصوص اکسیژن و نیتروژن، می‌شوند. این برخورد از بالاترین لایه‌های رقیق جو (ارتفاع چند صد کیلومتری) شروع می‌شود و تا ۸۰ کیلومتری زمین ادامه می‌یابد و اوج می‌گیرد. علاوه بر ساکنان روی زمین، فضانوردان نیز می‌توانند از سوی دیگر، این نورهای رنگارنگ را بر سیاره‌ی زمین ببینند.

برخی از زیباترین و رنگارنگ‌ترین مناظر آسمان، نورها و درخشش‌های نادر و اغلب جوی هستند. با آن‌که عامل بسیاری از آن‌ها اثر خورشید بر جو زمین است، برخی دیگر نیز، مانند نور منطقه‌البروجی، در مکان‌های دورتری از فضا شکل می‌گیرند. زیبایی هر یک از این مناظر، به تنهایی ستودنی است؛ اما علاوه بر آن، چنین پدیده‌هایی به دانشمندان کمک می‌کند درباره‌ی جو زمین بیش‌تر بدانند و این پدیده‌ها را از پدیده‌هایی که در فضا به وجود می‌آیند، تشخیص دهند.



تمویر ماهواره‌ای
بازسازی شده از
حلقه‌ی شفق قطبی بر
فراز جنوبگان




شفق قطبی



پرتو

شفق‌های قطبی

بورهای رنگارنگ، متحرک و گذری که شفق قطبی نام دارند، اغلب در مناطق قطبی زمین دیده می‌شوند. وقتی ذرات پراش‌زنی و باردار باد خورشیدی با قطب‌های مغناطیسی زمین برخورد می‌کنند، شفق‌ها را به وجود می‌آورند. این ذرات با برخورد به لایه‌ی بالایی جو زمین، موجب درخشیدن اتم‌های گار می‌شوند. شفق‌های قطبی مانند پرده‌های عظیمی هستند که ر آسمان، ویخته شده‌اند و به آرامی تغییر شکل می‌دهند. گاهی، اوقات، به‌خصوص زمانی که فعالیت لکه‌های خورشیدی زیاد می‌شود، در مناطق بیش‌تری از کره‌ی زمین می‌توان شفق‌ها را دید. ما دوری ایران از قطب شمال مغناطیسی، سبب می‌شود که شفق‌های قطبی در آسمان ایران پدیده‌ای بسیار نادر و دست‌کم در بین دوران محال باشند.



تاج

پرتوها و تاج‌ها

شفق‌های قطبی معمولاً از یک یا چند پرتو نور تشکیل شده‌اند که مانند نورافکن‌هایی به نظر می‌رسند که از افق شمال به سمت آسمان می‌تابند (و در نیم‌کره‌ی جنوبی از افق جنوب). گاهی شفق بزرگی بالای سر، در سراسر، دیده می‌شود که پرتوهای رنگی آن به سمت زمین، به هم می‌رسد و افق کشیده شده است. به این حالت تاج گفته می‌شود.

هاله‌ی خورشید، آن‌طور که در این عکس از آسمان تهران مشخص است، به شکل دایره‌ی بزرگی دیده می‌شود که خورشید را در بر گرفته است. این هاله، گاهی قوس‌های دیگری از نور دارد که کامل نیستند.



مناظر آسمان روز

ممکن است پدیده‌ی رنگین‌کمان در روز، مثلاً در هاله‌ی اطراف خورشید و حتی زمانی که بارانی نبوده است، دیده شود. هاله‌های خورشید زمانی به وجود می‌آیند که لایه‌ی رقیقی از ابری مرتفع در آسمان باشد. این پدیده در فصل‌های سرد بیش‌تر رخ می‌دهد اما ابرهای مرتفع، حتی در روزهای گرم نیز شکل می‌گیرند. آن‌ها معمولاً از بلورهای یخ تشکیل شده‌اند؛ زیرا دمای هوا در ارتفاعات بالا زیر دمای انجماد آب است. هنگام عبور نور خورشید از درون بلورها، نور سفید به رنگ‌های گوناگون تجزیه می‌شود؛ مانند زمانی که نور بر قطره‌های باران یا قطره‌های آب کنار فواره یا یک آبشار می‌تابد.

آن‌طور که در این عکس از آسمان تهران پیداست، هاله‌ی ماه به شکل حلقه‌ای اطراف آن دیده می‌شود.



مناظر آسمان شب


هاله‌ی ماه، مانند هاله‌ی خورشید، بر اثر شکست نور بلورهای یخ جو به وجود می‌آید. زیباترین نوع این هاله، حلقه‌ی بزرگی به شعاع $22/5^\circ$ درجه دور ماه است که گاهی در آسمان شب‌های مهتابی پدیدار می‌شود. سایر نورهای آسمانی، مانند نور منطقه‌البروجی، در ورای زمین به وجود می‌آیند. این نور محروم کم‌نوری است که در امتداد دایره‌البروج (مسیر حرکت خورشید) به وجود می‌آید و فقط زیر آسمانی تاریک دیده می‌شود. این نور حاصل از بازتاب نور خورشید از درات غبری است که در صفحه‌ی مظلومه‌ی شمسی وجود دارند. این نور پس از تاریکی آسمان در شب‌های اسفند و فروردین یا بیش از سیه‌دم در شب‌های شهریور و مهر، به سبب روه‌ی عمودی دایره‌البروج نیست به افق، بهتر از هر زمانی دیده می‌شود.

مناظر هنگام طلوع و غروب


با رسیدن نور آفتاب به جو زمین، نور آبی در جو پخش می‌شود؛ در حالی که نورهای زرد و قرمز از آن بهتر عبور می‌کنند. این پدیده هنگام غروب یا طلوع خورشید، که خورشید ارتفاع کمی دارد و نور آن باید از لایه‌های بیش‌تری از جو عبور کند، شدیدتر است. پدیده‌ی ستون آفتاب یا خورشیدهای کاذب نتیجه‌ی تابش خورشید بر لایه‌هایی از بلور یخ در ابرهاست.



رنگ‌های غروب یا طلوع، معمولاً زرد، نارنجی و قرمزند؛ زیرا سایر طول موج‌ها در طی مسیر خود، هنگام عبور از لایه‌های ضخیم جو، جذب می‌شوند.




شعاع‌های شفق، هنگام شفق و فلق رخ می‌دهند. تابش خورشید از درون شکاف‌هایی در ابرهایی زیر افق، این نورها را به وجود می‌آورد.



نور منطقه‌البروجی گاهی در آسمان‌های بسیار صاف و تاریک رمان اندکی پس از پایان شفق شامگاهی در بهار و پیش از آغاز فلق صبحگاهی در پاییز، دیده می‌شود. چون دید آن گاهی سبب اشتباه در تشخیص سپیده‌دم و اذان صبح می‌شد، در ادبیات ایران به آن صبح کاذب می‌گویند. برخی نیز به سبب شکل مغروطی، آن را دم‌گرگ نامیده‌اند.




خورشید کاذب، زمانی به وجود می‌آید که ابری رقیق و مرتفع، به صورت مناطق روشن و رنگارنگی در دو طرف خورشید وجود داشته باشد.



ستون آفتاب، هنگامی که خورشید در نزدیکی افق است، دیده می‌شود. نور خورشید از لایه‌های بلور یخ در ابرها بازتاب می‌شود و ستون‌هایی بر فراز آن ایجاد می‌کند.

ابرهای شب‌تاب

ابرهای شب‌تاب اغلب در طول جغرافیایی بیش از 45° درجه و تابستان‌ها، زمانی که خورشید تازه زیر افق پنهان شده است، دیده می‌شود. این ابرها گاهی بر اثر موشک‌های پرتاب شده یا پرواز شاتل‌های فضایی شکل می‌گیرند و گاهی از بلورهای یخی که بر غبار باز مانده از شهاب‌واره‌ها بسته شده‌اند، تشکیل می‌شوند. با وجود این، دلیل شکل‌گیری انواعی از آن‌ها هنوز به‌درستی مشخص نشده است. این ابرها آن‌قدر مرتفع‌اند (۸۰ کیلومتر) که در شب نیز دیده می‌شوند؛ زیرا خورشید هنوز در ارتفاع آن‌ها غروب نکرده است.



بیش‌تر بدانیم

جو زمین ۱۰۶ ماه ۱۱۰ سطح خورشید ۱۷۶ جو خورشید ۱۷۸ اخترشناسی در روز ۲۶۶

عکاسی از آسمان شب

اندکی پس از زمان اختراع دوربین عکاسی، تصویربرداری از آسمان نیز آغاز شد. اکنون فن آوری جدید، گرفتن عکس‌های رنگی خوب از آسمان را بسیار ساده‌تر از پیش کرده است. بیش‌تر عکس‌های امروز، جزییات بیش‌تری از آنچه چشم می‌بیند، نشان می‌دهند. زیرا شاتر (پرده) دوربین مدتی طولانی باز می‌ماند و نور بیش‌تری جمع‌آوری می‌کند که موجب ثبت و نمایش اطلاعات بیش‌تری می‌شود. خوش‌بختانه ابزارهای عکاسی آسمان، حتماً نباید گران‌قیمت باشد. حتی با دوربین مکانیکی ساده و یک سه‌پایه، بدون نیاز به تلسکوپ، می‌توان تصاویر خوبی تهیه کرد. مهارت مورد نیاز این است که بدانید برای هر نوع عکسی چه حساسیتی از فیلم‌های عکاسی یا تراشه‌ی دوربین دیجیتال را باید انتخاب کنید و زمان نوردهی چه‌قدر باشد.

انتخاب دوربین

دوربین‌های تک‌عدسی بازتابی، معروف به SLR، بهترین گزینه برای عکاسی آسمان شب هستند. اغلب دوربین‌های مکانیکی قدیمی از این نوع‌اند و دوربین‌های جدید SLR نیز فراوان است. داشتن زمان نوردهی B الزامی است؛ زیرا با این تنظیم می‌توانید پرده‌ی دوربین را تا زمان دلخواه باز نگاه‌دارید و نوردهی بلندمدت لازم برای ثبت ستاره‌ها را انجام دهید. بهتر است پرده یا شاتر دوربین، مکانیکی و دستی باشد. شاتر الکتریکی، هنگام نوردهی‌های بسیار طولانی باتری دوربین را تمام می‌کند. از دوربین‌های کوچک دیجیتالی، که بلندترین زمان نوردهی آن‌ها کسری از ثانیه است، استفاده نکنید؛ این زمان برای ثبت بسیاری از جرم‌های آسمانی کافی نیست. در دوربین‌های دیجیتال، انواعی شبیه SLR وجود دارد. این دوربین‌های DSLR که بسیار گران‌تر از دوربین‌های مکانیکی ساده‌اند، عکاسی نجومی را متحول کرده‌اند؛ زیرا با سرعت B، حساسیت قابل تنظیم و امکان نمایش بلافاصله‌ی تصویر، کار را بسیار آسان‌تر می‌کنند.

سمپایه‌ی عکاسی، دوربین را هنگام گرفتن عکس با نوردهی طولانی، ثابت نگه‌می‌دارد. به‌علاوه، دوربین را دقیق‌تر به سمت هدفی که دارد، نشانده می‌گیرد.



سیم دکلتانشور، شاتر دوربین را از دور می‌چکاند. این سیم ابزار قفل‌شونده‌ای دارد که می‌توان با آن، بدون تماس مستقیم با دوربین، شاتر را مدتی طولانی باز نگه‌داشت. این ابزار ساده، در عکاسی نجومی بسیار ضروری است.



دوربین SLR

با منظرپای، از درون عدسی دوربین به منظره‌ای که می‌خواهید عکاسی کنید، می‌نگرید. در حین عکاسی، آینه‌ی دوربین بالا می‌رود و دیگر نور به منظرپای نمی‌رسد؛ زیرا بر فیلم می‌افتد.

حلقه‌ی سرعت شاتر زمان‌های نوردهی را از ۱/۱۰۰۰ تا ۱ ثانیه، به اضافه‌ی سرعت B برای نوردهی‌های طولانی‌تر، فراهم می‌آورد. در برخی دوربین‌ها، سرعت‌های متنوع‌تر یا کم‌تنوع‌تری وجود دارد.

دکمه‌ی شاتر

دسته‌ی برگردان فیلم



لوله‌ی عدسی

حلقه‌ی کانونی‌کننده یا فکوس که برای اجسامی نزدیک تا در بی‌نهایت تنظیم می‌شود.

دیفراگم تنظیم‌کننده‌ی قطر دهانه‌ی جمع‌کننده‌ی نور در عدسی است.

استفاده از دوربین

هنگام عکاسی از آسمان، حلقه‌ی کانونی یا فکوس عدسی را روی بی‌نهایت و دیافراگم عدسی را در بازترین حالت خود (کوچک‌ترین عدد روی لوله‌ی عدسی، معمولاً ۲/۸ یا ۲) تنظیم کنید. حساسیت فیلم به نور، سرعت آن نامیده و با ISO بیان می‌شود. فیلم‌های کند، ISO ۱۰۰ هستند که حساسیت کمتر، اما رنگ و تضاد نوری زیادی دارند. فیلم‌های سریع (ISO ۴۰۰ تا ۱۶۰۰) حساس‌ترند؛ اما تصاویری محوتر با رنگ‌های غیردقیق می‌دهند.

حساسیت فیلم یا تراشه‌ی دیجیتال (ISO)

موضوع	حساسیت (ISO)	زمان نوردهی
دوربین روی سمپایه‌ای ثابت	۱۶۰۰-۲۰۰	۱۰-۶۰ ثانیه
شفق قطبی و هاله‌های کم‌نور جوی	۱۶۰۰-۴۰۰	۱۰-۳۰ ثانیه
دنبالدارهای پرنور	۱۶۰۰-۴۰۰	۲۰-۳۰ ثانیه
صور فلکی	۱۶۰۰-۲۰۰	۵-۱۰ دقیقه
شهاب‌ها	۴۰۰-۲۰۰	۱/۶۰-۱/۵۰۰ ثانیه
نمای نزدیک ماه (تربیع تا بدر)	۴۰۰-۲۰۰	۱/۳۰-۱ ثانیه
نمای نزدیک ماه (هلال باریک)	۲۰۰-۵۰	۵-۶۰ دقیقه
رد ستاره‌ها	۲۰۰-۵۰	۵-۲۰ ثانیه
آسمان شفق و فلق	۱۶۰۰-۲۰۰	۳-۶۰ دقیقه
دوربین با موتور ردیاب	۱۶۰۰-۲۰۰	۳-۶۰ دقیقه
دنبالدارها و سحابی‌ها	۱۶۰۰-۵۰	۳-۶۰ دقیقه
صور فلکی	۱۶۰۰-۴۰۰	۳-۵ دقیقه
راه شیری (بخش درخشان تابستانی)		

حساسیت فیلم


فیلم‌های کند یا حساسیت کم تراشه‌ی دوربین دیجیتال، برای عکاسی در شفق و فلق و عکاسی از جرم‌های پرنور، مانند ماه و سیاره‌های پرنور، بهترین‌اند. اما ستاره‌ها برای ثبت شدن روی فیلم‌های کند یا تراشه‌ای با حساسیت کم، بسیار کم‌نورند. از سوی دیگر، با افزایش زمان نوردهی، چرخش زمین تصویر آن‌ها را به شکل خطی از ستاره درمی‌آورد. به همین سبب، برای ثبت نقطه‌ای از آسمان پرستاره (بدون استفاده از تلسکوپ یا موتور ردیاب) بهتر است از فیلم‌های سریع یا تراشه‌ای با حساسیت زیاد استفاده کنید.



هلال ماه و سیاره‌ها در شفق و فلق، به زمان نوردهی ۵ تا ۲۰ ثانیه، با دیافراگم باز و فیلم کند نیاز دارند. این شرایط برای نشان دادن سیاره‌ها و ستاره‌های پرنور، به شکل نقاط نورانی، کافی است. عکاسی در نور شفق و فلق، عکس جذاب‌تری بوجود می‌آورد؛ زیرا در این زمان برخی جزئیات پیش‌زمینه نیز دیده می‌شود.



رد ستاره‌ها نتیجه‌ی نوردهی بلندمدت (از چند دقیقه تا یک ساعت) بر فیلم کند یا متوسط است. برای ثبت چنین عکس دور قطبی، دوربین خود را بر سیم‌پایه‌ای سوار کنید و به سمت قطب آسمان نشانه روید. ستاره‌ها با چرخش زمین ردی از نور از خود بر جای می‌گذارند که همه به دور ستاره‌ی قطبی (در حقیقت قطب شمال آسمان) چرخیده‌اند. اگر آلودگی نوری دارید، نوردهی را کوتاه کنید.



ستاره‌ها تا قدر ۶، به شکل نقاطی نورانی، بدون رد، بر فیلمی سریع یا تراشه‌ی حساس با نوردهی حدود ۲۰ ثانیه، ثبت می‌شوند. این روش مناسبی برای عکاسی از صورت‌های فلکی است. مانند این تصویر که طلوع جبار را در آسمان استان فارس نشان می‌دهد.

استفاده از عدسی تله

فاصله‌ی کانونی عدسی استاندارد دوربین، حدود ۵۰ میلی‌متر است. اما عدسی تله، فاصله‌ی کانونی بلندتری، حدود ۱۳۵ تا ۳۰۰ میلی‌متر، دارد که بزرگ‌نمایی بیش‌تری در اختیار شما می‌گذارد. دوربینی با عدسی تله، که روی سه‌پایه نصب شده باشد، برای عکاسی از ماه مناسب است؛ به‌علاوه، رد ستاره‌ها در نوردهی‌های فقط چند ثانیه‌ای، با این عدسی ثبت می‌شود. اگر دوربین بر تلسکوپ موتوردار با استقرار استوایی نصب شود، می‌توان نوردهی‌های بلندمدتی برای ثبت جرم‌های کم‌نور، مانند سحابی‌ها، انجام داد.

حلقه‌ی فوکوس یا کانونی‌کننده

سایه‌بان عدسی حطر تشکیل مه و شبنم بر عدسی را کاهش می‌دهد.

عدسی تله

عدسی‌های سنگین را از نزدیکی میانه‌ی آن‌ها نگه می‌دارند.

بدنه‌ی دوربین SLR

سر این سیم‌پایه از نوع توییپ است و دوربین را به سرعت، در هر جهتی که بخواهید، قرار می‌دهد.

تصویر ماه با عدسی ۲۰۰ میلی‌متر



ماه از درون عدسی تله

با عدسی تله با فاصله‌ی کانونی ۲۰۰ میلی‌متر یا بیش‌تر، گودال‌های بزرگ‌تر ماه نمایان می‌شوند. ماه محیطی است که با تابش خورشید روشن می‌شود. بنابراین، برای عکاسی از آن باید از همان نوردهی زمان روز استفاده کنید. به نورسنج دوربین یا انتخاب خودکار (سرعت اتوماتیک) اعتماد نکنید؛ زیر پیرامون ماه تاریک است و نورسنج تخمین درستی از نوردهی مناسب ماه به‌دست نمی‌دهد.



عکس ستاره‌ها با چاپ ماشینی معمولاً رنگ مناسبی ندارد.

پردازش فیلم یا تصویر دیجیتال

چاپ عکس نجومی از فیلم‌های رنگی در آتلیه‌های ماشینی گاهی ناامیدکننده است؛ زیرا دستگاه‌های چاپ ماشینی برای چاپ‌های تیره طراحی نشده‌اند و زمینه را خاکستری می‌کنند. فردی که فیلم را چاپ می‌کند، می‌تواند کمی این مشکل را برطرف کند. پس فیلم خود را به جایی بدهید که درخواست شما را اجرا کند. راه دیگر، استفاده از فیلم اسلاید است که چون با رنگ‌های طبیعی ظاهر می‌شود، چنین مشکلی به‌وجود نمی‌آورد. اما چاپ از روی آن همه‌جا امکان‌پذیر نیست. در عکاسی دیجیتال هنوز کاستی‌هایی مانند بهای زیاد دوربین‌های مناسب، نویز یا توفه در تصاویر و محدودیت چاپ در اندازه‌ی بزرگ وجود دارد؛ اما مشکلات چاپ و ظهور فیلم از میان می‌رود.

بیش‌تر بدانیم

- سمت نزدیک ماه ۱۱۸
- دنباله‌دارها ۱۶۲
- شهاب‌ها ۱۶۴
- زمین چرخان ۲۶۲
- نقشه‌برداری از آسمان شب ۲۷۰
- نقشه‌های آسمان قطبی ۲۷۲

اخترشناسی با دوربین دوچشمی

رصد با دوربین بزرگ ۱۰۰×۲۵ در رقابت رصدی مسیه، ایران




دوربین‌های دوچشمی، نمونه‌ی ضعیف تلسکوپ نیستند. آن‌ها بسیار کاربردی‌اند و به سبب میدان دید باز، مناظری را نشان می‌دهند که تلسکوپ‌ها قادر به نشان دادن آن‌ها نیستند. با دوربین‌های دوچشمی می‌توان رصد‌های جدی و دقیقی انجام داد. در کنار این‌ها، دوربین‌ها ابزارهایی آسان، قابل حمل و نقل و اغلب کم‌هزینه‌اند. حتی رصدگرانی که تلسکوپ‌های قوی دارند، گاهی از دوربین استفاده می‌کنند. دوربین‌های دوچشمی، دو تلسکوپ با بزرگ‌نمایی کم هستند که در کنار هم گذاشته شده‌اند. برای کسانی که ترجیح می‌دهند به جای دوچشمی‌ها، برای رصد جرم‌های کوچک و جزئیات سیاره‌ها مناسب نیستند، زیر آسمانی تاریک تصاویر بی‌نظیری از راه شیری، سحابی‌ها و کهکشان‌هایی بزرگ مثل کهکشان مسلسله (آندرومدا) و خوشه پروین به ما می‌دهند.

انتخاب دوربین دوچشمی

کار با دوربین‌های دوچشمی با بزرگ‌نمایی زیاد، چندان ساده نیست. بزرگ‌نمایی بیش از ۱۰ برابر، رصد را بدون سه‌پایه و روی دست بسیار مشکل می‌کند. زیرا لرزش‌ها در تصویر به‌خوبی نمایان می‌شوند. در رصد با دوربین‌هایی با بزرگ‌نمایی ۱۰ تا ۲۵ برابر، حتماً آن‌ها را روی سه‌پایه‌ی عکاسی نصب کنید و به سراغ دوربین‌هایی با بزرگ‌نمایی بیش‌تر نیز نروید؛ زیرا میدان دید باز و زیبای دوچشمی‌ها را ارائه نمی‌دهند. دوربین‌های دوچشمی با دو عدد بیان می‌شوند: مثلاً دوربین ۱۰×۵۰ نشان‌دهنده‌ی بزرگ‌نمایی ۱۰ برابر و عدسی شیئی ۵۰ میلی‌متر است. از دوربین‌هایی با بزرگ‌نمایی زوم در شب استفاده نکنید؛ این دوربین‌ها عدسی‌های اضافه‌ای دارند که اغلب در رصد جرم‌های کم‌نور آسمان شب، به سبب افت نوری که ایجاد می‌کنند، مناسب نیستند. نسبت عدد دوم (قطر دهانه) به عدد اول (بزرگ‌نمایی) پهنای باریکه‌ی نور خارج شده از چشمی دوربین به میلی‌متر است. این پهنای باید نزدیک به گشودگی مردمک چشم انسان در شب، یعنی حدود ۴ تا ۷ میلی‌متر باشد. مثلاً دوربین‌های ۴×۴۰، ۵×۵۰، ۷×۷۰، ۱۰×۷۰، ۱۵×۷۰، ۲۰×۸۰، ۲۵×۱۰۰ انتخاب‌هایی مناسب و دوربین‌های ۲۰×۵۰ یا ۴۰×۸۰ نامناسب‌اند. دوربین دوچشمی مناطق ستاره‌ای را نشان می‌دهند که با چشم غیر مسلح دیده نمی‌شوند. این ویژگی دوربین، آن‌ها را حتی در شهرهای بزرگ، که آلودگی نوری بیش‌تر ستاره‌ها را از دید پنهان می‌سازد، قابل استفاده می‌کند. اما بهترین مناظر با دوربین دوچشمی را باید زیر آسمان تاریک دید. بزرگ‌نمایی دوربین به شما کمک می‌کند خوشه‌های ستاره‌ای مانند پروین راه، با جزئیات بیش‌تری ببینید.




دوربین دوچشمی



خوشه پروین با چشم غیر مسلح



خوشه پروین با دوربین دوچشمی ضعیف




خوشه پروین با دوربین دوچشمی قوی


تنظیم دوربین



تنظیم عدسی راست
این بار همان جسم را با سمت راست ببینید و با کمک حلقه‌ی تنظیم‌کننده‌ی دیوپتر چشم، تصویر را کانونی کنید. با این روش، با توجه به تفاوت‌های احتمالی کانون چشم راست و چپ شما جسم کاملاً کانونی می‌شود.




تنظیم عدسی چپ
جسمی در دور ست انتخاب کنید. چشم راست خود را ببندید و با چشمی چپ، آن را کانونی یا فکوس کنید. این کار را با چرخاندن حلقه‌ی کانونی مرکزی انجام دهید.




تنظیم فاصلهی چشمی‌ها
جدایی دوچشمی دوربین را با فاصلهی چشمان خود تنظیم کنید. عدد نوشته شده بر لوله‌ی محور اصلی را هم برای رصد‌های بعدی یادداشت کنید.

آزمایش دوربین دوچشمی

امکان آزمودن دوربین‌های دوچشمی در روز، با نگاه کردن به جسمی دور، مانند ساختمان بلندی در زمینه‌ی آسمان آبی، وجود دارد. نخست به ساختاری میله‌مانند نگاه کنید و مطمئن شوید وقتی دوربین دقیقاً کانونی و فاصله‌ی دو چشم درست است، یک تصویر می‌بینید و دوربین هم‌خط است. سپس برای آزمودن وضوح و خطای رنگ، به لبه‌های میدان دید نگاه کنید. دوربین‌های گران‌تر میدان دید وسیع‌تری با خطاهای کمتر و روشنایی و وضوح تصویر بیش‌تر دارند. یک توصیه‌ی خوب این است که پیش از خرید، نمونه‌ای از مدل انتخابی را آزمایش کنید.




خطای رنگ به شکل رنگ‌های قرمز، آبی یا سبز و صورتی در لبه‌ی جرم‌های داخل تصویر در مقایسه با پس‌زمینه‌ی آسمان روشن نمایان می‌شود. ممکن است خطای رنگ در روز چندان به‌نظر نرسد؛ اما در شب، به‌خصوص هنگام رصد ماه، بسیار تأثیرگذار است.



ممکن است تصویر در گوشه‌های میدان دید، آشفته و ناواضح باشد. وقتی طی روز دوربین خود را آزمایش می‌کنید، مطمئن شوید وضوح تصویر از یک گوشه تا گوشه‌ی دیگر، بدون نیاز به کانونی کردن دوباره، تغییر نکند. یعنی دوربین خطای کروی چندانی نداشته باشد.

اتا - عقاب و ستاره‌های مجاور



رصد ستاره‌های متغیر

نور برخی از ستاره‌ها تغییر می‌کند و یکی از بهترین روش‌های رصد برخی از آن‌ها، دوربین دوچشمی است. زیرا برای مقایسه‌ی نور متغیر با ستاره‌های اطراف، میدان دیدی وسیعی دارد. ستاره‌ی اتا - عقاب را با ستاره‌های مجاور آن مقایسه کنید. دقت کنید هر زمان چه‌قدر از ستاره‌های کناری پر نورتر یا کم‌نورتر است و سپس قدر آن را از تصویر کناری، که قدر ستاره‌های اطراف را داده است، تخمین بزنید. به یاد داشته باشید ستاره‌های پر نورتر عدد قدر کوچک‌تری دارند.

راهنمای قدر

- A = ۳/۲
- B = ۳/۴
- C = ۳/۷
- D = ۴/۴
- E = ۴/۵



رصد های بیابای طی یک هفته نشان می‌دهد روشنایی اتا - عقاب بین قدر ۴/۴ و ۳/۵ تغییر کرده است


به دنبال چه باشیم؟			
جرم	نوع	مکان	بهترین زمان (شامگاهی)
خوشه‌ی آلفا برساوش	خوشه‌ی باز	برساوش	آبان تا دی
مسلله (آندرومدا)	کهکشان	مسلله	مهر تا آذر
سحابی شاه تخته (جنوب)	سحابی	شاه‌تخته	فروردین و اردیبهشت
خوشه‌ی دوتایی	خوشه‌های باز	برساوش	آبان تا دی
قللص	خوشه‌ی باز	ثور	آذر تا بهمن
سحابی مرداب	سحابی	قوس	تیر تا شهریور
ابر بزرگ ماژلان (جنوب)	کهکشان	ماهی‌طلایی	دی و بهمن
ماه	قمر	دایرة‌البروج	همه‌ی سال
سحابی اومگا (ش)	سحابی	قوس	تیر تا شهریور
سحابی جبار	سحابی	جبار	دی تا اسفند
پروین	خوشه‌باز	ثور	آذر تا بهمن
کندوی عسل	خوشه‌ی	سرطان (خرچنگ)	بهمن تا فروردین
ابر کوچک ماژلان (جنوب)	کهکشان	توکان	آبان و آذر
مثلث	کهکشان	مثلث	مهر تا آذر

مناظر دوربین دوچشمی

تفاوت تماشای راه شیری با چشم غیر مسلح و با دوربین دوچشمی، شگفت‌آور است. دوربین‌ها، در مقایسه با دید غیر مسلح، ستاره‌ها و جرم‌های بسیار بیش‌تری نشان می‌دهند. با آن‌که برخی جرم‌ها مانند سحابی امگا، با چشم غیر مسلح نیز قابل رصد است، منظره‌ی آن‌ها با دوربین با زمینه‌ای مملو از ستاره، بسیار زیباتر است. استفاده از دوربین را با یافتن جرم‌هایی که با چشم نیز آن‌ها را می‌بینید، تمرین کنید.



راه شیری و سحابی امگا با دوربین دوچشمی



راه شیری و سحابی امگا با چشم برهنه

بیش‌تر بدانیم

- ستاره‌های متغیر ۱۸۴
- خوشه‌ها و دوتایی‌ها ۱۹۴
- راه شیری ۲۱۴
- آمادگی برای رصد ۲۶۸
- نقشه‌های آسمان قطبی ۲۷۲

تلسکوپ‌های شکستی


ابزارهای جانبی

شکستی‌ها معمولاً ابزارهایی مانند منظریاب یا جوینده (دوربین تک‌چشمی با بزرگ‌نمایی کم که هدف‌گیری را ساده می‌کند)، چشمی‌های گوناگون با بزرگ‌نمایی‌های متفاوت و چپقی دارند. چپقی ابزاری است که نور را با زاویه‌ی قائمه یا ۴۵ درجه خم می‌کند و سبب می‌شود رصدگر هنگام رصد، نیازی به خم شدن و نشستن نداشته باشد. می‌توان روی چپقی و پیش از نصب چشمی (یا حتی بدون چپقی) عدسی بارلو نیز نصب کرد. این عدسی توان هر چشمی را دو یا چند برابر می‌کند.




شکستی‌ها چگونه کار می‌کنند؟

عدسی شیشه‌ی نور رسیده را جمع و در نقطه‌ای نزدیک انتهای لوله کانونی می‌کند. سپس چشمی تصویر را بزرگ می‌کند. فاصله شیشه تا نقطه‌ی کانونی آن، فاصله‌ی کانونی نامیده می‌شود. حاصل تقسیم فاصله‌ی کانونی بر فاصله‌ی کانونی چشمی (عددی که روی آن نوشته شده است)، توان بزرگ‌نمایی را به دست می‌دهد و حاصل تقسیم فاصله‌ی کانونی بر قطر دهانه‌ی تلسکوپ، نسبت کانونی است.



ماه درون شکستی ۱۵۰ میلی‌متر



ساده‌ترین نوع تلسکوپ، شکستی نام دارد. تلسکوپ‌های شکستی در ابتدای لوله، عدسی بزرگی به نام شیشه دارند که گردآورنده و شکست‌دهنده‌ی نور است. آن‌ها عدسی کوچک‌تری نیز به نام چشمی دارند که تصویر را بزرگ می‌کند. مهم‌ترین ویژگی هر تلسکوپ، اندازه‌ی عدسی شیشه‌ی یا قطر دهانه‌ی آن است. هرچه دهانه بزرگ‌تر باشد، بهتر است (البته قیمت تلسکوپ نیز بیش‌تر و جابه‌جایی آن نیز سخت‌تر خواهد شد). شکستی‌ها تصویر معکوسی می‌دهند و برای درست کردن وارونگی تصویر، به منشور یا آینه‌ای به نام چپقی نیاز دارند. با وجود این، تصویر برگردان (وارونه‌ی جانبی) است که با عدسی‌های اضافی مستقیم‌کننده مشکل حل می‌شود. اما این عدسی‌ها نور را جذب می‌کنند. به همین سبب، رصدگران تلسکوپ‌ی ساده را با تصویر معکوس ترجیح می‌دهند. تلسکوپ‌های شکستی ابزارهای خوبی برای شروع کار رصد کردن به شمار می‌روند. اما برخی از آن‌ها با عدسی‌های پلاستیکی، اسباب‌بازی هستند و حتی می‌توانید یکی از آن‌ها را به سادگی بسازید. از سوی دیگر، برخی از تلسکوپ‌های شکستی، به‌خصوص در عکاسی نجومی، ابزارهایی بسیار دقیق و توانا هستند؛ مانند شکستی‌هایی با عدسی شیشه‌ی ترکیبی بدون نشانی از خطاهای اپتیک که به تلسکوپ‌های آپوکروماتیک معروف‌اند.

انتخاب تلسکوپ شکستی

متداول‌ترین نوع، تلسکوپ شکستی با تصحیح‌کننده‌ی رنگی است که آکروماتیک نام دارد. از عدسی‌های غیر آکروماتیک یا به اصطلاح گالیله‌ای، استفاده نکنید. تلسکوپ‌هایی با این عدسی‌ها، معمولاً قرصی با سوراخی درون خود دارند که پشت عدسی‌ها نصب شده است و دهانه را، برای بالا بردن کیفیت تصویر، کاهش می‌دهد. در این تلسکوپ‌ها، رنگ‌های غیر واقعی کاهش می‌یابند؛ اما تصویر کم‌نورتر می‌شود و کاربردی برای رصد در شب ندارد. هنگام استفاده از هر تلسکوپ‌ی فراموش نکنید که بزرگ‌نمایی‌هایی بیش از دو برابر عدد قطر دهانه‌ی تلسکوپ به میلی‌متر، تصاویر کم‌نوری به دست می‌دهد. مثلاً حداکثر بزرگ‌نمایی مفید تلسکوپ‌ی ۱۰۰ میلی‌متری ۲۰۰ برابر است. در انتخاب بین انواع تلسکوپ‌های آکروماتیک، انواعی با فاصله‌ی کانونی یا لوله‌ی بلند، تصویر دقیق‌تر و خطای رنگی کمتری دارند؛ اما سنگین‌تر و برای حمل و نقل دشوارترند. شکستی‌هایی با فاصله‌ی کانونی کوتاه برای بردن به طبیعت و رصد‌هایی با میدان دید باز و بزرگ‌نمایی کمتر، مناسب هستند.

زحل درون شکستی ۱۵۰ میلی‌متر



رصد با تلسکوپ شکستی

همه‌ی شکستی‌ها، به‌جز انواع پیش‌رفته‌ی آپوکروماتیک با عدسی چندگانه، خطای رنگی کم یا زیاد دارند؛ اما اغلب آن‌ها تصاویر دقیقی با تضاد نوری چشم‌گیر بین روشنایی و تاریکی نشان می‌دهند. زیرا هیچ مانعی بر سر راه پرتو نور وجود ندارد و مسیر نور با عدسی شیشه‌ی و لوله کاملاً پوشیده است. شکستی‌ها برای رصد ماه و سیاره‌ها، که نیاز به دیدن جزئیات دارند، مناسب‌اند. تلسکوپ‌ی شکستی حتی با دهانه‌ای به کوچکی ۶۰ میلی‌متر، حلقه‌ی زحل را تفکیک می‌کند و دهانه‌های ماه و قرص مریخ را نشان می‌دهد.

ساخت یک تلسکوپ ساده

اگر اخترشناسان آماتور بخواهند تلسکوپ کارآمد بسازند، معمولاً به سراغ تراش آینه و ساخت تلسکوپ بازتابی می‌روند. اما ساخت تلسکوپ شکستی کوچک هم، اگر عدسی‌های مناسب شینی و چشمی در دسترس باشد، کار ساده‌ای است؛ اما به اندازه‌ی تلسکوپ بازتابی دست‌ساز کارآمد نیست. امکان دارد برای عدسی شینی، عینک‌سازان عدسی تکی بفروشند (از آن‌ها بخواهید توان عدسی +۲ دیوپتر باشد) یا ممکن است فروشگاه‌های دوربین عکاسی، عدسی‌های نزدیک‌کننده برای دوربین‌های SLR داشته باشند. از هر عدسی کوژ (محدب) اگر فاصله‌ی کانونی آن بیش‌تر از چشمی باشد، می‌توان استفاده کرد. برای چشمی، از یک لوپ، شیشه‌ی بزرگ‌کننده‌ای با فاصله‌ی کانونی کوتاه، که در فروشگاه‌های عکاسی نیز فروخته می‌شوند یا از چشمی آماده‌ی تلسکوپ یا میکروسکوپ استفاده کنید.

مقوای مشکی، قطب‌نما و مداد سفید



سوار کردن


دو لوله درست کنید؛ یکی برای شینی (لوله‌ی A) و دیگری برای چشمی (لوله‌ی B). قطر لوله‌ی B باید اندکی کمتر از A باشد تا بتوان آن‌دو را درون هم جابه‌جا و تلسکوپ را کانونی کرد. هر دو باید ۳۷/۵ سانتی‌متر، یا سه‌چهارم فاصله‌ی کانونی شینی، طول داشته باشند. فاصله‌ی کانونی شینی را با کانونی کردن نور چراغی روی کاغذ امتحان کنید (فاصله‌ی عدسی تا کاغذ، فاصله‌ی کانونی است). از خورشید برای این کار استفاده نکنید؛ ممکن است کاغذتان بسوزد.

چه چیزی رصد کنیم؟

جرم	نوع	مکان	بهترین زمان (شامگاهی)
ماه	—	دایرة البروج	تمام سال
مشتری	سیاره	دایرة البروج	به صفحه‌ی ۲۶۹
مریخ	سیاره	دایرة البروج	به صفحه‌ی ۲۶۹
زحل	سیاره	دایرة البروج	به صفحه‌ی ۲۶۹
زهره	سیاره	دایرة البروج	به صفحه‌ی ۲۶۹
گاما - دجاجة	ستاره‌ی دوتایی	دجاجة	تیر تا آبان
۴۷ - توکان (جنوبی)	خوشه‌ی گروهی	توکان	آبان و آذر
خوشه‌ی جعبه‌ی جواهر (جنوبی)	خوشه‌ی باز	صلیب جنوبی	اردیبهشت و خرداد
M۱۳	خوشه‌ی گروهی	جائی	خرداد تا مرداد
امگا قنطورس (جنوبی)	خوشه‌ی گروهی	قنطورس	اردیبهشت و خرداد
خوشه‌ی مرغابی وحشی	خوشه‌ی باز	سپر	خرداد تا مرداد

آن‌چه نیاز دارید

- شینی: عدسی کوژ (محدب) با فاصله‌ی کانونی حدود ۵۰ سانتی‌متر؛
- چشمی: لوپ یا عدسی با فاصله‌ی کانونی حدود ۳ سانتی‌متر؛
- مقوا یا کاغذ ضخیم مشکی، حدود ۵۰×۵۰ سانتی‌متر؛
- نوار چسب مشکی؛
- قطب‌نما و مداد سفید برای کشیدن حلقه‌ها، پیش از بریدن؛
- قیچی؛
- خط‌کش بلند؛
- چسب مایع.



بریدن حلقه‌ها

دو حلقه از مقوای مشکی ببرید؛ یکی به پهنای ۱ سانتی‌متر و قطری برابر شینی و دیگری به اندازه‌ای برابر اولی با چهار نوار بیرون آمده به طول ۲/۵ سانتی‌متر.



بریدن لبه

دورتادور لوله‌ی B نوارهایی به طول ۲/۵ سانتی‌متر ببرید. آن‌ها را درون لوپ خم کنید و مطمئن شوید با زاویه ۹۰ درجه وسط لوله قرار دارند. وقتی در مکان صحیح قرار گرفت، نوارها را به لوپ بچسبانید.



بیش‌تر بدانیم

تلسکوپ چگونه کار می‌کند؟ ۱۸
آمادگی برای رصد ۲۶۸
نقشه‌های آسمان قطبی ۲۷۲

تلسکوپ‌های بازتابی

بازتابی دایسونی

چشمی

این دستگیره حرکت بالا و پایین تلسکوپ را تنظیم می‌کند.


لوله‌ی تلسکوپ دایسونی از مواد ارزان و کم‌وزنی تهیه می‌شود.

سطح این بخش از فورمیکا (ورق پلاستیکی) است که روی سطحی از تفلون حرکت می‌کند تا اصطکاک کمی داشته باشد.

آینه‌ی اصلی در انتهای لوله است.

با پایمی سمت - ارتفاعی، به راحتی می‌توان با بالا و پایین و چپ و راست بردن تلسکوپ، جرم‌های آسمان را شانه‌گیری کرد

پایه‌ای برای حرکت چپ و راست



تلسکوپ بازتابی چگونه کار می‌کند؟

آینه‌ی اصلی بازتابی‌ها در انتهای لوله قرار دارد. این آینه (مقعر) سطح بشقاب‌مانندی دارد که نور ورودی را جمع‌آوری و در بردیگی سر لوله کانونی می‌کند. سپس آینه‌ای تخت در سر لوله نور را به دیواره‌ی لوله، که چشمی آن‌جاست، بازمی‌تاباند. این طرح بازتابی نیوتونی است.

رصد با تلسکوپ بازتابی

چشمی در دیواره‌ی لوله در سر تلسکوپ قرار دارد و تصویر معکوس است. بازتابی‌ها برای رصد جرم‌های کم‌نور، مانند سحابی‌ها، کهکشان‌ها و دنباله‌دارها، بسیار مناسب‌اند. از ماه و سیاره‌ها نیز تصویر خوبی می‌دهند. پیش از استفاده، تلسکوپ باید با هوای بیرون هم‌دما شود تا هنگام رصد، جریان‌های هوایی ناشی از تفاوت دمای تلسکوپ و محیط، موجب آشفتگی تصویر نشود.


رایج‌ترین نوع تلسکوپ در اخترشناسی، تلسکوپ بازتابی است. در بازتابی‌ها، برای کانونی کردن تصویر، به جای عدسی، از آینه‌ای در ته لوله‌ی تلسکوپ استفاده می‌کنند. یک تلسکوپ بازتابی هم‌قیمت شکستی، معمولاً دهانه‌ی بسیار بزرگ‌تری دارد و خطای رنگی نیز ندارد. البته در مدل‌های ساده‌ی آن‌ها، خطای کروی وجود دارد. یعنی نمی‌توان همه‌ی میدان دید را یک‌جا کانونی کرد و معمولاً وقتی مرکز تصویر کانونی است، گوشه‌ها کمی محو و کشیده است. این تلسکوپ‌ها به مراقبت بیش‌تری نیاز دارند و در مقایسه با شکستی‌ها، تصاویری با تضاد کمتر می‌دهند. با وجود این، تقریباً همه‌ی تلسکوپ‌های بزرگ بازتابی‌اند. ساخت آن‌ها ساده است و بعضی‌ها بخش‌های اپتیک را می‌خرند و تلسکوپ خود را می‌سازند یا حتی آینه را نیز تراش می‌دهند. تلسکوپ‌هایی که از آینه‌ی اصلی و عدسی تشکیل شده‌اند، کاتادیوپتริก یا ترکیبی نام دارند و بسیار پرمخاطب‌اند. این تلسکوپ‌ها معمولاً به موتور الکترونیک و دستگاه هدایت خودکار مجهزند.

انتخاب تلسکوپ بازتابی

تلسکوپ‌های بازتابی با دهانه‌ی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی‌متری، متداول‌ترین نوع برای رصدگران تازه‌کارند. این تلسکوپ‌ها تصاویر بسیار خوبی از بسیاری از جرم‌ها نشان می‌دهند. ارزان‌ترین نوع آن‌ها تلسکوپ دایسونی است. دایسونی‌ها لوله و پایه‌ی ساده‌ای دارند و برای بخش اپتیک آن‌ها بیش‌تر وقت صرف شده است. این تلسکوپ برای رصدگری که کمتر به عکاسی از اعماق آسمان می‌اندیشد، نتایج بسیار خوبی می‌دهد. اما تلسکوپ‌های گران‌قیمت‌تر، پایه‌های استوایی دارند که دنبال کردن جرم‌ها را، در حال حرکت در آسمان، ساده‌تر می‌کند. پایه‌های استوایی و موتورهای ردیاب برای گرفتن عکس از جرم‌های کم‌نور لازم‌اند. با وجود این، دایسونی‌ها به دلیل ساختار ساده و بهای مطلوب، حتی در اندازه‌های بزرگ، انتخاب اول بسیاری از رصدگران تازه‌کار یا حتی باتجربه است. بیش‌تر افرادی که تلسکوپ بازتابی می‌سازند، پایه‌ی آن را نیز به صورت دایسونی طراحی می‌کنند.



مریخ در تلسکوپ بازتابی ۲۰۰ میلی‌متری به هنگام مقابله



دنباله‌داری پر نور در تلسکوپ بازتابی ۴۵۰ میلی‌متر

تلسکوپ‌های کاتادیوپتريک (توکیبی)

در برخی تلسکوپ‌ها، هم از آینه و هم از عدسی استفاده می‌شود تا لوله کوتاه‌تر باشد و این نوعی تلسکوپ شکستی / بازتابی است. رایج‌ترین این تلسکوپ‌ها، اشمیت - کاسگرین است. اشمیت - کاسگرین‌ها به این دلیل مطلوب‌اند که در ازای دهانه‌ای مشخص، قطر لوله‌ی آن‌ها از نیوتونی‌ها کوتاه‌تر است. استقرار کاسگرین‌ها معمولاً استوایی است و می‌توان بری دنبال کردن ستاره‌ها، آن‌ها را موتوردار یا به کنترل رایانه‌ای مجهز کرد. لوله‌ی سربسته‌ی آن‌ها به این معناست که آینه‌ها مدت بیش‌تری تمیز می‌مانند و جلوی جریان‌های هوا، که کیفیت تصویر را خراب می‌کنند، گرفته می‌شود. در انواع تلسکوپ‌های کاسگرین، خطای کروی آینه بسیار کمتر می‌شود و لوله‌ی کوتاه حمل و نقل را آسان‌تر می‌کند. اما همه‌ی این‌ها با افزایش بهای تلسکوپ همراه است.



هدایت رایانه‌ای

پایه‌های گران‌قیمت تلسکوپ‌های آماتوری امروز به کنترل دستی رایانه‌ای و امکان هدایت از رایانه مجهزند. برای استفاده، مکان دو یا سه ستاره‌ی آسمان را به آن نشان می‌دهید و سپس تلسکوپ ستاره‌ها و هزاران جرم آسمان را، فقط با فشردن چند دکمه می‌یابد. این تلسکوپ اطلاعات زیادی از مکان خوشه‌های ستاره‌ای، سحابی‌ها و کهکشان‌ها در خود دارد. با آن‌که اغلب تلسکوپ‌های کاسگرین روی پایه‌های هدایت خودگرد قرار دارند، همه نوع تلسکوپ‌ی را می‌توان همراه این پایه‌ها تهیه کرد.

اشمیت - کاسگرین چگونه کار می‌کند؟

برای کوتاه نگه‌داشتن لوله، اشمیت - کاسگرین‌ها آینه‌ی بسیار خمیده‌ای دارند که در حالت عادی تصویری بدون کیفیت دارد. عدسی یا نیچه‌ی تصحیح‌کننده‌ی در ابتدای لوله، این مشکل را برطرف می‌کند. وسط این عدسی نیچه‌ی ثانویه‌ای است که نور را به جرفه‌ای در وسط آینه‌ی اصلی، بازمی‌تاباند. این رفت و برگشت نور و غیر تخت بودن آینه‌ی ثانویه، طول لوله را کوتاه می‌کند. چشمی، مانند تلسکوپ‌های شکستی، در انتهای لوله و پشت آن جرفه قرار دارد. در این تلسکوپ‌ها نیز ر چپقی برای تنظیم و روئگی تصویر و دیدن جرم‌های بالای سر استفاده می‌شود.

تماشای صورت‌های فلکی



نام	بهترین ماه	مکان
حمل	آبان	۶۰ درجه‌ی جنوبی - ۹۰ درجه‌ی شمالی
ثور (گاو)	آذر	۶۰ درجه‌ی جنوبی - ۹۰ درجه‌ی شمالی
جوزا (دوبیگر)	دی	۶۰ درجه‌ی جنوبی - ۹۰ درجه‌ی شمالی
خرچنگ (سرطان)	بهمن	۶۰ درجه‌ی جنوبی - ۹۰ درجه‌ی شمالی
اسد (شیر)	فروردین	۸۰ درجه‌ی جنوبی - ۸۰ درجه‌ی شمالی
سنبله	اردیبهشت	۹۰ درجه‌ی جنوبی - ۸۰ درجه‌ی شمالی
میزان (ترازو)	خرداد	۹۰ درجه‌ی جنوبی - ۷۰ درجه‌ی شمالی
عقرب	تیر	۹۰ درجه‌ی جنوبی - ۵۰ درجه‌ی شمالی
قوس	تیر	۹۰ درجه‌ی جنوبی - ۵۰ درجه‌ی شمالی
جدی	شهریور	۹۰ درجه‌ی جنوبی - ۶۰ درجه‌ی شمالی
دلو	مهر	۸۰ درجه‌ی جنوبی - ۶۰ درجه‌ی شمالی
حوت (ماهی)	آبان	۶۰ درجه‌ی جنوبی - ۹۰ درجه‌ی شمالی
جبار (شکارچی)	دی	۸۰ درجه‌ی جنوبی - ۷۰ درجه‌ی شمالی
صلیب جنوبی	بیش‌تر سال - بهمن	۹۰ درجه‌ی جنوبی - ۲۵ درجه‌ی شمالی
دب اکبر	بیش‌تر سال - بهمن	۲۵ درجه‌ی جنوبی - ۹۰ درجه‌ی شمالی
قنطورس	بهمن	۹۰ درجه‌ی جنوبی - ۲۵ درجه‌ی شمالی

سحابی رتیل و سحابی جبار

بازتابی‌ها برای رصد سحابی‌ها، مانند سحابی مرداب (صورت فلکی قوس) یا رتیل در نیم‌کره‌ی جنوبی و سحابی جبار برای رصدگران هر دو نیم‌کره، کاربردی عالی دارند. رتیل نقطه‌ی روشنی در ابر بزرگ ماژلان است. دیدن رنگ این سحابی‌ها دشوار است؛ زیرا چشم به نور قرمز تیره‌ی سحابی، حتی با تلسکوپ‌ی بزرگ، حساس نیست. سحابی جبار حتی از رتیل نیز درخشان‌تر است و با تلسکوپ آماتوری مناسب ساختارهای بی‌نظیر درون آن دیده می‌شود.

کهکشان گرداب

این کهکشان (M51) در صورت فلکی شمالی تازی‌ها و نزدیک به دسته‌ی ملاقه‌ی دب‌اکبر است. نخستین بار لرد رس (۱۸۶۷ - ۱۸۰۰) ساختار مارپیچی آن را در سال ۱۸۲۵ با تارابی ۱۸۰ سانتی‌متری دید که بزرگ‌ترین تلسکوپ آن زمان بود. زیر آسمان تاریک با بازتابی‌های جدید، بازوهای مارپیچی این کهکشان با تلسکوپ‌ی به دهانه‌ی فقط ۲۰ تا ۳۰ سانتی‌متر، البته بدون رنگ و با جزئیاتی کمتر از این عکس دیده می‌شود.




بیش‌تر بدانیم

- تلسکوپ چه‌طور کار می‌کند؟ ۱۸
- دنیالمدارها ۱۶۲
- جایی که ستاره‌ها متولد می‌شوند ۱۹۲
- سحابی‌های سیاره‌نما ۲۰۲
- کهکشان‌ها ۲۳۰
- نقشه‌برداری از آسمان شب ۲۷۰
- تلسکوپ‌های شکستی ۲۹۰

نام‌های نجومی

اخترشناسان نام‌های گوناگونی برای ستاره‌ها و سیاره‌ها برمی‌گزینند. در گذشته، این اسامی بر مبنای اساطیر بومی هر قوم درباره‌ی آسمان بود. با پیش‌رفت اخترشناسی، صورت‌های فلکی در سراسر دنیا یکی شد و روش منسجمی برای نام‌گذاری جرم‌ها تدوین گردید. اکنون انتخاب اسم برای عوارض سیاره‌ای یا قمرهای جدید، دنباله‌دارها و سایر جرم‌های آسمانی، زیر نظر انجمن بین‌المللی نجوم (IAU) صورت می‌گیرد.



سیاره‌ها و قمرها

اسامی سیاره‌ها، در زبان انگلیسی، از شخصیت‌های افسانه‌ای یونان و روم باستان گرفته شده است. رومی‌ها شخصیت‌های گوناگون را در پنج سیاره‌ای که با چشم غیر مسلح دیده می‌شدند، می‌دیدند. عطارد را مرکوری یا الهی پیام‌آور می‌دانستند؛ زهره را ونوس یا الهی زیبایی، مریخ سرخ را مارس یا الهی جنگ و مشتری درخشان را ژوپیتر یا الهی خدایان می‌نامیدند. سیاره‌های بعدی و (جدید) نیز با همین روش نام‌گذاری شدند. سیاره‌ی اورانوس پدر خدایان، نپتون الهی دریاها و سیاره‌ی سابق و دوردست پلوتون، الهی سرزمین‌های زیرین است. در ایران باستان، تیر نام عطارد، ناهید یا آناهید نام زهره و به‌معنی الهی زایش و باروری بود؛ بهرام (مریخ) نام الهی جنگ و هرمزد (مشتری) نام اهورامزدا بود. اسامی قمرها نیز معمولاً وابسته به نام سیاره‌ی مادر آن‌هاست؛ فوبوس و دی‌موس دو اساطیر یونان پسران الهی جنگ بودند و قمرهای اصلی مشتری به نام عاشقان پرشمار ژوپیتر است. عوارض سطحی سیاره‌ها و ماه نیز نام‌های خاصی دارند؛ تقریباً همه‌ی عوارض زهره به نام خاتم‌های سرشناس تاریخ‌اند.

دنباله‌دارها و سیارک‌ها

دنباله‌دارها تنها جرم‌های نجومی‌اند که بنا بر نام کاشف آن‌ها نام‌گذاری می‌شوند. کشف دنباله‌دار از طریق پست الکترونیک (ای‌میل) به مرکز تلگرام‌های نجومی وابسته به IAU اعلام می‌شود. اگر دو رصدگر، هم‌زمان، کشف دنباله‌داری را اعلام کنند، دنباله‌دار نام هر دو را دربرمی‌گیرد (مانند دنباله‌دار هیل - باب در سال ۱۹۹۷). در سال‌های اخیر، بسیاری از دنباله‌دارها به نام طرح‌های جست‌وجوی روباتی آسمان شب یا یک ابزار نام‌گذاری شده‌اند؛ مانند لی‌نیز، تیت یا سوان. پس از به‌دست آوردن مدار دنباله‌دار، نامی رسمی نیز به آن داده می‌شود؛ مثلاً دنباله‌دار هیل - باب C/۱۹۹۵O نام دارد (O نشان‌دهنده‌ی چندمین بازه‌ی دوهفته‌ای پس از آغاز سال ۱۹۹۵ است که در آن کشف شده است). A اولین دوهفته‌ی سال و O پانزدهمین دوهفته است. عدد (۱) نیز نشان‌دهنده‌ی نخستین دنباله‌دار کشف شده در آن دوهفته است. دنباله‌دار هالی به نام مردی است که مدار آن‌را محاسبه کرد؛ او به نام کاشف آن که شناخته شده نیست. سیارک‌ها نیز غیر معمولاً نام‌های آن‌ها نیز از معدود جرم‌هایی هستند که کاشف، حق نظر دادن در مورد نام‌گذاری آن‌ها را دارد؛ اما به نام خود او نخواهد بود. فهرست‌های نجومی سیارک‌ها را با نام و عدد مشخص می‌کنند. مثلاً (۱) سرس، اولین سیارکی است که در سال ۱۸۰۱ کشف شد. در این اواخر، به نام سیارک‌ها سال و حرفی، مشابه دنباله‌دارها اضافه می‌شود. در مورد نام خاص، هم‌چنان کاشف نظر می‌دهد و کمیته‌ی نام‌گذاری در IAU آن‌را نهایی می‌کند. به این ترتیب، نام سیارک‌ها بسیار گوناگون است.

سحابی‌ها و دیگر جرم‌های ژرفای آسمان

برخی سحابی‌ها، کهکشان‌ها و خوشه‌های ستاره‌ای نام‌های خاصی دارند (مانند پروین)؛ اما همه‌ی آن‌ها در فهرست جرم‌ها، شماره نیز دارند. در فهرست مسیه معروف شارل، که در سال ۱۷۸۴ با ۱۰۳ جرم مه‌آلود غیرستاره‌ای آسمان منتشر شد (و پس از آن به مجموع ۱۱۰ جرم رسید)، هریک از جرم‌ها با M و عددی کنار آن مشخص می‌شوند. مثلاً خوشه‌ی پروین M۴۵ است. فهرست مسیه را جان درپر در دهه‌ی ۱۸۸۰ با فهرست عمومی جدید (NGC) و فهرست ضمیمه (IC)، که بیش از ۱۳ هزار جرم را شامل می‌شد، کامل کرد. برخی فهرست‌ها نیز فقط برای انواع خاصی از جرم‌ها هستند. مثلاً اخترش ۳۷۷۳، دوست‌وهفتادوسومین منبع رادیویی بود که در سومین نقشه‌برداری رادیویی کمبریج (۳۷) یافت شد. هجانه ۱ - K اولین منبع پرتو ایکس در هجانه بود. تپاختر خرچنگ، به نام ۵۳۱+۲۱، بنا بر مختصات بعد (چپ) و میل (راست) آن نام‌گذاری شده است و آبرنواختر ۱۹۸۷A نخستین آبرنواختر مشاهده شده در سال ۱۹۸۷ است.

نام ستاره‌ها

بیش از صد ستاره، هنوز نامی را که قرن‌ها پیش گرفته‌اند، دارند. ممکن است این نام‌ها ستاره‌ی توصیف کنند یا به اساطیر و افسانه‌های باستان مربوط شوند. بسیاری از ستاره‌های درخشان آسمان نیم‌کره‌ی شمالی، نامی عربی دارند که اخترشناسان سرشناس دوره‌ی اسلامی، به‌خصوص ایرانیانی مانند صوفی رازی، بر آن‌ها گذاشته‌اند. برای مثال، «ذ‌ال‌ر‌ان» در عربی به معنای «دنباله‌رو» است. ریزا به دنبال پروین است. در انگلیسی نیز به آن آلدبران می‌گویند. کاستور و پلوکس، دو ستاره‌ی سرجوزا، نام دو قلوهایی در افسانه‌های یونانی بودند. امروزه اخترشناسان روش منسجم‌تری می‌پسندند. دادن حرفی یونانی به هر ستاره‌ی صورت فلکی، بر مبنای روشنایی آن، روش پوهان بایر در ابتدای قرن هفدهم میلادی است. به این ترتیب، شباهنگ پر نورترین ستاره‌ی صورت فلکی کلب‌اکبر، آلفا - کلب‌اکبر نامیده می‌شود. با اختراع تلسکوپ‌های قوی‌تر، میلیون‌ها ستاره‌ی کم‌نور دیده شد و برخی اخترشناسان، فهرستی از ستاره‌ها را بر اساس شماره و صورت فلکی جمع‌آوری کردند. در دنیا، امروز، اغلب نام‌گذاری‌ها بر اساس فهرست‌های رایج مانند HIP یا بر اساس بعد و میل ستاره است. ممکن است ستاره‌های پر نور نامی خاص یا نامی با حروف یونانی و اعداد فهرستی بسیار، از جمله عدد SAO (رصدخانه‌ی اخترفیزیکی اسمیت سونی) و عدد HD (هنری درپر) داشته باشد.

نام و تلفظ ۱۸ ستاره‌ی درخشان آسمان				
ردیف	نام رایج	اِعراب	نام کهن یا دیگر معادل‌ها	نام لاتینی
۱	شعرای یمنی (شباهنگ)	ش ی ق	تیشتر	Sirius
۲	سهیل	س ه	احتمالاً سنجویس	Canopus
۳	سماک راح	س ک م	نگهبان شمال، احتمالاً هفت‌اورنگ	Arcturus
۴	نسر واقع	ن ر	احتمالاً وُتند	Vega
۵	عیوق	ع	سروش، بَربان	Capella
۶	رجل الجبار	ر ل	پای شکارچی	Rigel
۷	شعرای شامی	ش	-	Procyon
۸	یدالجوزا (ابطالجوزا)	ی (ا ط)	شامی شکارچی	Betelgeuse
۹	نسر طایر	ن ی	سجلیه	Altair
۱۰	دبران	د ب	چشم‌گاو	Aldebaran
۱۱	نعیم (آلفا - صلیب جنوبی)	ن	تیر نعیم	Acrux
۱۲	قلب‌العقرب	ق ب ع ر	دل مریخ	Antares
۱۳	سماک اعزل	س ک ا ز	-	Spica
۱۴	پلوکس	-	راس پیکر پسین (هره)	Pollux
۱۵	فم‌الحوت	ف م	دهان ماهی	Fomalhaut
۱۶	ردف	ر	ذم قو	Deneb
۱۷	رجل‌القطورس	ر ل	پای قنطورس	Alpha-Centauri
۱۸	قلب‌الاسد	ق ب ا س	قلب شیر	Regulus

صورت‌های فلکی

صور فلکی در ابتدا نقشی از ستاره‌های پر نور بودند که مردم تمدن‌های باستان، حیوانات، مردم و دیوهای اسطوره‌ای خود را از آن‌ها تصور می‌کردند. حدود سال ۱۵۰ میلادی، بطلمیوس فهرستی از ۴۸ صورت فلکی ابداع شده تا آن زمان تهیه کرد و پس از آن اخترشناسان اسامی دیگری به این فهرست اضافه کردند تا ۸۸ صورت فلکی امروزی به دست آمد. اکنون صورت‌های فلکی، ناحیه‌های تقسیم شده‌ی آسمان‌اند و نه فقط شکل و نقشی از ستاره‌ها. در جدول زیر مساحت هر صورت فلکی به درجه‌ی مربع آمده است. بزرگ‌ترین آن‌ها شجاع و کوچک‌ترین صلیب جنوبی است.

نام صورت‌های فلکی (به ترتیب الفبا) و تلفظ درست آن‌ها

نام رایج	اعراب	معادل فارسی	نام لاتین	اندازه
آتش‌دان (مجره)	م خ م ر	-	Ara	۲۳۷
مسلسله، امراة المسلسله (آندرومدا)	ا ر م س	زن به زنجیر بسته	Andromeda	۷۲۲
ارابه‌ران	-	-	Auriga	۶۵۷
اسد	ا س	شیر	Leo	۹۴۷
اسد اصغر	ا س	شیر کوچک	Leo Minor	۲۳۲
قلم (اسکنه)	ا ک ن	قلم سنگ تراش	Caelum	۱۲۵
اکلیل جنوبی	ا	تاج جنوبی	Corona Australis	۱۲۸
اکلیل شمالی	ا	تاج شمالی، کاسه درویشان	Corona Borealis	۱۷۹
بادبان (شراع)	ش	-	Vela	۵۰۰
برساوش	ب و	-	Perseus	۶۱۵
حریا،	-	آفتاب‌پرست	Chamaeleon	۱۳۲
پرگار	-	-	Circinus	۹۳
تازی‌ها	-	سگان شکاری	Canes Venatici	۴۶۵
تکشاخ	-	-	Monoceros	۴۸۲
تلسکوپ	-	-	Telescopium	۲۵۲
تلمبه	-	-	Antila	۲۳۹
تنین (اژدها)	ت ن	اژدها	Draco	۱۰۸۳
تور	-	-	Retculum	۱۱۴
توککن	-	-	Tucana	۲۹۵
ثمان	ث م	هشتک	Octans	۲۹۱
ثور	ث	گاو	Taurus	۷۹۷
جالی	-	برزانو نشسته	Hercules	۱۲۲۵
جام (باطیه)	-	-	Crater	۲۸۲
جبار	ج ب	شکارچی	Orion	۵۹۴
جدی	ج ذ	بزماهی	Capricornus	۴۱۴
حجار	ح ج	سنگ تراش	Sculptor	۴۷۵
شامتخته	خ م	(بخشی از کشتی) (۱)	Carina	۴۹۴
حمل	خ م	بره، قوچ	Aries	۴۴۱
حوت	-	ماهی	Pisces	۸۸۹
حوت جنوبی	-	ماهی جنوبی	Pisces Austrinus	۲۴۵
خرگوش (ارنب)	(ا ز ن)	-	Lepus	۲۹۰
خطکش	-	-	Norma	۱۶۵
دب اصغر	ذ	خرس کوچک	Ursa Minor	۲۵۶
دب اکبر	ذ	خرس بزرگ	Ursa Major	۱۲۸۰
دجابه	ذ ج یا د	ماکیان، قو، صلیب شمالی	Cygnus	۸۰۴
درنا	ذ	-	Grus	۳۶۶
دلفین	-	-	Delphinus	۱۸۹
دلو	د ل و	آب‌ریز	Aquarius	۹۸۰
جوزا (دوبیکر)	-	دوبیکر	Gemini	۵۱۴
ذات‌الکرسی	ث ک	الهی کرسی	Cassiopeia	۵۹۸

نام صورت‌های فلکی (به ترتیب الفبا) و تلفظ درست آن‌ها

نام رایج	اعراب	معادل فارسی	نام لاتین	اندازه
روباهک	-	-	Vulpecula	۲۶۸
زرافه	-	-	Camelopardalis	۷۵۷
ساعت	-	-	Horologium	۲۴۹
سپر	-	-	Scutum	۱۰۹
سرطان	س ز	خرچنگ	Cancer	۵۰۶
شذس (سکستانت)	س ک	-	Sextans	۳۱۴
سندبله	س ن ب	دوشیزه، خوشه	Virgo	۱۲۹۴
سوسمار (چلپاسه)	(چ)	چلپاسه	Lacerta	۲۰۱
سمپایه	-	سمپایه نقاشی	Pictor	۲۴۷
سهم (تیر)	س ه	تیر	Sagitta	۸۰
سیاه‌گوش (وشق)	و ش	عنقا	Lynx	۵۴۵
ققنوس (سیمرغ) (۲)	-	-	Phoenix	۴۶۹
شجاع	ش	مار نر	Hydra	۱۳۰۳
شلیاق	ش	چنگ رومی	Lyra	۲۸۶
صلیب جنوبی	-	چلیپا	Crux	۶۸
طاووس	-	-	Pavo	۳۷۸
عقاب	-	کزدم	Aquila	۶۵۲
عقرب	-	گاوران	Scorpius	۴۹۷
عوا	غ	-	Bootes	۹۰۷
فرس اعظم (اسب‌بالدار)	ف ز س	اسب‌بال‌دار	Pegasus	۱۱۲۱
قطب‌نما	-	-	Pixis	۲۲۱
پارهایسب	-	-	Equineus	۷۲
قنطورس	ق ن ر	کمان، نیم‌اسب، رامی	Centaurus	۱۰۶۰
قوس	-	نهنگ	Sagittarius	۸۶۷
قیطس	ق ی م	-	Cetus	۱۲۳۱
قیفاووس	ق و	-	Cepheus	۵۸۸
کیوتر	-	-	Columba	۲۷۰
کشیدم	-	-	Puppis	۶۷۳
کلاغ (غراب)	غ	سگ کوچک	Corvus	۱۸۴
کلب اصغر	ک	سگ بزرگ	Canis Minor	۱۸۳
کلب اکبر	ک	-	Canis Major	۳۸۰
کوره	-	-	Fornax	۳۹۸
کومیز	-	-	Mensa	۱۵۳
گرگ	-	-	Lupus	۳۳۳
گیسوان برنیکه (گیسو)	ب	-	Coma Berenices	۳۸۶
مار (حیه)	(خ ی)	-	Serpens	۶۳۷
مار آب (۳)	-	-	Hydrus	۲۴۳
مارافسای (حوا)	ز ا خ و	مار بحدوش	Ophiuchus	۹۴۸
ماهی پرند	-	-	Volans	۱۴۱
ماهی طلایی	-	-	Dorado	۱۷۹
مثلث	-	-	Triangulum	۱۳۲
مثلث جنوبی	-	-	Triangulum Australe	۱۱۰
مرغ بهشتی	-	-	Apus	۲۰۶
مگس	-	-	Musca	۱۳۸
میزان (ترازو)	ن ه	-	Libra	۲۹۰
میکروسکوپ	ه	-	Microscopium	۲۱۰
نهر	-	رود	Eridanus	۱۱۳۸
سرخ‌پوست (هندی)	-	-	Indus	۲۹۴

۱. کشتی، نام یکی از صورت‌های فلکی قدیمی است که امروزه به چهار صورت فلکی کشتیدم، بادبان، قطب‌نما و شامتخته تقسیم شده است.
 ۲. Phoenix (فونیکس) در اسطوره‌ها نام مرغ آتش است که از خاکستر نوع خود متولد می‌شود و در فارسی برابر ققنوس است.
 ۳. نام شجاع (بزرگ‌ترین صورت فلکی آسمان) و صورت فلکی جنوبی مار آب، گاهی اشتباه می‌شود. شجاع نوعی مار نر و مار آب نوعی مار باریک و ظریف است.

نام دوم و رایج برخی صورت‌های فلکی بین دو قلاب (پراکنج) نوشته شده است. مانند تنین یا اژدها که هر دو آن‌ها متداول است.

گاه‌شمار نجوم و فضا

۴۰۰۰ پیش از میلاد

نخستین برج‌های فلکی

بنا بر نقش‌های برج‌های مانده بر سفال‌های این دوره در بین‌النهرین و منطقه‌ای از ایران امروز، برخی صورت‌های فلکی منطقه‌البروج شناخته شده است. اسان دشت‌نشین و کشاورزی، به شناخت دقیق فصل‌ها و تقویم نیاز داشت. به همین سبب، حرکت‌های آسمانی ماه و خورشید را دنبال و قلمرو آن‌ها را در بین ستاره‌ها با ابداع برخی از نخستین صورت‌های فلکی، مشخص می‌کرد. به احتمال زیاد، چهار صورت فلکی میزبان نقاط انقلاب زمستانی و تابستانی و نقاط اعتدال بهاری و پاییزی ابداع شده بود. شواهدی نیز در دست است که صورت‌های فلکی بسیار بارزی مانند دب‌اکبر یا جبار در افسانه‌های انسان چند هزار سال پیش از این دوره نیز وجود داشته است.

۳۰۰۰ پیش از میلاد

اخترشناسی سنگی

بنای استون‌هنج، که در چند قرن نخست هزاره‌ی سوم پیش از میلاد در جنوب انگلستان ساخته شد، تقویم نجومی عظیمی است که آرایش تکه‌سنگ‌های بسیار بزرگ آن، دایره‌های هم‌مرکز و نشانه‌هایی می‌سازند. اقوام باستانی این منطقه می‌توانستند به کمک رصد طلوع و غروب خورشید و جایگاه ماه و ستاره از بین این سنگ‌ها، تقویمی به‌وجود آورند و شاید حتی برخی پدیده‌های نجومی را پیش‌بینی کنند. امکان دارد بسیاری از مکان‌های باستانی، مانند اهرام مصر (حدود ۲۶۰۰ پیش از میلاد) و بناهایی در چین و آمریکای مرکزی و جنوبی (اوایل هزاره‌ی نخست پیش از میلاد تا هزاره‌ی نخست میلادی)، اهمیت نجومی داشته باشند.

۷۵۰ پیش از میلاد

چرخه‌ی ماه

اخترشناسان در بابل باستان، چرخه‌ای ۱۸/۶ ساله را در طلوع و غروب ماه، یا در حقیقت در موقعیت‌های سماوی آن، شناختند که به چرخه‌ی ساروس معروف است. بر اساس آن، بابلیان نخستین تقویم‌های نجومی یا آلمانک (حدّ اول حرکات خورشید، ماه و سیاره‌ها که در اختربینی از آن‌ها استفاده می‌شد) را پدید آوردند. رصدهای دقیق نجومی در بابل با پیوستن آن به قلمرو هخامنشیان و پیوستن مُغان (پیروان حضرت نوح علیه السلام) رصدگر ایرانی به آن‌ها، اوج گرفت. آن‌ها بیش‌تر پدیده‌های آسمان، به‌خصوص پدیده‌های تکرارشونده را با دقت خاصی ثبت می‌کردند و دنبال دوره‌های ناشناخته‌ی سماوی بودند.

۳۸۰ پیش از میلاد

دیدگاه زمین‌مرکز

فیلسوف یونانی، افلاطون، مکتبی بنیان نهاد که بر ۲۰۰۰ سال

آینده هم تأثیر گذاشت. این مکتب حامی این نظریه بود که همه چیز در جهان هستی در هماهنگی کامل حرکت می‌کند. خورشید، ماه و سیاره‌ها هم در مدارهای دایره‌ی کامل دور زمین می‌گردند. دو دهه‌ی بعد، ارسطو زیر نظر اتودوکسوس آموزش دید و نظریه‌های جهان‌شناسی خود را، که قرن‌ها مبنای کار فلاسفه و اخترشناسان بود، پایه‌گذاری کرد. او نیز زمین را ثابت و در مرکز کیهان می‌دانست.

۲۷۰ پیش از میلاد

دیدگاه خورشیدمرکز

آریستارخوس یونانی نظریه‌ای در مقابل عالم زمین‌مرکز مطرح کرد. مدل خورشیدمرکز او خورشید را در مرکز جهان هستی نشانده و زمین را به مقام سیاره‌ای، که فقط دور آن می‌گردد، تنزل داد. عده‌ی اندکی این نظریه را جدی گرفتند: اگر زمین در فضا حرکت می‌کند، چرا ستاره‌ها در آسمان نسبت به هم حرکت نمی‌کنند؟ آریستارخوس به روش مثلثاتی فاصله‌ی ماه و خورشید را از زمین تخمین زد.

۱۶۴ پیش از میلاد

دنباله‌دار هالی

نخستین ثبت رصد دنباله‌دار هالی را اخترشناسان بابل باستان ۱۶۴ سال پیش از میلاد انجام دادند. ثبت حرکت دنباله‌دار به‌دست آن‌ها، به اخترشناسان قرن بیستم امکان داد تغییرات مدار آن‌را طی قرن‌ها پیش‌بینی کنند. در آن دوره، کسی متوجه نشد که هالی در دوره‌های ۷۶ ساله بازمی‌گردد. این موضوع ۱۹ قرن بعد در زمان دانشمندی به نام هالی کشف شد.

۱۵۰ پیش از میلاد (تقریبی)

قدرسنجی اَبَرخُس

در سال‌های نیمه‌ی دوم قرن دوم پیش از میلاد، بزرگ‌ترین اخترشناس رصدگر آن دوره، اَبَرخُس، یکی از نخستین فهرست‌های ستاره‌ای آسمان را تهیه کرد که احتمالاً حدود ۸۵۰ ستاره را شامل می‌شد و مبنای کار بطلمیوس در قرن دوم بود. او از تغییرات سال نجومی به حرکت تقدیمی زمین پی برد. اندازه و فاصله‌ی نسبی ماه و خورشید را تخمین زد و روشی برای سنجش روشنایی ستاره‌ها پایه‌گذاری کرد که مبنای قدرسنجی در اخترشناسی امروز است.

۱۵۰ میلادی

فهرست ستاره‌ای

بطلمیوس فهرست ستاره‌ای خود را شامل ۴۸ صورت فلکی، منتشر و از دیدگاه عالم زمین‌مرکز حمایت کرد. دیدگاه‌های او تقریباً ۱۵۰۰ سال با هیچ پرسش پافشارانه‌ای مواجه نشد. بطلمیوس در کتاب خود، مجسطی، عالم زمین‌مرکز و اصول ریاضی آن‌را شرح داد. این کتاب به‌دست اخترشناسان جهان اسلام ترجمه شد و از آن راه به اروپای قرون وسطی رسید.

۹۲۸ میلادی / ۳۱۶ هجری قمری

اسطرلاب

نخستین اسطرلاب برج‌های مانده را صنعت‌گران مسلمان ساخته‌اند (نمونه‌های متفاوت و ساده‌تری از همین ابزار در دوران باستان نیز وجود داشته است). اسطرلاب پیش‌رفته‌ترین ابزار دوره‌ی خود بود که هنوز هم ابزاری کاربردی و مفید در سنجش آسمان با چشم برهنه است. اندازه‌گیری‌های دقیق موقعیت ستاره‌ها و سیاره‌ها به اخترشناسان مسلمان امکان داد مفصل‌ترین تقویم‌ها و جدول‌های نجومی و اطلس‌های ستاره‌ای را تا آن زمان تهیه کنند.

۹۶۴ میلادی / ۳۵۳ هجری قمری

کتاب راهنمای آسمان

عبدالرحمن صوفی رازی، بزرگ‌ترین اخترشناس رصدگر دوره‌ی خود، کتاب صورالکواکب را به پایان رساند. این اخترشناس ایرانی کتاب راهنمای آسمان خود را به زبان علمی آن دوره، عربی، نوشت و بعدها خواجه نصیرالدین توسی آن‌را به فارسی برگرداند. این کتاب هفت قرن پس از فهرست ستاره‌ای بطلمیوس، نخستین راهنمای جامع آسمان بود که تا قرن‌ها بعد منبع اصلی اخترشناسان به‌شمار می‌رفت. صوفی در کتاب خود نخستین اشاره را در تاریخ به چند جرم غیر ستاره‌ای ژرفای آسمان کرده است؛ از جمله کهکشان مسلسله (آندرومدا) و ابر بزرگ ماژلان که هر دو را سحابی‌ای مه‌آلود توصیف کرده است.

۱۰۵۴ میلادی

اَبَرنواختر

در این سال، اخترشناسان چینی ظهور ناگهانی ستاره‌ای درخشان را ثابت کردند. حکاکای‌های بومیان آمریکا روی سنگ‌ها این ستاره‌های درخشان را کنار ماه نشان می‌دهد. در حقیقت این ستاره انفجار اَبَرنواختری بود که سحابی خرچنگ را ساخت. این واقعه پس از اَبَرنواختر سال ۱۰۰۷ میلادی، که تقریباً در سراسر تمدن‌های پیش‌رو آن زمان ثبت شد، دومین اَبَرنواختر حیرت‌انگیز آن قرن بود.

۱۲۶۰ میلادی / ۶۵۸ هجری قمری

رصدخانه‌ی مراغه

خواجه نصیرالدین توسی موفق شد با دریافت بودجه‌ای کلان از فرمان‌روای مغول در دوره‌ی ایلخانی، رصدخانه‌ای در مراغه بسازد که مجهزترین و کارآمدترین رصدخانه‌ی عصر خود بود. به‌طوری که به الگویی برای رصدخانه‌های آینده‌ی دنیای پیش از تلسکوپ تبدیل شد. در ساختمانی گرد به قطر حدود ۲۸ متر و احتمالاً مانند برجی ۴ طبقه، اخترشناسان بسیاری جمع می‌شدند. رصدخانه‌ی مراغه با کتاب‌خانه‌ای بی‌نظیر، ابزارهایی چون ربع دیواری بزرگی برای زاویه‌سنجی در آسمان و حضور منجمانی مانند قطب‌الدین شیرازی، بخاری و ابن‌شاطر در

کنار نصیرالدین توسی، به بزرگ‌ترین پژوهشکده‌ی نجوم در آن دوره تبدیل شد. حدود ۱۲ سال پس از ساخت رصدخانه، زیج یا جداول نجومی ایلخانی از اطلاعات به‌دست آمده منتشر شد. پس از توسی دو دهه‌های بعد، دوران شکوفایی رصدخانه با کمبود بودجه و وقوع چند زمین‌لرزه به پایان رسید و فقط ویرانه‌ای از آن باقی ماند.

۱۴۲۰ میلادی / ۸۲۳ هجری قمری

سمرقند

الغییک، پادشاه و از نواده‌های تیمور لنگ، زاده‌ی سلطانیه در نزدیکی زنجان، اخترشناسی بلندپرواز و با پشت‌کار بود. او با طراحی منجم ایرانی دیگری به نام غیاث‌الدین جمشید کاشانی، رصدخانه و مدرسه‌ی بزرگ نجوم را در سمرقند ساخت تا ادامه‌ی راه رصدخانه‌ی مراغه و نصیرالدین توسی باشد. رصدخانه ساختمانی سه طبقه و شامل بزرگ‌ترین ابزار زاویه‌سنجی بود. قوس سنگی بزرگی از جنس مرمر در تونلی زیر ساختمان، رو به آسمان و در جهت نصف‌النهار ناظر (رو به جنوب) باز می‌شد. این ابزار کمانی ۶۰ درجه به شعاع ۴۰ متر و یک سدس فخری بود (سدس به معنی یک ششم است). سدس‌های کوچک‌تر دستی بعدها مبنای ساخت سکستانت، ابزار جهت‌یابی دریانوردان شد. اندازه‌ی ابزار و دقت کار منجمان چنان بود که موقعیت ستاره‌ها را با دقت چند ثانیه قوس با چشم غیر مسلح می‌سنجیدند و زمان دقیق عبور ستاره از نصف‌النهار ناظر (نصف‌النهار گذرنده از شمال، جنوب و بالای سر) را به‌دست می‌آوردند. در نتیجه‌ی این مشاهدات، در حدود سال ۱۴۳۷ میلادی، زیج سلطانی با فهرست ۹۹۲ ستاره‌ی آسمان و تصحیحاتی بر معسطی بطلمیوس و اطلاعاتی دقیق از حرکت سیاره‌ها، منتشر شد. تصور می‌شود این داده‌ها و نظریات توسی در مراغه، مبنای اندیشه‌ی خورشیدمرکزی کوپرنیک شده باشد.

۱۵۴۳ میلادی

منظومه‌ی کوپرنیکی

نیکلاس کوپرنیک نظریه‌ی خود را، مبنی بر چرخش زمین به دور خورشید، منتشر کرد که کاملاً با تعالیم کلیسا مغایر بود. با آن‌که او از مدار بیضوی سیاره‌ها آگاه نبود، با حفظ مدارهای دایره‌ای کامل آن‌ها، که افلاطون پیشنهاد کرده بود، نظریه‌ی خورشیدمرکزی خود را به‌طور ناقص ارائه داد.

۱۵۷۷ میلادی

دنباله‌دار تیکو

تیکو براهه دنباله‌دار درخشانی را رصد کرد. او از اختلاف منظر مشاهده شده در این دنباله‌دار، ثابت کرد که این جسم در فراوسوی جو زمین در حال حرکت است. به این ترتیب، نخستین شواهد از ماهیت آسمانی و غیر جوی دنباله‌دارها و امکان تغییر کردن آسمان‌ها برخلاف اندیشه‌های ارسطویی

فراهم آمد.

۱۶۰۸ میلادی

نخستین تلسکوپ

عیک‌ساز هلندی، هانس لیپزشی (حدود ۱۶۱۹ - حدود ۱۵۷۰)، تلسکوپ شکستی را اختراع کرد (با آن‌که نمونه‌هایی از طرح‌های قدیمی‌تر نیز پیدا شده است، مشخص نیست که به ساخت تلسکوپ منجر شده باشد). این اختراع به‌سرعت در سراسر اروپا گسترش یافت و دانشمندانی مانند گالیله نمونه‌های خود را از روی آن ساختند. کشف‌های دانشمندان گوناگون در این زمینه، سرآغاز انقلابی در اخترشناسی بود.

۱۶۰۹ میلادی

قوانین کپلر

یوهان کپلر کتاب خود، اخترشناسی نوین، را منتشر کرد. او در این کتاب و کتاب‌های بعدی سه قانون حرکت‌های سیاره‌ای خود را اعلام کرد که در آن‌ها مدارهای بیضوی را جای‌گزین مدارهای دایره‌ای افلاطون و کوپرنیک کرده بود تا مشکل تغییر سرعت حرکت سیاره‌ها را در آسمان و در مدارهایشان توضیح دهد. تقویم‌های نجومی، که بر اساس قوانین کپلر طراحی شد، موقعیت سیاره‌ها را بسیار دقیق‌تر از قبل پیش‌بینی می‌کرد.

۱۶۱۰ میلادی

رصد‌های تلسکوپ

گالیله‌نو گالیله یافته‌های حاصل از رصد با تلسکوپ دست‌ساز خود را منتشر کرد. این یافته‌ها شامل لکه‌هایی روی خورشید، دهانه‌های برخوردی روی ماه، ماهیت ستاره‌ای نوار راه شیری و چهار قمر مشتری و گردش آن‌ها به دور مشتری بود. او، با اثبات این‌که همه چیز به دور زمین نمی‌گردد، دیدگاه خورشیدمرکزی کوپرنیک را تأیید کرد. گالیله در پافشاری بر این دیدگاه در سال‌های پایانی عمرش از سوی کلیسا در خانه‌ی خود در فلورانس ایتالیا حبس شد. اما در آن دوره هم رخ‌گرد یا لیبراسیون ماه را کشف کرد.

۱۶۵۵ میلادی

تیتان

با افزایش قدرت و کیفیت تلسکوپ‌ها، کریستین هوگنس به بررسی زحل پرداخت و بزرگ‌ترین قمر آن، تیتان، را کشف کرد. او شکل زحل را شرح داد و به وجود حلقه‌ای نازک اطراف این سیاره اشاره کرد.

۱۶۶۳ میلادی

تلسکوپ بازتابی

جیمز گریگوری (۱۶۷۵-۱۶۳۸)، اخترشناس اسکاتلندی، تلسکوپ بازتابی ساخت که در آن به جای عدسی از آینه استفاده شده بود به این ترتیب به گشودگی دهانه‌های بزرگ‌تری

دست یافت و از هدر رفتن نور جلوگیری کرد. طی پنج سال بعدی، ایزاک نیوتن این طرح را تکمیل و تلسکوپ نیوتنی را اختراع کرد. نمونه‌های دیگری از این تلسکوپ در سال‌های بعد ساخته شد و به مرور، برتری‌های بازتابی‌های بزرگ در مقایسه با شکستی‌ها مشخص گردید.

۱۶۸۷ میلادی

نظریه‌ی گرانش

ایزاک نیوتن کتاب اصول ریاضیات خود را منتشر کرد که در آن، به ارائه‌ی نظریه‌ی گرانش و قوانین حرکت اجسام پرداخته بود. او در این کتاب به شرح قوانین حرکت‌های سیاره‌ای کپلر پرداخت و به اخترشناسان در درک نیروهای عمل‌کننده میان خورشید، سیاره‌ها و قمرهای آن‌ها کمک کرد. فیزیک نیوتنی انقلابی در علم بود.

۱۷۰۵ میلادی

دنباله‌دار هالی

ادموند هالی بر اساس محاسباتی نشان داد که دنباله‌دارهایی که از سال ۱۴۵۶ تا ۱۶۸۲ در بازه‌های زمانی ۷۶ ساله ظهور کرده و ثبت شده‌اند، یک دنباله‌دار است (هالی). او پیش‌بینی کرد که این دنباله‌دار دوباره در سال ۱۷۵۸ بازمی‌گردد. وقتی طبق پیش‌بینی او دنباله‌دار دوباره ظاهر شد، هالی زنده نبود؛ اما دنباله‌دار را به نام او نامیدند.

۱۷۵۰ میلادی

آسمان جنوبی

نیکولا دولاکای (۱۷۶۲-۱۷۱۳)، اخترشناس فرانسوی، به سوی اقیانوس‌های جنوبی پادبان کشید و کار بزرگ فهرست کردن بیش از ۱۰ هزار ستاره‌ی آسمان جنوبی را به‌انجام رساند. با آن‌که پیش از او کسانی مانند هالی، آسمان را رصد کرده بودند، دولاکای نخستین فهرست جامع از آسمان جنوبی را تهیه کرد.

۱۷۸۱ میلادی

اورانوس

اخترشناس آماتور، ویلیام هرشل، سیاره‌ی اورانوس را کشف کرد. اما در نخستین رصدها، آن‌را با یک دنباله‌دار اشتباه گرفت. اورانوس نخستین سیاره‌ای بود که فراسوی زحل (دورترین سیاره‌ای که از دوره‌ی باستان شناخته شده بود) کشف می‌شد.

۱۷۸۴ میلادی

فهرست مسیه

شارل مسیه فهرست خود را، که مجموعه‌ای از خوشه‌های ستاره‌ای و سحابی‌ها بود، منتشر کرد. این فهرست شامل اجرامی بود که به تصور مسیه، امکان داشت با دنباله‌دارها اشتباه گرفته شود. این فهرست به سرعت به مرجعی برای رصد خوشه‌های ستاره‌ای، سحابی‌ها و کهکشان‌ها تبدیل شد و هنوز هم در

رصد‌های عمومی کاربرد دارد.

۱۸۵۰ میلادی

تابش فروسرخ

ویلیام هرشل، به کمک یک منشور، نور خورشید را تجزیه کرد و با گرماسنج به بررسی میزان انرژی هریک از رنگ‌های تجزیه شده‌ی طیف پرداخت. این نخستین بررسی طیف یک ستاره در تاریخ بود. در این بررسی، او متوجه شد که بعد از نور قرمز طیف، افزایش ناگهانی حرارت رخ می‌دهد. سپس موج نامرئی فروسرخ (حرارتی) را کشف کرد و سنگ بنای طیف‌سنجی مدرن را نهاد.

۱۸۵۱ میلادی

سیارک‌ها

جوزیه پیاتزی (۱۸۲۶ - ۱۷۴۶) اخترشناسی ایتالیایی بود که موفق شد جرم جدیدی را، که به نظر یک سیاره می‌آمد، در مدار میان مریخ و مشتری کشف کند. او این جرم را سرس نامید. ویلیام هرشل با محاسبات خود قطر این سیاره‌ی جدید را فقط ۳۲۰ کیلومتر تخمین زد که به اندازه‌ی یک سیاره نبود. به همین سبب، نام سیارک را برای چنین جرم‌هایی پیشنهاد کرد. اندکی بعد از آن، جرم‌های مشابه بیش‌تری در این ناحیه کشف شد. امروز می‌دانیم که قطر سرس حدود ۹۵۰ کیلومتر است و باز هم بسیار کوچک‌تر از آن است که سیاره باشد.

۱۸۱۴ میلادی

خطوط فرانیهوفر

یوزف فون فرانیهوفر با ساخت نخستین طیف‌سنج دقیق، آن‌را برای بررسی نور خورشید به‌کار برد. او صدها خط نازک تیره را در طیف خورشید کشف و ثبت کرد. در سال ۱۸۵۹، ارتباط این خطوط با عناصر شیمیایی جو خورشید مطرح شد و از آن پس طیف‌سنجی به ابزاری کارآمد برای بررسی ماهیت ستاره‌ها و مواد سازنده‌ی آن‌ها تبدیل شد.

۱۸۳۸ میلادی

اختلاف منظر ستاره‌ای

فردریش بیسل با موفقیت از روش تفاوت منظر ستاره‌ای (اثر گردش زمین به دور خورشید بر دید ما از موقعیت ستاره‌ها) برای تعیین فاصله‌ی ستاره‌ی نزدیک ۶۱-دجانه، نخستین ستاره به‌جز خورشید که فاصله‌ی آن از ما مشخص می‌شد، استفاده کرد. بیسل پیش‌گام اندازه‌گیری‌های صحیح موقعیت ستاره‌ها بود و اختلاف منظر ستاره‌ای قالبی جدید را برای تغییر ابعاد کیهان به‌وجود آورد.

۱۸۴۳ میلادی

چرخه‌ی لکه‌های خورشیدی

هاینریش شوابه (۱۸۷۵ - ۱۷۸۹)، اخترشناس آماتور آلمانی که

۱۷ سال به بررسی خورشید پرداخته بود، کشف خود را مبنی بر وجود چرخه‌ای منظم در تعداد لکه‌های خورشیدی منتشر کرد. این نخستین سر‌بخ به ساختار داخلی خورشید بود.

۱۸۴۵ میلادی

تلسکوپ‌های بزرگ

اخترشناس ایرلندی، لرد راس، نخستین نمونه از تلسکوپ‌های غول‌پیکر جهان را با آینه‌ای اصلی به قطر ۱۸۰ سانتی‌متر ساخت. او از این ابزار برای رصد و طراحی سحابی‌ها استفاده می‌کرد و در ظرف چند ماه، متوجه ساختار مارپیچی جرمی شد که امروز به نام کهکشان گردابی می‌شناسیم.

۱۸۴۵ میلادی

عکاسی نجومی

پنج سال پس از نخستین عکس‌های آماتوری با تلسکوپ از قرص ماه (سال ۱۸۴۰)، فیزیک‌دانان فرانسوی ژان فوکو (۱۸۶۸ - ۱۸۱۹) و آرمان فیزو (۱۸۹۶ - ۱۸۱۹)، نخستین عکس را با جزئیات زیاد از سطح خورشید، با یک تلسکوپ تهیه کردند. این عکس اعلام تولد عکاسی علمی نجومی بود. پس از ۵ سال، اخترشناسان تصاویر دقیقی از سطح ماه تهیه کردند. فیلم‌های عکاسی اولیه آن‌قدر حساس نبود که نور ستاره‌ها را نیز ثبت کند.

۱۸۴۶ میلادی

نپتون

اخترشناس آلمانی، یوهان گوتفرد گاله (۱۹۱۰ - ۱۸۱۲) سیاره‌ی جدیدی یافت که نپتون نامیده شد. او اولین کشف را هنگام جست‌وجو در ناحیه‌ای به‌دست آورد که اوربن لووریه پیش‌بینی کرده بود. لووریه فرانسوی محل و ابعاد این سیاره را از اثر گرانشی که بر مدار اورانوس می‌گذاشت، محاسبه کرده بود. ریاضی‌دانی انگلیسی به نام جان کوچ آدافر (۱۸۹۲ - ۱۸۱۹) نیز یک سال پیش از آن، محاسبات مشابهی انجام داده بود.

۱۸۶۸ میلادی

عنصری در خورشید

هنگام یک خورشیدگرفتگی کلی، توجه اخترشناسان به خط طیفی نشری درخشان جدیدی در جو خورشید جلب شد. خط نشری هنگام گرم شدن و با تابش عناصر ایجاد می‌شود. اخترشناس انگلیسی، نورمن لاکیر (۱۹۲۰ - ۱۸۳۶)، اعلام کرد این عنصر روی زمین وجود ندارد و آن‌را هلیوم نامید که برگرفته از کلمه‌ی یونانی خورشید است. تقریباً ۳۰ سال بعد، عنصر هلیوم روی زمین کشف شد.

۱۸۷۲ میلادی

طیف ستاره‌ها

هنری دریپر (۱۸۸۲ - ۱۸۳۷)، اخترشناس آمریکایی، نخستین

عکس را از طیف یک ستاره (ستاره‌ی نسرواقع) گرفت. او توانست با مشخص کردن خطوط جذبی، ساختار شیمیایی جو آن‌را آشکار کند. با کمک طیف‌نگاری، اخترشناسان به کلیه مهمی برای درک تحول ستاره‌ها دست یافتند. ویلیام هاگینز از بررسی خطوط جذبی طیف به اندازه‌گیری انتقال به سرخ و انتقال به آبی ستاره‌ها پرداخت که بر مبنای اثر دوپلر، راهی برای درک میزان سرعت حرکت ستاره‌ها بود.

۱۸۹۵ میلادی

موشک‌ها

کنستانتین تسلیکوفسکی (یا سالکوفسکی) نخستین مقاله‌ی خود را درباره‌ی امکان پروازهای فضایی منتشر کرد. بزرگ‌ترین یافته‌ی این نابغه‌ی روس، این بود که موشک‌ها، برخلاف سایر پیش‌رانه‌ها، در وضعیت خلأ نیز کار می‌کنند. او اصول اولیه‌ی پرتاب‌گرهای چند مرحله‌ای را نیز تدوین کرد.

۱۹۰۱ میلادی

رده‌بندی طیفی

هنری دریپر فهرست ستاره‌ای خود را، که جامع‌ترین اطلاعات آن‌روز را داشت، منتشر کرد. در این فهرست، آتی جامپ کائن روشی را برای طبقه‌بندی ستاره‌ها بر مبنای خطوط جذبی طیف آن‌ها ارائه داده بود که مبنای رده‌بندی طیفی اخترفیزیک امروز است.

۱۹۰۶ میلادی

قدر ستاره‌ها

آینار هر تسپر ونگ استاندارد را برای اندازه‌گیری میزان درخشش حقیقی یک ستاره (قدر مطلق) بنیان نهاد. او نشان داد که در ۹۰ درصد از ستاره‌های کهکشان راه شیری، رابطه‌ی میان قدر مطلق و رنگ ستاره وجود دارد. در سال ۱۹۱۳، هنری راسل نموداری منتشر کرد که این رابطه را به نمایش می‌گذاشت. اخترشناسان درباره‌ی این موضوع که نمودار نشان‌دهنده‌ی خط سیر تحول ستاره‌هاست، هم‌نظر بودند. اما درباره‌ی جهت پیش‌رفت این خط سیر، اختلاف نظر داشتند. سرانجام، آرتور ادینگتون در سال ۱۹۲۴ به این مباحثه‌ها پایان داد.

۱۹۱۶ میلادی

سیاه‌چاله‌ها

کارل شوارتزشیلد (۱۹۱۶ - ۱۸۷۳)، اخترشناس آلمانی، از نظریه‌ی نسبیت عام انیشتین سود جست تا پایه‌های نظریه‌ی سیاه‌چاله‌ها را بنا نهد. بر اساس نظر او، اگر ستاره‌ای آن‌قدر به رمیش ادامه دهد که از اندازه‌ای مشخص بگذرد، گرانش آن به حدی افزایش خواهد یافت که اجازه‌ی فرار هیچ نوع تابشی را نمی‌دهد.

۱۹۲۳ میلادی

کهکشان‌ها

ادوین هابل متغیری فضاووسی را در «سحابی مسلسله» کشف و ثابت کرد که مسلسله یا آندرومدا و برخی از سحابی‌های شناخته شده در آن زمان، خود کهکشان‌هایی در فضاوسی راه شیری‌اند. در سال ۱۹۲۵، او روشی را برای طبقه‌بندی کهکشان‌ها ارائه داد.

۱۹۲۶ میلادی

موشک‌ها

رابرت گادارد نخستین موشک سوخت مایع را با موفقیت پرتاب کرد. او امکان کار کردن موشک‌ها در خلأ را نیز اثبات کرد. نمونه‌های بعدی موشک‌های او نخستین بار دیوار صوتی را شکستند.

۱۹۳۰ میلادی

ستاره‌های کوتوله

سورامانیان چاندراسکار، به کمک ایده‌های تازه‌ای که از فیزیک ذرات اتمی گرفته بود، پیش‌بینی کرد که در کوتوله‌های سفیدی که بیش از $1/44$ برابر خورشید جرم دارند، اتم‌ها فرومی‌ریزند و باعث می‌شوند ستاره ناگهان و به شدت بر خود فروبریزد. در سال ۱۹۳۳، والتر باده و فریتز زویکی توضیح دادند که ستاره‌های نوترونی حاصل از این فروریزش، با تولد خود سبب نوعی انفجار آبرنواختاری می‌شوند.

۱۹۲۹ میلادی

قانون هابل

ادوین هابل کشف کرد که کهان در حال انبساط است و نقاط دورتر عالم با سرعت بیش‌تری از ما دور می‌شوند. دو سال بعد، ژرژ لومتر نظر داد که این انبساط را می‌توان با ادامه دادن در جهت معکوس زمانی به یک نقطه‌ی ابتدایی، مهانگ یا انفجار بزرگ، رساند.

۱۹۳۰ میلادی

پلوتون

کلاید تومبا سیاره‌ی پلوتون را در رصدخانه‌ی لاول در آریزونا‌ی آمریکا کشف کرد. این سیاره آن‌قدر کم‌سو بود و جان سرعت کمی داشت که فقط با مقایسه‌ی عکس‌هایی با فاصله‌ی چند شب می‌شد متوجه حضور آن شد.

۱۹۳۲ میلادی

اخترشناسی رادیویی

کارل جانسکی نخستین امواج رادیویی از فضا را ثبت کرد. در سال ۱۹۴۲، امواج رادیویی خورشید آشکار شد و ۷ سال بعد، اخترشناسان رادیویی نخستین منابع رادیویی دوردست را در سحابی خرچنگ و کهکشان‌های قطورس A و M۵۷ شناسایی کردند.

۱۹۳۸ میلادی

انرژی ستاره‌ای

فیزیک‌دان آلمانی، هانس بته (۲۰۰۵ - ۱۹۰۶)، به توضیح فرآیند تولید انرژی در ستاره‌ها پرداخت. او مجموعه‌ای از فرآیندهای هم‌حوشی هسته‌ای را شرح داد که باعث تبدیل هیدروژن به هلیوم و تولید میزان هنگفتی انرژی در هسته‌ی ستاره‌ها می‌شد. این فرآیند هیدروژن ستاره را به آهستگی مصرف و امکان ادامه‌ی حیات ستاره را تا میلیارد‌ها سال امکان‌پذیر می‌کند.

۱۹۴۴ میلادی

موشک ۲-۷

گروهی از دانشمندان آلمانی به رهبری ورنر فون براون، موشک ۲-۷ را تکمیل کردند که نخستین سلاح پرتابه‌ای (بالستیکی) با پیش‌ران موشکی بود. مهندسان و دانشمندان گروه فون براون در پایان جنگ دوم جهانی از سوی آمریکا و روسیه دستگیر شدند. با انتقال آن‌ها به این دو کشور، برنامه‌های فضایی روسیه و آمریکا رشد کرد.

۱۹۵۷ میلادی

آغاز مسابقه‌ی فضایی

روسیه نخستین ماهواره‌ی خود را به نام اسپوتنیک ۱ به مدار فرستاد که آغازگر عصر فضا بود. آمریکا نخستین ماهواره‌ی خود را به نام اکسپلورر ۱، ۴ ماه بعد به مدار زمین فرستاد.

۱۹۵۹ میلادی

کاوش‌گرهای ماه

روسیه و آمریکا کاوش‌گرهایی را به سوی ماه فرستادند؛ اما کاوش‌گرهای پایونیر ناسا به‌کلی از دست رفتند و شکست خوردند. در حالی که برنامه‌ی لونا‌ی روس‌ها بسیار موفقیت‌آمیزتر از آب درآمد. در سپتامبر همان سال، لونا ۲ به روش برخوردی بر سطح ماه فرود آمد و لونا ۳ نخستین تصاویر را در ماه اکتبر از پشت ماه به زمین فرستاد.

۱۹۶۱ میلادی

انسان در فضا

روسیه بار دیگر در رقابت‌های فضایی پیش‌تر شد و توانست در ماه آوریل، یوری گاگارین را به مدار زمین بفرستد تا اولین انسانی باشد که به فضا رفته است. فضانورد آمریکایی، آلن شپارد، یک ماه بعد نخستین آمریکایی‌ای بود که به فضا رفت؛ اما در مدار زمین قرار نگرفت. در سال ۱۹۶۲، جان گلن نخستین آمریکایی بود که توانست به مدار زمین برود.

۱۹۶۲ میلادی

کاوش‌گرهای سیاره‌ای

مارینر ۲ نخستین فضایی‌مای کاوش‌گری بود که به سیاره‌ی دیگر رسید و در ماه دسامبر، از نزدیک زهره عبور کرد. ناسا این

۱۹۶۳ میلادی

اختروش‌ها

اخترشناس آمریکایی - هلندی، مارتین اشمیت (۱۹۲۹)، طیف اختروش‌ها را ثبت کرد. اختروش‌ها منابع رادیویی ستاره‌مانندی هستند که در سال ۱۹۶۰ کشف شده‌اند. او با این بررسی‌ها نشان داد که اختروش‌ها احتمالاً کهکشان‌های فعال و تقریباً دورترین جرم‌های عالم به ما هستند.

۱۹۶۵ میلادی

مهبانگ

آرنو پنزیاس و رابرت ویلسون اعلام کردند که موفق به کشف علائم رادیویی ضعیفی شده‌اند که از همه سوی آسمان به‌طور یکسان به ما می‌رسد. محاسبات دانشمندان مشخص کرد که این تابش باید ناشی از جسمی به دمای ۲۷۰- درجه‌ی سانتی‌گراد باشد. خیلی زود مشخص شد که این تابش بازمانده‌ای از تابش بسیار گرم حاصل از مهبانگ است که حدود ۱۴ میلیارد سال پیش به احتمال باعث تولد کیهان شده است.

۱۹۶۶ میلادی

فرود بر سطح ماه

مأموریت لونا ۹ روسیه در ماه ژانویه موفق شد نخستین فرود موفقیت‌آمیز و آرام را بر سطح ماه انجام دهد. آمریکا سورور ۱ را با عملیاتی پیچیده‌تر در ماه مه بر سطح ماه نشانند. مأموریت‌های سورور، که در پی برنامه‌ی رنجرهای ناسا (که فرود برخوردی بر ماه را در دستور داشتند) شکل می‌گرفت، قرار بود محل‌های مناسب برای فرود احتمالی انسان را مشخص کنند.

۱۹۶۷ میلادی

تپ‌اخترها

جاسلین بل برنل و آنتونی هویس نخستین تپ‌اختر را کشف کردند؛ جرمی که تابش‌های رادیویی به صورت تپ‌های بسیار منظمی ارسال می‌کند. تپ‌اخترها سرانجام ستاره‌های نوترونی‌ای شناخته شدند که بسیار سریع می‌چرخند و میدان مغناطیسی بسیار شدیدی دارند. ستاره‌های نوترونی بقایای انفجار آبرنواختاری هستند.

۱۹۶۹ میلادی

آپولو ۱۱

آمریکا مسابقه‌ی فضایی به سوی ماه را، در ۲۱ ژوئیه، زمانی که نیل آرمسترانگ قدم به خاک گذاشت، به سود خود خاتمه

داد. این مأموریت با ۵ مأموریت مهنشین دیگر ادامه پیدا کرد که در سه مورد آن‌ها خودروهای مه‌نورد به ماه برده شدند.

۱۹۷۰ میلادی

اخترشناسی پرتو ایکس

ماهواره‌ی اوهورو، که برای نقشه‌برداری آسمان در طول موج پرتو ایکس طراحی شده بود، از سوی ناسا به مدار زمین فرستاده شد. پیش از آن، وجود تابش‌های پرتو ایکس خورشید و چند ستاره‌ی دیگر با کمک برخی آزمایش‌ها با بالن و موشک‌های تحقیقاتی تأیید شده بود. اما ماهواره‌ی اوهورو بیش از ۳۰۰ منبع تابش پرتو ایکس کشف کرد که برخی از آن‌ها نامزدهای احتمالی سیاه‌چاله‌ها بودند.

۱۹۷۱ میلادی

ایستگاه‌های فضایی

روسیه نخستین ایستگاه فضایی خود، سالیوت ۱، را به مدار زمین فرستاد. این برنامه با ارسال تعداد دیگری از ایستگاه‌های فضایی ادامه پیدا کرد تا به نقطه‌ی اوج خود، یعنی ایستگاه فضایی میر، در سال ۱۹۸۶ رسید. این ایستگاه‌ها در فضا به کیهان‌نوردان امکان می‌داد آزمایش‌هایی را در مدار زمین انجام دهند و رکوردهایی از اقامت در فضا به‌دست آورند.

۱۹۷۵ میلادی

ملاقات با سیاره‌ها

کاوش‌گر روسی ونرا ۹ بر سطح سیاره‌ی زهره فرود آمد و نخستین تصاویر را از سطح این سیاره به زمین فرستاد. نخستین کاوش‌گری که با موفقیت بر سطح سیاره‌ای دیگر فرود آمد، ونرا ۷ در سال ۱۹۷۰ بود. اما دوربینی همراه نداشت. هر دو کاوش‌گر یک ساعت در وضعیت دشوار و فشار فوق‌العاده‌ی جو‌ی زهره دوام آوردند و سپس زیر فشار خرد شدند.

۱۹۷۶ میلادی

کاوش‌گرهای وایکینگ

دو کاوش‌گر فضایی آمریکایی به مریخ رسیدند. مأموریت وایکینگ‌ها شامل یک مدارگرد بود که به عکاسی از سطح سیاره از بالا می‌پرداخت. یک سطح‌نشین هم با فرود بر سطح، ساختارهای سنگی و جست‌وجوی (البته بدون موفقیت) حیات مریخی را بررسی می‌کرد.

۱۹۷۷ میلادی

ویجرها

ناسا دو کاوش‌گر ویجر را برای ملاقات با سیاره‌های بیرونی به فضا فرستاد. ویجرها اطلاعات علمی و تصویری از مشتری و زحل به زمین فرستادند و پیش از آن‌که از قلمرو سیاره‌ای منظومه‌ی شمسی خارج شوند، ویجر ۲ نخستین کاوش‌گری

شد که به ملاقات اورانوس و نپتون رفت.

۱۹۸۱ میلادی

شاتل فضایی

کلمبیا، نخستین نمونه از شاتل‌های فضایی قابل استفاده‌ی مجدد ناسا، نخستین پرواز خود را انجام داد. شاتل‌های فضایی، که ۱۰ سال صرف تکمیل و ساخت آن‌ها شده بود، سفرهای فضایی را به رویه‌ای معمول تبدیل کردند و حتی راه‌های جدیدی برای ساخت نسل بعدی ایستگاه‌های فضایی گشودند.

۱۹۸۳ میلادی

اخترشناسی پرتو فروسرخ

نخستین ماهواره‌ی تخصصی اخترشناسی فروسرخ، IRAS (ایراس)، به فضا پرتاب شد. این ماهواره به کمک هلیوم مایع در وضعیتی بسیار خنک نگه‌داشته می‌شد. این ماهواره، تا زمانی که ذخیره‌ی هلیوم آن به پایان برسد، ۳۰۰ روز فعالیت کرد. ایراس در این مدت نقشه‌برداری ۹۸ درصد از کل آسمان را در طول موج فروسرخ به پایان رساند.

۱۹۸۶ میلادی

فاجعه‌ی چلنجر

برنامه‌ی فضایی ناسا پس از انفجار شاتل فضایی چلنجر و مرگ ۷ فضانورد آن، که اندکی پس از پرتاب رخ داد، به تعویق افتاد. تحقیقات و رسیدگی به دلایل این انفجار و بازسازی و رفع نقص بقیه‌ی ناوگان شاتل‌ها باعث شد تا آن‌ها سه سال زمین‌گیر شوند.

۱۹۸۶ میلادی

کاوش‌گرهای دنباله‌دارها

بازگشت دنباله‌دار هالی با کاروانی از ۵ کاوش‌گر روسی، ژاپنی و اروپایی خوش‌آمد گفته شد. چشمگیرترین این مأموریت‌ها، کاوش‌گر اروپایی جیوتو بود که از میان گیسوی دنباله‌دار عبور و از هسته‌ی آن تصویر تهیه کرد.

۱۹۸۷ میلادی

آبرنواختر ماژلان

پرنورترین آبرنواختر دیده شده طی حدود چهار قرن در کهکشان اقماری راه شیری، ابر بزرگ ماژلان، ظاهر شد. بررسی این آبرنواختر تا امروز، که به سحابی کوچک در حال انبساطی تبدیل شده، کمک بزرگی به رشد دانش اخترشناسان از تحول ستاره‌های پُرجرم کرده است.

۱۹۹۰ میلادی

ماژلان

کاوش‌گر ماژلان، که از سوی ناسا به فضا رفته بود، به زهره رسید و ۳ سال به نقشه‌برداری رادیویی از آن پرداخت. ماژلان

نخستین کاوش‌گر از نسل جدیدی از کاروان کاوش‌گرهایی مانند گالیله و کاسینی بود که به ترتیب در سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۲ به ملاقات مشتری و زحل رفتند.

۱۹۹۰ میلادی

تلسکوپ فضایی

تلسکوپ فضایی هابل، نخستین تلسکوپ فضایی نوری بزرگ، به وسیله‌ی شاتل فضایی و فضانوردان آن در مدار قرار گرفت. اما اخترشناسان خیلی زود متوجه شدند نقص فنی کوچکی در آینده اصلی مانع فعالیت مفید هابل می‌شود. مأموریت تعمیر پیچیده‌ای در سال ۱۹۹۳ به این تلسکوپ امکان داد ثبت تصاویر شگفت‌انگیز و شریخش را از ستاره‌های دور دست، سحابی‌ها و کهکشان‌ها آغاز کند.

۱۹۹۲ میلادی

افت و خیزهای کیهانی

ماهواره‌ی کاوش‌گر زمینه‌ی کیهانی (کوبی COBE) نقشه‌ی دقیقی از تابش‌های باقی‌مانده از مه‌بانگ، که در پس‌زمینه‌ی کیهان وجود دارد، تهیه کرد. این نقشه ناهم‌سانی و افت و خیزهایی را نشان می‌دهد که حاصل تغییرات کوچکی در چگالی و پراکنندگی جرم در عالم اولیه و نطفه‌ی کهکشان‌ها و خوشه‌های کهکشانی است.

۱۹۹۲ میلادی

تلسکوپ کک

تلسکوپ ۱۰ متری کک، بر فراز قله‌ی موناکی در هاوایی، تکمیل شد. این مهم‌ترین نمونه‌ی اولیه از نسل جدید و انقلابی اپتیک‌ها بود که ساخته می‌شد. آینده‌ی اصلی کک از ۳۶ قطعه‌ی شش‌گوش تشکیل شده که جهت آن‌ها با کمک رایانه‌ها تنظیم می‌شود. این تلسکوپ‌های نسل جدید قابلیت تداخل‌سنجی نوری نیز دارند که قادر به ترکیب نور تلسکوپ‌های متفاوت برای رسیدن به تفکیکی بالاتر از توان هر تلسکوپ مستقل است.

۱۹۹۳ میلادی

برخورد دنباله‌دار

دنباله‌داری که در سال ۱۹۹۳ کشف شده بود، بر اثر گذر از نزدیکی مشتری (عبور از حدّ رُش) به ۲۰ تکه تقسیم شد و حدود یک سال پس از کشف، تکه‌های آن با جوّ سیاره‌ی مشتری برخورد کرد و آثار این انفجارها چند هفته‌ای دیده می‌شد. اخترشناسان با تلسکوپ‌های زمینی، تلسکوپ هابل و فضایی‌های گالیله، که در راه مشتری بود، ابرهای عظیم سیاه حاصل از برخورد را مشاهده و آن‌ها را تجزیه و تحلیل کردند.

۱۹۹۵ میلادی

سیاره‌ی فراخورشیدی

میشل مایورو و دیدیه کونلور سونبسی نخستین سیاره‌ی فراخورشیدی قطعی را به دور ستاره‌ای خورشیدمانند در رشته‌ی اصلی به نام ۵۱-اسپ بال‌دار (فرس) پیدا کردند. آن‌ها شواهد وجود سیاره‌ی در طیف ستاره یافتند؛ روشی که تا امروز روش اصلی جست‌وجوی سیاره‌های فراخورشیدی بوده است. پیش از آن‌ها، در سال ۱۹۹۲ نیز، نشانه‌هایی از وجود سیاره‌ای به دور یک تپ‌خستر پیدا شده بود. از آن زمان تا امروز، حدود ۵۰۰ سیاره‌ی فراخورشیدی شناخته شده است.

۱۹۹۸ میلادی

ایستگاه فضایی بین‌المللی

کار ساخت سازه‌های عظیم ایستگاه جدید فضایی آغاز شد. این پروژه با همکاری چند کشور از جمله رقبای قدیمی عرصه‌ی فضا، آمریکا و روسیه، شکل گرفت. این ایستگاه پس از تکمیل، اباعادی معادل یک زمین فوتبال خواهد داشت و در هر زمان میزبان ۷ فضانورد خواهد بود. به‌علاوه، آزمایشگاه مناسبی برای آزمون‌های ریزگرانشی اخترشناسی، و پژوهش‌های مربوط به کاوش‌های آینده‌ی منظومه‌ی شمسی است.

۱۹۹۹ میلادی

انرژی تاریک

کیهان‌شناسان از مقایسه‌ی فاصله‌ی به‌دست آمده از اُبرنواخترهای دیده شده در کهکشان‌های بسیار دور با شتاب انبساط کیهان، که در انتقال به سرخ کهکشان‌ها دیده می‌شود، به افزایش شتاب انبساط کیهانی پی بردند. این موضوع وجود انرژی ضد گرانشی را در کیهان مطرح کرد که انرژی تاریک نام گرفت. ماهیت این انرژی هنوز ناشناخته است.

۲۰۰۱ میلادی

اقمار جدید

با روش‌های جدید تصویربرداری، اخترشناسان قمرهای بسیاری در اطراف مشتری و زحل کشف کردند. در این سال ۱۰ قمر جدید برای زحل و ۱۲ قمر برای مشتری پیدا شد و در سال‌های بعد نیز به شمار این اقمار افزوده گشت.

۲۰۰۳ میلادی

فاجعه‌ی کلمبیا

شاتل فضایی کلمبیا، ۲۲ سال پس از نخستین پرواز فضایی، در راه بازگشت به زمین همراه ۷ فضانورد خود در جو سوخت. تیرهای نورانی این واقعه در ایالت‌های گوناگون آمریکا دیده شد و تکه‌های شاتل بر زمین ناحیه‌ی گسترده‌ای فروریخت. پس از مدت‌ها تحقیق، دلیل انفجار برخورد تکه‌ای از فوم دور مخزن بیرونی سوخت شاتل به بال فضایی‌ها در هنگام صعود تشخیص داده شد. این برخورد صدمه‌ای به بال وارد کرده بود که در هنگام برگشت، حادثه آفرید. این فاجعه ۲/۵ سال شاتل‌ها را زمین‌گیر کرد تا مهندسان به دلیل وقوع چنین حوادثی پی

ببرند. با وجود ایجاد ایمنی بیش‌تر در پروازهای بعدی شاتل، انفجار کلمبیا دوره‌ی بازنشتگی شاتل‌ها و آغاز کار نسل جدید فضایی‌های سرنشین‌دار را قطعی کرد.

۲۰۰۴ میلادی

مریخ‌نوردهای دوقلو

جفت مریخ‌نوردهای ناسا در دو سوی مخالف سیاره‌ی سرخ فرود آمدند. کار آن‌ها زمین‌شناسی مریخ، یعنی بررسی خاک و سنگ‌های اطراف محل فرود به دنبال نشانه‌هایی از حضور آب و فعالیت‌های زمین‌شناختی در گذشته‌ی مریخ و شناخت اقلیم سیاره از گذشته تا حال بود. در حالی که عمر مفید هریک از مریخ‌نوردها با توجه به وضعیت سخت محیط سه ماه در نظر گرفته شده بود، تا زمان انتشار این کتاب، آن‌ها بیش از ۶ سال فعالیت کرده‌اند، کیلومترها بر مریخ پیموده‌اند و هزاران عکس بی‌همتا به زمین فرستاده‌اند.

۲۰۰۵ میلادی

کاوش تیتان

کاوش گر هوینگس از فضایی‌های مادر خود، کاسینی، در مدار زحل جدا شد تا راهی دیدار با تیتان، بزرگ‌ترین قمر زحل و تنها قمر دارای جو غلیظ شود. طی حدود سه ساعت فرود هوینگس، اطلاعات بسیاری از جو تیتان، که ساختاری نسبتاً مشابه جو زمین دارد، به‌دست آمد. به‌علاوه، نخستین تصاویر واضح از سطح تیتان پیش روی انسان قرار گرفت. هوینگس نشان داد که سطح سرد تیتان محیطی پویا از جریان‌های متان مایع و کوه و صخره‌هایی کوتاه از یخ آب است.

۲۰۰۵ میلادی

بزرگ‌تر از پلوتون

اخترشناسان جرمی را در ورای مدار پلوتون و متعلق به کمربند خرده‌سیاره‌های کویپر، و کمی بزرگ‌تر از پلوتون یافتند که انتظار می‌رفت سیاره‌ی دهم شود. این جرم، که اریس نام گرفت، اخترشناسان را متقاعد کرد در سال ۲۰۰۶ تعریف جدیدی از سیاره ارائه دهند. طبق آن تعریف، پلوتون، اریس و سرس، که هر سه ظاهری سیاره‌مانند اما ساختار و محیطی متفاوت دارند، به جمع سیاره‌های کوتوله پیوستند و منظومه‌ی شمسی شامل ۸ سیاره‌ی اصلی شد.

۲۰۰۵ میلادی

برخورد ژرف

فضایی‌های دیپ ایمپکت (برخورد ژرف) در کنار هسته‌ی دنباله‌دار تمپل ۱ قرار گرفت و گلوله‌ی آزمایش‌گری را به جرم حدود ۴۰۰ کیلوگرم با شتاب به سوی کوه یخ فضایی رها کرد. فضایی‌های از یک سو، و تلسکوپ‌های زمینی و فضایی از سوی دیگر، ابر و درخشش حاصل از انفجار را زیر نظر گرفتند تا اسرار بیش‌تری از دنباله‌دارها فاش شود.

۲۰۰۶ میلادی

نقشه‌برداری ماده‌ی تاریک

کیهان‌شناسان در خوشه‌ی کهکشانی دوردستی نشانه‌ی قطعی و دقیق ماده‌ی تاریک را یافتند و نخستین بار از توزیع آن نقشه‌برداری کردند. از آن‌جا که ماده‌ی تاریک در هیچ طول موجی دیده نمی‌شود، اخترشناسان اثر گرانشی این ماده را بر نور کهکشان‌های زمینه بررسی کردند. در سال ۲۰۰۷ نیز با این روش ماده‌ی تاریک خوشه‌ی کهکشانی دیگری بررسی شد و حتی برای نخستین بار، نقشه‌ای سه بعدی از توزیع ماده‌ی تاریک در بخشی از کیهان به‌دست آمد.

۲۰۰۸ میلادی

بزرگ‌ترین شتاب‌گر ذرات

شتاب‌گر بزرگ هادرون (LHC)، بزرگ‌ترین دستگاه روی زمین، از سوی مؤسسه‌ی سرن و در نتیجه‌ی سال‌ها همکاری ۱۰ هزار دانشمند و متخصص از حدود ۱۰۰ کشور، ۱۷۵ متر زیر زمین در مرز سوئیس و فرانسه به‌راه افتاد. کار LHC با تونل‌هایی به مجموع ۲۷ کیلومتر و شامل بیش از ۹ هزار آهن‌ربای عظیم، ایجاد میدان مغناطیسی بسیار قوی برای شتاب‌دادن به ذرات پروتون تا بسیار نزدیک به سرعت نور است. LHC با ایجاد میلیون‌ها برخورد شدید میان پروتون‌های شتاب‌گرفته، رازهای ذرات بنیادی عالم را جست‌وجو می‌کند که پیش‌بینی می‌شود هم در فیزیک و هم در کیهان‌شناسی (شناخت ما از وضعیت پیدایش عالم و وضعیت امروز و آینده‌ی آن) تحولی ایجاد کند.

۲۰۰۹ میلادی

سال جهانی نجوم

انجمن بین‌المللی نجوم و بخش آموزشی سازمان ملل (یونسکو)، چهارصدمین سال‌گرد تلسکوپ گالیله (و آغاز اخترشناسی جدید) را سال جهانی نجوم نامید. به کوشش مراکز نجوم و اخترشناسان آماتور و حرفه‌ای در سراسر جهان، برنامه‌های گسترده‌ای برای ترویج نجوم میان مردم و رشد آموزشی این دانش ترتیب داده شد و پروژه‌های جهانی متعددی آغاز گردید. طبق آمار، این سال بزرگ‌ترین فعالیت جهانی در ترویج نجوم بود.

۲۰۰۹ میلادی

آب در ماه

بررسی آثار برخورد موشک فضایی‌های LCROSS با قطب جنوب ماه، شواهد قلی مبنی بر وجود یخ آب در بستر همیشه در سایه‌ی گودال‌های قطبی ماه را تأیید کرد که منبع ارزش‌مندی برای اکتشاف‌های آینده‌ی انسان در ماه است.

نام آوران نجوم و فضا

اودوکسوس اهل شنیدوس

۳۵۵ - ۴۸۰ ق.م.

این اخترشناس و ریاضی‌دان یونانی، مدلی از منظومه‌ی شمسی بر مبنای مرکز بودن زمین و حرکت سیاره‌های دیگر به دور آن، ارائه داد که در آن، سیاره‌ها را کره‌های شفافی در مسیر خود نگه می‌داشتند. این کره‌های شفاف یا فلک‌ها، به گونه‌ای درون هم قرار داشتند که محور هر فلک، به فلک محیط بر آن متصل بود. با این مدل می‌شد حرکت سیاره‌ها را برای ناظر زمینی توضیح داد. اما نمی‌شد با آن تغییر روشنایی و فاصله‌ی میان زمین و سیاره‌ها را شرح داد. این نظریه بعد از چند قرن، جای خود را به مدل زمین‌مرکزی بطلمیوس داد.

آریستارخوس ساموسی

۲۵۰ - ۳۱۰ ق.م.

اخترشناس یونانی که با استفاده از هندسه، فاصله‌ی زمین تا ماه و زمین تا خورشید را تخمین زد. او به کمک این روش، فاصله‌ی خورشید تا زمین را ۲۰ برابر فاصله‌ی ماه تا زمین برآورد کرد (که در حقیقت، این فاصله ۴۰۰ برابر است). او با توجه به این موضوع که خورشید ۷ بار بزرگ‌تر از زمین است (این عدد هم در حقیقت ۱۰۹ برابر است) نتیجه گرفت که زمین باید دور خورشید بگردد. این نظریه، ۱۸ قرن پیش از پذیرش عمومی نظریه‌ی خورشیدمرکزی بود.

اراتوستن اهل سیرن

۱۹۲ - ۲۷۳ ق.م.

دانشمند مصری یونانی که شعاع زمین را محاسبه کرد. او در شمال آفریقا متولد شد و تحصیلات خود را در اتن به انجام رساند. سپس کتاب‌دار کتاب‌خانه‌ی عظیم اسکندریه و معلم شخصی بطلمیوس سوم، پادشاه مصر، شد. او در کنار فعالیت‌های بسیار خود، جغرافیادانی ماهر بود که انحنای کره‌ی زمین را با اندازه‌گیری طول سایه‌ی ایجاد شده در دو منطقه به فاصله‌ی ۹۵۰ کیلومتر از هم، محاسبه کرد. بر مبنای محاسبات او، محیط زمین ۴۶/۵۰۰ کیلومتر بود که در حقیقت این عدد در مورد دایره‌ای استوایی ۴۰/۰۷۵ کیلومتر است.

آبرخس

حدود ۱۲۰ - ۱۹۰ ق.م.

اخترشناس یونانی که به سبب اختراع نوع جدیدی از زاویه‌سنج‌ها و استفاده از آن در ثبت موقعیت ۸۵۰ ستاره، معروف شده است. او فهرستی ستاره‌ای تهیه کرد که تا ۱۸ قرن پس از او، هنوز مورد استفاده بود. ابرخس ستاره‌ها را بر مبنای روشنایی ظاهری آن‌ها در آسمان طبقه‌بندی کرد. این طبقه‌بندی، پایه‌ای برای مقیاس قدر ستاره‌ها بود که امروزه نیز کاربرد دارد. محور چرخش سیاره‌ی ما دارای حرکتی مانند حرکت محور فرقه در حال ایستادن است که حرکت تقدیمی نام دارد. ابرخس سرعت تغییرات موقعیت این محور را اندازه گرفت و به اندازه‌گیری تغییر فاصله‌ی زمین و خورشید در طول یک سال پرداخت.

بطلمیوس

حدود ۱۶۸ - ۹۰ میلادی

اخترشناس مصری عقاید اخترشناسی یونان باستان و نتایج مشاهدات و نظرهای خود را در کتاب مجسطی ثبت کرد. کارهای اخترشناسی بطلمیوس تا قرن هفدهم، جهان اخترشناسی را در سیطره‌ی خود داشت. نوشته‌های او بر مبنای کارهای آبرخس و دیگران بود؛ اما خودش هم رصد‌های بسیاری به آن‌ها افزود. کتاب او مبنای تحقیقات بسیاری از متجمنان مسلمان شد. بطلمیوس گمان می‌کرد زمین کره‌ای کامل و در مرکز کیهان است و ۷ گوی شفاف، که هر یک، یکی از جرم‌های سماوی را، بر مبنای سرعتی که در آسمان داشتند، حمل می‌کنند، احاطه‌اش کرده‌اند. این ۷ فلک شامل ماه، عطارد، زهره، خورشید، مریخ، مشتری و زحل بودند. فلک هشتم نیز همه‌ی ستاره‌ها را شامل می‌شد. او سامانه‌ی ریاضی‌واری ابداع کرد که حرکت سیاره‌ها را، با وجود نادرستی مبنای تصور او، پیش‌بینی می‌کرد. همچنین طول و عرض جغرافیایی بسیاری از نقاط زمین را تعیین کرد و نقشه‌هایش آن‌قدر خوب بود که کریستف کلمب از آن‌ها استفاده کرد.



عبدالرحمن صوفی رازی

۹۸۶ - ۹۰۴ میلادی / ۳۷۶ - ۲۹۱ هجری قمری

اخترشناس و ریاضی‌دان ایرانی متولد ری در قرن چهارم هجری که در دوران دیلمیان در شیراز زندگی می‌کرد و بیش‌تر رصدهای خود را آن‌جا انجام داد. او را بزرگ‌ترین منجم رصدگر پس از بطلمیوس می‌دانند. کتاب مجسطی بطلمیوس را ترجمه و اشتباهاتی در رصدهای او را تصحیح کرد. سپس کتاب صورالکواکب خود را نوشت که راهنمای آشنایی با آسمان شب است. این فهرست ستاره‌ای تا قرن‌ها از منابع اصلی کار منجمان بود و حتی هنوز هم در بررسی‌های تاریخی ستاره‌ها، به آن رجوع می‌شود. صوفی پیش‌رو ثبت جرم‌های غیر ستاره‌ای و سحابی‌مانند آسمان بود. نخستین بار کهکشان مسلسله (آندرومدا) و خوشه‌ی چوب‌لباسی (خوشه‌ی صوفی) و ابر بزرگ ماژلان را ثبت کرد. او علاوه بر شیراز، در ری و بغداد نیز به پژوهش و رصد پرداخت و تصور می‌شود در شیراز و ری رصدخانه‌هایی برای کار او بنا شده بود. مجموعه‌ی دهانه‌های صوفی (AZOPHI) روی ماه به نام او نام‌گذاری شده است.



ابوریحان بیرونی

۱۰۴۸ - ۹۷۳ میلادی / ۴۴۰ - ۳۶۳ هجری قمری




بیرونی را بسیاری علامه‌ی دهر ایرانی قرن چهارم و پنجم هجری قمری می‌دانند که علاوه بر اخترشناسی، در ریاضی، فیزیک، فلسفه، تاریخ، طب و داروسازی نیز دانش کسب کرده و در اثر سفرهای بسیار، فردی جهان‌دیده بود. بیرونی در خوارزم به دنیا آمد که آن زمان، در قلمرو ساسانیان و امروز در خاک ازبکستان است. بیرونی را برخی استاد جاوید خوانده‌اند و نام بیرونی بر دانشگاه‌ها، کتاب‌خانه‌ها و مراکز علمی - فرهنگی در گوشه و کنار جهان دیده می‌شود. او گردش روزانه و سالانه‌ی خورشید در آسمان، چرخش محوری زمین، جهات جغرافیایی، عرض جغرافیایی خوارزم و قطر کره‌ی زمین را در کارهای خود به دقت بررسی و محاسبه کرد. خورشیدگرگفتگی کلی سال ۱۰۱۹ میلادی را در کوه‌های لغمان (افغانستان کنونی) و ماه‌گرفتگی کلی همان سال را در غزنه رصد و ثبت کرد. حتی برای مشاهده‌ی خورشیدگرگفتگی ابزاری نوآورانه ساخت. ۱۴۶ کتاب و رساله از او برجای مانده است که مهم‌ترین آن‌ها کتاب التفهیم در زمینه‌ی ریاضیات و نجوم، آثار الباقیه در زمینه‌ی تاریخ و جغرافیا و قانون مسعودی است که دانش‌نامه‌ای به نام مسعود غزنوی، حاکم وقت و حامی فعالیت‌های اوست. کتابی درباره‌ی تاریخ، جغرافیا و فرهنگ هندوستان نیز از او مانده است. بیرونی معاصر ابوعلی سینا بود و با او مکاتبه و تبادل نظر داشت. دهانه‌ای بر سطح ماه به نام بیرونی است.

عمر خیام نیشابوری

۱۱۳۱ - ۱۰۴۸ میلادی / ۵۲۵ - ۴۴۰ هجری قمری

ریاضی‌دان، فیلسوف، اخترشناس و شاعر قرن پنجم و ششم هجری قمری که رساله‌ی او در جبر و ریاضی، یکی از مهم‌ترین آثار این رشته پیش از دوران مدرن است. تحول در تقویم خورشیدی ایران و آغاز کیسه‌گیری‌های دقیق برای نگه‌داشتن دقت تقویم را به او نسبت می‌دهند. جلال‌الدین ملک‌شاه سلجوقی، خیام را به اصفهان دعوت کرد تا در رصدخانه‌ای ساکن شود که گفته می‌شود چندین سال محل پژوهش‌های خیام بود.



غیاث‌الدین جمشید کاشانی

۱۴۲۹ - ۱۳۸۰ میلادی / ۸۳۲ - ۷۸۲ هجری قمری

اخترشناس و ریاضی‌دان قرن نهم قمری که او را از نوایع تاریخ ریاضیات می‌دانند. او با دقت حیرت‌انگیزی عدد پی را حساب کرد و به دعوت الغیبیگ، حاکم دانشمند سمرقند، در این شهر رصدخانه‌ای به سبک رصدخانه‌ی مراغه بنا کرد. او و گروه اخترشناسان رصدخانه‌ی سمرقند زیج خاقانی را تدوین کردند و دست‌آوردهای مهمی در زمینه‌ی ساخت ابزارهای جدید نجومی داشتند.



نیکولاس کوپرنیک

۱۴۷۳ - ۱۵۴۳ میلادی

اخترشناس، پزشک و کشیش لهستانی که خورشید، و نه زمین، را مرکز منظومه‌ی سیاره‌ای ما دانست. او تحصیلات خود را در ریاضیات و علوم کلاسیک در لهستان و اخترشناسی و حقوق را در ایتالیا انجام داد. در سال ۱۵۰۶ به لهستان بازگشت تا مقام کشیشی کلیسای جامع فروتنبورگ را در اختیار بگیرد؛ سمتی که تا زمان مرگ در اختیار داشت. وظایف او در این مقام، سبک بود و کوپرنیک توانست زمان بسیاری را به مطالعه‌ی اخترشناسی اختصاص دهد. در حدود سال ۱۵۱۳، به این نتیجه رسید که زمین در مرکز جهان و حتی منظومه‌ی شمسی قرار ندارد. برخی بر این باورند که برداشت‌های او حاصل مطالعه‌ی آثار منجمان دوره‌ی اسلامی مانند بیرونی و توسی بوده است. از دید کوپرنیک، زمین که دور خورشید می‌گردد، آن‌طور که تصور می‌شد خاص نیست؛ بلکه صرفاً یکی از مجموعه سیاره‌هاست. او به تضاد عقاید خود با تعالیم کلیسا آگاه بود و به همین سبب، کتاب انقلاب در حرکت افلاک را تا زمانی که در بستر مرگ بود، منتشر نکرد.



خواجه نصیرالدین توسی

۱۲۷۴ - ۱۲۰۱ میلادی / ۶۷۲ - ۵۹۷ هجری قمری

در توس خراسان متولد شد و علاوه بر اخترشناسی، به فلسفه، ریاضی، فیزیک و علوم دینی نیز پرداخت. او را اخترشناس پیش‌رو قرن هفتم هجری در جهان اسلام و اخترشناس بزرگ میان دوره‌ی بطلمیموس تا کوپرنیک می‌دانند. توسی در زمینه‌ی کنار آمدن با حاکمان و سیاست‌مداران توانایی زیادی داشت. زمانی هم که وزیر هلاکوخان مغول شد، او را به ساختن رصدخانه‌ی بزرگی در مراغه ترغیب کرد. در این رصدخانه، که کتابخانه‌ای کم‌نظیر داشت، ابزارهای دقیقی ساخته شد و منجمان بزرگی گرد آمدند یا در مدرسه‌ی نجوم مراغه تربیت شدند که در سراسر جهان بی‌مانند بود. تلاش‌های توسی سبب حفظ و انتقال بخش بزرگی از دانش ایران پیش از حمله‌ی ویرانگر مغول به آیندگان شد. او را از نخستین افرادی می‌دانند که مثلثات را علمی جدا از ریاضیات دانسته و مطالب کاملی در این زمینه نوشته است که مبنای کار اروپاییان پس از دوره‌ی نوزایی(رنسانس) شد. توسی کتاب صورالکواکب صوفی را از عربی به فارسی برگرداند و از خود او نیز ۲۹ کتاب و رساله‌ی علمی و مذهبی باقی مانده است. یکی از بزرگ‌ترین کارها به سرپرستی او، تهیه‌ی زیج ایلخانی است که در نتیجه‌ی سال‌ها رصد در رصدخانه‌ی مراغه به دست آمد.



جیووانی کاسینی

۱۷۱۲ - ۱۶۲۵ میلادی



اخترشناس ایتالیایی که نخستین بار به ماهیت حلقه‌های زحل پی برد او زمانی که استاد اخترشناسی دانشگاه بولونیا در ایتالیا بود، توانست زمان حرکت وضعی (چرخش دورانی) سیاره‌های مشتری، زهره، و مریخ را حساب کند. ۴ قمر از اقمار زحل و شکافی در حلقه‌های آن را نیز کشف کرد. او این نظریه را مطرح کرد که حلقه‌های زحل از یک ساختار

صلب یک پارچه شکل نگرفته و از صخره‌های کوچک منفرد تشکیل شده‌اند. در سال ۱۶۶۹، کاسینی به فرانسه رفت و در ساخت و راه‌اندازی رصدخانهی پاریس، نخستین رصدخانهی تلسکوپی جهان، کمک کرد و مدیریت آن‌جا را به عهده گرفت. در پاریس، فاصله‌ی زمین تا مریخ را اندازه گرفت و با کمک آن سعی کرد فاصله‌ی زمین تا خورشید را حساب کند. اما هیچ‌گاه چرخش سیاره‌ها دور خورشید یا قانون جهانی گرانش را نپذیرفت. پسر و نوه‌اش مدیران بعدی رصدخانهی پاریس بودند.

کریستین هوینگس

۱۶۹۵ - ۱۶۲۹ میلادی

هوینگس دانشمندی هلندی بود که در سال ۱۶۶۶ به پاریس رفت و ۱۵ سال در آن‌جا زندگی کرد. او بهترین تلسکوپ دوره‌ی خود و نوع جدیدی از چشمی‌های تلسکوپی را ساخت. در سال ۱۶۵۵، با کمک این ابزارها به رصد زحل پرداخت و قمر بزرگ آن‌را، که بعدها تیتان نام گرفت، کشف کرد. او متوجه شد که این سیاره را حلقه‌ای احاطه کرده است. سپس نوعی ساعت پاندولی ساخت و این نظریه را مطرح کرد که نور نیز، مانند صوت یا آب، حرکتی موجی دارد.



گالیلئو گالیله

۱۶۴۲ - ۱۵۶۴ میلادی



ریاضی‌دان، فیزیک‌دان و اخترشنا ایتالیایی که نخستین بار تلسکوپی را به سوی آسمان نشانه رفت. گالیله، در مقام استاد ریاضیات دانشگاه‌های پیزا و پادووا، تلاش بسیاری در رد نظریه‌های کهن یونانی درباره‌ی فیزیک کرد. او، پس از آن‌که متوجه اختراع تلسکوپ شد، نمونه‌ای را در سال ۱۶۰۹ ساخت و آن‌را به آسمان نشانه رفت و متوجه شد که لکه‌های خورشیدی هر ۲۵ روز یک‌بار گرد خورشید می‌چرخند؛ ماه دارای کوهستان است؛ مشتری ۴ قمر دارد؛ زهره نیز مانند ماه اهل دارد. رصدهای او از زهره کمک کرد تا این نظریه که خورشید به جای زمین در مرکز منظومه‌ی شمسی است، تأیید شود. این نظریات انقلابی، همراه با روحیه‌ی متخاصم او و علاقه‌ای که به جاروجنجال داشت، باعث شد بقیه‌ی عمر خود را با تفتیش عقاید کلیسای رم و در بازداشت خانگی سپری کند. سرانجام بیش از سه قرن بعد، کلیسا در دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی در پی حکم کمیته‌ای، که از سوی پاپ ژان پل دوم تشکیل شده بود، او را بخشید!



تیکو براهه

۱۶۰۱ - ۱۵۴۶ میلادی


اخترشناس دانمارکی که موقعیت ستاره‌ها و سیاره‌ها را به‌دقت اندازه‌گیری کرد. در ۳۰ سالگی، استعداد او در اخترشناسی چنان بود که فردریک دوم، پادشاه دانمارک، جزیره‌ی وین در ناحیه‌ی بالتیک را در اختیار او گذاشت تا رصدخانه‌ی خود را در آن‌جا بنا کند. ابزارهای رصدی براهه بسیار کامل و دقیق ساخته شده و برخی از آن‌ها بر مبنای ابزارهای رصدخانه‌های مراغه و سمرقند بود. او ۲۰ سال به رصد و ثبت موقعیت خورشید و سیاره‌ها در مقابل زمینه‌ی ستاره‌های آسمان پرداخت. در فاصله‌ی سال‌های ۱۵۷۲ و ۱۵۷۴ ستاره‌ی جدیدی، یک ابرنواختر، را در صورت فلکی ذات‌الکرسی ثبت کرد که ثابت می‌کرد وضعیت آسمان برخلاف باور ارسطویی، بی‌تغییر نیست. او فاصله‌ی دنباله‌دار ۱۵۷۷ را تخمین زد و نشان داد که این دنباله‌دار در فواصلی ماه است و مدار کشیده‌ای دارد که از میان سیاره‌ها عبور می‌کند. این نخستین نشانه از ماهیت غیر جوی دنباله‌دارها بود. او در سال ۱۵۹۷ به پراگ رفت و یوهانس کپلر را به دستپاری خود برگزید. کپلر به کمک نتایج رصدهای تیکو براهه به محاسبه‌ی مدار سیاره‌ها پرداخت.



یوهانس کپلر

۱۶۳۰ - ۱۵۷۱ میلادی

اخترشناس آلمانی که مدار سیاره‌ها را رسم کرد و نشان داد این مدارها باید بیضوی باشند. کپلر ۳ قانون خود را درباره‌ی مدار سیاره‌ها، که بعدها به قوانین کپلر معروف شد، با استفاده از داده‌های سال‌ها رصد تیکو براهه، اخترشناس دانمارکی، تدوین کرد. زیرا در چند ماه پایان عمر براهه، دستیار او بود. او به‌دقت رصدهای تیکو ایمان داشت و تا زمانی که مدارها را به‌درستی استخراج کرد، بر این دقت تأکید داشت. در سال ۱۶۰۹، کپلر دریافت که مدار سیاره‌ها بیضی است و نه دایره‌ای و سرعت سیاره‌ها در مدارشان، با دور شدن از خورشید کاهش می‌یابد. او یک پروتستان لوتری بود و به سبب اذیت و آزارهای مذهبی، چند بار ناچار به سفر شد. در سال ۱۶۲۷، جداولی موسوم به جدول‌های رادلفی منتشر کرد که اخترشناسان می‌توانستند بر مبنای آن، محل سیاره‌ها را در گذشته و حال و آینده محاسبه کنند. کپلر باور اشتباهی نیز داشت که سیاره‌ها هنگام حرکت مداری خود، نت‌های موسیقی منتشر می‌کنند.



ایزاگ نیوتون

۱۷۲۷ - ۱۶۴۲ میلادی

دانشمند انگلیسی و بنیان‌گذار اصول مهمی در فیزیک که توضیح داد چگونه گرانش باعث حفظ سیاره‌ها در مدار آن‌ها به دور خورشید می‌شود. نیوتون در ۲۶ سالگی استاد ریاضیات دانشگاه کمبریج شد. او انقلابی در مفهوم گرانش ایجاد کرد و نظریه‌اش پیوندی میان قوانین کپلر و نظریه‌ی سقوط آزاد جرم‌های گالیله برقرار کرد. در دهه‌ی ۱۶۸۰، به این نتیجه رسید که گرانش در سراسر کیهان و نه فقط در زمین و اطراف آن، حکمرانی می‌کند. در دهه‌ی ۱۶۶۰، به بررسی ماهیت نور پرداخت و متوجه شد که نور سفید ترکیبی از یک طیف رنگی رنگین‌کمان‌مانند است. او این موضوع را با عبور دادن نور سفید از میان یک منشور یا عدسی اثبات کرد. نیوتون قصد داشت تلسکوپی بسازد؛ اما به سبب همین خاصیت شکست نور در عدسی‌ها، جرم‌ها دارای تصاویری با خطای رنگی می‌شدند. برای حل این مشکل، در سال ۱۶۶۸، تلسکوپی بازتابی ساخت که در آن به جای عدسی، از آینه استفاده شده بود. این نوع تلسکوپ به مدل نیوتونی مشهور شد. در سال ۱۶۸۷، کتاب او به نام اصول (اصول ریاضیات) منتشر شد که باید آن را یکی از مؤثرترین کتاب‌های علمی تاریخ نامید.



جان فلامستید

۱۷۱۹ - ۱۶۴۶ میلادی



نخستین ستاره‌شناس سلطنتی انگلستان و مدیر رصدخانه‌ی گرینویچ در نزدیکی لندن بود. این رصدخانه در سال ۱۶۷۶ آغاز به کار کرد. او از ابزارهایی مانند قوس دیواری (رُجِجِ جَداری، ابزار منجمان مسلمان) و سکستانتی مجهز به نمایش گر ایتیک در ترکیب با ساعتی جدید و دقیق، که یک سال بی‌خطا کار می‌کرد، بهره گرفت تا فهرست جدیدی از ۳ هزار ستاره تنظیم کند. این فهرست پس از مرگ او، و در سال ۱۷۲۵ منتشر شد و دقت آن ۱۵ برابر بیش‌تر از نمونه‌ی پیش از آن بود. فلامستید در این فهرست، روش نام‌گذاری ستاره‌ها با شماره را پایه‌گذاری و در فعالیتی دیگر، شکل مدار ماه و زمین را به دقت بررسی کرد.

ادموند هالی

۱۷۴۲ - ۱۶۵۶ میلادی



این اخترشناس و ریاضی‌دان انگلیسی ثابت کرد برخی دنباله‌دارها دارای تناوب‌اند. او توانست زمان بازگشت دنباله‌دار هالی را پیش‌بینی کند. هالی دوست نزدیک ایزاک نیوتن بود و در دهه‌ی ۱۶۸۰، او را در انتشار کتاب معروف اصول یاری داد. در سال ۱۶۹۸، کاپیتان نیروی دریایی سلطنتی شد و به مقصد اقیانوس اطلس شمالی و جنوبی بادبان برافراشت. در این سفر، به اندازه‌گیری تغییرات انحنای مغناطیسی قطب‌نما پرداخت و امیدوار بود ابزاری برای اندازه‌گیری طول جغرافیایی بسازد. هالی نخستین شخصی بود که نقشه‌ای از ستاره‌های نیم‌کره‌ی جنوبی آسمان تهیه کرد، متوجه حرکت حقیقی و بسیار درازمدت ستاره‌ها شد و دریافت که زمین بسیار پیر است. او بیش‌تر معروفیت خود را مدیون محاسبه‌ی مدار دنباله‌دار هالی و پیش‌بینی بازگشت هر ۷۶ سال یک‌بار این دنباله‌دار است. هالی در اواخر عمر استاد ریاضیات دانشگاه آکسفورد و دومین اخترشناس سلطنتی انگلستان شد.

ویلیام هرشل

۱۸۲۲ - ۱۷۳۸ میلادی



اخترشناس آلمانی‌الاصل که اورانوس را کشف کرد و تلسکوپ‌های بازتابی غول‌پیکری ساخت. در سال ۱۷۵۷، هرشل از هانوفر آلمان به انگلستان مهاجرت کرد و تا سال ۱۷۶۶، در شهر بات نوازنده‌ی ارگ بود. در همان‌جا به ساخت تلسکوپ بازتابی و تراش آینه‌های فلزی آن‌ها پرداخت. در سال ۱۷۸۱، در حالی که خارج از خانه‌اش از یکی از تلسکوپ‌ها استفاده می‌کرد، به‌طور تصادفی سیاره‌ی اورانوس را کشف کرد (اما ابتدا فکر می‌کرد که یک دنباله‌دار کشف کرده است). این کشف باعث شهرت او شد؛ در طی یک سال موسیقی را کنار گذاشت و به اخترشناس مخصوص پادشاه تبدیل شد. او بزرگ‌ترین تلسکوپ جهان را در زمان خود با آینه‌ای به قطر ۱۰۰ سانتی‌متر ساخت و با آن به بررسی آسمان و کهکشان پرداخت. هرشل از همکاری خواهرش کارولین، که رصدگری توانا بود، بهره می‌برد. او صدها سحابی یافت و متوجه شد که خورشید در حال حرکت به سوی صورت فلکی جایی است. فرزندش، جان (۱۸۷۱ - ۱۷۹۲)، نیز اخترشناس معروفی شد و فهرست جرم‌های غیرستاره‌ای را کامل کرد، به رصد دقیق آسمان جنوبی پرداخت و ستاره‌های دوتایی بسیاری را بررسی کرد.



شارل مسیه

۱۸۱۷ - ۱۷۳۰ میلادی

دنباله‌دارها موضوع مورد علاقه‌ی این اخترشناس فرانسوی بود. در نتیجه، نخستین کسی بود که به‌طور اصولی، به جست‌وجوی دنباله‌دارهای جدید پرداخت و این کار را با ظهور پیش‌بینی‌شده‌ی دنباله‌دار هالی در سال‌های ۱۷۵۸ و ۱۷۵۹ آغاز کرد. مسیه بیش از ۱۵ دنباله‌دار جدید کشف کرد و باعث شد او را «جست‌وجوگر دنباله‌دارها» بخوانند. او فهرستی از ۱۰۳ جرم شامل سحابی‌ها، خوشه‌های ستاره‌ای و کهکشان‌ها نیز تهیه کرد که ممکن بود با دنباله‌دارها اشتباه گرفته شوند. این فهرست، که به ۱۱۰ جرم ژرفای آسمان تبدیل شد، هنوز هم کاربرد دارد و شامل برخی از زیباترین جرم‌های ژرفای آسمان است. مثلاً کهکشان مسلسله یا آندرومدا جرم سی‌ویکم مسیه یا M۳۱ است.

پیر سیمون دولاپلاس

۱۸۲۷ - ۱۷۴۹ میلادی

ریاضی‌دان و اخترشناس فرانسوی و استاد مدرسه‌ی عالی نظامی پاریس. از سال ۱۷۷۳، مدت ۱۳ سال به بررسی این موضوع پرداخت که چگونه می‌توان آشفتگی‌های مداری مشتری و زحل را با قانون گرانش نیوتون توضیح داد. در سال ۱۷۹۶، دولاپلاس اعلام کرد که خورشید و منظومه‌ی شمسی از دل قرصی از گاز شکل گرفته‌اند که حین انقباض، تندتر و تندتر می‌چرخید و هرچه کوچک‌تر می‌شد، حلقه‌هایی از مواد در اطراف برجای می‌گذاشت. این حلقه‌ها سپس سیاره‌های فعلی را به‌وجود آوردند. این نظریه‌ی شکل‌گیری منظومه‌ی شمسی تا آخر قرن نوزدهم میلادی اعتبار خود را حفظ کرد و مبنای نظریه‌های تغییر یافته‌ی امروزی درباره‌ی سحابی اولیه‌ی خورشیدی بود.

کارولین هرشل

۱۸۴۸ - ۱۷۵۰ میلادی

در هانوفر آلمان به دنیا آمد. در سال ۱۷۷۲ همراه برادرش، ویلیام، به انگلستان رفت. او، که قرار بود خواننده باشد، به نجوم آماتوری روی آورد و در فاصله‌ی سال‌های ۱۷۸۶ و ۱۷۹۷، ۸ دنباله‌دار کشف کرد. در سال ۱۷۸۷، پادشاه انگلستان حقوقی برایش تعیین کرد تا به همکاری با برادرش ادامه دهد. او به‌ویژه به سبب کمک در تهیه‌ی فهرستی از ۲۵۰۰ سحابی و خوشه‌ی ستاره‌ای معروف است.



فردریک بسل

۱۸۴۶ - ۱۷۸۴ میلادی

این اخترشناس آلمانی برای ساخت رصدخانه‌ی جدیدی در کونیگزبرگ راه‌کارهایی ارائه داد و در سال ۱۸۱۳، نخستین مدیر آن شد. تمرکز او بر اندازه‌گیری موقعیت دقیق ستاره‌ها بود. در سال ۱۸۳۸ متوجه حرکتی جزئی در ستاره‌ی ۶۱ - دجاجة شد. او می‌دانست که این حرکت به سبب اختلاف منظر ناشی از حرکت زمین دور خورشید به‌وجود می‌آید. از روی این اختلاف منظر فاصله‌ی این ستاره را ۱۰/۳ سال نوری تخمین زد. این نخستین استفاده از اختلاف منظر برای تعیین فاصله‌ی ستاره‌ها بود و به تعیین مقیاسی برای ابعاد عالم کمک کرد.

یوزف فون فرانهورف

۱۸۲۶ - ۱۷۸۷ میلادی

عدسی و عینک‌ساز اهل استان باواریای آلمان بود و می‌کوشید عدسی‌ای بسازد که نور را به طیف رنگین‌کمان شکستد و سبب ایجاد خطای رنگی تلسکوپ‌های شکستی نشود. در سال ۱۸۱۴، در حال آزمودن این عدسی، متوجه شد طیف خورشید را مجموعه‌ای از خطوط تیره قطع کرده‌اند. او طول موج ۳۲۴ خط از ۵۷۴ خط تیره‌ای را که می‌دید، اندازه گرفت که امروزه به خطوط فرانهورف مشهور است. آن‌گاه در دهه‌ی ۱۸۲۰، متوجه شد که نور پس از عبور از یک توری مشبک نیز به رنگ‌های تشکیل‌دهنده‌ی خود می‌شکند و هرچه تعداد حفره‌های توری بیش‌تر باشد، شکست نور افزایش می‌یابد. این توری‌ها امروزه به‌طور وسیعی در طیف‌سنج‌ها کاربرد دارند.

ورنر لووریه

۱۸۷۷ - ۱۸۱۱ میلادی

اخترشناس فرانسوی که ثابت کرد مدار سیاره‌ها پایدار است. در سال ۱۸۴۵، به این موضوع علاقه‌مند شد که چگونه مدار سیاره‌ها بر اثر نیروی سیاره‌های مجاور خود دچار کشش می‌شود. او موقعیت سیاره‌ای ناشناخته را، که باعث تأثیر بر مدار اورانوس می‌شود، پیش‌بینی کرد. سپس این پیش‌بینی را در اختیار اخترشناس آلمانی، یوهان گاله (۱۹۱۰ - ۱۸۱۲) قرار داد که او نیز در سال ۱۸۴۶ به سرعت نپتون را بر آن مبنایافت.

ویلیام هاگینز

۱۹۱۰ - ۱۸۲۴ میلادی

انگلیسی و تا سال ۱۸۵۴ پارچه‌فروش بود. سپس کسب و کار خانوادگی را رها کرد تا به رصد آسمان بپردازد. او در لندن یک رصدخانه‌ی خصوصی ساخت و تلسکوپی طراحی کرد که به یک طیف‌نگار مجهز بود. با کمک این ابزار، به بررسی ترکیبات و ساختار خورشید، ماه، سیاره‌ها و ستاره‌ها پرداخت. او در سال ۱۸۶۳ نشان داد که کیهان از همان عناصری ساخته شده است که روی زمین یافت می‌شود. در سال ۱۸۶۸ نخستین بار از طیف‌سنج برای اندازه‌گیری سرعت و حرکت ستاره‌ها و دور شدن آن‌ها از زمین استفاده کرد. هاگینز کشف کرد که برخی سحابی‌ها از گاز ساخته شده‌اند.



جیووانی شیاپارلی

۱۹۱۰ - ۱۸۳۵ میلادی

این اخترشناس ایتالیایی، از سال ۱۸۶۰ تا ۱۹۰۰، در رصدخانه‌ی برادر در میلان کار می‌کرد. در سال ۱۸۶۲، متوجه شد که منشأ ذرات مولد بارش شهاب برساوشی دنباله‌دار سوئیفت - تاتل است و هر دو، مدار یکسانی دارند. او رصدهای دقیقی از مریخ انجام داد و بر این باور بود که رگه‌های تیره‌ای شبیه کانال، ساختارهایی که برخی از آن‌ها به نظر می‌آمد به دو شاخه تقسیم می‌شود، روی مریخ وجود دارد. او به اشتباه به این نتیجه رسید که همواره یک سوی عطارد، با آن‌که حرکت وضعی آن بسیار کند است، رو به خورشید قرار می‌گیرد.

پرسیوال لاول

۱۹۱۶ - ۱۸۵۵ میلادی

این ریاضی‌دان آمریکایی، پس از آن‌که مدت کوتاهی شغل خانوادگی خود، تجارت پارچه و پنبه را پیشه کرد و مدتی دیپلمات بود، با عشق به رصد ناشناخته‌های مریخ، رصدخانه‌ای در فلگ‌استف آریزونا بنا کرد. او به رصدهای مستقیم و عکاسی از مریخ پرداخت و به این باور رسید که خطوط تیره‌ای که شیاپارلی ایتالیایی نیز دیده بود، شبکه‌ای از کانال‌های دست‌ساز روی این سیاره‌اند که تمدن‌های مریخی ساخته‌اند. لاول در کتابش، مریخ را جایگاه مناسبی برای حیات توصیف کرد. در سال ۱۹۰۵، او به اشتباه محل سیاره‌ی ایکس را، که گمان می‌شد بر مدار اورانوس و نپتون تأثیر می‌گذارد، مشخص کرد. اما در سال ۱۹۳۰، کلاید تومبا با خوش اقبالی، پلوتون را با تلسکوپ لاول کشف کرد.



کنستانتین تسلیکوفسکی

۱۸۵۷ - ۱۹۳۵ میلادی



پیش‌گام روس نظریه‌ی پروازهای فضایی که دهه‌ها از اندیشه‌های دوره‌ی خود جلوتر بود. اسپوتنیک ۱ در گرامی‌داشت صدمین سالگرد تولد او به مدار زمین رفت. تسلیکوفسکی نظریه‌های پرتاب موشک را بررسی کرد؛ اما به سبب در اختیار نداشتن منابع، هیچ‌گاه نتوانست موشکی بسازد. در سال ۱۸۹۸، نظریه‌ای بر این مبنی ارائه داد که هر موشک چه‌قدر سوخت مصرف می‌کند و سرعت پرتابه‌ها با قدرت موتورهای چه نسبتی دارد. کتاب او در سال ۱۹۰۳ با عنوان اکتشاف فضای کیهانی با وسیله‌های واکنشی منتشر شد. تسلیکوفسکی در این کتاب، طرح‌هایی درباره‌ی موشک‌های سوخت هیدروژن و اکسیژن مایع مطرح کرد که بسیار شبیه نمونه‌های امروزی بودند. او نشان داد که موشک‌های چندمرحله‌ای برای فرار از میدان گرانش زمین، مورد نیاز خواهند بود و نحوه‌ی نصب و قرارگیری آن‌ها روی هم (مانند نمونه‌ی آمریکایی ساترن ۵) یا در کنار هم (مانند نمونه‌های پرتابه‌های روسی) را مطرح کرد.

آینار هر تسپرونگ

۱۸۷۳ - ۱۹۶۷ میلادی

این اخترشناس دانمارکی، استاندارد برای میزان درخشش حقیقی ستاره‌ها وضع کرد و آنرا به صورت قدر ظاهری ستاره‌ها، زمانی که همه‌ی آن‌ها ۳۷/۶ سال نوری از ناظر فاصله داشته باشند، تعریف کرد (قدر مطلق). او در سال ۱۹۰۶ متوجه شد که این قدرمطلق با دمای ستاره ارتباط دارد. این موضوع را هنری راسل به‌طور مستقل در سال ۱۹۱۳ کشف کرده بود. نموداری که به نام نمودار هر تسپرونگ - راسل معروف است و از ثبت ستاره‌ها بر مبنای قدر مطلق و دمای آن‌ها به‌دست می‌آید، ابزار کارآمدی برای درک تحولات ستاره‌ای است.

هنری راسل

۱۸۷۷ - ۱۹۵۷ میلادی

این دانشمند آمریکایی در سال ۱۹۰۵ به استادی اخترشناسی در دانشگاه پرینستون رسید. او به بررسی ستاره‌های چندتابی و رابطه‌ی میان مدار و جرم آن‌ها پرداخت. سپس با بررسی‌هایی که روی فواصل ستاره‌ها انجام داد، متوجه شد که اگر بر مبنای میزان درخشندگی حقیقی ستاره‌ها و دمای سطحی آن‌ها نموداری رسم کند، رشته‌ای اصلی از ستاره‌ها در آن وجود خواهد داشت که بیش‌تر ستاره‌های کهکشان را شامل می‌شود. این نمودار به نمودار هر تسپرونگ - راسل معروف شد؛ زیرا آینار هر تسپرونگ نیز در سال ۱۹۰۶ به‌طور مستقل چنین نموداری رسم کرده بود. راسل به اشتباه حدس می‌زد که ستاره‌ها در جهت این رشته‌ی اصلی تحول پیدا می‌کنند. او در سال ۱۹۲۹ به درستی این نظریه را مطرح کرد که ستاره‌ها بیش‌تر از هیدروژن تشکیل شده‌اند.

جورج هیل

۱۸۶۸ - ۱۹۳۸ میلادی

اخترشناس آمریکایی و مخترع دستگاه طیف‌سنج که جزئیات سطح خورشید را آشکار می‌کرد. در سال ۱۹۰۴، مدیر رصدخانه‌ی مونت ویلسون در کالیفرنیا شد و در سال ۱۹۰۸ کشف کرد که لکه‌های خورشیدی میدان مغناطیسی دارند و سپس قدرت این میدان‌ها را اندازه گرفت. او شیفته‌ی ارائه‌ی تلسکوپ‌های بزرگ به جهان بود و بخش زیادی از وقت خود را صرف تأمین بودجه و مدیریت ساخت بزرگ‌ترین رصدخانه‌های دوره‌ی خود، مانند رصدخانه‌ی ۲/۵ متری مونت ویلسون و ۵ متری مونت پالومار در کالیفرنیا کرد. تلسکوپ ۵ متری نیز به افتخار او، تلسکوپ هیل نام گرفت.

آنی جامپ کانون

۱۸۶۳ - ۱۹۴۱ میلادی

این زن اخترشناس آمریکایی، طیف بیش از ۳۰۰ هزار ستاره را بر حسب دما طبقه‌بندی کرد. او در سال ۱۸۹۶ به جمع کارکنان رصدخانه‌ی کالج هاروارد پیوست و تا سال ۱۹۴۰، که بازنشسته شد، در آن‌جا ماند. کارهای کانون سنگ بنایی برای تنظیم فهرست طیفی ستاره‌های هنری دربربر و رده‌بندی طیفی ستاره‌ها در اخترفیزیک امروز به‌حساب می‌آید.



هنریتا لیویت

۱۸۶۸ - ۱۹۲۱ میلادی

این اخترشناس آمریکایی به بررسی ستاره‌های متغیر قیفاووسی پرداخت و موفق به کشف رابطه‌ی دوره‌ی تناوب این متغیرها با درخشش آن‌ها شد. لیویت، که در رصدخانه‌ی کالج هاروارد در ماساچوست کار می‌کرد، از روی صفحات عکاسی، به تعیین نورانی بودن ستاره‌ها پرداخت. او سال‌ها متغیرهای قیفاووسی را در ابرهای ماژلان بررسی کرد؛ آن‌ها ستاره‌هایی هستند که در بازه‌های زمانی منظمی دچار تغییرات منظم نورانی شدن می‌شوند. در سال ۱۹۱۲، لیویت متوجه شد که ستارگان با درخشندگی حقیقی بیش‌تر، تناوب بلندتری دارند؛ بنابراین، با اندازه‌گیری مدت تناوب این ستاره‌ها می‌توان با مقایسه‌ی قدر ظاهری، به قدر حقیقی آن‌ها رسید و سپس فاصله‌ی این ستاره‌ها را تخمین زد. این موضوع باعث کشف این واقعیت شد که ابرهای ماژلان حدود ۱۰۰ هزار سال نوری از ما فاصله دارند و کهکشان‌های کوچکی در فراوسوی کهکشان راه شیری‌اند. ادوین هابل نیز از روش لیویت برای پی بردن به دنیایی پر از کهکشان‌های دیگر استفاده کرد.



برنارد اشمیت

۱۸۷۹ - ۱۹۳۵ میلادی

در استوس به دنیا آمد. در سال ۱۹۰۰ برای تحصیل مهندسی به آلمان رفت. سپس عدسی‌ها و آینه‌هایی نجومی ساخت و سرانجام در سال ۱۹۲۶ به جرگه‌ی همکاران رصدخانه‌ی هامبورگ پیوست. تلسکوپ‌های بازتابی بزرگ آن زمان میدان دید کوچکی در اختیار رصدگران می‌گذاشتند. در نتیجه، اشمیت تلسکوپی برای رصدخانه طراحی کرد که با استفاده از یک آینه‌ی کروی، که در پشت عدسی تصحیح‌کننده‌ای در سر تلسکوپ قرار می‌گرفت، نه تنها تصویری با شفافیت بسیار ایجاد می‌کرد، بلکه میدان دید بزرگ‌تری نیز در اختیار ناظران می‌گذاشت. بسیاری از تلسکوپ‌های اشمیت برای نقشه‌برداری آسمان به‌کار رفتند و بر اساس طرح او، مدل‌های دیگری مانند اشمیت - کاسگرین، ساخته شد که یکی از متداول‌ترین تلسکوپ‌های آماتوری امروزی است.

هارلو شیلی

۱۹۷۲ - ۱۸۸۵ میلادی

ابتدا روزنامه‌نگار بود؛ اما به سرعت وارد حوزه‌ی اخترشناسی شد. هنگامی که در رصدخانه‌ی مونت ویلسون کالیفرنیا کار می‌کرد، با استفاده از متغیرهای قیفاووسی، به تخمین فاصله‌ی خوشه‌های ستاره‌های کروی پرداخت. او از این خوشه‌ها، که اغلب در مرزهای



کهکشان قرار دارند، برای نقشه‌برداری و تعیین ابعاد راه شیری استفاده کرد. شیلی در سال ۱۹۲۱ به هاروارد رفت و به سبب مناظره‌ای که با هبر کرتیس (۱۸۷۲ - ۱۹۴۲)، مدیر رصدخانه‌ی آلگنی آمریکا، درباره‌ی این که آیا عالم از یک یا چند کهکشان تشکیل شده است، انجام داد به شهرت رسید. بعدها شیلی نشان داد که کهکشان‌ها در خوشه‌هایی مجتمع شده‌اند.

ادوین هابل

۱۹۵۳ - ۱۸۸۹ میلادی

این اخترشناس آمریکایی ثابت کرد کهان حاوی تعداد بسیار زیادی کهکشان است که در حال دور شدن از راه شیری هستند. هابل در شیکاگو و انگلستان حقوق خوانده بود؛ اما در بازگشت به آمریکا، به اخترشناسی روی آورد. او در رصدخانه‌ی مونت ویلسون در کالیفرنیا از تلسکوپ جدید ۲/۵ متری برای بررسی سحابی‌ها استفاده و دو نوع سحابی را شناسایی کرد: گروهی درون کهکشان ما و گروهی بیرون آن. در سال ۱۹۲۴، هابل دریافت که سحابی‌های دورتر در حقیقت کهکشان‌هایی مستقل‌اند. در ادامه، با بررسی طیف کهکشان‌ها، متوجه شد که کهکشان‌های کم‌سوتر و دورتر با سرعت بیش‌تری در حال دور شدن از ما هستند. او انواع کهکشان‌ها را طبقه‌بندی کرد؛ اما به اشتباه ادعا کرد که هریک از این انواع، در گذر زمان، به گونه‌ای دیگر تحول پیدا می‌کنند.



آلبرت اینشتین

۱۹۵۵ - ۱۸۷۹ میلادی

فیزیک‌دان نظری آلمانی تبار که نظریه‌ی نسبیت عام او، راه را برای درک و توضیح تحول عالم در حال انبساط باز کرد. اینشتین جایزه‌ی نوبل فیزیک را در سال ۱۹۲۱، برای توضیح ماهیت تابشی نور در بسته‌های کوچک انرژی، که کوانتای نور یا فوتون خوانده می‌شوند، دریافت کرد. اما بیش از همه به سبب دو نظریه‌ی نسبیت خود مشهور شده است. از این نظریه‌ها نتیجه می‌شود که هیچ چیز در کیهان سریع‌تر از سرعت نور (C) حرکت نمی‌کند. این سرعت در محیط خلأ ثابت است و جرم‌ها هنگامی که با سرعت بیش‌تری حرکت می‌کنند، جرم یا تکانی بیش‌تری پیدا می‌کنند. او متوجه شد که جرم (M) و انرژی (E) با رابطه‌ای مشهور $E=MC^2$ به هم مربوط‌اند؛ یعنی هم‌ارزی جرم و انرژی و امکان تبادل هر یک به دیگری وجود دارد. اینشتین نشان داد که میدان‌های گرانشی باعث ایجاد انحراف در مسیر پرتو نور یا تغییر طول موج آن می‌شوند. او همواره مردی صلح‌طلب بود و در سال ۱۹۳۳ به آمریکا رفت تا از یهودی‌ستیزی نازی‌های آلمانی در امان بماند. در سال ۱۹۵۲، پیشنهاد پذیرفتن ریاست جمهوری اسرائیل را رد کرد.



آرتور ادینگتون

۱۹۴۴ - ۱۸۸۲ میلادی


اخترشناس انگلیسی که نشان داد می‌توان ویژگی‌های فیزیکی درون ستاره‌ها را از عوامل سطحی آن‌ها دریافت. ادینگتون پس از آن که تحصیلات خود را در کمبریج به پایان رساند، در رصدخانه‌ی سلطنتی گرینویچ به کار پرداخت و پس از آن به کمبریج بازگشت و ۳۱ سال مدیریت رصدخانه‌ی آن‌را به‌عهده گرفت. او مدلی از درون یک ستاره ارائه داد، رابطه‌ی میان جرم ستاره و درخشش آن‌را کشف کرد، تأکید کرد که هم‌جوشی هسته‌ای عامل تولید انرژی در ستاره‌هاست و میزان خمیدگی پرتو نور را بر اثر میدان گرانشی اندازه گرفت. این کار، که در کسوف کلی سال ۱۹۱۹ انجام شد، تأییدی تجربی بر نظریه‌ی نسبیت عام اینشتین بود. او همچنین جرم عالم را تخمین زد و بر این باور بود که ثابت‌ها، نظیر سرعت نور، به این عدد بستگی دارند. ادینگتون نویسنده‌ی ماهری بود که کتاب‌های عامه‌فهمی درباره‌ی اخترشناسی و نظریه‌ی نسبیت عام اینشتین به رشته‌ی تحریر درآورد.



رابرت گارد

۱۹۴۵ - ۱۸۸۲ میلادی

مخترع و مهندس علوم موشکی آمریکایی که موفق شد در سال ۱۹۲۶، نخستین موشک سوخت‌مایع را با موفقیت بسازد و پرتاب کند. گارد یکی از پیش‌گامان صنایع موشکی بود که اکثر کارهایش در کشورش با بی‌توجهی روبه‌رو شد. او از کودکی شیفته‌ی فکر سفرهای فضایی بود و زمانی که دانشجوی محقق در دانشگاه کلارک در ماساچوست بود، آزمایش‌هایی در این زمینه انجام داد. او ۳۰ سال در این دانشگاه درباره‌ی فیزیک سخن‌رانی کرد. در سال ۱۹۱۹، نظریه‌ی خود را درباره‌ی علوم موشکی، بدون این که از نظریات کنستانتین تسلیکوفسکی که ۲ دهه‌ی پیش مطرح شده بود، اطلاع داشته باشد، منتشر کرد. در دهه‌ی ۱۹۳۰، نخستین موشک تعادل‌یافته را پرتاب کرد. این موشک یک موتور سوخت مایع داشت که نفت و اکسیژن مایع را، که به یک محفظه‌ی احتراق پمپ می‌شد، می‌سوزاند. موفقیت این طرح منابع مالی را جذب کرد و او به تحقیق و تولید موشک‌هایی با کنترل ژيروسکوپ و تیغه‌های بالی هواپیما پرداخت.



ارنست اویک

۱۸۸۵ - ۱۸۹۳ میلادی

این اخترشناس اهل استونی، بخشی از سال‌های جوانی خود را به کار در دانشگاه تارتو پرداخت؛ اما در سال‌های ۱۹۴۸ به ایرلند شمالی رفت و بعدها به مدیریت رصدخانه‌ی آرماغ رسید. در سال ۱۹۳۲، او پیش‌بینی کرد که منظومه‌ی شمسی را ابری از هسته‌های دنباله‌دارها احاطه کرده است. این ابر را امروز، به افتخار یان اورت، ابر اورت می‌نامیم. بررسی‌های او در زمینه‌ی نحوه‌ی سوختن ذرات غبار در هنگام ورود به جو زمین به طراحی سیستمی منجر شد که فضاپیماها را در هنگام ورود به جو زمین محافظت می‌کند.

والتر باده

۱۹۶۰ - ۱۸۹۳ میلادی

در سال ۱۹۳۱ از آلمان به آمریکا مهاجرت کرد. در رصدخانه‌ی مونت ویلسون در کالیفرنیا مشغول کار شد و در سال ۱۹۴۸ به رصدخانه‌ی پالومار در همان نزدیکی رفت. در سال ۱۹۴۳ کشف کرد که دو نوع ستاره‌ی اصلی در عالم وجود دارد: ستاره‌های بسیار پیر که میزان اندکی مواد فلزی دارند و ستاره‌های جوانی که مملو از عناصر فلزی هستند. این وضعیت در مورد متغیرهای قیفاووسی هم صادق بود که از ویژگی‌های آن‌ها برای تعیین فاصله‌ها در کیهان استفاده می‌شد. از آن زمان، یک‌باره ابعاد عالم به دو برابر آن‌چه پیش از آن تصور می‌شد، گسترش یافت.



هرمان اوبرت

۱۸۸۹ - ۱۸۹۴ میلادی

هرمان اوبرت را باید همراه با رابرت گادرد و کنستانتین تسلیکوفسکی، پدران عصر فضا دانست. کتاب‌های او به نام‌های موشک‌هایی به سوی فضای میان‌سیاره‌ای (۱۹۲۳) و جاده‌ای به سوی سفر فضایی (۱۹۲۹) آثار کلاسیک این حوزه به‌شمار می‌روند. اوبرت در دهه‌ی ۱۹۳۰ به آزمایش روی موتورهای موشک‌ها پرداخت و در خلال جنگ دوم جهانی، موشک‌های ۷-۲ را توسعه داد. در اواخر دهه‌ی ۱۹۵۰، مدتی در آمریکا زندگی کرد. در آن‌جا، در کنار دستیار قدیمی خود ورنر فون براون، که خود از مشاهیر عصر فضا بود، به توسعه‌ی پرتاب‌گرهای ماهواره‌ای پرداخت.

ژرژ لومتر

۱۹۶۶ - ۱۸۹۴ میلادی

لومتر بلژیکی، در سال ۱۹۲۳ کشیش شد و سپس به کیهان‌شناسی روی آورد. در سال ۱۹۳۱، این نظریه را مطرح کرد که زمانی کل جهان در یک اتم اولیه به ابعاد ۳۰ برابر خورشید متراکم بود و بر اثر انفجار این اتم اولیه در فضا، موادی در عالم پخش شد که بر اثر تراکم، دوباره کهکشان‌ها و ستاره‌ها را شکل داد. او این نظریه را نیز مطرح کرد که می‌توان از حرکت کهکشان‌ها برای تعیین انبساط کیهان استفاده کرد. این نظریه بعدها به نظریه‌ی مه‌بانگ ارتقا پیدا کرد.



فریتز زوییکی

۱۹۷۴ - ۱۸۹۸ میلادی

این اخترفیزیک‌دان سوئیسی، که در سال ۱۹۲۷ به مؤسسه‌ی فن‌آوری کالیفرنیا (کلتک) رفت، در سال ۱۹۳۴ متوجه شد که انفجارهای آبرنواختری، از انفجارهای نواختری انرژی فوق‌العاده بیش‌تری دارند. او این حدس را مطرح کرد که آبرنواخترها تمام ساختار ستاره را نابود می‌کنند و فقط هسته‌ی کوچکی از آن برجای می‌گذارند که به ستاره‌ی نوترونی تبدیل می‌شود. زوییکی به جست‌وجوی آبرنواخترها پرداخت؛ اما محاسبه کرد که هر کهکشان در هر ۴۰۰ سال تنها شاهد وقوع یک آبرنواختر است (تخمین امروز در کهکشانی مانند راه شیری، یکی در هر قرن است). به علاوه، به بررسی خوشه‌های کهکشانی پرداخت و متوجه شد برخلاف کل عالم، این خوشه‌ها دچار انبساط نیستند و با گرانش خود با انبساط مقابله می‌کنند.

یان اورت

۱۹۹۲ - ۱۹۰۰ میلادی

اخترفیزیک‌دان دانمارکی که با استفاده از امواج رادیویی به بررسی کهکشان راه شیری پرداخت و این نظریه را مطرح کرد که منظومه‌ی شمسی را ابری از دنباله‌دارها احاطه کرده است. اورت پس از آن تحصیل در دانشگاه گرونینگن، به دانشگاه لیدن رفت و در آن‌جا به ساختار کهکشان علاقه‌مند شد. او در سال ۱۹۲۷، دریافت که خورشید در مرکز راه شیری قرار ندارد و مسیر ستاره‌های نزدیک نشان می‌دهد که مرکز کهکشان ما حدود ۳۰ هزار سال نوری با خورشید فاصله (تخمین امروزی ۲۵ هزار سال نوری است) و در جهت صورت فلکی قوس قرار دارد. سپس متوجه شد که خورشید هر ۲۰۰ میلیون سال مدار خود را دور مرکز کهکشان طی می‌کند و جرم راه شیری، ۱۰۰ میلیارد برابر خورشید است. اورت در سال ۱۹۵۱ شکل بازوهای کهکشان راه شیری را بر مبنای رصد رادیویی تابش‌های هیدروژن محیط میان‌ستاره‌ای رسم کرد. در همین ایام، این موضوع را نیز مطرح کرد که خورشید را ابر عظیمی از هسته‌های دنباله‌دارها احاطه کرده است که پایداری آن‌ها گاهی بر اثر عبور ستاره‌هایی از نزدیکی این ابر، برهم می‌خورد.

سیسیلیا پاین (گاپوشکین)

۱۹۷۹ - ۱۹۰۰ میلادی

نخستین بار، این اخترشناس انگلیسی - آمریکایی متوجه شد هیدروژن و هلیوم اجزای اصلی سازنده‌ی عالم‌اند. سیسیلیا پاین، پس از شرکت در سخنرانی‌های سر آرتور ادینگتون در دانشگاه کمبریج، تصمیم گرفت اخترشناس شود. در سال ۱۹۲۳، انگلستان را به مقصد رصدخانه‌ی کالج هاروارد ترک کرد تا در آن‌جا با هارلو شینپلی همکاری کند. پس از مشخص کردن رابطه‌ی میان دمای ستاره و رده‌ی طیفی آن، این نتیجه‌گیری را مطرح کرد که ستاره‌های رشته‌ی اصلی بیش‌تر از هیدروژن و هلیوم ساخته شده‌اند. او در سال ۱۹۳۴ با سرگنی گاپوشکین ازدواج کرد و با هم به شناسایی ستاره‌های متغیر از طریق عکاسی از آن‌ها پرداختند. او ستاره‌های بسیار درخشان را نیز بررسی کرد که امروزه برای تعیین فاصله‌ی دورترین کهکشان‌ها از آن‌ها استفاده می‌شود. در سال ۱۹۵۶، سیسیلیا پاین کرسی استادی اخترشناسی در هاروارد را به‌دست آورد و نخستین بانوی استاد در این دانشگاه شد.



سوبرامانیان چاندراسکار

۱۹۹۵ - ۱۹۱۰ میلادی

اخترفیزیک‌دان هندی که تحصیلات خود را پیش از مهاجرت به آمریکا در سال ۱۹۳۶، در مدرّس و انگلستان دنبال کرد. در سال ۱۹۸۳ جایزه‌ی نوبل فیزیک را برای تحقیقات در زمینه‌ی مرگ ستاره‌ها دریافت کرد. او به این واقعیت پی برد که کوتوله‌ی سفیدی که بیش از ۱/۴ خورشید جرم داشته باشد، بر رمبش گرانشی خود غلبه نمی‌کند و سرانجام به ستاره‌ی نوترونی یا سیاه‌چاله تبدیل می‌شود.

برنارد لاول

متولد ۱۹۱۳ میلادی



در جنگ دوم جهانی، لاؤل سیستم رادارهای ناوبری را برای بمباران‌هایی توسعه داد که نمی‌شد در تعیین هدف به چشم متوسل شد. پس از جنگ، این مرد انگلیسی پیش‌گام رصد راداری شهاب‌ها در دانشگاه منچستر شد. در سال ۱۹۴۹، توانست سرمایه‌ای را برای ساخت تلسکوپ رادیویی ۷۶ متری جودرل‌بَنک در نزدیکی منچستر تهیه کند. ساخت این رصدخانه در سال ۱۹۵۱ آغاز و در سال ۱۹۵۷، درست هنگام پرتاب اسپوتنیک ۱، تکمیل شد و لاؤل توانست آن‌را به شکل رادیویی ردیابی کند. این موضوع سرمایه‌ی بیش‌تری جذب کرد. او بیش از ۳۰ سال مدیر رصدخانه‌ی جودرل‌بَنک بود.

سرگئی کرولف

۱۹۶۶ - ۱۹۰۶ میلادی

در سال ۱۹۳۱، این مهندس روس یکی از اعضای بنیان‌گذار گروه مسکو برای بررسی پیش‌راندن‌های موشکی بود. در جنگ دوم جهانی، استالین او را زندانی و مجبور به کار روی هواپیماهای دریای موتور جت کرد. پس از جنگ، به کمک دانشمندان منتقل شده‌ی آلمانی، نمونه‌ی اصلاح‌شده‌ای از موشک ۲-۷ را، که از آلمان‌ها به غنیمت گرفته شده بود، ساخت و مسئولیت تولید بخش موشک‌های قاره‌پیمای شوروی را به‌عهده گرفت. او طراحی ماهواره‌ی اسپوتنیک و فضاپیماهای سرنشین‌دار وُستوک، وُسخود و سویفر را نیز عهده‌دار بود.

فرد وِیپل

۲۰۰۴ - ۱۹۰۶ میلادی


این اخترشناس آمریکایی، پیش از آن‌که در سال ۱۹۳۱ به دانشگاه هاروارد در ماساچوست برود، در کالیفرنیا تحصیل می‌کرد. در سال ۱۹۵۰ استاد اخترشناسی هاروارد و در سال ۱۹۵۵ مدیر رصدخانه‌ی اخترفیزیکی اسمیتسونی شد. او، به‌غیر از کشف ۶ دنباله‌دار، در سال ۱۹۵۱ این فرض را مطرح کرد که هسته‌ی یک دنباله‌دار توپ بزرگی از برف و غبار است که هنگامی که بر اثر گرمای نواحی داخلی منظومه‌ی شمسی گرم می‌شود، سطح آن تصعید خواهد شد. او به بررسی مدار شهاب‌ها و فضاپیماها و چگونگی تأثیر چگالی و دمای لایه‌ی فوقانی جوّ زمین بر مدار آن‌ها نیز پرداخت.



ورنر فون براون

۱۹۷۷ - ۱۹۱۲ میلادی

مهندس آلمانی فن‌آوری موشک که موشک‌های ۲-۷ و پرتاب‌گر عظیم ساترن ۵ را برای مأموریت فتح ماه طراحی کرد. کارهای فون براون در زمینه‌ی موتورهای موشکی در دهه‌های ۱۹۳۰ باعث شد به سمت مدیر فنی تأسیسات موشکی پینهمونده، جایی که در خلال جنگ دوم جهانی موشک‌های سوخت مایع ۲-۷ را ساخت، انتخاب شود. در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۴۲ و ۱۹۴۵، بیش از ۵ هزار موشک ۲-۷ ساخته شد. بعد از جنگ، ارتش آمریکا فون براون را برای کار در نیومکزیکو انتخاب کرد. در آن‌جا، او موشک رِداسْتون را طراحی کرد که در سال ۱۹۵۸ اکسپلورر ۱ یا نخستین ماهواره‌ی آمریکا را در مدار قرار داد. در سال ۱۹۶۱، نیز آلن شپرد را در نخستین مأموریت زیرمرداری سری مرکوری به فضا برد. در سال ۱۹۶۰، فون براون مسئول مرکز فضایی مارشال در آلاباما شد و موشک ساترن ۵ را طراحی کرد که در برنامه‌ی آپولو برای اعزام انسان به ماه از آن استفاده شد.



ژرژ گاموف

۱۹۶۸ - ۱۹۰۴ میلادی

فیزیک‌دان اوکراینی که در سال ۱۹۳۳ به آمریکا مهاجرت کرد. در سال ۱۹۴۸ به همراهی رالف آلفر (۲۰۰۷ - ۱۹۲۱) و هانس بته (۲۰۰۵ - ۱۹۰۶)، گروهی سه‌تایی معروف به آلفا - بتا - گاما، نشان دادند که چگونه در خلال مه‌بانگ هلیوم از واکنش‌های نوترون‌ها و پروتون‌ها شکل گرفته و چگونه هلیوم در ترکیب با دیگر هسته‌ها، عناصر دیگر را به‌وجود آورده است. او پیش‌بینی کرد که کیهان باید از تابشی که بازمانده‌ی دمای زیاد دوره‌ی مه‌بانگ است، پُر باشد.

کارل جانسکی

۱۹۵۰ - ۱۹۰۵ میلادی

مهندس رادیویی آمریکایی که به پدر اخترفیزیک رادیویی معروف است. او به دنبال کشف منشأ اختلال‌های رادیویی در ارتباطات بین‌گشتی و ساحل بود. در سال ۱۹۳۲، آنتن رادیویی چرخان و دریافت‌کننده‌ای برای آن ساخت و خیلی زود متوجه شد که این اختلالات از صورت فلکی قوس منشأ می‌گیرد. این منطقه، که امروز قوس A شناخته می‌شود، چگال‌ترین بخش راه شیری و مرکز کهکشان است و جانسکی در حال آشکارسازی تابش حاصل از الکترون‌ها در میدان مغناطیسی کهکشان بود.



کلاید تومبا

۱۹۹۷ - ۱۹۰۶ میلادی

در ایلینویز آمریکا به دنیا آمد و به سبب مشکلات مالی، نتوانست به دانشگاه برود. در عوض در سال ۱۹۲۹ با سمت دستیاری وارد رصدخانه‌ی لاؤل در فلگ‌استف آریزونا شد. در سال ۱۹۰۵، پرسپوال لاؤل موقعیت سیاره‌ی ایکس را محاسبه کرده بود. تومبا برای کمک به تحقیقات ابزاری ساخت که با کمک آن می‌شد دو تصویر را، که با فاصله‌ی چند ساعت از یک ناحیه‌ی آسمان گرفته شده بود، بررسی کرد تا اگر جسمی در طی این بازه در مقابل زمینه‌ی ثابت ستارگان جابه‌جا می‌شد، بتوان آن‌را پیدا کرد. در هجدهم فوریه‌ی سال ۱۹۳۰، تومبا پلوتون را پیدا کرد. اما دریاره‌ی اندازهی پلوتون و این‌که آیا این سیاره باعث تأثیرات گرانشی بر مدار اورانوس می‌شود، نامطمئن بود. به همین سبب، ۸ سال دیگر هم به جست‌وجوی بدون موفقیتی برای یافتن سیاره‌ی دیگر ادامه داد.

آکن شلندیج

متولد ۱۹۲۶ میلادی

این اخترشناس آمریکایی رصدخانه‌های مونت ویلسون و مونت پالومار کالیفرنیا، کار خود را در سمت دستیاری ادوین هابل آغاز کرد. در سال ۱۹۶۰، همراه با اخترشناس کانادایی، تام متیوس، نخستین بار با رصد اشیکی و غیررادیویی به شناسایی اختروش‌ها پرداخت. در سال ۱۹۶۵ نخستین اختروش بی صدا (بدون امواج رادیویی) را کشف کرد. در حقیقت، فقط یک مورد از هر ۲۰۰ اختروش تابش‌های رادیویی دارند. اندازه‌گیری‌های او از فواصل کهکشان‌ها نشان داد که سرعت انبساط عالم، از آنچه پیش‌تر فرض می‌شد، کمتر است.

نیل آرمسترانگ

متولد ۱۹۳۰ میلادی

خلبان نیروی هوایی آمریکا و فرمانده مأموریت آپولو ۱۱ و نخستین انسانی که در بیست‌ویکم ژوئیه سال ۱۹۶۹ قدم بر سطح ماه گذاشت. زمانی که بر ماه گام گذاشت، گفت: «این گامی کوچک برای یک انسان و جهشی بزرگ برای بشر است.» او در سال ۱۹۷۱ ناسا را ترک کرد و پیش از آن‌که وارد کارهای تجاری شود، به تدریس در دانشگاه پرداخت.

ادوین (باز) آلدَرین

متولد ۱۹۳۰ میلادی

فضانورد آمریکایی که هدایت مدول مهنشین مأموریت آپولو ۱۱ را به عهده داشت و در بیست‌ویکم ژوئیه سال ۱۹۶۹ دومین انسانی بود که قدم بر ماه گذاشت. آلدَرین مهندس و دارای مقام مذهبی در کلیسای پرسبیتی بود. در نوامبر سال ۱۹۶۶، در مأموریت جمینی ۱۲، رکوردی ۵ ساعته برای راه‌پیمایی فضایی از خود برجای گذاشت.



فرد هویل

۲۰۰۱-۱۹۱۵ میلادی



اخترفیزیک‌دان انگلیسی که نشان داد چگونه ستاره‌ها عناصر متفاوتی تولید می‌کنند و اعلام کرد جهان در حالتی پایدار قرار دارد. هویل، به جز ۱۰ سالی که در رصدخانه‌ی پالومار در کالیفرنیا کار کرد، به فعالیت در دانشگاه کمبریج در انگلستان مشغول بود. در پالومار، همکار ویلیام فولر (۱۹۹۵-۱۹۱۱) بود. آن‌دو در سال ۱۹۵۷ نشان دادند که چگونه عناصری مانند لیتیم، کربن، اکسیژن و آهن درون ستاره‌ها تولید می‌شوند. هنگامی که ستاره‌های عظیم سرانجام بر اثر انفجارهای ابرنواختری منهدم می‌شوند، این عناصر در فضا پراکنده و در ستاره‌های نسل‌های بعدی بازیافت می‌شوند. در سال ۱۹۴۸، هویل، توماس گلد و هرمان بوندی نظریه‌ی عالم پایدار را مطرح کردند. هویل مخالف سرسخت نظریه‌ی مه‌بانگ یا انفجار بزرگ بود. نظریه‌ی حالت پایدار آن‌ها پس از کشف تابش زمینه‌ی کیهانی در سال ۱۹۶۵، که نشانه‌ای از انفجار بزرگ بود، از سوی بسیاری کنار گذاشته شد.

جان گلن

متولد ۱۹۲۱ میلادی

گلن نخستین آمریکایی‌ای بود که در سال ۱۹۶۲ در پروازی ۵ ساعته سه دور مدار زمین را طی کرد. در سال ۱۹۶۴، پس از بازنشستگی از برنامه‌های فضایی، وارد سیاست شد و ده سال بعد به مقام سناتور ایالت اوهایو رسید. در سال ۱۹۹۸ بار دیگر با شاتل فضایی به فضا رفت تا لقب سال‌خورده‌ترین فضانورد را از آن خود کند.



آکن شپرد

۱۹۹۸-۱۹۲۳ میلادی

این خلبان آزمایشی ارتش آمریکا، نخستین آمریکایی‌ای بود که به فضا رفت. در این پرواز زیرمداری، کپسول مرکوری حامل او تا ۱۸۰ کیلومتری سطح زمین بالا رفت. سپس در فاصله‌ی ۴۸۵ کیلومتری از محل پرتاب، در کپسول فلوئوریدا در اقیانوس اطلس فرود آمد. او در سال ۱۹۷۱، زمانی که فرمانده مأموریت آپولو ۱۴ به مقصد ماه بود، دوباره به فضا بازگشت.

یوزف نسلکوفسکی

۱۹۸۵-۱۹۱۶ میلادی

اخترشناس اوکراینی که در سال ۱۹۵۳، بخش اخترشناسی رادیویی مؤسسه‌ی اخترشناسی روسیه را بنیان نهاد. او از نخستین کسانی بود که این نظریه را مطرح کرد که الکترون‌های چرخانی که به دام میدان‌های مغناطیسی جرم‌های آسمانی می‌افتند، امواج رادیویی با طول موج بلند تولید می‌کنند که به تابش سینکروترون معروف است.

آرتور سی. کلارک

۲۰۰۸-۱۹۱۷ میلادی

این نویسنده‌ی بزرگ علمی - تخیلی انگلیسی، در سال ۱۹۴۵ امکان استفاده از ماهواره‌هایی در مدار زمین ثابت، حدود ۳۵۸۰۰ کیلومتری سطح زمین، را برای کاربردهای مخابراتی مطرح کرد. چنین ماهواره‌هایی، که امروز بسیار فراوانند، با دوره‌ای برابر چرخش زمین دور سیاره می‌گردند و همواره بالای یک نقطه‌ی زمین ثابت‌اند. بر این اساس، ماهواره‌ای بر فراز اقیانوس اطلس علائم تلویزیونی و تلفنی را میان اروپا و آمریکای شمالی مخابره می‌کند. این فن‌آوری در آن هنگام در دسترس نبود؛ اما امروزه استفاده از ماهواره‌های زمین ثابت به جزیی از زندگی روزمره‌ی ما بدل شده است.



آنتونی هویش

متولد ۱۹۲۴ میلادی

اخترشناس امواج رادیویی اهل انگلستان که نوسان‌های منابع رادیویی را بررسی می‌کرد. او به دنبال یافتن راهی برای ترکیب علائم دریافتی از دو تلسکوپ رادیویی مستقل بود که سبب می‌شد قدرت آشکارسازی مجموع دستگاه، به اندازه‌ی یک بشقاب مستقل به قطر فاصله‌ی میان دو بشقاب جدا از هم باشد (روش تداخل‌سنجی). در سال ۱۹۶۷، همراه با دانشجوی خود، خانم جاسلین یل برنل، موفق به کشف تپ‌اخترها شد. در سال ۱۹۷۴، هویش و مارتین رابیل موفق به کسب جایزه‌ی نوبل فیزیک شدند.



فرانک دریگ

متولد ۱۹۳۰ میلادی

اخترشناس پرتوهای رادیویی اهل آمریکا در دهه‌ی ۱۹۶۰ و پیش‌تاز استفاده از تلسکوپ‌های رادیویی برای گوش دادن به علائم احتمالی حیات هوش‌مند فرازمینی. این طرح در سال ۱۹۷۴ به کمک تلسکوپ رادیویی آرسیبو در پورتوریکو ادامه یافت. دریگ، که از بنیان‌گذاران طرح ستی یا جست‌وجوی هوش‌مندان فرازمینی است، معادله‌ای را فرمول‌بندی کرد که تعداد تمدن‌های دارای فن‌آوری ارتباطات در کهکشان را در هر زمان تخمین می‌زند و اکنون به رابطه‌ی دریگ معروف است.



جان یانگ

متولد ۱۹۳۰ میلادی

فضانورد آمریکایی که در نیروی دریایی ارتش، در مقام خلبان آزمایشی تمرین دیده بود. در سال ۱۹۶۵، او با فضایی‌های جیمینی ۳، نخستین مأموریت فضایی آمریکا، با دو سرنشین، پرواز کرد. پس از پرواز با جیمینی ۱۰ در سال ۱۹۶۹، ۳۱ بار همراه فضایی‌های آپولو ۱۰، در مداری دور ماه گشت که نوعی مأموریت تمرینی برای فرود آپولو بر سطح ماه بود. او در سال ۱۹۷۲، فرمانده آپولو ۱۶ بود و سه بار بر سطح ماه راهپیمایی کرد. در آوریل سال ۱۹۸۱ نیز فرمانده نخستین پرواز فضایی بود.

آرنو پنزیاس

متولد ۱۹۳۳ میلادی

در دوره‌ی کودکی از آلمان تحت حکومت نازی‌ها فرار و به آمریکا مهاجرت کرد. در سال ۱۹۶۱، با سمت مهندس رادیویی، به آزمایشگاه تلفن بل پیوست. در سال ۱۹۶۵، در حالی که با همکارش، رابرت ویلسون، با آنتن رادیویی عجیب گوش‌مانند و ابتکاری خود مشغول بررسی تداخل‌های رادیویی بودند، موج رادیویی ضعیفی کشف کردند که از همه‌ی جهات به زمین می‌رسید. منبع این موج دمایی معادل ۲۷۰- درجه‌ی سانتی‌گراد داشت و خیلی زود مشخص شد باقی‌مانده‌ای از تشعشع داغ تابش مه‌بانگ یا انفجار بزرگ است. در سال ۱۹۷۸، پنزیاس و ویلسون جایزه‌ی نوبل فیزیک را برای این کشف دریافت کردند.

کارل ساگان

۱۹۹۶ - ۱۹۳۴ میلادی

اخترشناس آمریکایی که بیش‌تر فعالیت‌هایش بررسی جو سیاره‌های متمرکز بود. در دهه‌ی ۱۹۶۰، پیش از فرود کاوش‌گرهایی بر سطح زهره، بر اساس محاسبات و داده‌ها نتیجه گرفت که دمای سطحی سیاره‌ی زهره به سبب اثر گازهای گل‌خانه‌ای در جو آن بسیار زیاد است. او جو اولیه‌ی زمین و راه‌های شکل‌گیری حیات روی آنرا بررسی کرد. ساگان به سبب تلاش‌هایش برای عمومی کردن علم، بسیار مشهور است. او در دهه‌ی ۱۹۸۰ مجموعه‌ی تلویزیونی کاسموس (کیهان) را اجرا می‌کرد که میلیون‌ها بیننده در سراسر جهان پیدا کرده بود.

یوری گاگارین

۱۹۶۸ - ۱۹۳۴ میلادی

در دوازدهم آوریل سال ۱۹۶۱، این کیهان‌نورد شوروی سابق، نخستین انسانی بود که به مدار زمین و به فضا پرواز کرد. مدت این پرواز فقط یک دور مداری بود و در آن فضایی‌های حامل او، وستوک ۱، به ارتفاع ۳۴۴ کیلومتری سطح زمین رسید. گاگارین ۱۰۸ دقیقه را در فضا سپری کرد و برخلاف پیش‌بینی، ناچار شد ۷ کیلومتر آخر مسیر خود را به زمین، با چتر نجات فرود آید. او ۷ سال بعد بر اثر سانحه‌ای هوایی در یک پرواز تمرینی، در حالی کشته شد که خود را برای سفر مجدد به فضا آماده می‌کرد.



رابرت ویلسون

متولد ۱۹۳۶ میلادی

این فیزیک‌دان آمریکایی متولد هیوستون، در سال ۱۹۳۶ به آزمایشگاه مخابراتی بل در نیوجرسی پیوست. با آرنو پنزیاس در پی کاهش اختلالات رادیویی، یک آنتن بزرگ بوقی شکل و گوش‌مانند ساخت. این دو در سال ۱۹۶۵ تابش‌های رادیویی «مزاحمی» را، که از تمام جهات آسمانی به زمین می‌رسید، کشف کردند. این تابش از منبعی با دمای ۲۷۰- درجه‌ی سانتی‌گراد ناشی می‌شد که بازمانده‌ی تابش گرم ناشی از مه‌بانگ بود. او و پنزیاس در سال ۱۹۷۸ جایزه‌ی نوبل فیزیک را بردند.

والتینا ترشکوا

متولد ۱۹۳۷ میلادی

کارگر سابق کارخانه‌ی پارچه‌بافی و چترباز آمانور روس، نخستین زن تاریخ بود که به فضا سفر کرد. در ژوئن سال ۱۹۶۳، سوار بر فضایی‌های وستوک ۶ در پروازی ۷۱ ساعته، ۴۸ بار به دور زمین چرخید. سپس ۱۹ سال طول کشید تا دومین زن فضانورد به فضا برود. ترشکوا در سال ۱۹۶۳ ازدواج کرد و پس از آن‌که صاحب فرزند شد، تا سال ۱۹۶۹ به تمرین‌های فضانوردی خود ادامه داد.

والری پولیاکوف

متولد ۱۹۴۲ میلادی

کیهان‌نورد و پزشک روس که دو رکورد جهانی را در اختیار دارد: بیش‌ترین مدت حضور در فضا و طولانی‌ترین اقامت به‌تنهایی در فضا. او روز بیست‌ونهم اوت سال ۱۹۸۸ با فضایی‌های سایوز TML۶ به ایستگاه مداری میر سفر کرد و ۲۴۱ روز آن‌جا ماند. بار دیگر، هشتم ژانویه‌ی سال ۱۹۹۴ به ایستگاه فضایی میر بازگشت و این بار ۴۳۸ روز در ایستگاه ماند. متخصصان در مورد او به آزمون پزشکی منحصربه‌فردی دست زدند: پیش از مأموریت بخشی از مغز استخوان او را برداشتند تا پس از بازگشت و نمونه‌برداری مجدد، اثر بی‌وزنی را بر این ساختار مهم بدن تعیین کنند.

مارتین ریس

متولد ۱۹۴۲ میلادی


مهم‌ترین فعالیت مارتین ریس، دانش موختی دانشگاه کمبریج، بررسی نواحی مرکزی کهکشان‌های فعال و بررسی چگونگی اندرکنش فوران مواد مرکز این کهکشان‌ها با ماده‌ی میان‌ستاره‌ای اطراف است. او مقاله‌های زیادی درباره‌ی کیهان‌شناسی و ماده‌ی تاریک کیهان نوشته است. ریس یکی از فعال‌ترین ترویج‌دهندگان علم در میان عامه‌ی مردم است.



استفان هاو کینگ

متولد ۱۹۴۲ میلادی

فیزیکدان نظری انگلیسی که با وجود سال‌ها فلج بودن و ضایعه‌ی دستگاه عصبی بدنش، عمر خود را صرف بررسی رفتار ماده در نزدیکی سیاهچاله‌ها کرده است. اخترشناسان گمان می‌کردند هیچ چیز از دام گرانش سیاهچاله نمی‌گریزد؛ ما هاو کینگ نشان داد که تابش گرمایی خاصی از سیاهچاله‌ها به بیرون می‌تابد. کتاب تاریخی مختصر زمان او یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های علمی جهان است.



جاسلین بل برنل

متولد ۱۹۴۳ میلادی

اخترشناس انگلیسی که در دوره‌ی دانشجویی خود در کمبریج موفق به کشف تپ‌اخترها شد. در ششم اوت سال ۱۹۶۷، در حالی که سرگرم رصد تغییرات سریع امواج یک منبع رادیویی و در حال جست‌وجوی اختروش‌ها بود، موج رادیویی غیر معمولی پیدا کرد که تپی با تناوب دقیق $1/337$ ثانیه یک‌بار تولید می‌کرد. این تپ‌های رادیویی (غیر طبیعی)، که ابتدا تصور شد پیامی از هوش‌مدان کره‌های دیگر است، تپ‌های ستاره‌ای نوترونی (تپ‌اختر) بود ستاره‌ای کمی بزرگ‌تر از خورشید که شعاعی در حد چند کیلومتر دارد.

جیل تارتر

متولد ۱۹۴۴ میلادی

این اختر فیزیکدان آمریکایی پس از رها کردن جست‌وجوی کوتوله‌های قهوه‌ای، نخستین اخترشناس رادیویی شد که در ابتدای دهه‌ی ۱۹۷۰ تمام‌وقت به جست‌وجوی علائم هوش‌مدان فرامینی پرداخت. او، در سمت مدیر طرح ققنوس، از یک تحلیل‌کننده‌ی چندکاناله استفاده کرد و امواج دریافتی از تلسکوپ‌های رادیویی بزرگ را گرفت و هم‌زمان در چند فرکانس به این امواج گوش کرد تا شاید پیامی از دل آن‌ها کشف کند این طرح بعدها در قالب طرح ستی دنبال شد.



فرهاد یوسفزاده

متولد ۱۹۵۴ میلادی / ۱۳۳۳ هجری شمسی


اختر فیزیکدان ایرانی که کشفیات جالب توجه و پیش‌گامانه‌ی در ساحت مرکز کهکشان و تحول ستاره‌ها انجام داده است. متولد سال ۱۳۳۵ در تهران است. او از کودکی به آسمان شب علاقه‌مند بود دکترای خود را در اخترشناسی رادیویی و دانشگاه کلمبیا در آمریکا گرفت و مدتی در بخش اخترفیزیک مرکز پروازهای فضایی گاردن باس، کار نظری انجام داد. او با تحلیل نظری داده‌های رادیویی مرکز کهکشان، به بررسی بیش‌تر منبع رادیویی قوس A، که قرص گار و غبار اطراف ابرسیاهچاله‌های مرکز کهکشان است، علاقه‌مند شد و برای این کار امکان استفاده از آرایه‌ی تلسکوپ‌های VLA (آرایه‌ی سیار مرگ) در نیومکزیکو برای او فراهم آمد. به کمک این مجموعه شامل ۲۷ تلسکوپ عظیم، که کار با آن برای هر اخترشناسی افتخار است، گروه یوسفزاده ساختارهای تازه‌ای در قلب کهکشان پیدا کردند و به نخستین تخمین دقیق از حرم سیاهچاله‌ی مرکز کهکشان دست یافتند (حدود ۴/۵ میلیون برابر جرم خورشید). یوسفزده بررسی قلب کهکشان را با تلسکوپ فضایی پرتو ایکس چاندرا و تلسکوپ‌های رادیویی دیگری نیز ادامه داد و به بررسی مدل‌های پیدایش ستاره‌ها و کاوش سحابی‌های بازمانده‌ی ابرواختری پرداخت. او استاد دانشگاه نورت وسترن است و در کنار تحقیقات، به ترویج علم میان مردم نیز می‌پردازد.



فیروز نادری

متولد ۱۹۴۶ میلادی / ۱۳۲۵ هجری شمسی

مدیر علمی موفق پروژه‌های فضایی کاوش مریخ، شناخت منظومه‌ی شمسی در آزمایشگاه جت پروپالشن ناسا. او در سال ۱۳۲۵ در شیراز متولد شد و پس از دریافت دیپلم در تهران، دوره‌ی دانشگاهی خود را در آمریکا گذراند و دکترای الکترونیک گرفت. کارهای فضایی را با طراحی سیستم‌های مخابرات بین‌المللی آغاز کرد سپس با گرایش به رشته‌ی مهندسی سیستم، وارد مدیریت‌های کلان علمی شد دوره‌ی موفقیت‌آمیزی را در مدیریت طرح بزرگ منشأ (GENESIS) برای شناخت بیش‌تر منشأ پیدایش منظومه‌ی شمسی و حیات زمین به کمک کاوش گرهای فضایی و ماهواره‌ها گذراند. سپس مدیر مأموریت‌های مریخ شد که در دوره‌ی او، دو مریخ‌نورد ناسا، که کار آن‌ها بسیار موفقیت‌آمیزتر از پیش‌بینی‌ها بود، ساخته و ارسال شد. نادری جوایز بسیاری از سوی ناسا و مراکز بین‌المللی گرفته است که مدال مشاهیر فضاوری فضایی و حایره‌ی لیبرال (برای شخصیت‌های تأثیرگذار بر جهان) از جمله‌ی آن‌هاست. او پس از مدیریت مأموریت‌های مریخ، در گامی دیگر، مدیر برنامه‌ریزی و راهبردی پروژه‌های آزمایشگاه جت پروپالشن شد.



آلن گات

متولد ۱۹۴۷ میلادی

فیزیکدان متخصص ذرات، اهل آمریکا که به کیهان‌شناسی تغییر رشته داد. در سال ۱۹۷۹ نظریه‌ی تورم را بنیان نهاد که بر مبنای آن، عالم در مدت کسری از ثانیه (۱۰^{-۳۳} ثانیه) و درست بلافاصله پس از مه‌بانگ، از اندازه‌ی یک پروتون به اندازه‌ی یک پرتقال درشت رسیده است. در این ساختار، فضا - زمان در همه‌ی جهات به‌طور یکسان گسترش پیدا کرده‌اند.

واژه‌نامه

یادآوری: کلماتی که با حروف سیاه چاپ شده‌اند، خود، مدخل هستند.

آلودگی نوری Light pollution

تابشی در آسمان که نور چراغ‌های خیابان و آلودگی‌های جزئی مسبب آن‌اند و دید رصدگران را از جرم‌های کم‌فروغ محدود می‌کند.

ابر اُرت oort cloud

توده‌ی کروی عظیمی از خرده‌سیاره‌های یخی، به پهنای حدود ۱/۶ سال نوری که خورشید و سیاره‌ها را احاطه کرده است. این منطقه شامل میلیاردها هسته‌ی دنباله‌دار است.

ابر ملکولی molecular cloud

ابری میان‌ستاره‌ای که بیش‌تر از ملکول‌های هیدروژن و کمی از ملکول‌های دیگر مانند مونوکسید کربن تشکیل شده است.

اتم Atom

کوچک‌ترین بخش یک عنصر که از سه نوع ذره‌ی زیراتمی ساخته شده است: پروتون، نوترون و الکترون.

اثر دوپلر Doppler Effect

تغییر فرکانس (بسامد) امواجی (صوت یا تابش) که در حین دور شدن منبع موج از ناظر یا نزدیک شدن به او، اتفاق می‌افتد.

اثر گل‌خانه‌ای Greenhouse Effect

افزایش دما که به سبب به دام افتادن حرارت بازتاب شده از سطح سیاره به فضا به وسیله‌ی گازهایی مانند دی‌اکسید کربن، متان و بخار آب، در جو آن رخ می‌دهد.

اجرام اعماق آسمان (ژرفاسمان) Deep-sky Objects

واژه‌ای کلی برای سحابی‌ها، خوشه‌های ستاره‌ای و کهکشان‌ها و دیگر اجرام بسیار دور.

اختفا occultation

عبور یک جرم سماوی با زاویه‌ای بزرگ‌تر، از مقابل جرمی دیگر با اندازه‌ی ظاهری کوچک‌تر که سبب پنهان شدن آن می‌شود؛ مثلاً وقتی ماه روی ستاره‌ای دوردست را می‌پوشاند، اختفا رخ می‌دهد.

اسطرلاب Astrolabe

ابزار نجومی قدیمی که برای اندازه‌گیری و پیش‌بینی موقعیت و حرکت اجسام در آسمان از آن استفاده می‌شد.

اکسیژن oxygen

عصری حیاتی برای گسترش حیات که در کیهان جزو عناصر سنگین فراوان است. اکسیژن ۲۰ درصد از جو زمین را تشکیل می‌دهد.

الکترون Electron

نگاه کنید به اتم

انتقال به آبی blue shift

انتقالی در خطوط طیفی به سوی انتهای آبی طیف. این انتقال، نشان می‌دهد که جسم گسیل‌کننده‌ی این تابش در حال نزدیک شدن به ماست. (اثر دوپلر)

انرژی تاریک Dark Energy

نگاه کنید به ثابت کیهان‌شناختی.

انفجار بزرگ (مه‌بانگ) Big Bang

حادثه‌ای ناگهانی که حدود ۱۳/۷ میلیارد سال پیش به تولد کیهان منجر شد.

اوج Aphelion

نقطه‌ای در مدار یک جسم که در آن‌جا بیش‌ترین فاصله را از خورشید دارد.

اوج زمینی Apogee

دورترین نقطه‌ای که ماه یا ماهواره‌ای مصنوعی در مدار زمین به آن می‌رسد.

بازوی محلی Local Arm

هم‌چون بازوی جبار، یکی از بازوهای مارپیچی کهکشان راه شیری که خورشید و ما در حاشیه‌ی آن قرار داریم.

بلazar Blazar

کهکشانی فعال و هم‌خانواده‌ی اخترش که با زاویه‌ای خاص قرار گرفته است؛ به‌طوری که از روی زمین تابش‌هایی را می‌بینیم که مستقیم از مرکز بسیار پرنرژی آن ارسال می‌شود.

پادماده Antimatter

ماده‌ای ساخته شده از ذرات ربر تمی با ویژگی‌های مساوی و متضاد از نظر بار الکتریکی، در مقایسه با ماده‌ی عادی

پارسک Parsec

فاصله‌ای که در آن ستاره یا هر جسم دیگری دارای اختلاف منظر یک ثانیه‌ی قوس است. این فاصله‌ی قراردادی برابر است با ۳/۲۶ سال نوری.

پرتو کیهانی Cosmic Ray

ذره‌ای کوچک و پرسرعت با بار الکتریکی که از فضا می‌آید.

پرتوهای گاما Gamma Rays

بخشی از تابش الکترومغناطیس با طول موج بسیار کوتاه که پُرانرژی‌ترین جرم‌های کیهان آن‌را ارسال می‌کند

پوسته Crust

لایه‌ی سنگی یا یخی سطح یک سیاره یا قمر.

تابش الکترومغناطیس Electromagnetic radiation

امواج انرژی که فوتون‌هایی آن‌ها را حمل می‌کنند و می‌توانند از میان فضا و ماده عبور کنند. این تابش با سرعت نور حرکت می‌کند و شامل پرتوهای گاما (کوتاه‌ترین و پُرانرژی‌ترین طول موج) تا امواج رادیویی (بلندترین و کم‌انرژی‌ترین طول موج) است.

تابش زمینه‌ی کیهانی background radiatieu

تابش رادیویی بسیار ضعیفی که از سراسر آسمان ارسال می‌شود و باقی‌مانده‌ی تابش انفجار بزرگ است.

تاج Corona

لایه‌ی بالایی و بسیار داغ جو خورشید که فقط در زمان خورشیدگرفتگی کامل به شکل هاله‌ای کم‌نور دیده می‌شود. این لایه در جو هر ستاره‌ی دیگری نیز تاج نام دارد.

اختلاف منظر parallax

تغییری ظاهری در موقعیت جسمی نزدیک نسبت به زمینه‌ی دوردست، وقتی که از دو نقطه‌ی متفاوت دیده شود. اخترشناسان از تفاوت منظر دو سوی مدار زمین برای سنجش فاصله‌ی ستاره‌های نزدیک ستاده می‌کنند.

تورم

inflation

دوره‌ای از انبساط سریع که در کمتر از یک ثانیه پس از انفجار بزرگ رخ داد.

ثابت کیهان‌شناختی cosmological constant

ممکن است یکی از ویژگی‌های پنهان فضا، که نخستین بار اینشتین وجود آن را در روابط خود یافت، انرژی خلأ یا خود فضایی در حال انبساط باشد و سبب نوعی نیروی پادگرانش یا انرژی تاریک شود که به انبساط کیهان شتاب دهد.

ثابت هابل Hubble Constant

شتاب انبساط کیهان که بر حسب کیلومتر بر ثانیه به ازای هر میلیون پارسک دورتر عنوان می‌شود.

ثانیه‌ی قوس Arc second

واحدی که اخترشناسان برای اندازه‌گیری اندازه یا جدایی جرم‌ها در آسمان از آن استفاده می‌کنند. یک ثانیه‌ی قوس برابر با $\frac{1}{۳۶۰۰}$ درجه است.

جرم Mass

میزان ماده‌ی موجود در یک جسم یا میزان تأثیرپذیری آن از گرانش.

جرم سماوی celestial object

هر جسمی که در آسمان می‌بینیم، از جمله سیاره‌ها، ستاره‌ها و کهکشان‌ها جرم سماوی است.

جو Atmosphere

لایه‌ای از گاز که گرانش یک سیاره یا قمر دور آن نگه می‌دارد. لایه‌های خارجی یک ستاره پس از نورسپهر آن نیز جو نامیده می‌شوند.

چاه گرانشی Gravitational well

احتیای فضا و زمان که به سبب گرانش جسمی پُرجرم، مانند یک ستاره، رخ می‌دهد.

چشم غیر مسلح (چشم برهنه) Naked Eye

دید چشم انسان بدون کمک ابزارهای رصد. واژه‌ی غیر مسلح برای هر جرمی به‌کار می‌رود که باید در وضعیت خوبی برای رصدگری معمولی باشد.

چشمی Eyepiece

عدسی کوچک و معمولاً قابل تعویضی است که در انتهای تلسکوپ برای دیدن تصویر آن نصب می‌شود. چشمی، تصویری را که آینه یا عدسی اولیه می‌سازد، بزرگ می‌کند.

خط جذبی

Absorption Line

خطی تیره در طیف که به سبب جذب تابش طول موجی خاص، به وسیله اتم‌ها شکل می‌گیرد. اخترشناسان از خطوط جذبی برای شناسایی عناصر در ستاره‌ها و کهکشان‌ها استفاده می‌کنند.

خط نشری

Emission Line

خطی درخشان در طیف یک جسم که اتم‌هایی آن‌را ایجاد می‌کنند که در طول موجی خاص انرژی رها می‌کنند. خطوط نشری معمولاً از گاز داغ در یک سحابی یا ستاره سرچشمه می‌گیرند

خورشیدگره (خورشیدگره)

Heliosphere

فضای درون شعاع ۱۰۰ واحد نجومی از خورشید که منطقه‌ی اثرگذاری باد خورشیدی است

خوشه‌ی ستاره‌ای

cluster stellar

مجموعه‌ای از ستارگان که به صورت توده‌ای انبوه و درخشان تحت تأثیر گرانش متقابل دور یکدیگر گرد آمده‌اند.

خوشه‌های کهکشانی

Galaxy cluster

گروهی از کهکشان‌ها که در اثر گرانش کنار هم جمع شده‌اند.

خوشه‌ی باز

open cluster

خوشه‌ی ستاره‌ای است با ستاره‌های کم تراکم و عمدتاً جوان.

خوشه‌ی گروی

Globular cluster

خوشه‌ی ستاره‌ای است بسیار متراکم با ستاره‌های پیر و تقارن کروی.

دایره‌البروج

Ecliptic

خطی فرضی دورتادور آسمان که حرکت ظاهری خورشید در طول یک سال روی آن اتفاق می‌افتد و بیش‌تر سیاره‌ها هم در نزدیکی آن دیده می‌شوند. در حقیقت، این خط، تصویر مدار زمین دور خورشید روی کره‌ی آسمان است.

درجه

Degree

واحد پایه برای اندازه‌گیری زوایا، $\frac{1}{360}$ یک دایره‌ی کامل.

درخشندگی

Luminosity

میزان انرژی ارسال شده از ستاره به صورت تابش

در هر ثانیه. این کمیت به نسبت درخشندگی خورشید نیز بیان می‌شود.

دریا

(جمع Mare (Maria

ناحیه‌ی وسیع و تیره‌ای بر سطح ماه که در ابتدا تصور می‌شد دریاهایی روی ماه‌اند؛ اما حالا می‌دانیم که فرورفتگی‌های عظیمی هستند که مدت‌ها پیش از گدازه پر شده‌اند

دنباله‌دار

comet

جسمی کوچک از جنس یخ و غبار سنگی از نوع خردسپاره‌ها. وقتی دنباله‌داری به خورشید نزدیک می‌شود، حرارت خورشید یخ‌ها را به گاز تبدیل می‌کند و سری گازی و درخشان و دم‌هایی از غبار و گاز می‌سازد.

دوتایی گرفتگی

Eclipsing Binary

یک جفت ستاره در مداری به دور هم، به‌طوری که از دید زمین، ستاره‌ها از مقابل و پشت هم عبور کند

دوره‌ی تناوب مداری

Orbital period

زمانی که طول می‌کشد تا یک جسم یک بار در مداری، دور جسم دیگر بگردد.

دهانه‌ی برخوردی

crater

گودالی فنجانی‌مانند بر سطح قمر یا سیاره که در اثر برخورد یک شهاب‌سواره شکل گرفته است.

ذره

Particle

نگاه کنید به اتم.

راه شیری

Milky way

نام کهکشانی که ما در آن ساکن هستیم و نوار شبح‌گونی از ستاره‌ها در آسمان، زمانی که در جهت صفحه‌ی کهکشانمان به آسمان نگاه می‌کنیم.

زخ‌گرد

Libration

پدیده‌ای در چرخش ماه که باعث می‌شود رصدگران کمی بیش از نصف سطح آن‌را ببینند.

رشته‌ی اصلی

Main sequence

ناحیه‌ای بر نمودار هرتسپرونگ - راسل که خورشید و بیش‌تر ستاره‌ها آن‌جا قرار دارند. ستاره‌های روی رشته‌ی اصلی به کمک واکنش‌های هسته‌ای، که در آن‌ها هیدروژن به هلیوم تبدیل می‌شود، انرژی تولید می‌کنند و در حالتی تقریباً پایدارند.

رشته‌ی کیهانی

Filament

رشته‌ای از خوشه‌ها و آب‌خوشه‌های کهکشانی که در پهنای وسیعی از فضا گسترده شده است. رشته‌ها و دیواره‌های کیهانی بزرگ‌ترین ساختارها در عالم‌اند و با فضاهای عظیم خالی به نام تهی‌جا از هم جدا می‌شوند.

رُمبش

collapse

فروریزش ناگهانی یک جرم روی خود بر اثر نیروی گرانش؛ مانند رُمبش هسته‌ی ستاره و تبدیل آن به یک ستاره‌ی نوترونی یا سیاه‌چاله.

روشنایی

Brightness

نگاه کنید به درخشندگی و قدر.

ریزگرانش

Microgravity

گرانش بسیار کمی که در مدار زمین یا هر جرمی به سبب حرکت سقوط آزاد دائمی - هوی‌لار ایجاد می‌شود. ریزگرانش واژه‌ای بسیار دقیق‌تر از گرانش صفر یا بی‌وزنی است؛ زیرا حرکت فضاپیما همیشه در یک جهت، کمی گرانش تولید می‌کند.

ریزموج

Microwave

نوعی موج رادیویی که کوتاه‌ترین طول موج رادیویی را دارد و در مرز امواج فروسرخ است.

ریزموج زمینه

Microwave background

نگاه کنید به تابش زمینه‌ی کیهانی.

سال نوری

Light year

واحدی استاندارد در اندازه‌گیری‌های نجومی. بر اساس فاصله‌ای که نور با سرعت حدود ۳۰۰ هزار کیلومتر بر ثانیه در مدت یک سال طی می‌کند؛ و تقریباً معادل ۹/۵ میلیون میلیون کیلومتر است.

ستاره‌ی چندتایی

Multiple star

سه ستاره یا بیش‌تر که به سبب گرانش خود در مداری گرد هم در گردش‌اند.

ستاره‌ی دوتایی

Double star

نگاه کنید به منظومه‌ی دوتایی.

ستاره‌ی دور قطبی

Circumpolar star

هر ستاره‌ای که از مکان رصدگر به‌نظر می‌رسد غروب نمی‌کند و همواره دور قطب آسمان می‌گردد.

ستاره‌ی غول

Giant star

ستاره‌ای که به آخرین مرحله‌ی تحول خود رسیده و ابعادش بزرگ شده، روشنایی‌اش افزایش یافته و رنگش تغییر کرده است. ستاره‌های خورشیدمانند به غول سرخ تبدیل می‌شوند؛ ستاره‌هایی با بیش از ۱۰ برابر جرم خورشید، به آب‌غول تبدیل می‌شوند که درخشندگی‌ترین ستاره‌های کیهان هستند.

ستاره‌ی نوترونی

Neutron star

ستاره‌ای رُمبیده که عموماً از نوترون تشکیل شده است و فراوان‌ترین بازمانده‌ی انفجار ابرنواختری است.

سحابی

Nebula

ابری از گاز و غبار در فضا. سحابی‌ها زمانی پدیدار می‌شوند که نور ستاره‌ای را بازتاب دهند یا جلوی نوری را که از پشت سرشان می‌آید، سد کنند یا از گرمای خود تابش کنند.

سرعت فرار

escape velocity

سرعتی که یک جسم باید داشته باشد تا بتواند از دام گرانش جسمی دیگر فرار کند. سرعت فرار برای زمین ۱۱٫۲ کیلومتر بر ثانیه است. سرعت فرار برای مریخ ۵٫۰ کیلومتر بر ثانیه است.

سی.سی.دی

CCD (Charged-Coupled Device)

کوتاه‌شده‌ی عبارت ابزار مزدوج‌کننده‌ی بار الکتریکی که ابزاری بسیار کارآمد برای ثبت تصاویر روی تراشه‌ی الکترونیک حساس به نور و ارائه‌ی تصویر به صورت دیجیتال است.

سیارک

Asteroid

جسمی سنگی - فلزی در فضا، از نوع خردده سیاره‌ها که اندازه‌ی آن‌ها از چند متر تا حدود ۹۰۰ کیلومتر متغیر است.

سیاره‌ی بیرونی

outer planet

هر سیاره‌ای در منظومه‌ی شمسی که بیرون کمربند سیارک‌هاست، شامل چهار سیاره‌ی گازی غول‌پیکر.

سیاره‌ی درونی

inner planet

هر سیاره‌ای در منظومه‌ی شمسی که درون کمربند سیارک‌هاست شامل چهار سیاره‌ی سنگی.

سیاره‌ی زیرین

inferior planet

هر سیاره‌ای در منظومه‌ی شمسی که در مقایسه با زمین، در مدار نزدیک‌تری به خورشید قرار دارد، شامل عطارد و زهره

سیاهچاله

Black Hole

یک جسم زمبیده که گرانش در اطراف آن، آنقدر زیاد است که هیچ چیز، حتی نور، از آن نمی‌گریزد.

شفق قطبی

Aurora

تابش رنگارنگی، بیش‌تر سبز و قرمز، که در نواحی نزدیک قطب‌های زمین در آسمان دیده می‌شود. دلیل ایجاد این تابش، برخورد ذرات باردار باد خورشید با گازهای جو زمین است.

شهاب

Meteor

ردی نورانی در آسمان (به آن تیر شهاب هم می‌گویند) که حاصل سوختن شهاب‌واره‌های کوچک حین ورود به جو زمین است

شهاب‌سنگ

Meteorite

شهاب‌واره‌ای که به سطح سیاره یا قمر برسد. ممکن است جایی که شهاب‌واره با سطح برخورد می‌کند، دهانه‌ای بسازد

شهاب‌واره

Meteoroid

قطعاتی از سنگ و غبار از سیارک‌ها و دنباله‌دارها که در فضا پیدا می‌شوند.

صفر مطلق

Absolute zero

کمترین دمای ممکن، برابر با $273/15^{\circ}\text{C}$ - درجه‌ی سانتی‌گراد، دمای صفر در مقیاس کلوین.

صورت فلکی

Constellation

شکل‌هایی که ستاره‌ها در آسمان می‌سازند و بیش‌تر به نام شخصیت‌ها یا موجودات افسانه‌ای نام‌گذاری شده‌اند. امروزه اخترشناسان صورت‌های فلکی را مناطقی از آسمان محسوب می‌کنند، نه مجموعه‌ای از ستاره‌های منفرد.

عالم

Cosmos

واژه‌ی دیگری برای کیهان.

عنصر

Element

هر یک از مواد پایه‌ی طبیعت که به کمک واکنش‌های شیمیایی تجزیه‌پذیر نیستند. هر عنصر ویژگی‌های منحصر به فردی دارد.

غبار

Dust

دانه‌های میکروسکوپی در فضا که نور ستاره را جذب می‌کنند یا بازتاب می‌دهند. غبار، «دوده‌ی»

ستاره‌های سرد است که گاهی در ابرهای تیره‌ی عظیم، کنار هم جمع می‌شوند.

غول گازی

Gas Giant

سیاره‌ای عظیم، مانند مشتری که بیش‌تر از مواد گازی بسیار حجیم تشکیل شده است.

فاصله‌ی کانونی

Focal Length

فاصله‌ی بین عدسی یا آینه و نقطه‌ای که پرتوهای نوری ورودی در آن جمع شده و کانونی شده است.

فام‌سپهر (رنگ‌کره)

Chromosphere

پایین‌ترین لایه‌ی جو خورشید. این لایه به رنگ قرمز مایل به صورتی می‌درخشد؛ اما فقط زمانی می‌توان آن‌را دید که نورسپهر درخشان پوشیده شده یا در طول موج خاصی کم‌نور شده باشد.

فراخورشیدی

Extrasolar

جسمی که متعلق به خورشید نیست؛ خارج از منظومه‌ی شمسی.

فراز مینی (برون‌زمینی)

Extraterrestrial

چیزی که متعلق به زمین نیست. معمولاً در مورد گونه‌های حیات گفته می‌شود.

فرکانس (بنسآمد)

Frequency

تعداد قله‌های امواج تابش الکترومغناطیس که در هر ثانیه از یک نقطه بگذرند.

فروسرخ

Infrared

تابش حرارتی یا نوعی از تابش الکترومغناطیس با طول موجی بلندتر از نور مرئی.

قدر

Magnitude

روشنایی جرمی سماوی که با مقیاسی از اعداد بیان می‌شود. به اجسام پرنور اعداد کوچک (گاهی منفی) نسبت داده می‌شود و اجسام کم‌فروغ اعداد بزرگی دارند. هر یک قدر تفاوت برابر $2/5$ بار تفاوت روشنایی است. قدر ظاهری میزان روشنایی جسم، آن طوری است که در آسمان زمین دیده می‌شود. قدر مطلق میزان روشنایی واقعی جسم است.

قدر ظاهری

Apparent Magaitude

نگاه کنید به قدر.

قرص برآفرایشی

Accretion Disc

قرصی از مواد که با حرکتی مارپیچی به درون سیاه‌چاله می‌روند. جیس قرص‌هایی در اصراف ستاره‌های نوترونی، کوتوله‌های سفید و ستاره‌های جوان تیر پیدا شده است.

قلاّب‌سنگ

Fly-By

روشی در مواجهه‌ی یک فضاپیما با یک سیاره، دنباله‌دار یا سیارک که در آن، فضاپیما قصد ورود به مداری به دور آن جسم یا فرود بر آن‌را ندارد و فقط با کمک گرانش آن در مداری دیگر قرار می‌گیرد یا بر سرعت حرکت خود می‌افزاید.

کانون

Focus

نقطه‌ای در تلسکوپ که پرتوهای نوری، که آینه یا عدسی اصلی جمع کرده است، در آن نقطه به هم می‌رسند و تصویر را شکل می‌دهند.

کربن

Carbon

یکی از معمولی‌ترین عناصر در کیهان که ستاره‌ها آن‌را تولید می‌کنند. کربن پایه‌ی همه‌ی انواع ساخته‌شده‌ی حیات است.

کره‌ی آسمان

Celestial sphere

کره‌ای فرضی که زمین را احاطه کرده است و به‌نظر می‌رسد جرم‌های سماوی روی آن قرار گرفته‌اند. اخترشناسان موقعیت ستاره‌ها را بر حسب میل (برابر عرض جغرافیایی) و بُعد (برابر طول جغرافیایی) آن‌ها بر کره‌ی آسمان می‌سنجیدند.

کمر بند کویپر

Kuiper Belt

ناحیه‌ای در منظومه‌ی شمسی شامل میلیون‌ها جسم یخی دنباله‌دارمانند. این ناحیه ورای مدار نپتون گسترده شده است و پلوتون را نیز شامل می‌شود.

کوتوله‌ی قهوه‌ای

Brown Dwarf

جسمی کوچک‌تر از ستاره، اما بزرگ‌تر از سیاره. این جسم تابش گرمایی تولید می‌کند؛ اما نور مرئی ندارد.

کهکشان

Galaxy

مجموعه‌ای شامل میلیون‌ها ستاره و گاز و غبار که در اثر گرانش کنار هم جمع شده‌اند. کهکشان‌ها خود نیز به صورت گروه‌ها و خوشه‌هایی جمع شده‌اند.

کهکشان بیضوی

Elliptical Galaxy

کهکشانی به شکل بیضی یا تقریباً دایره در آسمان و بدون بازوهای مارپیچی. کهکشان‌های بیضوی

عموماً از ستاره‌های پیر تشکیل شده‌اند و شامل غبار و گاز بسیار اندکی هستند.

کهکشان فعال

Active Galaxy

کهکشانی با یک آبرسیاه‌چاله‌ی فعال در مرکز که مقدار عظیمی انرژی تولید می‌کند.

کهکشان مارپیچی میله‌ای

Barred spiral Galaxy

کهکشانی با بازوهای مارپیچی که از طریق میله‌ی مستقیمی از ستاره و گاز، به برآمدگی مرکزی کهکشان متصل است.

کهکشان نامنظم

Irregular Galaxy

کهکشانی بدون هیچ شکل مشخص. کهکشان‌های نامنظم معمولاً کوچک، پُر از گاز و شامل ستاره‌های پیر و جوان‌اند؛ مانند ابرهای ماژلان.

گدازه

Lava

سنگ‌ها یا ماده‌ی مذابی که از درون سیاره یا قمر بیرون می‌آید.

گرانش

Gravity

نیروی جاذبه بین همه‌ی اجسامی که جرم دارند؛ مانند کشش بین زمین و ماه.

گرفت

Eclipse

پدیده‌ی حاصل از افتادن سایه‌ی یک جرم سماوی روی سطح دیگری. ماه‌گرفتگی زمانی رخ می‌دهد که سایه‌ی زمین روی ماه می‌افتد. خورشید‌گرفتگی زمانی رخ می‌دهد که سایه‌ی ماه روی زمین می‌افتد.

گروه محلی

Local Group

خوشه‌ای از حدود ۵۰ کهکشان اغلب کوچک که کهکشان راه شیری و مسلسل، کهکشان‌های بزرگ آن هستند.

گشودگی دهانه

Aperture

قطر آینه یا عدسی اصلی تلسکوپ؛ مقیاسی برای سنجش میزان نوری است که جمع‌آوری می‌کند.

گوشته

Mantle

لایه‌ای سنگی که بین پوسته و هسته‌ی درونی سیاره قرار دارد.

لیتون

Lepton

هریک از سه نوع ذره‌ی ریز اتمی با بار منفی که در

انفجار بزرگ ایجاد شدند؛ فقط الکترون (نگاه کنید به اتم) هنوز وجود دارد.

ماده Matter

هر آنچه جرم دارد و فضایی اشغال می‌کند.

ماده تاریک Dark Matter

ماده‌ای نامرئی که با توجه به اثر گرانش آن باید بیش‌تر جرم کیهان را شامل شود. ماده‌ی تاریک شاید شامل ذرات ویمپ، نوترینوها و کوتوله‌های قهوه‌ای باشد.

ماده میان‌ستاره‌ای Interstellar Matter

اتم‌ها و ملکول‌هایی در فضا که بین ستاره‌ها هستند.

ماه Moon

قمر طبیعی یک سیاره و نام خاص قمر زمین است. قمر سایر سیاره‌ها نیز اسامی خاصی دارد؛ مانند «یو» که قمر مشتری است.

متان Methane

گازی تشکیل شده از کربن و هیدروژن.

متغیر قیفاووسی Cepheid variable

نوعی ستاره‌ی متغیر که روشنایی و اندازه‌ی آن تغییر می‌کند. طول دوره‌ی تغییرات به قدر مطلق ستاره بستگی دارد. اخترشناسان از قیفاووسی‌ها برای اندازه‌گیری فواصل در کیهان استفاده می‌کنند.

محموله Payload

باری که یک وسیله‌ی پرتاب به مدار به فضا حمل می‌کند یا سوار بر یک ماهواره می‌شود.

محور Axis

خطی فرضی که از مرکز یک سیاره یا ستاره می‌گذرد و این جسم حول آن می‌چرخد.

مدار Orbit

مسیر حرکت یک جسم دور جسم دیگری یا جرم و گرانش بیش‌تر. مانند مدار قمرها دور سیاره‌ها، سیاره‌ها دور ستاره‌ها و ستاره‌ها دور مرکز کهکشان.

مدار بیضوی Elliptical orbit

مداری به شکل دایره‌ای کشیده. همه‌ی مدارها بیضوی‌اند؛ دایره نیز نوع خاصی از بیضی است.

مدار زمین‌ثابت Geostationary Orbit

مداری در ارتفاع ۳۵۸۰ کیلومتری بر فراز استوای زمین که در آن مدت، زمان گردش ماهواره به دور زمین با زمان چرخش زمین به دور محور خود برابر است. به همین سبب، به‌نظر می‌رسد که ماهواره در آسمان و بالای سر منطقه‌ی خاصی از زمین ثابت است.

مدار نزدیک زمین Low Earth Orbit

مداری حدود ۲۰۰ کیلومتر بر فراز سطح زمین. این مدار مخصوص برخی پروازهای شاتل فضایی، ایستگاه‌های فضایی و بسیاری از ماهواره‌هاست.

مغناطسفره Magnetosphere

حبابی دور سیاره که در آن‌جا میدان مغناطیسی به حد کافی قوی است که باد خورشیدی را دور نگاه‌دارد.

مقابله opposition

نقطه‌ای در مدار یک سیاره که در آن‌جا از دید ناظر زمینی سیاره در سوی مخالف خورشید و درست مقابل زمین قرار می‌گیرد. مقابله به زمان وقوع این پدیده نیز گفته می‌شود. این وضعیت بهترین زمان برای دیدن آن سیاره است.

مقارنه Conjunction

نقطه‌ای در مدار یک سیاره که در آن‌جا از دید زمین درست با خورشید در یک خط قرار می‌گیرد. به زمانی نیز گفته می‌شود که این اتفاق رخ می‌دهد. گاهی به نزدیکی هر دو جرم سماوی در آسمان نیز مقارنه می‌گویند.

ملکول Molecule

مجموعه‌ای از اتم‌ها که به وسیله‌ی پیوندهای شیمیایی به هم متصل شده‌اند و مانند یک واحد رفتار می‌کنند.

منظومه‌ی دوتایی Binary system

یک جفت ستاره در مداری به دور هم.

میان‌ستاره‌ای Interstellar

بین ستاره‌ها.

میان‌کهکشانی Intergalactic

بین کهکشان‌ها.

میدان مغناطیسی Magnetic Field

نیروی مغناطیسی که یک سیاره، ستاره یا کهکشان تولید می‌کند و در فضا گسترش می‌یابد.

میکرومتر Micrometer

یک میلیونوم متر یا یک هزارم میلی‌متر.

نابودی Annihilation

نابودی یک ذره‌ی ریز اتمی و هم‌تای پادماده‌ی آن وقتی با هم ملاقات می‌کنند.

نانومتر Nanometer

یک میلیاردم یک متر.

نمودار هرتسپرونگ - راسل Hertzsprung - Russell Diagram

نموداری که نشان می‌دهد ارتباط بین درخشندگی و رنگ یک ستاره چیست. چنین نموداری نشان می‌دهد که همه‌ی ستاره‌ها به چند گونه‌ی اصلی تعلق دارند. از این نمودار می‌توان برای ردگیری چرخه‌ی زندگی ستاره‌ها و تخمین درخشندگی یا فاصله‌ی آن‌ها کمک گرفت.

نواختر Nova

ستاره‌ی کوتوله‌ی سفیدی در یک منظومه‌ی دوتایی که از ستاره‌ی هم‌دم خود موادی را به سمت خود می‌کشد و قرصی فزاینده برای خود درست می‌کند. وقتی انفجاری در گاز در حال فروریختن بر کوتوله ایجاد می‌شود، ستاره به نواختری هزاران هزار بار درخشان‌تر از پیش تبدیل می‌شود.

نوترون Neutron

نگاه کنید به اتم.

نوترینو Neutrino

ذره‌ی زیراتمی بسیار فراوانی که طی هم‌جوشی هسته‌ای در ستاره‌ها و انفجار بزرگ تولید می‌شود. نوترینوها جرم بسیار کمی دارند و به سبب اثرگذاری کم بر محیط، آشکارسازی آن‌ها بسیار مشکل است.

نور Light

تابش الکترومغناطیس در طول موج‌هایی که برای چشم انسان مرئی‌اند.

نور مرئی Optical Light

نگاه کنید به نور.

نیتروژن Nitrogen

گازی که ۷۹ درصد جو زمین را تشکیل داده است.

نیم‌سایه Penumbra

بخش خارجی‌تر و روشن‌تر لکه‌ی خورشیدی و بخش روشن‌تر سایه.

واحد نجومی Astronomical Unit (AU)

فاصله‌ی متوسط بین زمین و خورشید که معادل ۱۴۹.۶ میلیون کیلومتر است.

هاله Halo

ناحیه‌ای کروی در اطراف کهکشان مارپیچی که شامل ماده‌ی تاریک، خوشه‌های ستاره‌ای کروی و ستاره‌های پیر و مرده است.

هسته Nucleus (Nuclei)

بخش مرکزی اتم که تقریباً همه‌ی جرم آن در آن‌جا متمرکز شده است. هسته از پروتون‌ها و نوترون‌ها تشکیل شده است (البته به‌جز هسته‌ی هیدروژن که یک تک‌پروتون است).

هلیوم Helium

دومین عنصر فراوان و دومین عنصر سبک در کیهان که بر اثر انفجار بزرگ و هم‌جوشی هسته‌ای در ستاره‌ها تولید شده است و می‌شود.

هم‌جوشی هسته‌ای Nuclear Fusion

به‌هم پیوستن هسته‌ی اتم‌ها بر اثر درهم کوبیده شدن در دما و فشار بسیار زیاد برای ساختن اتم‌های سنگین‌تر. هم‌جوشی هسته‌ای منبع انرژی ستاره‌هاست.

هم‌گرایی گرانشی Gravitational Lensing

انحراف نور جسمی دوردست زمانی که از میان منطقه‌ای با گرانش قوی عبور می‌کند و به‌طور تصادفی برای ناظر زمینی سبب هم‌گرا شدن پرتوهای نوری جسم دور و روشن‌تر شدن آن می‌شود.

هیدروژن Hydrogen

فراوان‌ترین و سبک‌ترین عنصر کیهان، ماده‌ی اصلی تشکیل‌دهنده‌ی ستاره‌ها و جرم قابل مشاهده‌ی کهکشان‌ها.

یون‌کره Ionosphere

ناحیه‌ای از جو زمین که ذرات به صورت یون‌هایی با بار الکتریکی‌اند. این ناحیه بین ۵۰ تا ۶۰۰ کیلومتر بالای سطح زمین است.

نمایه‌ی موضوعی

یادآوری: کلماتی که با حروف سیاه چاپ شده‌اند، خود مدخل هستند.

۲

آبوکروماتیک ۲۹۰

آپولو ۱۶۶

آتش‌گوی ۱۶۵

آتن ۱۶۶

ایمیتوس ۱۵۳

آدافر، والتر ۲۴۷

آدرستا ۱۴۶

آذرگوی ۱۶۵

آرمسترانگ، نیل ۱۱۷، ۱۱۶، ۷۳

آریل ۱۵۵

آسف هال ۱۳۵

آفرودیت ۱۲۸

آکروماتیک ۲۹۰

آلدین، پاژ ۱۱۶

آلفر، رالف ۲۲۷

آلکوی، پره میگل ۹۱

آمالتای ۱۴۶

آمور ۱۶۶

آناهیتا ۱۲۸

۱

ابر اورت ۱۶۰

ابر غول ۲۰۱

ابر نواخت ۲۳۹

ابر خس ۱۸۳

ابر غول‌ها ۱۸۹

ابرنواخت ۲۰۴

ابرهای مولکولی ۲۱۶

ابزار مزدوج‌کننده‌ی بار الکتریکی ۲۳

ابن سینا ۱۲۰

ایتیک تطبیقی ۲۳

اثر دوپلر ۱۸۳، ۲۴۰

اثر ریز هم‌گرایی ۱۹۹

اثر گل‌خانه‌ای ۱۰۷

اخترشناسی پرتو ایکس ۳۴

اخترشناسی رادیویی ۳۰

اختروش ۲۴۱

اختلاف منظر ۱۸۷، ۲۶۵

ادینگتون، سر آرتور ۱۸۱

ارسطو ۲۳۹

اریس ۱۵۸

اسپیتر، لیمان ۱۷

اسکای لب ۸۰

اسلافر، وستو ملوین ۲۴۱

اشمیت - کاسگرین ۲۹۳

اشمیت، مارتن ۲۴۱، ۲۲۷

اعتدالین ۲۶۴

افق روی داد ۲۱۰

اگریدی، اسکات ۶۶

ال نینو ۶۳

انبساط فضا ۲۴۰

انبساط کیهان ۲۴۰

اندامی، آذر ۱۳۱

انرژی تاریک ۲۵۵، ۲۵۲

انسان‌زف ۸۱

انسلا دوس ۱۵۳

انصاری، انوشه ۷۳

انقراض جمعی موجودات ۱۰۸

انکه، یوهان ۱۵۱

اوپنهایم، جی. رابرت ۳۱۱

اوج ۱۱۰، ۹۴

اورانوس ۱۵۴، ۹۴

اورت، یان ۲۲۵

اورینتال ۱۲۰

اومبریل ۱۵۵

اهله ۱۱۰

اهله‌ی ماه ۱۱۱

اینشتین، آلبرت ۹۰، ۹۱، ۱۸۱، ۲۴۲

ب

باد خورشیدی ۱۷۹

بادام‌های سفید ۱۴۵

بادبان خورشیدی ۹۱

باده ۲۴۱، ۲۳۷، ۲۰۵

بارش اسدی ۱۶۴

بارش برساشی ۱۶۴

بازوی برساش ۲۲۰

بازوی قوس ۲۲۲

باندی، هرمان ۲۴۱

بدر ۱۱۰

براهه، تیکو ۲۲۱

بردلی، جیمز ۲۶۵

بسامد ۳۰

بسل، دریک ۱۸۶

بسل، فردریک ۱۸۷

بعد ۲۷۰

بوزجانی، ابوالوفا ۱۲۰

بوزون X ۲۵۳

بوزون‌های W و Z ۲۵۳

بوزون‌های هیگز ۲۵۳

بیلی، سولان ۱۹۷

پ

پارسک ۱۸۶

پارسون، ویلیام ۲۳۱

پاندورا ۱۵۰

پرتو ایکس ۳۴

پروکیسما - قنطورس ۱۸۶

پرومته ۱۵۰

پس‌ماند فضایی ۶۸

پلوتون ۱۵۸، ۹۴

پنزیاس، آرنو ۲۴۶، ۲۴۷

پیل، جیم ۲۴۹

پیکسل ۲۴

ت

تابش سینکروترون ۳۱

تابش فروسرخ ۲۸

تاج ۱۷۹، ۲۸۴

تپاختر ۱۹۹، ۲۰۷

تپاختر بیوه ۲۲۳

ترکیب سخت‌افزاری ۸۲

تریتون ۱۵۷

تسبیج دانه‌های بیلی ۱۸۱

تسیولکوفسکی ۱۲۱

تصویر موزاییکی ۱۲۳

تکامل ۱۰۸

تکینگی ۲۰۸، ۲۱۰

تلسکوپ دابسونی ۲۹۲

تلسکوپ فضایی هابل ۱۴

تلسکوپ‌های بازتابی ۱۸، ۲۹۲

تلسکوپ‌های شکستی ۱۸

تلسو ۱۵۳

تورم کیهانی ۲۴۲

تورن، کیپ ۹۱

توریجلی، لوانجلیستا ۱۰۷

تومبا، کلاید ۱۵۸

تیتان ۱۵۳، ۹۷

تیو، دنیس ۸۷

ث

ثابت کیهان‌شناختی ۲۵۲

ج

جزر ۱۱۲

جفریز، هرولد ۱۰۱

جوزمین ۱۰۶

جینز، جیمز ۱۰۱

چ

چاندراسکا، سوپرامانیان ۲۰۳

چاه‌های گرانشی ۲۴۰

چپقی ۲۹۰

ح

حباب محلی ۲۱۹

حد قدر ۲۸۳

حرکت تقدیمی ۲۶۵

حضيض ۱۱۰

حضيض ۹۴

حلقه‌ی الماس ۱۸۱

حلقه‌ی اینشتین ۲۵۱

خ

خرده سیارک ۱۰۱

خرده سیاره ۱۶۶

خوارزمی ۱۲۰

خورشید ۱۷۷

خورشیدگرفتگی ۱۸۰

خوشه‌های کروی ۱۹۶

خوشه‌ی باز پروین ۱۹۴

خوشه‌ی سنبله ۲۳۴

خوشه‌ی صوفی ۱۹۵

خوشه‌ی قلائص ۱۸۷

خوشه‌ی گیسو ۲۳۵

خیام ۱۲۰

د

دایره‌البروج ۲۷۰

دایسون، فریم ج. ۲۵۵

دبران ۱۸۷، ۲۰۱

درخشندگی بصری ۱۸۸

دریای باران‌ها ۱۱۹

دریای بحران‌ها ۱۱۸

دریک، فرانک ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹

دنباله‌دار شومیکر - لوی ۹، ۱۶۳

دنباله‌دار هالی ۱۶۳

دنباله‌دار هیل - پاپ ۱۶۲

دوربین دوچشمی ۲۸۸

دهانه‌های برخوردی ۱۲۷

دهانه‌ی کرولف ۱۲۰

دهانه‌ی مانیکوآگان ۱۷۱

دهانه‌ی مید ۱۳۰

دهانه‌ی هن‌بری ۱۷۰

دهانه‌ی هومبولت ۱۱۸

دیک، رابرت ۲۴۷

دیموس ۱۳۳

دیون ۱۵۳

ذ

ذات‌الحلق ۱۰

ذرات مجازی ۲۴۳

ر

رأس الفول ۱۸۵

راسل، هنری ۱۸۸

راه شیری ۱۹۷، ۲۱۴

ربع جلوی (ربع دیواری) ۱۰

رجل الجبار ۲۰۱

رخ‌گرد ۱۱۴

ردف ۲۰۱

رده‌ی طیفی ۱۸۲

رصدخانه ۲۰

رصدخانه‌های ربوتی ۲۰

روپس‌آلای ۱۱۸

روتون ۸۵

ریتز، یوهان ۳۳

ریسمان کیهانی ۲۵۳

ز

زحل ۱۴۸، ۹۴

زلدوویچ، یاکوف ۲۴۹

زمین ۱۰۲، ۹۴

زمین‌ساخت صفحه‌ای ۱۰۴

زویکی، فریتزر ۲۰۵

زویکی، ویتس ۲۵۰

زهره ۱۲۶، ۹۴

زج ۸

زیست‌زف ۸۱

ژ

ژانوس ۱۵۳

ژرف هابل ۲۴۹

ژول، جیمز ۱۲۰

ژیروسکوپ ۱۴

س

ساعت‌های آفتابی ۲۶۵

سال کیبسه ۲۶۵

سال نوری ۱۸۶

ستاره‌های دورقطبی ۲۷۲

ستاره‌های نارس ۱۸۹

ستاره‌ی شهابتگ ۲۶۴

ستاره‌ی قطبی ۲۶۵

سحابی ۱۹۲

سحابی آتا - شاه‌تخته ۱۸۴

سحابی پروانه ۲۰۲

سحابی جبار ۱۹۳، ۲۱۸، ۲۲۷

سحابی چشم‌گربه ۲۰۲

سحابی حلقه ۲۰۲

سحابی خرچنگ ۲۰۶، ۲۲۱

سحابی خورشیدی ۱۰۰

سحابی رتیل ۲۲۷

سحابی روزت ۲۲۱

سحابی سه‌تکه ۲۲۳

سحابی سیاره‌نما ۲۰۲

سحابی قو ۱۹۲

سحابی مرداب ۲۸۱، ۲۲۳

سحابی هلیکس ۲۷۸، ۲۱۸

سراجی، همایون ۱۳۹

سرس ۱۵۸

سرسو ۲۸۴، ۲۸۰، ۲۷۸، ۲۶۵

سرگی کرولف ۷۰

سماک رامج ۲۰۱

سهیل ۲۰۱

سیارک ۱۶۶

سیارک وستا ۱۶۶

سیاره‌ساز ۱۰۱

سیاره‌های بیرونی ۹۴

سیاره‌های درونی ۹۴

سیاره‌های کوتوله ۱۵۸

سیاره‌ی اورسا ۲۵۶

سیاه‌چاله ۲۰۸

سیفرت، کارل ۲۳۷

طول موج ۲۶

طیف ۱۸۳

طیف‌نگار ۱۸۳

ع

عدسی‌های گرانشی ۱۷

عطارد ۱۲۲، ۹۴

عنکبوتی‌ها ۱۲۷

عیوق ۲۰۱

غ

غبار کیهانی ۲۱۷

غول سرخ ۲۰۰

غول‌ها ۱۸۹

ف

فابریسیوس، داویت ۱۸۵

فام سپهر ۱۷۸

فرانیهوف، یوزف فون ۱۸۳

فرکانس ۳۰

فرورانش ۱۰۵

فریدمان، الکساندر ۲۵۵

فضای میان‌ستاره‌ای ۲۱۶

فلات آفرودیت ۱۳۰

فلاستید، جان ۲۲۱، ۲۰۵

فوبوس ۱۳۳

فوتبه ۱۵۳

فولر، ویلیام ۲۰۵

ق

قانون اول کپلر ۹۷

قانون دوم کپلر ۹۷

قانون سوم کپلر ۹۷

قانون عکس مربع ۱۸۷

قانون هابل ۲۴۰

قدر ۱۸۲

قرص برافزایشی ۲۰۸

قرص پیش‌سیاره‌ای ۱۹۳

قلانص ۲۱۹

قلب‌العقرب ۲۰۱

قله‌ی سیف ۱۳۱

قله‌ی ماکسول ۱۳۰

قمرهای چوپان ۱۵۰

قنطور ۱۶۱

ک

کتورگی، هوارد م. ۲۵۵

کارن ۱۵۸

کاسینی، جیووانی ۱۵۳، ۱۵۱، ۲۰

کالیبو ۱۵۳

کالیستو ۱۴۷

کالینز، مایکل ۱۱۶

کانت، امانوئل ۲۳۱

کاوش‌گر مدارگرد ۹۶

کاوش‌گرهای گذرنده ۹۶

کایرون ۱۶۱

کپلر، جیمز ۱۵۱

کپلر، یوهان ۲۶۵، ۲۳۹

کپلر، یوهانس ۲۰۵

کرم‌چاله ۲۱۱، ۹۱

کریلوف ۱۲۰

کسوف ۱۸۰

کسوف حلقوی ۱۸۱

کلاوسیوس، ردلف ۲۵۵

کلاهدک یخی قطبی ۱۴۱

کلون، لرد ۲۵۵

کمربند حیات ۱۰۸، ۱۰۲

کمربند کوبی‌پر ۱۶۰

کمک گرانشی ۹۶

کوارک ۲۵۳

کوپرنیک، نیکلاس ۲۶۵، ۹۵

کوتوله‌های سفید ۲۰۳، ۱۸۹

کوتوله‌ی سیاه ۱۹۱

کوکونی، جوزیه ۲۵۹

کوموروف، ولادیمیر ۷۳

کوه‌های آپنین ۱۱۹

کوبی‌پر، جرارد ۱۵۷، ۱۵۳

کهکشان راه شیری ۲۱۴

کهکشان سیاه‌چشم ۲۷۶

کهکشان کلاه مکزیکی ۲۸۰

کهکشان گرداب ۲۹۳، ۲۳۳

کهکشان مثلث ۲۲۸

کهکشان مسلسل ۲۲۸

که‌کشند ۱۱۲

گ

گات، آلن ۲۴۳

گارنت ۲۰۱

گاگارین، یوری ۷۰

گاله، یوهان ۱۵۷، ۱۵۶

گاموف، ژرژ ۲۴۳

گانمید ۱۴۷

گراوتون ۲۵۳

گرچکو، گئورگی ۷۵

گرمایش جهانی ۱۰۷

گروه محلی ۲۲۸

گلن، جان ۷۲

گلوئون ۲۵۳

گلیشر، جیمز ۱۰۷

گنبدی‌های کلوچه‌ای ۱۲۷

گودریک، جان ۱۸۵

گیسوان برنیکه ۲۳۵

ل

لئونوف، آلکسی ۷۳

لاپلاس، پیر ۱۰۱

لاکپر، نورمن ۱۸۱

لایه‌ی اوزون ۱۰۷

لب‌های رادیویی ۲۳۶

لکه‌های خورشیدی ۱۷۷، ۱۷۶

لومتر، ژرژ ۲۴۳

لویت، هنریتا ۲۲۷، ۱۸۵

م

ماچوها ۲۵۰

ماده‌ی میان‌ستاره‌ای ۲۱۶

ماریسون، فیلیپ ۲۵۹

ماریوس، زیمون ۱۴۳

ماژلان، فردیناند ۲۲۷

ماه ۱۱۰

ماه قمری ۱۱۱

ماه نجومی ۱۱۱

ماه‌گرفتگی ۱۱۱

متغیرهای قاجعه‌بار ۱۸۴

متغیرهای فورانی ۱۸۴

متیس ۱۴۶

مد ۱۱۲

مدار ۹۴

مدارگرد ۷۳

مدارهای فراخورشیدی ۱۹۸

مرکز جرم ۱۹۵

مرگ ستاره ۱۹۰

مریخ ۱۳۲، ۹۴

مشتري ۱۴۲، ۱۸۳، ۹۴

مغناط کره ۱۰۳

منصوری، رضا ۲۱

منظومه‌ی شمسی ۱۷۷

مو - قیفاووس ۲۰۱

موتور یونی ۸۸

مورگان، ویلیام ۲۲۰

مونتاناری، جیمینانو ۱۸۵

مهبانگ ۲۴۲، ۲۷

مه‌کشند ۱۱۲

میان‌وزن ۲۰۸

میچل، جان ۲۱۱

میراندا ۱۵۵

میل ۲۷۰

میماس ۱۷۰

مینکوسکی، رودولف ۲۳۷

ن

نادری، فیروز ۱۳۹

نپتون ۱۵۶، ۹۴

نظریه تسخیر ۱۰۱

نظریه‌ی تورم ۲۴۳

نظریه‌ی نسبیت عام ۲۵۱

نمودار هرتسپرونگ - راسل ۱۸۹

نواختر ۱۸۴

نوترینو ۲۵۳، ۱۷۵

نور سپهر ۱۷۶

نهر ماژلانی ۲۲۷

نیروهای بنیادی ۲۴۲

نیروهای کشندی ۱۰۱

و

وگنر، آلفرد ۱۰۵

ولز، هربرت جورج ۱۳۵

وُن دگراف ۱۲۱

ونوس ۱۲۸

ویلز، جان ۲۱۱

ویلسون ۲۴۷

ویلسون، رابرت ۲۴۶

ویمپ ۲۵۳، ۲۵۱

ه

هابل، ادوین ۱۷، ۲۳۱، ۲۳۹، ۲۴۱، ۲۴۳

هادلی، جورج ۱۰۷

هارتویگ، ارنست ۲۰۵

هاگیتز، ویلیام ۱۹۳

هاگینس، ویلیام ۱۸۳

هالی، ادموند ۱۰۷، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۹۷

هاوکینگ، استفان ۲۰۹، ۲۱۱، ۲۵۵

هرتسپرونگ، اینار ۱۸۸

هرشل، جان ۱۹۷

هرشل، کارولین ۲۳۴

هرشل، ویلیام ۱۳۴، ۱۹۳، ۲۰۲

۲۳۹، ۲۳۴، ۲۳۱

هریوت، توماس ۱۲۱

هس، هری ۱۰۵

هلن ۱۵۳

هندرسون، توماس ۱۸۷

هوش‌مندان فرازمینی ۲۵۸

هوک، رابرت ۱۸۷

هولیوس، یوهانس ۱۸۵

هویگنس، جیووانی ۱۳۴

هویگنس، کریستین ۱۵۱، ۱۵۳

۱۹۳

هویل، فرد ۲۰۵، ۲۴۱

هی، استنلی ۳۱، ۲۳۷

ی

یدالجوزا ۱۸۸، ۲۰۱

یوسف‌زاده، فرهاد ۳۱

یون ۸۸

ش

شاخص ۲۶۵

شارل مسیه ۲۰۵

شانه‌ی شکارچی ۲۰۱

شاره‌ها ۱۷۹

شفق‌های قطبی ۱۰۳، ۱۷۹، ۲۸۴

شکاف اوفیر ۱۴۰

شکاف‌های کرک‌وود ۱۶۷

شنون لوسید ۸۱

شهاب ۱۶۴

شهاب‌سنگ ۱۱۵، ۱۶۸

شهاب‌سنگ آهنی ۱۶۸

شهاب‌سنگ سنگی ۱۶۸

شهاب‌سنگ سنگی - آهنی ۱۶۸

شهاب‌سنگ سنگی بارول ۱۶۸

شهاب‌واره ۱۶۴

ص

صورالکواکب ۲۲۷

صورت فلکی برساوش ۱۸۵

صورت فلکی ثور ۱۸۷

صورت فلکی خرچنگ ۱۹۴

صورت فلکی دجاجة ۱۸۴

صورت فلکی ذات‌الکرسی ۲۰۵

صورت فلکی شکارچی ۱۸۸

صورت‌های فلکی ۲۷۱

صوفی، عبدالرحمن ۱۲۰، ۱۹۷، ۲۲۷، ۲۳۱

ط

طرح ازما ۲۵۹

طوق قطبی ۱۲۸

کاوش در اینترنت WWW.

منظومه‌ی شمسی
www.nineplanets.org

منظومه‌ی شمسی
<http://solarsystem.nasa.gov>

سال جهانی نجوم
www.astronomy2009.org

ماهنامه‌ی آسترونومی
www.astronomy.com

انجمن متجمان بدون مرز
www.astrowb.org

گرفت‌های ماه و خورشید (پیش‌بینی، نقشه، آموزش)
<http://eclipse.gsfc.nasa.gov>

انجمن نجوم پاسفیک
www.astrosociety.org

انجمن بین‌المللی آسمان تاریک (مبارزه با آلودگی نوری)
www.darksky.org

رصد ماهواره‌ها
www.heavens-above.com

آموزش بدفهمی‌های نجومی
www.badastronomy.com

نجوم برای نوجوانان
www.kidsastronomy.com

موجودات فرازمینی
www.seti-inst.edu

علم به زبان ساده
<http://www.enchantedlearning.com>

مرکز نجوم ادیب اصفهان
<http://adib.isfahan.ir>

باشگاه نجوم تهران
<http://astro.ir>

وبگاه‌های انگلیسی

ماهنامه اسکای اند تلسکوپ
www.skyandtelescope.com

اخبار فضا و نجوم
www.spaceflightnow.com

اخبار فضا و نجوم
www.universetoday.com

تصویر روز نجوم جهان
<http://apod.nasa.gov>

اقلیم فضایی (پدیده‌های نجومی)
www.spaceweather.com

سازمان فضایی ناسا
www.nasa.gov

تلسکوپ فضایی هابل
www.hubblesite.org

جهان در شب (تصاویر آسمان شب از سراسر جهان)
www.twanight.org

اخبار و مطالب فضا
www.space.com

آزمایشگاه جت پروپالشن (کاوشگرهای فضایی)
<http://jpl.nasa.gov>

وبگاه‌های فارسی

ماهنامه‌ی نجوم
www.nojumnews.com

انجمن نجوم ایران - شاخه آماتوری
www.asiac.ir

آسمان پارس
www.parssky.com

موسسه‌ی آسمان شب (تلسکوپ و ابزارهای نجومی)
www.telescope.ir

درگاه خبری نجوم ایران
www.astronomy.ir

دانش فضایی
www.spacescience.ir

انجمن صلح ستارگان
www.starpeace.org

آسمان شب ایران
www.nightsky.ir


تصویر روز نجوم جهان (ترجمه‌ی روزانه از وبگاه ناسا)
<http://apod.nojum.ir>


تصویر روز ستاره‌شناسی ایران
www.apod.ir

آسمان تاریک (مبارزه با آلودگی نوری)
www.asemanetarik.com

انجمن نجوم مشهد
www.toosky.ir







نشر طلایی
www.talae.ir

ISBN 978-964-96407-9-2



9 789649 640792

۲۵۰۰۰ تومان